Nyomtatható katalógus

Treemail — Készült: 2026.11.10. 15:55

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
DÉZSÁSOK ÉS TÉLIKERTIEK			
Solar Flare fáklyaliliom	**Kniphophia x 'Solar Flare'**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Solar Flare fáklyaliliom egy félörökzöld évelő, amely dús, fürtös habitust és sötétzöld, fűszerű leveleket növeszt. Fő büszkesége a magas, felálló virágszárakon nyíló, élénk nap-sárga színű virágok. A virágzatok tömött tüskékből állnak, melyek akár 2,5-3 cm hosszúak is lehetnek. A növény magassága a virággal együtt 90-110 cm, szélessége 60-75 cm körül van. Virágzási ideje június szeptemberig tart, ami rendkívül hosszú időszaknak számít.
Gondozási útmutató

Fényigény: Teljes napsütés az ideális számára

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, jól tűri a szárazságot

Metszés: Virágzás után az elvirágzott szárakat érdemes eltávolítani

Télállóság: Jó télállóságú, de kemény teleken téli védelem javasolt

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával támogatható

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Vegyes virágágyásokba ideális választás

Konténeres nevelésre kiváló

Társítás: Füves levelű növényekkel, hibiszkuszokkal jól harmonizál

Méhlegelőként is kiválóan alkalmazható

Ajánlott kerttípusok

Napos kertek

Mediterrán kertek

Sziklakertek

Modern kertek

Városi kertek

Alacsony jázmin	**Jasminum humile**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Az alacsony jázmin, (Jasminum humile) 1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken a lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásaitelveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvetésű talajt igényel, Az agyagos kötött talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzástkövetően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épület lábazatok, egyéb épületek mellett.Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé szétesõ a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertekbe félárnyékos, szórt árnyékos részekre. USDA zóna: 7b			
Alba Nivea selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'**	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Alba Nivea selyemmirtusz, Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, 'Alba Nivea' változat a faj fehér virágú, nemesített formája. A fajta neve („Alba” = fehér, „Nivea” = hófehér) a virágok tiszta, hófehér színére utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, hófehér virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot. A közönséges név („selyemmirtusz”) mellett ismert még „indiai selyemmirtusz”, „görög ciprus” vagy „krepp mirtusz” néven is, utalva a virágszirmok finom, selymes, ráncolt (krepp-papír szerű) textúrájára.
Külső megjelenés
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-4 méter, szélessége 1,5-3 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-t is nőhet. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek viszonylag kicsik, 3-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, tojásdadok vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-30 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Alba Nivea' fajta virágának színe tiszta, hófehér, a virágok közepe néha sárgás vagy zöldessárga. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák. A nyitott virágok a napos időben a leglátványosabbak, de a krepp-papír szerű szirmok még részleges árnyékban is dekoratívak.
Termés
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő, laza, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, kijelölt cserjéknek (pl. rózsa vagy virágos cserjék számára kifejlesztett) műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), mielőtt a növény kihajtana. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, sérült, keresztben növő, egymást dörzsölő ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást, mert a selyemmirtusz az új hajtásokon virágzik.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés: A selyemmirtusz 'Alba Nivea' mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a fiatal növények és a hajtásvégek érzékenyebbek a fagyra. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország északi, keleti részein vagy a hideg, szeles télen a fiatal növényeket takarni (vastag lombtakaró, szalmával, fenyőgallyakkal takarni a gyökérterületet). A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A fagyott hajtásokat tavasszal, a metszéskor vágjuk vissza. A növény a gyökérzettől újrahajthat.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de bizonyos problémák előfordulhatnak:

Lisztharmat: A leggyakoribb betegség, különösen párás, szellőzetlen körülmények között. Fehér, lisztszerű bevonat a leveleken. Megelőzhető szellős hely ültetéssel, a levelek beázásának elkerülésével.

Levélfoltosság: Különböző gombák okozhatják, a leveleken barna vagy fekete foltok jelennek meg.

Levéltetű, pajzstetű, takácsatka: Ritkán, de megjelenhetnek. Ellenük használhatunk rovarölő vagy atkaölő szereket.

Felhasználás a kertben
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' a méretének, színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a fehér virág más színekkel is jól kombinálható

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, házikertekbe – a délies hangulatot erősíti

Sorfa utcákba, parkokba, közterületekre – a hámló kéreg és a virág miatt dekoratív

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de teleltetésről gondoskodni kell

Bonszai alapanyagnak – a kis méret, a hámló kéreg, a virág és az őszi szín miatt bonszainak is nevelhető

Változatos növénytársítások
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' fehér virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus), orvosi zsálya (Salvia officinalis) – a fehér és a lila-kék színek harmonikus, friss, elegáns párost alkotnak, és a mediterrán hangulatot erősítik

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia) – a fehér és a sárga vidám, napsütötte összképet ad

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Rózsaszín és piros virágú növények: Csodamogyoró (Hamamelis), törpecseresznye (Prunus glandulosa) – a kontrasztos színek izgalmas, élénk hatást keltenek			
Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a sötétzöld lombot			
Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca) – a füvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját			
Ősszínű díszcserjék: Sárga levélű növények (pl. aranyvessző), vörös levelű juharok – a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel			
Télálló pálmák, ciprusok, borókák – a mediterrán, szubtrópusi hangulatot erősítik			
USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna - pl. Budapest, Dél-Dunántúl) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április-május) tehető ki a szabadba).			
Aranyfoltos japán babérsom	**Aucuba japonica 'Picturata'**	18 900 Ft	18 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel az Aranyfoltos japán babérsom (Aucuba japonica 'Picturata') egyedülálló szépségét! Ez az örökzöld díszcserje aranyozott levelével tökéletes választás árnyékos kertrészek díszítéséhez, konténeres elhelyezéshez vagy színes sövények kialakításához. Erős gyökerű, egész évben ültethető növényeinket gondosan szállítjuk! A nyári öntözést meghálálja.
Termékjellemzés és gondozási útmutató
Külső jellemzők

Méret: 1,5-2 m magas, 1-1,5 m széles

Levelek: Nagy, bőrös, sötétzöld alapon arany sárga középponti folttal

Virágok: Apró, bíborvörös virágok tavasszal

Termés: Vörös bogyók ősszel (nőivarú egyedek)

Előnyös tulajdonságok

Örökzöld: Egész évben díszít

Árnyéktűrő: Kiválóan alkalmazható árnyékos helyeken is

Légzszennyezés-tűrő: Alkalmazható városi környezetben

Fagytűrő: -15°C-ig ellenáll

Ültetési javaslatok

Talaj: Nedves, jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj

Fényigény: Árnyékos vagy részleges árnyékos helyek

Ültetési idő: Tavasztól őszig

Tőtávolság: 80-100 cm sövényként való alkalmazáshoz

Gondozás

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot nem kedveli

Metszés: Tavasszal könnyen formálható

Trágyázás: Tavasszal lassú oldódású trágya ajánlott

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tervezési javaslatok			
Társítás: Harmonizál Hortenzsiával, Hóstával vagy Rhododendronnal			
Ajánlott helyek:			
Árnyékos kertrészek			
Konténeres elhelyezés			
Előtetők és udvarok			
7a-9b USDA-zóna			
Babe® selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Babe®'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Babe® Selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Babe®') – A kompakt, halványrózsaszín virágú törpe selyemmirtusz
A selyemmirtusz Babe®, Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta, amely a Mighty Myrtles sorozat tagja. A fajta neve („Babe”) a kompakt, törpe méretre utal. Ez a növény a nyár második felétől kora őszig halványrózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, kompakt mérete miatt pedig kiválóan alkalmas kis kertekbe és konténeres nevelésre.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A selyemmirtusz Babe® a faj egyik legkompaktabb, legsűrűbb növekedésű változata. Kifejlett magassága 40-60 cm, szélessége 30-50 cm között alakul, ami kiválóan alkalmassá teszi kis kertekbe és konténeres nevelésre. Növekedési erélye közepes, habitusa sűrű, bokros. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek közepes méretűek, 3-7 cm hosszúak, oválisak vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fényes, fonáka világosabb. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára vagy vörösre színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, tömött, bugaszerű fürt. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Babe®' fajta virágának színe halványrózsaszín, a pasztell, áttetsző halványrózsaszíntől a közepes, meleg rózsaszín árnyalatig. A szín a napfény hatására különösen szépen érvényesül. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart (júliustól szeptemberig), a növény bőségesen, hosszan virágzik. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A selyemmirtusz Babe® napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 6,0-6,5) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni a szerkezet javítása és a pH beállítása érdekében.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 2-3 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés és alakítás: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, fagykárosodott, sérült, keresztező, egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Telelés és fagytűrés: A selyemmirtusz Babe® mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -15°C és -18°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval, szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte teljesen szárazon kell tartani; 4-6 hetente egyszer, nagyon kevés vizet adjunk neki, csak annyit, hogy a földje teljesen ne száradjon ki.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A selyemmirtusz Babe® kompakt méretének, halványrózsaszín színének és hosszú virágzási idejének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Kis kertekbe, előkertekbe – a kompakt méret (40-60 cm) miatt ideális választás.

Szoliterként – egy-egy példány a teraszon, a bejáratnál is feltűnő.

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható.

Dézsás növényként teraszokra, erkélyekre, balkonládákba, tetőkertekbe – a tökéletes konténeres növény, mivel nem nő nagyra.

Mediterrán hangulatú kertekbe – a délies hangulatot erősíti.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A selyemmirtusz Babe® halványrózsaszín virágai, sötétzöld lombja és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák – a fehér és a halványrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak.

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia atriplicifolia) – a halványrózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mediterrán hangulatú összképet adnak.

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia) – a halványrózsaszín és a sárga vidám, kontrasztos, napsütötte hatást keltenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj (Sedum) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a halványrózsaszín virágokat.

Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), árvalányhaj (Stipa tenuissima), csenkesz fajták – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a selyemmirtusz Babe® mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajthat.)

Balkon füge	Ficus carica 'Little Miss Figgy'	4 750 Ft	5 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Balkon füge (Ficus carica 'Little Miss Figgy') egy kifejezetten törpe növekedésű, kompakt fügefajta, amelyet a balkonra és teraszra, valamint kis kertekbe való termesztésre nemesítettek. Kiválóan alkalmas dézsában való nevelésre, miközben ízletes, sötétlila gyümölcsöket hoz. Kompakt, bokros növekedés. Magassága 1-1.8 méter, szélessége 1-1.2 méte. Gyümölcse sötétlila/bordó héjú, epervörös húsú. Körte alakú, kb. 35-40 gramm. Íze igen édes.
Little Miss Figgy (MAJOAM) törpe füge (Ficus carica Little Miss Figgy MAJOAM) a fügefajták legújabb generációjának egyik legizgalmasabb képviselője. Ez a nemesített, védett fajta (MAJOAM) minden előnyét hordozza a hagyományos fügéknek, de egy törpe, kompakt méretben, ami lehetővé teszi, hogy szinte bárki élvezhesse a saját termésű, édes fügét, még a legkisebb erkélyen vagy teraszon is.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Little Miss Figgy valóban törpe méretű: kifejlett állapotban mindössze 1-1,5 méter magas és ugyanilyen széles. Habitusa sűrű, bokros, ágai rövidek, ami miatt természetesen is kompakt marad, alig igényel metszést. Levelei a hagyományos fügéhez hasonlóan nagyok, karéjosak, 3-5 lebenyűek, élénkzöld színűek, de a rövidebb ízközök miatt sűrűbben állnak. A termések a fajta egyik nagy büszkesége: a viszonylag kis fa méretéhez képest nagy, közepes vagy nagy méretű fügék érnek rajta, amelyek héja sötétlila vagy barnáslila, belsejük élénk pirosas-rózsaszín, tele apró, roppanós magokkal. Ízük rendkívül édes, mézes, kellemes fügearomával. A fajta bőtermő, gyakran már az első évben terem, és a termések nyár közepétől őszig, két hullámban érnek.
Igényei és gondozási útmutató: A Little Miss Figgy a legszebb terméseit teljes napos, széltől védett helyen hozza. A meleg, napfényes fekvés elengedhetetlen a termések beéréséhez és az édes íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű, közepesen tápanyagú virágföldet vagy kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, ezért a cserepek aljára feltétlenül tegyünk vízelvezető réteget (kavics, agyagkavics). Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, különösen nyáron, a virágzás és terméskötődés idején. A konténerben nevelt növényt gyakrabban kell öntözni, mint a szabadföldit. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal és nyár elején, fügeműtrágyával vagy lassú felszívódású, káliumban gazdag műtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése minimális: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat. Formázó metszésre alig van szükség, mivel a növény természetesen is kompakt marad. Teleltetése egyszerű: konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen, például lépcsőházban, garázsban vagy hideg üvegházban teleltethető. Szabadföldbe ültetve téli takarást (lomb, szalma, fólia) igényel a fiatal növény.
Kertstílus és növénytársítások: A Little Miss Figgy a kis helyű kertek és teraszok sztárja. Teraszokon és erkélyeken dekoratív cserépben a mediterrán hangulatot idézi, miközben hasznos, ehető hozamot biztosít. Városi kertekben és kisebb udvarokban a helyhiány miatt ideális választás. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, modern cserepekhez a nagy, formás levelei izgalmas textúrát adnak. Mediterrán kertekben a hagyományos füge kicsinyített másaként is megállja a helyét. Akár nagyobb ablakpárkányra vagy fűtött téli kertbe is ültethető.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: A Little Miss Figgy mellé ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris) és oregánó (Origanum) egy igazi mediterrán hangulatú teraszt varázsolnak, és mind hasonló gondozást igényelnek. Törpe citrusfélékkel: Egy kaliforniai paprikafával (törpe narancs, citrom vagy kumquat) párosítva a déli, egzotikus hatás tökéletes. Évelő virágokkal: A cserép aljába vagy köré ültetett macskamenta (Nepeta), árvácska (Viola) vagy büdöske (Tagetes) színesíti a kompozíciót és vonzza a beporzó rovarokat. Díszfüvekkel: A törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis Adagio) vagy a tollborzfű (Pennisetum) lágy, mozgó kontrasztot ad a füge nagy, keményebb leveleihez. Hagymásokkal: A cserépbe tavasszal virágzó krókuszok (Crocus) vagy apró nárciszok (Narcissus) ültethetők a füge tövébe, amelyek a tavaszi hónapokban, még a füge lombfakadása előtt nyílnak.
A Little Miss Figgy tökéletes választás azok számára, akik szeretnének saját termésű fügét, de nincs helyük egy hagyományos, nagy fügefának. Konténerben nevelve akár egy balkonon is tartható, és a kompakt mérete miatt könnyen mozgatható, így a teleltetés is egyszerű. USDA besorolása: 7-10 (konténerben teleltetve 5-6-os zónában is tartható).
A 'Little Miss Figgy' egy törpe fügefajta, amelyet a 'Violette de Bordeaux' ősi francia fajta ágmutációjaként fedeztek fel . Legfőbb előnye a kompakt, tömör növekedési formája, ami ideálisvá teszi nemcsak kisebb kertek, hanem balkonok és teraszok számára is, ahol konténerben nevelhető.
A növény levelei nagyok, jellegzetesen karéjosak és sötétzöldek, magas dekoratív értékkel. Gyümölcse közepes méretű, körte alakú, sötétlila héjjal és élénk epervörös, lédús hússal . Íze kiváló, intenzíven édes . A füge partenokarp, azaz beporzás nélkül is képes termést hozni, így egyetlen fa is elegendő a bő terméshez.
Gondozási útmutató
A 'Little Miss Figgy' viszonylag könnyen nevelhető, de a szükséges alapfeltételeket be kell tartani a sikeres termesztéshez.

Fényigény: A teljes napsütés elengedhetetlen a jó fejlődés és a gyümölcsképződés érdekében. Naponta legalább 6-8 óra közvetlen napfényre van szüksége.

Talaj: A jól vízelvezető, laza szerkezetű talaj a legfontosabb. A konténerbe ültetéskor ügyeljünk a megfelelő lyukak és esetleg egy kavicsréteg elhelyezésére az alján. A növény nem igényes, de a tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben.

Öntözés: Közepes vízigényű. A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, különösen a száraz, forró időszakokban. Kerüljük a túlöntözést, mivel a pangó víz gyökérrothadáshoz vezethet.

Télvédelem: Bár a fajta -10°C - -15°C-ig fagytűrő, a dézsa és a növény töve téli védelemre szorul. A konténert szalmával, jutaszövetekkel be lehet burkolni, a növény tövét pedig levelekkel vagy kéregmulccsal lehet letakarni. Nagyon hideg teleken a növényt érdemes lehet egy fagymentes, világos helyiségbe (pl. garázs, üvegház) átteleltetni.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Metszés: Alapvetően nem igényel radikális metszést. A legfontosabb a száraz vagy gyenge ágak tavaszi eltávolítása. A növény alakja könnyen tartható és szabályozható.

Trágyázás: A növekedési szezon kezdetén, tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassan oldódó műtrágyával történő trágyázás elősegítheti az egészséges fejlődést és a bő termést.

Ültetési javaslatok
Ez a fajta rendkívül sokoldalúan használható fel.

Konténeres nevelés: Kifejezetten dézsa- és cserépben való ültetésre nemesítették, így ez az elsődleges javaslat balkonra és teraszra.

Kis kertek: Korlátozott helyű kertje számára is kiváló választás, akár szoliter növényként, akár gyümölcstermő díszcserjeként.

Díszérték: Nemcsak gyümölcséért, de látványos, exotikus megjelenése miatt is érdemes ültetni, ami mediterrán hangulatot visz a teraszra!

Blue Storm afrikai szerelemvirág	**Agapanthus 'Blue Storm'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Blue Storm afrikai szerelemvirág a Dél-Afrikából származó Agapanthus nemzetség egyik legújabb, legkedveltebb nemesített változata. Ez a fajta az Anthony Tesselaar nemesítő által bevezetett 'Snow Storm' (fehér virágú) fajta természetes mutációjaként jött létre. Kompakt méretének, rendkívül bőséges és hosszan tartó virágzásának, valamint igénytelenségének köszönhetően a kertek és teraszok egyik kedvenc évelője.
Külső megjelenés
A Blue Storm afrikai szerelemvirág kompakt, bokros növekedésű, tőálló évelő. Kifejlett magassága 70-85 cm (a virágzati szárakkal együtt), szélessége 50-60 cm körül alakul. A növény sűrű, szíj alakú, fényes sötétzöld levelekből álló rozettát képez, amely még a virágzás idején és után is dekoratív marad.
A növény legnagyobb dísze a nyár közepén, júniustól augusztusig (akár szeptemberig) nyíló, feltűnő virágzata. A 10-12 cm átmérőjű, gömb vagy félgömb alakú ernyős virágzatok 25-30 darab tölcsér alakú, világos ibolyaskék virágból állnak össze. A virágok a hosszú (70-85 cm), erős, egyenes szárak csúcsán nyílnak. A növény kivételesen bőségesen virágzik: egy 4-5 éves, kifejlett tövön akár 50-100 virágzati szár is megjelenhet egyszerre, ami igazi látványossággá teszi. Virágzási ideje a legtöbb más afrikai szerelemvirág fajtáénál hosszabb, akár 70 napon át is nyílhat.
Virágzás utáni időszak
Az elnyílt virágzatok maghüvelyekké fejlődnek, amelyek ősszel és télen is díszítenek. Ha nem vágjuk le őket, a növény további dekorációs értéket biztosít a kertben a hideg hónapokban is.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel, de a legbőségesebb virágzást teljes napfényben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Nem válogatós, a homokostól az agyagos talajig sok mindenben megél. A legjobban a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tűri, de a rövid ideig tartó szárazságot jól elviseli.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már viszonylag szárazságtűrők, a legjobb virágzást azonban egyenletes talajnedvesség mellett hozzák. Kifejezetten jól viseli a városi körülményeket.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes komposzttal vagy lassú oldódású, káliumban gazdag műtrágyával megtámogatni a bőséges virágzás érdekében. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák a lombozat kárára mehetnek.

Metszés: A növény nem igényel rendszeres metszést. Az elnyílt virágzatokat késő ősszel vagy tavasszal lehet eltávolítani. A kártevők (pl. csigák) távoltartása érdekében az elszáradt leveleket rendszeresen el kell távolítani. A növényt 3-4 évente tavasszal érdemes osztani, hogy megőrizze vitalitását.

Telelés: A Blue Storm afrikai szerelemvirág mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C, -15°C-ot is, de a tartós, -10°C alatti fagyokban a föld feletti része elfagyhat. A növény mély, vastag gyökere azonban általában áttelel, és tavasszal újrahajt. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellett) érdemes ültetni, és télen vastag lombtakaróval (mulcs) takarni. Konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. pince, garázs, lépcsőház) kell teleltetni, 5-10°C között, kevés öntözéssel. A szabadföldi növények esetében a téli takaráson túl az is segíthet, ha a növény tövét ősszel földdel feltöltjük. A növények nem bírják a téli nedvességet és a fagyott talajt.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, betegségekre nem hajlamos. A meztelen csigák és a levéltetvek időnként károsíthatják, de komolyabb problémát nem okoznak.

Felhasználás a kertben
A Blue Storm afrikai szerelemvirág rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Konténeres növényként: Tökéletes választás teraszokra, erkélyekre, bejárati ajtók mellé. Szereti a szűk helyet, és a gyökérzete is jobban virágzik, ha a cserépben „szűkös” körülmények között van.

Talajtakaróként: Tömött, dús lombozatával nagyobb felületeken is kiválóan takarja a talajt.

Szegélynövényként: Ágyások szegélyezésére, előterébe ültetve kiváló.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Vágott virágnak: Hosszú, erős szárai és tartós virágai miatt kedvelt csokoralapanyag.

Tengerparti és városi kertekbe: Jól bírja a sótartalmat és a szennyezett levegőt.

Kertstílus, ahová illik

Mediterrán kertekbe: Kékeslila virágai és szíjas levelei tökéletesen illenek a mediterrán hangulatba.

Városi kertekbe, előkertekbe: Igénytelensége és kompakt mérete miatt ideális választás.

Természetes hatású kertekbe: Csoportosan ültetve, más évelőkkel társítva természetközeli hatást kelt.

Konténeres kertekbe, teraszokra: Az egyik legjobb cserepes virág.

Változatos növénytársítások
A Blue Storm világos ibolyáskék virágai kiválóan kombinálhatók más növényekkel:

Sárga virágú évelők: Kúpvirág, napvirág, aranyvessző – a komplementer színek (sárga és lila) vibráló kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz, perovszkia – az ezüstös szürke kiemeli a kék-lila virágokat.

Fehér virágú évelők: Őszirózsa, gyöngyvirág, párnás őszirózsa – a fehér és a kék-lila harmonikus, elegáns párost alkotnak.

Díszfüvek: Tollbuga, japán vértfű, kék csenkesz – a füvek laza habitusa oldja a liliom tömött formáját.

Alacsony talajtakarók: Árnyéki meténg, pacsifürt – a növény tövében takarhatják a talajt.

USDA besorolása: 8-11 (biztonságosan áttelelő régiók). A megadott télállósági zónák eltérőek a különböző forrásokban. Vannak források, amelyek szerint a fajta akár a 6b (akár 7a) zónában is nevelhető (rövid ideig akár -21°C-ot is elviselhet). A biztonságosabb besorolás szerint azonban 8-11 között van, ahol a tél nem túl zord. Magyarország nagy része a 6-os és 7-es zónákba tartozik, ezért itt a növény téli védelmet (tövek takarása, mulcsozás) igényel, konténerben tartva pedig fagymentes, világos helyen kell átteleltetni.

Bódító illatcserje	**Osmanthus fragrans**	3 950 Ft	4 950 Ft

Gyönyörű örökzöld cserje, vagy idővel akár kisebb fa, mely rendkívül illatos, fehér virágaival kétszer is kényeztet minket, először kora tavasszal, majd ősszel még nagyobb számban! Termései 1- 1,5 cm-es sötétlilás bogyók. Hazánkban kevéssé elterjedt, de mostanra egyre többen ismerik, és keresik, hiszen tudható, hogy védett helyeken nálunk is szépen díszít, nem kell tartani az elfagyásától. 7b-9b USDA-zóna

Brilliant Blue szerelemvirág®	**Agapanthus 'Brilliant Blue'®**	4 450 Ft	4 950 Ft

A Brillant Blue afrikai szerelemvirág (Agapanthus 'Brillant Blue'®) nyár derekától kora őszig a látványos, sötétkék virágaival a kert egyik fő látványossága. Nálunk csak nagyon védett, napos helyre lehet ültetni, de kiváló dézsás növény, miként a tartása megegyezik a leanderével. 8a-10b USDA-zóna

Burkwood illatcserje	**Osmanthus x burkwoodii**	4 450 Ft	4 950 Ft

Méltatlanul ismeretlen hazánkban ez a nemzetség, illetve ennek a nemzetségnek jeles képviselője, a Burkwood illatcserje, mely gyakorlatilag az egész hazánkban ültethető, igénytelen, de annál szerethetőbb örökzöld cserje. A puszpángnak lehetne egy helyettesítő növénye, mert azokkal a tulajdonságokkal, mint örökzöld, igénytelen, sövénynek is alkalmas cserje mind bír, ezen felül tavasszal émelyítően illatos virágai varázslatos hellyé teszik a kertet. Ennek a szinte tökéletes hibridnek a szülei az Osmanthus decorus (Kaukázusi illatcserje) és az Osmanthus delavayi (Delavay illatcserje). 7a-9b USDA-zóna

Cailletier olíva, olajfa	**Olea europaea 'Cailletier'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Cailletier olíva, olajfa (Olea europaea Cailletier) az olajfák egyik legkiválóbb és legismertebb francia fajtája, amely a francia Riviéráról, Nizza környékéről származik. A Cailletier név a provanszál caillet (kavicsos) szóból eredhet, utalva a fajta által kedvelt kavicsos, meszes talajokra. Ez a fajta a kiváló minőségű, lágy, vajas aromájú olaj és a megbízható hozam hármasát kínálja, és a világhírű Nizzai Olívaolaj (AOC Nice) egyedüli alapanyagaként tartják számon. A Cailletier olívaolaját finom, gyümölcsös, enyhén diós, nem csípős, nem kesernyés jellemzők különböztetik meg, ami a gasztronómiai célú felhasználás egyik legkeresettebb olajává teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Cailletier közepes termetű, 4-6 méter magas és 3-5 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 3-6 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A Cailletier levelei a fajtánál kisebbek és keskenyebbek, ami a szárazságtűrését is jelzi. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Cailletier igazi büszkeségei: a bogyók közepes méretűek, 2-4 grammosak, ovális vagy enyhén tojásdad alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek. Húsuk közepesen vastag, a mag aránya közepes. A Cailletier olajhozama közepes vagy magas, akár 18-20% is lehet, és az olaj minősége kiváló. A termések olajpréselésre készülnek, asztali fogyasztásra kevésbé alkalmasak, bár tartósítva is fogyaszthatók.
Igényei és gondozási útmutató: A Cailletier a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és a kiváló minőségű olaj kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Cailletier jól tűri a metszést. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a lisztharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Cailletier a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, különösen a francia Riviéra hangulatát. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad. Provanszi kertekben a levendulával és rozmaringgal alkotott társítása a dél-francia vidék hangulatát idézi.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis), oregánó (Origanum vulgare) és szantolina (Santolina chamaecyparissus) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Cailletier mellé ültetett más olajfafajták (például Frantoio, Leccino, Pendolino, Ascolana) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Cailletier részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Cailletier kiváló választás azok számára, akik saját, kiváló minőségű, lágy, vajas aromájú olívaolajat szeretnének préselni, és egy megbízható, bőtermő, a francia Riviéra hangulatát idéző olajfafajtát keresnek, amely a Nizzai Olívaolaj egyedüli alapanyagaként is ismert. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Cinnabar Silver tűzeső	**Heuchera hybrida 'Cinnabar Silver'**	3 350 Ft	3 750 Ft

A 'Cinnabar Silver' tűzeső izgalmas és szemet gyönyörködtető dísznövény, amelyet érdemes lehet a kertekjeinkbe ültetni. Ez a hibrid növény a Heuchera nemzetségbe tartozik, amely híres a színpompás leveleiről és különleges megjelenéséről. A 'Cinnabar Silver' tűzeső a kertekben vagy akár az erkélyeken és teraszokon is lenyűgöző látványt nyújt, miközben könnyen kezelhető és kevés gondozást igényel. A 'Cinnabar Silver' nevét a lombozatáról kapja, amely egyedülállóan elegáns és varázslatos. A levelek ezüstös szürkések, finoman bronzos árnyalatokkal tarkítva, ami szép kontrasztot hoz létre a kertben. A levelek alakja kerekded vagy szív alakú, és enyhén hullámosak lehetnek, ami tovább növeli a növény dekoratív értékét. A 'Cinnabar Silver' tűzeső közepes méretű, kompakt bokrot alkot, ami ideális a kerti ágyásokhoz, sziklakertekhez és konténerekhez is. A nyári hónapokban apró, rózsaszín vagy korallvirágokat hoz, amelyek több hétig tartó virágzást biztosítanak. Ezek a virágok különleges látványt nyújtanak az ezüstös-szürke lombozat között, és csábítják a pillangókat és a méheket a kertbe. Emellett a virágok szintén alkalmasak vágott virágként is. A Heuchera hybrida 'Cinnabar Silver' könnyen gondozható növény, amely kedveli a részleges árnyékot vagy a naposabb helyeket, amennyiben a talaj laza, jól vízelvezető és tápanyagban gazdag. A rendszeres öntözést meghálálja. Télen hidegebb éghajlati viszonyok között a növény általában visszahúzódik, de tavasszal újra kihajt. A 'Cinnabar Silver' remekül kombinálható más dísznövényekkel, például Hostákkal, Kúszó borostyánnal vagy más színű tűzesőkkel. Szép kontrasztot alkot az élénkzöld növényekkel vagy a sárga virágokkal. Röviden összefoglalva, a Heuchera hybrida 'Cinnabar Silver' lenyűgöző választás a kertbe, amely az ezüstös-szürke lombozatával és különleges megjelenésével feldobja a környezetét. Egyszerűen gondozható és hosszan élvezhető a virágzása és a díszítő levelei miatt.

Citrom illatú kefevirág	**Callistemon citrinus**	3 950 Ft	4 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A citrom illatú kefevirág (Callistemon citrinus), egy rendkívül érdekes örökzöld cserje, nevét az örökzöld, lándzsa formájú levelén elhelyezkedő, citromos illatot árasztó mirigyeiről kapta. Tavasztól nyárig virágai látványos karmazsinvörösek. Nálunk inkánbb nagy bokorrá fejlődik, hazájában, Ausztráliában kis fa is lehet. Ez a különleges megjelenésű növény szinte trópusi hangulatot teremt maga körül. Hajtásai végén fejlődő virágzatai leginkább kicsi üvegmosó kefékre emlékeztetnek, innen kapta a nevét is. Ágai ivesen bókolnak, melyek végén fejlődnek piros virágai, valóban különleges látvány.
Csak azoknak ajánlhatjuk, akik a teleltetést világos, 8-12 Celsius fokos helységben meg tudják oldani. Fagyérzékeny a növény, mely teljes napot igényel, tápanyagbangazdag laza tőzeges talajban fejlődik a legeszebben. Sok vizet nem, de rendszeres locsolást igényel. Az elszárdat virágokat vágjuk le, és a hajtást valamelyest metsszük vissza. Ilyenkor számíthatunk utóvirágzásra is, és nem is nyurgul fel a növényünk.
Az évközi időszakra ki is lehet telepíteni. Edényestől földbe süllyesztve lehet csökkenteni a locsolási szükségeletet. Ügyesen elhelyezve szinte állandó tagjának tűnhet kertünknek annak napsütötte részén.

8b USDA-zóna

Cserjés törpeborostyán	**Hedera helix 'Erecta'**	2 750 Ft	2 750 Ft

A Hedera helix 'Erecta' - Csodásan formált, felkapaszkodó örökzöld növény, amely kerteket és otthonokat varázsol díszesebbé!
Jellegzetes, szív alakú levelei ragyogó, sötétzöld színűek. Szárai Felfelé törő szárai 1 méter magasságot érnek el. A lombozat sűrűsége és tömörsége miatt tökéletesen alkalmas, alacsony hogy falakat, kerítéseket, burkoljon be, így szépen kiemelkedik a környezetéből. Egyedi és látványos vertikális elemeket hozhatunk létre a kertben vagy akár az otthonok homlokzatán, támfalakon.
Az Cserjés törpeborostyán a részleges árnyékot és a napos helyeket is jól tűri, ami lehetővé teszi a széles körű telepítést. A jó vízáteresztő képességű talaj és az időnkénti öntözés hozzájárul a növény optimális egészségének és növekedésének fenntartásához.
A Cserjés törpeborostyán egyszerűen gondozható növény. Az időnkénti metszéssel a méretét és alakját könnyen ellenőrizhetjük. A támrendszerrel vagy hálóval ellátott felületeken az növény könnyen felkapaszkodik, de szükség lehet időnkénti irányításra, hogy megfelelően formálható legyen.

5b USDA-zóna

Csokoládé menta	**Mentha piperita 'Chocolate'**	1 950 Ft	1 950 Ft

A Csokoládé menta (Mentha piperita 'Chocolate') egy aromás növény, amely a hagyományos mentához hasonlóan gazdag illatú és frissítő, ám egyedi jellegzetessége a csokoládés aroma, ami miatt népszerűsége az évek során fokozódott. Küllemében a Csokoládé menta hasonló a hagyományos mentához, kifejlett növényei pedig általában 30-60 cm magasra nőnek. A levelek kicsik, oválisak és sötétzöldek, de néhány csokoládé menta változatban enyhe lilás vagy bordós árnyalat is előfordulhat. Az igazi vonzereje azonban az illata és íze, amely intenzív csokoládé jegyeket mutat, megszólítva az édesség és a menta szerelmeseit. A Csokoládé menta könnyen termeszthető kertben vagy edényben, és kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket. A jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben, így fontos biztosítani a megfelelő vízelvezetést vagy rendszeres öntözést. A növény gyorsan terjedhet, ezért érdemes korlátozott területre ültetni, vagy rendszeresen ellenőrizni a terjedését. A Csokoládé menta kertészkedési szempontból sokoldalú növény. Használhatjuk friss formában, vagy szárítva, így kiválóan alkalmas teák, limonádék és koktélok ízesítésére. Az édes és csokoládés aroma miatt sok süteményhez, desszertekhez, fagylalthoz és csokoládéhoz is hozzáadható, hogy fokozza az ízélményt. A friss mentalevelekkel díszíthetjük desszerteket vagy főételeket, és akár frissítő illatú potpourrikat is készíthetünk belőle. Nemcsak ízletes és illatos, hanem néhány egészségügyi előnnyel is járhat termesztése. A mentát hagyományosan emésztést elősegítő és gyomorproblémákra alkalmazták. A csokoládé menta levelei enyhíthetik a gyomorégést, csillapíthatják az emésztési zavarokat és segíthetnek a stressz és a fejfájás enyhítésében is. A menta illóolaja, amely a csokoládé mentában is jelen van, frissítő hatású lehet, és segíthet enyhíteni a fáradtságot és a szorongást. Gondozása viszonylag egyszerű. Fontos, hogy rendszeresen öntözzük a növényt, hogy a talaja nedves maradjon, de ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl vizes, mert ez kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának. A növényt érdemes rendszeresen metszeni, hogy megőrizzük kompakt alakját és serkentsük az új hajtások növekedését. Mint minden menta, hosszú élettartammal rendelkezik, és akár éveken keresztül élvezhetjük a frissességét és az ízét. Azonban érdemes időnként megújítani a növényt, mivel idővel a levelek elveszíthetik az intenzív csokoládés aromájukat.

Csüngő rozmaring	**Rosmarinus officinalis 'Prostratus'**	2 450 Ft	2 950 Ft

A rozmaring fajták egyik legnépszerűbb csüngő változata. Dézsákba, rézsűkbe kiváló dísz-, illetve fűszernövény! 7b-10a USDA-zóna

Európai lószőrpálma	**Chamaerops humilis**	7 500 Ft	8 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az európai lószőrpálma kiválóan mutat bármilyen környezetben. Gyakorlatilag az egész növény pálmalevelek tömegéből áll. Több törzset nevel, ezért a bokorpálmák közé soroljuk. Alacsony termete miatt a mediterrán térségben főleg nagyobb fák, pálmák, vagy falak tövébe ültetik, de dézsás növénynek is kiváló! Nálunk teljes napot igényel, de a klasszikus mediterrán éghajlaton félárnyékos helyeken is jól érzi magát. A hűvösebb, nedvesebb éghajlaton hajlamos a gombás megbetegedésekre. Ha minden igénye ki van elégítve is, elég lassú növekedésű, ezért nem szerencsés teljesen magára hagyni, bár kiváló szárazságtűrésű, nagyon strapabíró pálma. Ha megszeretnénk mutatni törzsét, távolítsuk el a törzsre lapuló száraz leveleit. Ehhez használjunk vastag bőrkesztyűt, mert a levélnyelein fűrészfogasan helyezkednek el tövisek sokasága. Botanikai, latin nevének második tagja 'humilis' a termetére utal, mert latinban alacsonyat jelent. Hazájában, a Földközi-tenger térségében a legidősebb példányok is csak ritkán haladják meg az 5 méteres magasságot. Természetes élőhelye a Földközi-tenger nyugati medencéje, Olaszország délnyugati részétől a Riviérán keresztül Spanyolország keleti, délkeleti partján végig haladva egészen Portugália déli részéig. Élőhelye átnyúlik Afrika északnyugati részébe, az Atlasz-hegységbe, ahol a kék változata (Chamaerops humilis var. cerifera) él. Még egy változata él a természetben, méghozzá Sziciliától északra található Lipari-szigeteken, az alapfajnál kompaktabb Chamaerops humilis var. vulcano. Sokáig az egyedüli honos pálmának tartották Európában, de a botanikusok pár évtizede a krétai datolyapálmát (Phoenix theophrasti) is önálló fajnak és honosnak minősítették.
1. Fény: Napos, félárnyékos helyre ültessük
2.Talaj: Laza és jó vízelvezetéssel rendelkező talajba ültessük.
4. Öntözés: A pálma nem szereti a túlzott öntözést.
5. Trágyázás:Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt lassú felszívódású műtrágyával.
6. Metszés: Ha szükséges, távolítsuk el a hervadt vagy sérült leveleket, de ne metszük vissza a friss hajtásokat, hacsak nincs rá valós szükség.

8b-10b USDA-zóna

Eve Price örökzöld bangita	**Viburnum tinus 'Eve Price'**	3 950 Ft	4 250 Ft

2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdenek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése!

Kompakt, gömbölyded formájú örökzöld cserje, sötétzöld, fényes levelekkel (5-8 cm hosszúak). Virágai rózsaszín bimbókból nyílnak fehérre, novembertől februárig díszítenek, majd kékes-fekete bogyós termései következnek.

Méret: Kifejlett állapotban 1,5-2 m magas és széles, lassú növekedésű (teljes méretét 10-20 év alatt éri el).

Szoliterként kiemelkedő a téli kertben.

Örökzöld sövény alkotására tökéletes (jól formázható).

Társnövények:

Tavaszi virágú évelők.

Örökzöldekkel (pl. borostyán, aucuba).

7b-9b USDA-zóna

Eveline® selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Eveline®'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A selyemmirtusz Eveline® Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta. A fajta neve („Eveline”) a halványrózsaszín, finom, elegáns virágokra utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, halványrózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A selyemmirtusz Eveline® közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-3 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-es növekedést is mutathat. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek közepes méretűek, 4-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, elliptikusak vagy tojásdadok, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-25 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. Az 'Eveline®' fajta virágának színe halványrózsaszín, a pasztell, áttetsző halványrózsaszíntől a közepes, meleg rózsaszín árnyalatig. A virágok közepe sárgás vagy zöldessárga. A szín a napfény hatására különösen szépen érvényesül. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A selyemmirtusz Eveline® napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni a szerkezet javítása és a pH beállítása érdekében.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés és alakítás: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, fagykárosodott, sérült, keresztező, egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés és fagytűrés: A selyemmirtusz Eveline® mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval, szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte teljesen szárazon kell tartani; 4-6 hetente egyszer, nagyon kevés vizet adjunk neki, csak annyit, hogy a földje teljesen ne száradjon ki.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A selyemmirtusz Eveline® méretének, finom halványrózsaszín színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként (magányosan ültetve) – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő, különösen a halványrózsaszín virágok miatt.

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható.

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a halványrózsaszín virág más színekkel is jól kombinálható.

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, romantikus kertekbe – a finom szín és a délies hangulat tökéletesen illik.

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de a teleltetésről gondoskodni kell.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet és a szeles körülményeket.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A selyemmirtusz Eveline® halványrózsaszín virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák (Rosa), gyöngyvirágcserje (Deutzia) – a fehér és a halványrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak.

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus officinalis), orvosi zsálya (Salvia officinalis), perovszkia (Perovskia atriplicifolia) – a halványrózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mélységet adó összképet eredményeznek.

Sötétrózsaszín vagy piros virágú növények: Sötétebb rózsaszín selyemmirtusz fajták, piros rózsák – a különböző rózsaszín árnyalatok egymás mellett gazdag, réteges hatást keltenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia arborescens, Artemisia ludoviciana), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

(Sedum pruinatum), bárányfül (Stachys byzantina) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern, mediterrán hatást keltenek, és kiemelik a halványrózsaszín virágokat.

Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca), árvalányhaj (Stipa tenuissima) – a díszfüvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját.

Őszi színű díszcserjék: Sárga levelű növények (pl. aranycserje), vörös levelű juharok – a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel.

Más selyemmirtusz fajták – különböző színű (fehér, rózsaszín, lila, piros) selyemmirtusz fajták egymás mellé ültetve szivárványszerű hatást keltenek.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a selyemmirtusz Eveline® mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna – pl. Budapest, Dél-Dunántúl, Pécs, Villány) takarással, védett helyen áttelelhet a szabadban, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna – pl. Észak-Magyarország, Alföld, Dunántúli-középhegység) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajthat.)

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fehér kála	Zantedeschia aethiopica	4 950 Ft	4 950 Ft

A kála (Zantedeschia aethiopica) dekoratív dísznövény, amit kertben, teraszon vagy a lakásban egyaránt lehet tartani. Ez a dél-afrikai mocsarakban őshonos elegáns növény a konytvirágfélék családjához tartozik.A kála rendkívül látványos tölcsér vagy trombita alakú viaszos virágai magas vastag száron nőnek, és a középső részükből egy sárga buzogány formájú virág képződik. A kála napi legalább hat óra nagyon erős közvetett napfényt igényel. A közvetlen napfényt, különösen a nap közepén, kerülni kell, mivel az elégetheti a leveleket és a virágokat. Nem bírja az aszályt, ezért soha nem szabad hagyni, hogy teljesen kiszáradjon. A kála talaját nedvesen kell tartani, de kerüljük a pangó vizet. A kála általában késő tavasszal és nyár elején, általában hat hétig virágzik. Ha a növény gyökerei szorosan egymás mellett vannak, akkor az virágzásra ösztönzi a növényt. Jó minőségű tőzegmoha alapú talajt ajánlott használni, amely jól szellőző és gyors vízelvezető tulajdonságokkal rendelkezik. A talajhoz hozzá lehet adni valamilyen homokot vagy perlitet, ha a talaj túl nehéz és agyagszerű. Mély virágedényekbe kell ültetni a kála hagymáit. Egy hagymát egy 12-15 cm-es átmérőjű edénybe, vagy két vagy három hagymát egy 20 cm-es átmérőjű edénybe ültessünk. A kála, egy hagymás növény, ami évente egyszer pihenési időszakba kerül. A növény virágzásának befejezése után a levelek elsárgulnak, majd elszáradnak. Ahogy ez megtörténik, a növényt a talajszintig vissza kell vágni és egye hűvös, sötét helyre helyezni, ahol a hőmérséklet fagypont felett van, de ebben a 2-3 hónapig tartó pihenési időszakban nem haladja meg a 10° C-ot. Ilyenkor a kála talaját nagyon szárazon kell tartani, néhány hetenként takarékos módon öntözni, azért hogy a hagymák ki ne száradjanak. A növény tárolási helyének alacsony páratartalmúnak kell lennie, különben a hagymák penészedni és rothadni kezdenek. Két vagy három hónap elteltével, a kálát vissza kell helyezni egy fényes, meleg helyre, és rendszeresen öntözni. Miután a zöld levelek kifejlődtek, egy 1:2 arányban hígított, kifejezetten hagymagumókra szánt táppal kell gondozni a kálát, hogy ez ösztönzően hasson a növekedésre. A kála mérgező növény, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fodros levelű enyvesmag	Pittosporum tenuifolium	4 450 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Fodros levelű enyvesmag (Pittosporum tenuifolium) Új-Zélandról származó, örökzöld cserje vagy kisebb fa. Kifejlett magassága a legtöbb kertészeti fajtánál 2-4 méter, szélessége 1-2 méter, de a törpe változatok mindössze 50-100 centiméterre nőnek. Természetes élőhelyén akár 10 méter magasra is megnőhet. Levelei kicsik, keskenyek, hullámos szélűek, fényesek, világoszöldek; egyes fajtáknál sárgás, krémszínű vagy éppen sötétbíbor színezetűek. Tavasszal apró, illatos, sötétlila virágok nyílnak a hajtások végén, amelyeket később dekoratív toktermések követnek. A növény habitusa sűrű, bokros, finom textúrájú, így kiválóan alkalmas formázásra.
Igényei

Fény: Napos vagy világos félárnyékos fekvés az ideális; a legszebb lombszínt napos helyen hozza, de a forró délutáni napsütéstől védett helyen is szépen fejlődik.

Talaj: Jó vízáteresztő, termékeny, közepesen nedves talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz, agyagos talajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; rendszeres öntözést igényel, különösen az első években és száraz időszakokban. A kifejlett növény bizonyos mértékig szárazságtűrő, de a talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, rövid fagyokat elvisel, de a hosszan tartó, kemény fagyokat és a hideg, szárító szeleket nem. Hazánkban védett, meleg fekvésben vagy konténerben tartható, ahol teleltethető.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos vagy félárnyékos, szélvédett helyre, jó vízáteresztő, komposzttal dúsított talajba. Konténerben is nevelhető, ekkor ültesse jó minőségű, vízáteresztő komposztba.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később hetente egyszer mélyen locsolja meg; aszályos időszakban gyakrabban. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya támogatja a növekedést. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: A formázott sövényként tartott növényeket rendszeresen, de visszafogottan metssze, hogy megőrizze a tömör formát. A metszést tavasszal vagy nyár elején végezze el, mert a növény a metszést jól tűri. Az elhalt vagy sérült hajtásokat tavasszal távolítsa el.

Átteleltetés: Hazánkban a növényt takarással, védett helyen vagy konténerben teleltesse át. A konténeres növényt fagymentes, világos helyen tartsa, és csökkentse az öntözést.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló, de a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A levéltetvek és a pajzstetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább formális és informális sövényként, topiáriumként, mediterrán és cottage kertekben, valamint konténeres dísznövényként illik a kertbe. Finom textúrájú lombozata miatt kiválóan alkalmas modern, strukturált kompozíciókba és tengerparti hatású kertekbe is.
Növénytársítások

Örökzöldek: tiszafa, magyal, puszpáng – sűrű, rendezett sövénykompozíciót alkotnak.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a cserje tömör formáját.

Évelők: levendula, zsálya, kakukkfű – napos, szárazságtűrő társak, amelyek illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a cserje alá.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 8–10 (egyes források szerint 7–10); hazánkban (6–7. zóna) védett fekvésben vagy konténerben tartható.

Folyami vörösgumi eukaliptusz	**Eucalyptus camaldulensis**	14 900 Ft	14 900 Ft

A folyami vörösgumi eukaliptusz (Eucalyptus camaldulensis) legidősebb példányai elérhetik a 40-45 méteres magasságot is hazájukban Ausztráliában. Kérge a fehértől a szürkén át a vörösesbarnáig és ezek árnyalataiban pompázik. Hosszú szalagokban válnak le az idős kéregdarabok. Örökzöld, sűrű lombja hatalmasra terebélyesedhet, melyet hosszú, keskeny, a végekig keskenyedő levelek alkotnak. Az Eucalyptus camaldulensis alapjába véve elég vízigényes faj, de a hosszabb száraz időszakok átvészelése sem jelent gondot számára. Hazájában, Ausztráliában is elsősorban vízpartokon található meg. Az egyik leggyakrabban telepített eukaliptuszfaj a világon.
Sok gondozást egyébként nem igényel, de számíthatunk jó fejlődésére, és ebből adódóan a nehézkes teleltetésre.
8b-10a USDA-zóna

Frantoio olasz olajfa	**Olea europaea 'Frantoio'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Frantoio olajfa (Olea europaea Frantoio) az olajfák egyik legkiválóbb és legismertebb olajpréselési fajtája, amely Olaszország középső részéből, Toszkánából származik. A Frantoio név az olasz frantoio (olajprés) szóból ered, utalva a fajta elsődleges felhasználási módjára. Ez a fajta a kiváló minőségű, intenzív aromájú olaj és a megbízható, bőséges hozam hármasát kínálja, ami a világ egyik legkeresettebb olajbogyó-fajtájává teszi. A Frantoio olívaolaját friss, fűszeres, gyümölcsös, enyhén csípős és kesernyés jegyek jellemzik, amely a magas minőségű extra szűz olívaolajok egyik alapvető fajtája.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Frantoio közepes vagy nagyobb termetű, 5-8 méter magas és 4-6 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik, ami a mediterrán tájak jellegzetes hangulatát idézi. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-8 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Frantoio igazi büszkeségei: a bogyók közepes méretűek, 2-4 grammosak, ovális vagy enyhén tojásdad alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek. Húsuk közepesen vastag, a mag aránya közepes. A Frantoio olajhozama magas, akár 18-22% is lehet, és az olaj minősége kiváló. A termések olajpréselésre készülnek, asztali fogyasztásra kevésbé alkalmasak, mivel ízük túl intenzív és kesernyés lehet.
Igényei és gondozási útmutató: A Frantoio a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és a kiváló minőségű olaj kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Frantoio jól tűri a metszést, de a szakértői metszés fontos a magas olajminőség eléréséhez.
Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a lisztharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Frantoio a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi. Olajfaligetekben a hagyományos mediterrán táj hangulatát kelti, és kisebb ültetvényekben is megállja a helyét. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis) és oregánó (Origanum vulgare) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Frantoio mellé ültetett más olajfafajták (például Leccino, Pendolino, Coratina, Ascolana) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Frantoio részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Frantoio kiváló választás azok számára, akik saját, kiváló minőségű olívaolajat szeretnének préselni, és egy megbízható, bőtermő, intenzív aromájú olajbogyó-fajtát keresnek, amely a mediterrán kertek egyik alapvető eleme lehet. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

7b-10a USDA-zóna

Georgiai pálmaliliom	**Yucca recurvifolia**	3 550 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Yucca recurvifolia, vagyis a Georgiai pálmaliliom, egy lenyűgöző szépségű örökzöld növény, amely könnyed eleganciájával bármely kert kiemelt díszévé válhat. Jellemzője a hosszú, ívesen lehajló levelek, melyek színükben a világos- és kékeszöld között váltakoznak, lágyítva ezzel a növény jellegzetesen merész profilját. A levelek alatt, az idő múlásával egy lassan növő törzs képződik, mely szoborszerű megjelenést biztosít a növény számára.
Magassága elérheti az 1-2 métert, míg szélessége akár 1,5 méteres is lehet, így a Georgiai pálmaliliom térkitöltő elemként is megállja a helyét. Nyáron káprázatos, krémfehér virágokat hoz, melyek több mint egy méter magas virágszáron csoportosulnak.
Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Ültessük napfényes vagy félárnyékos helyre, ügyelve arra, hogy a talaj kiváló vízelvezető képességű legyen.

Talajelőkészítés: Kedveli a homokos, kavicsos talajt. Ültetéskor érdemes komposzttal és apró kaviccsal lazítani a talajt.

Ültetés: A gyökérlabdát úgy helyezzük a talajba, hogy annak teteje szintben legyen a talajfelszínnel. Hagyjunk legalább 1-1,5 méteres távolságot a szomszédos növényektől.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Első évben rendszeres öntözést igényel, ezt követően viszont szárazságtűrő. Fontos, hogy az öntözések között a talaj kiszáradjon.

Tápanyagok: Tavasszal lassú lebomlású műtrágyával támogassuk, hogy elősegítsük az erőteljes növekedést és a bőséges virágzást.

Téli gondozás: Bár télálló, fiatal növények esetén hidegebb területeken érdemes mulccsal védeni a tövet a fagy ellen.

A Yucca recurvifolia (Georgiai pálmaliliom) természetes élőhelye az Egyesült Államok Georgia állama. Európa területére először Angliába jutott 1847-ben, majd Dél-Európában is hamarosan elterjedt, de általánosan ültették a Monarchia tengerparti nyaralóközpontjaiban, Abbáziában (Opatija) és Fiume környékén. Az Adriáról került hozzánk, először botanikus kertjeinkbe és kastélyparkjainkba. A georgiai pálmaliliom, termőhelyi igényei szerint nálunk a Dráva környékén, illetve a Villányi-hegység déli lábánál és Pécs környékén terjedt el. E vidéken nemcsak a hőösszeg nagyobb, hanem a csapadék is több 150-200 milliméterrel, mint másutt az országban, s a téli hideg (-10 C-fok alatti) napok száma is kevés.

7a-10a USDA-zóna

Grossane olajfa, olíva	**Olea europaea 'Grossane'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Grossane olajfa, olíva (Olea europaea Grossane) az olajfák egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb francia fajtája, amely Provence régiójából, Franciaország délkeleti részéből származik. A Grossane név a provanszál nyelvjárásból ered, és a fajta nagy, húsos termésére utal. Ez a fajta a kiváló íz, a nagy terméséret és a sokoldalú felhasználhatóság hármasát kínálja, ami a házi kertek és a kisüzemi termelés egyik kedvencévé teszi. A Grossane különlegessége, hogy termései egyaránt kiválóan alkalmasak asztali olajbogyónak (tartósításra) és olajpréselésre is, ami ritka tulajdonság az olajfák között.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Grossane közepes termetű, 4-6 méter magas és 3-5 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-7 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Grossane igazi büszkeségei: a bogyók nagyok vagy nagyon nagyok, akár 5-8 grammosak is lehetnek, ovális vagy enyhén tojásdad alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek. Húsuk vastag, lédús, roppanós, enyhén édeskés, alma- és diós jegyekkel, kellemes, nem túl keserű olajbogyóízzel. A Grossane olajhozama közepes, 15-18% körüli, és az olaj minősége jó, lágy, gyümölcsös, enyhén fűszeres. A termések asztali célra is kiválóak: sós lében vagy olajban tartósítva, fűszerezve fogyaszthatók.
Igényei és gondozási útmutató: A Grossane a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és az íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Grossane jól tűri a metszést. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a lisztharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Grossane a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, különösen Provence hangulatát. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad. Provanszi kertekben a levendulával és rozmaringgal alkotott társítása a dél-francia vidék hangulatát idézi.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis), oregánó (Origanum vulgare) és szantolina (Santolina chamaecyparissus) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Grossane mellé ültetett más olajfafajták (például Frantoio, Leccino, Pendolino, Cailletier, Ascolana) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Grossane részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Grossane kiváló választás azok számára, akik egy sokoldalúan felhasználható, nagy, húsos termésű olajfafajtát keresnek, amelyből egyszerre készíthetnek asztali olajbogyót és kiváló minőségű olívaolajat is, miközben a provanszi kertek hangulatát idézi. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Hamvas cipruska	**Santolina chamaecyparissus**	2 550 Ft	2 550 Ft

Fél méteresre megnövő, finom, molyhos levelű, ezüstös lombú, gömbölyded cserje. Hosszú szárak végén nyíló gombszerű, sárga fészekvirágzatai júliusban nagy tömegben díszítik. Elmaradhatatlan része a sziklakertjeinknek!

7a USDA-zóna

Havasi gyopár	**Leontopodium alpinum**	2 150 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Európa magas hegységeiben, jellemzően magas térségekben sziklagyepekben jelenik meg. Több országban is védett növény Svájc, és Ausztria nemzeti növénye. Leginkább sziklakertekbe, vagy köves járdák környezetébe való, a szárazságot jól tűri, de a magas hőösszegre nincsen szüksége, vagyis inkább félárnyékba javasolható.
A Havasi gyopár, vagy Edelweiss, az Alpok egyik legszimbolikusabb növénye, mely fehér, csillag alakú, gyapjas virágairól ismert. Természetes élőhelyein magashegységek sziklás, napos lejtőin található. Júniustól augusztusig virágzik, és rendkívül ellenálló a szárazsággal, hideggel szemben. Dísznövényként tökéletes sziklakertekbe, természetes stílusú kertekbe vagy konténeres ültetésre. Virágai kitűnően alkalmasak szárított dekorációkhoz, hosszú élettartamuk miatt.
Gondozási útmutató:

Talaj: Jól átnedvesedő, köves vagy homokos talaj, semmiképp ne vízzel telített.

Fényigény: Teljes napos helyet preferál.

Öntözés: Mérsékelt öntözés; a talajt hagyjuk száradni vízadások között.

Tápanyag: Nem igényel trágyázást.

Télállóság: Magas fokú, de a téli túlnedvesedést kerülni kell.

Ültetési javaslat:

Ültessük sziklagyepekbe, lejtőkbe vagy kövek közé, ahol a víz gyorsan lefolyik.

Ideális kertek szegélyeinek kiemelésére vagy dekorációs cserépbe.

Ültetés időpontja: tavasz vagy kora nyár.

Távolság: 20-30 cm között, gyökérrothadás elkerülésére.

Hófehér virágú selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Natchez'**	3 950 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Lagerstroemia indica 'Natchez' varázslatos díszcserje, mely a nyári hónapokban bőséges, hófehér virágzással káprázтatja el a látogatókat. A növény 3-4 méter magasra nő, és széles, terebélyes habitusával kiemelkedik a kertekben. A 'Natchez' fajta különlegessége a tarka, sima kérge, amely tavasszal és ősszel csodálatos textúrát ad a tájnak.
A virágok májustól kezdve egészen késő őszig nyílnak, és gyönyörű kontrasztot alkotnak a sötétzöld levelekkel. A virágok nemcsak gyönyörűek, hanem az őket körülvevő mozgás is szemet gyönyörködtető, ahogyan a méhek és pillangók vonzzák.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A 'Natchez' cserje napfénykedvelő, legalább 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a legjobb virágzás érdekében.
Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj a legelőnyösebb, de a cserje jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz is, optimálisan pH-értéke 6,0-6,8 között van.
Öntözés: A fiatal növényeknek kezdetben rendszeres öntözés szükséges a gyökerek stabilizálása érdekében. A felnőtt növények szárazságtűrőek, de a forró időszakokban hasznos a megfelelő öntözés.
Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott műtrágyát alkalmazni a virágzás serkentésére.
Téliesítés: A Lagerstroemia indica 'Natchez' fagyérzékeny lehet a hidegebb éghajlatokon, így a téli hónapokban ajánlott takarni vagy védettebb helyre ültetni.

Felhasználási lehetőségek:

Szoliter növényként kiválóan mutat a kert közepén vagy más dísznövények között, színt és textúrát biztosítva.
Mivel a 'Natchez' cserje csodálatos virágaival díszít, ideális lehet kerítések és utak mentén is.
Ligetek és parkok díszítésére is ajánlott, hiszen vonzó látványt nyújt, miközben a beporzókat is vonzza.

A Lagerstroemia indica 'Natchez' egy csodálatos választás minden kertész számára, aki tartós, szép és könnyen gondozható növényt keres, amely minden évszakban vonzó látványt nyújt.
7a-10a USDA-zóna

Illatos fűszercserje	**Calycanthus floridus**	11 950 Ft	11 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Calycanthus floridus (Illatos Fűszercserje) egy Észak-Amerikából származó lombhullató cserje, amelyet mélybordó színű, kaméliaszerű virágai és kellemes szegfűbors-fahéj illata tünettet ki. Virágai áprilistól júliusig nyílnak, de esetenként ősszel is meglepetésként virágzik. Levelei sötétzöldek, 10-15 cm hosszúak, ősszel aranysárgára színeződnek. Minden része illatos: a virágok, levelek, sőt még a kéreg is!
Jellemzők:

Méret: 1,5-3 m magasra nő, lassú növekedésű.

Talajigény: Jól átvizelő, tápanyagban gazdag talajt kedvel (pH 6-7).

Fényigény: Napos vagy félárnyékos hely optimális.

Télállóság: -10°C-ig fagytűrő, fiatal egyedeket ajánlott télen takarni.

Küldés: Környezetbarát csomagolásban szállítjuk, 40-60 cm-es egészséges konténeres példányokként.

Kertstílusok:

Mediterrán kert: Szárazságtűrő tulajdonságaival kiemelkedik.

Természetes kertek: Méhek és pillangók kedvelt táplálékforrása.

Formasövény: Nyírással könnyen formázható.

Szoliter növény: Egzotikus megjelenése főként szobrok vagy teraszok mellé ajánlott.

Gondozási Útmutató:

Fény és hely: Napos vagy részleges árnyékot igényel. Teljes napon a több virágot hoz.

Öntözés: Fiatalon mérsékelt vízellátás szükséges, érett korában csak hosszú szárazság esetén. Kerülje a vízálló talajt!

Metszés: Virágzás után (július-augusztus) visszavágással formázható. Elhalt ágak tavasszal távolíthatók el.

Táplálkozás: Tavasszal komposzttal vagy lassan oldódó trágyával gazdagítsa a talajt.

Télvédelem: Fiatal növényeket mulccsal vagy fenyőgallyakkal védje.

6b-10a USDA-zóna

Ír borostyán	Hedera hibernica	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, léggyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje.
A levelek jellegzetesen nagyok, szív alakúak és csillogó zöldek. A sűrű lombozat egész évben megőrzi frissességét, és télen is színt visz a kertbe. Az Ír borostyán gyorsan növő, kúszó növény, amely könnyen felkapaszkodik a falakra, kerítésekre vagy más támaszokra. Hajlékony szárai lehetővé teszik, hogy könnyen alkalmazkodjon a környezetéhez és kialakított területekhez. A borostyánfajok nem feltétlenül hoznak látványos virágokat, de az Ír borostyán apró sárgászöld virágokat és később fekete bogyókat hozhat létre. Jól alkalmazkodik az árnyékos vagy félárnyékos környezethez, de a teljes napfényt is elviseli. A napfényre való kitettség segíti a sűrű lombozat kialakulását. Ez a borostyánfaj nem válogatós a talaj típusát illetően, de jól teljesít a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajokban.Kiváló választás lehet függőleges kertek, pergolák, vagy más kerti támaszok díszítésére. A talajtakaró képessége miatt alkalmas talajtakaróként is, különféle kerttervezési koncepciókhoz. Az Ír borostyán viszonylag ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi díszítő szerepét a kertben.
Az Ír borostyán (Hedera hibernica) könnyen gondozható és gyorsan fejlődő növény, amely sokoldalúan alkalmazható kertek és más zöld területek díszítésére. A lombozat szépsége és a hajlékony növekedési forma kiválóan kiegészíti a különböző kerti tervezéseket.
6a-8b USDA-zóna

Jean May kamélia	**Camellia sasanqua 'Jean May'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Jean May kamélia a Sasanqua fajcsoportba tartozó, népszerű és megbízható fajta, amelyet Ralph May nemesített a floridai Gerbing Camellia Nurseries-ben ismeretlen szülőpárokból. Nevéhez híven („Jean May”) a fajta a téli időszak egyik legszebb virágzójává teszi a kertet.
Külső megjelenés
A Jean May kamélia kompakt, bokros növekedésű, felálló habitusú örökzöld cserje. Kifejlett magassága 2-3 méter, szélessége 2-3 méter között alakul, idősebb korban szélesedő formát ölt. Növekedési erélye közepes, de fiatalon gyorsan fejlődik.
A levelek sötétzöldek, fényesek, elliptikus alakúak, 5 cm hosszúak és 2 cm szélesek. A levélváll kihegyezett, a levél széle sekélyen fűrészes, a levélerek alig kivehetők.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok közepes méretűek, körülbelül 8 cm átmérőjűek, telt vagy rózsaformájúak. Színük kagylórózsaszín (shell pink) vagy arcpiros (blush), a virág közepe felé mélyülő rózsaszín árnyalattal, a szirmok széle felé pedig csaknem fehérre halványodva. A szirmok hosszúkásak, kb. 5 × 2 cm-esek, a külső szirmok szélükön enyhén fogazottak. A virág közepén kevés sárga porzós szál található, amelyek majdnem teljesen elrejtőznek a telt szirmok között. A virágok illatosak, illatuk enyhén édeskés.
Virágzási idő
A Jean May kamélia virágzása ősszel kezdődik és a téli hónapokban is tart, egészen kora tavaszig. A virágzási időszak a termesztési körülményektől függően változhat, de általában októbertől márciusig nyílik. A virágok a hűvös, téli hónapokban is sokáig díszítenek.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyet kedvel. A reggeli napot és a szórt fényt jól viseli, de a déli erős napfénytől és a forró, délutáni naptól védeni kell. A túlzott árnyékban a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5), humuszban gazdag, jó vízáteresztő, laza talajt igényel. A meszes talajokban a növény nem fejlődik megfelelően, a levelei megsárgulnak (klorózis). Ültetés előtt a talajt érdemes tőzeggel, savanyú hatású komposzttal vagy rododendronfölddel javítani.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, egyenletes talajnedvességet kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket gyakrabban kell öntözni. Kerülni kell a pangó vizet és a talaj teljes kiszáradását.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a virágzás után érdemes savanyú hatású, kaméliáknak vagy rododendronoknak való műtrágyával megtámogatni. A túlzott nitrogéntartalmú trágyák károsíthatják a növényt.

Metszés: Virágzás után, kora tavasszal lehet metszeni. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a sűrű, bokros növekedés serkenthető.

Telelés: USDA besorolása 7-10. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhet, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Érzékeny lehet a mézgagombára, fitoftórás gyökérrothadásra, kamélia gubacsra, kamélia levélfoltosságra és a kamélia sárga mozaik vírusra.

Kertstílus, ahová illik

Ázsiai kertekbe (japán, kínai): Nélkülözhetetlen eleme az ázsiai hangulatú kerteknek.

Erdős, természetes hatású kertekbe: Nagyszerűen illik a rododendronok, havasszépek, páfrányok társaságába.

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve a sötétzöld lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós.

Sövénynek: Metszéssel sűrű, örökzöld sövénnyé nevelhető.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténeres teraszokra: Tökéletes választás nagyobb cserépbe, dézsába.

Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Rododendron, havasszépe (Kalmia), sikerpenisz (Leucothoe).

Lombhullató díszcserjék: Japán juhar (Acer palmatum), hortenzia (Hydrangea).

Árnyéktűrő évelők: Páfrányok (Dryopteris), árnyékliliomok (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria).

Kora tavaszi hagymások: Krókusz, hóvirág (Galanthus), gyöngyike (Scilla).

Talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

Eredete és története
A 'Jean May' fajtát Ralph May állította elő a floridai Fernandina Beach-ben található Gerbing Camellia Nurseries-ben ismeretlen származású magoncokból. A fajta nevét valószínűleg a nemesítő családtagja után kapta. Az American Camellia Society (Amerikai Kamélia Társaság) hivatalos adatbázisában is szerepel, és széles körben elismert, kiváló kerti teljesítményű fajta.
USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Júlia borbolya	Berberis julianae	3 250 Ft	3 250 Ft

A Júlia borbolya sűrű, örökzöld cserje, amely kitűnően alkalmazkodik a változó körülményekhez. A növény egyéb vonzó tulajdonságai között találhatók az élénk sárga virágok és a kis kék bogyók, amelyek ősztől hosszan díszítik a bokrot.
Gondozás: A Berberis julianae gondozása viszonylag egyszerű, és jól alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz.
1. Fény és hely: Az összességében napos vagy félárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A jó fényviszonyok elősegítik a dús lombozat és a virágzás kialakulását.
2. Talaj: A Júlia borbolya kedveli a jó vízáteresztő képességű, laza talajokat.
3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözést igényel, hogy a gyökerek jól kifejlődjenek. Miután megerősödött, a növény ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg, ha szükséges.
4. Metszés: Az idősebb hajtásokat évente egy alkalommal lehet metszeni a formázás vagy a méret visszafogása érdekében.
5. Táplálás: Tavasszal és nyáron tápanyagdús műtrágyával trágyázza meg a növényt, hogy segítse a növekedést és a virágzást.
6. Betegségek és kártevők: A Júlia borbolya általában ellenálló a legtöbb betegséggel és kártevővel szemben. Azonban rendszeresen ellenőrizze a növényt, hogy időben észrevegye a potenciális problémákat.
A Berberis julianae (Júlia borbolya) egy igazán gyönyörű és strapabíró növény, amely értékes dísze lehet kertjének. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül örömét lelheti a látványában és az általa nyújtott kellemes környezetben.
6a-9b USDA-zóna

Kalamondin hibridnarancs	Citrus x calamondrin	19 500 Ft	22 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kalamondin hibridnarancs (Citrus × microcarpa) – A kompakt, illatos termésű citrus

A kalamondin hibridnarancs a rutafélék (Rutaceae) családjába tartozó, hibrid eredetű örökzöld cserje vagy kis fa. A növény a mandarin (Citrus reticulata) és a kumkvat (Fortunella japonica) kereszteződéséből jött létre. A faj a Fülöp-szigetekről és Délkelet-Ázsiából származik, ahol évtizedek óta termesztik kereskedelmi mennyiségben. A nemzetség névadója a Citrus, a fajnév (microcarpa) pedig a latin "kis termésű" jelentésű szóból ered, ami a növény apró, de annál intenzívebb ízű termésére utal. Ez a citrusféle a kompakt méretével, az illatos virágaival és a dekoratív, ehető terméseivel az egyik legkedveltebb konténeres citrus a mérsékelt éghajlatú kertekben és lakásokban. A könnyű gondozhatósága és a rendkívüli hasznosíthatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kalamondin hibridnarancs egy sűrű, bokros növekedésű, örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 2,5-4 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul, de konténerben nevelve általában kisebb marad. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtásokon néha rövid, vékony tövisek találhatók. Növekedési erélye közepes, a végleges méret eléréséhez 5-10 év szükséges.

A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek elliptikusak vagy tojásdadok, 3-8 cm hosszúak, fényes, sötétzöld színűek, bőrszerűek, a levélnyélen apró, szárnyas függelék található. A levelek megdörzsölve kellemes, citrusos illatot árasztanak, ami a növény egyik jellegzetessége.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a levélhónaljakban, magányosan vagy kis csoportokban jelennek meg. A virágok 1-2 cm átmérőjűek, csillag alakúak, öt szirommal, fehér színűek, néha halványlila árnyalattal a külső oldalon, illatosak. A virágzási időszak a tavasztól a nyárig tart, de a növény az év során 4-5 alkalommal is virágozhat, így gyakran láthatóak egy időben a virágok és az érett termések is. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, 3-4 cm átmérőjű terméseket fejleszt, amelyek kezdetben zöldek, majd éréskor narancssárgára színeződnek. A termések vékony, édes héjjal rendelkeznek, míg a belső hús rendkívül savanyú és lédús, íze a citromra és a lime-ra emlékeztet. A termések akár egy évig is érhetnek a fán, és hosszú ideig megmaradnak. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kalamondin hibridnarancs napos fekvést igényel a legszebb, legbőségesebb virágzáshoz és terméshozáshoz. Félárnyékban is fejlődik, de a virágzás és a terméskötés gyengébb lehet. A napi minimum 6 óra közvetlen napsütés javasolt.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, savanyú vagy semleges kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a talaj folyamatos, mérsékelt nedvességét igényli. Ültetéskor érdemes a virágföldet homokkal vagy perlittel keverni a jobb vízelvezetés érdekében, és a cserép alján vízelvezető réteget kialakítani.

Öntözés: A kalamondin hibridnarancs közepes vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, de a két öntözés között hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes vagy magas tápanyagigényű. A vegetációs időszakban (tavasztól őszig) 2-4 hetente adjunk neki citrusok számára kifejlesztett folyékony műtrágyát. Télen, a nyugalmi időszakban a tápanyag-utánpótlást csökkentsük vagy szüneteltessük.

Metszés és ápolás: A kalamondin hibridnarancs alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal elvégezhető. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat. Konténerben nevelve a metszés segít a kompakt méret fenntartásában.

Telelés és fagytűrés: A kalamondin hibridnarancs fagyérzékeny. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik az -1°C és -7°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok elpusztítják. Magyarországon a növényt konténerben, védett, hűvös (5-10°C), világos helyen kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte szárazon kell tartani. A következő tavasszal, a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ismét ki a szabadba, fokozatosan szoktatva a napfényhez.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Felhasználás a kertben (alkalmazási területek) A kalamondin hibridnarancs a kompakt méretének, az illatos virágainak, a dekoratív terméseinek és a sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően az egyik legkedveltebb konténeres citrus: Konténerekbe, cserepekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a díszítő érték miatt kiválóan nevelhető konténerben. Szobanövényként lakásokba, irodákba, télikertekbe, üvegházakba – a növény a melegebb hónapokban kivihető a szabadba, télen pedig védett helyen tartható. Dísznövényként ágyásokba, szegélyekbe – a melegebb éghajlatú területeken szabadföldön is nevelhető, akár sövényként is. Gyümölcstermő növényként – a termések sokoldalúan felhasználhatók a konyhában: italok, mártások, lekvárok, chutney-k, valamint hal- és húsételek ízesítésére. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A kalamondin hibridnarancs sötétzöld lombozata és narancssárga termései számos más növénnyel kombinálhatók: Más citrusfélékkel: Citrommal, lime-mal, kumkvattal – a hasonló termesztési igények miatt jól társíthatók, és a különböző terméssznek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek. Mediterrán hangulatú növényekkel: Levendulával, rozmaringgal, olajfával – a hasonló szárazságtűrés és a mediterrán hangulat miatt kiváló társnövények. Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a növény narancssárga terméseit. Virágos növényekkel: Muskátlival, petúniával – a konténeres kompozíciókban a virágok színei kiegészítik a citrus terméseit. USDA besorolása: 8b-11 (Magyarországon a kalamondin hibridnarancs fagyérzékeny; az USDA 8b-11-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) konténerben, védett, hűvös (5-10°C), világos helyen teleltetve nevelhető biztonságosan. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -1°C és -7°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok elpusztítják.)			
Kanjiro kamélia	**Camellia sasanqua 'Kanjiro'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Kanjiro kamélia a Sasanqua fajcsoportba tartozó, kivételesen mutatós és megbízható fajta, amelyet Japánban nemesítettek 1954-ben ismeretlen szülőpárokból. Ez a népszerű fajta az egyik legélénkebb színű sasanqua kamélia, amely ősszel és télen hozza látványos virágait, amikor a kertben kevés más növény virágzik.
Külső megjelenés
A Kanjiro kamélia sűrű, felálló, enyhén csüngő (majdnem szétterülő) habitusú örökzöld cserje. Kifejlett magassága jellemzően 2,5-3 méter, de egyes források szerint akár 4-8 métert is elérhet, szélessége 1,8-2,5 méter között alakul. Növekedési erélye közepes.
A levelek sötétzöldek, fényesek, bőrszerűek, ovális vagy elliptikus alakúak, 3-5 cm hosszúak, szélük finoman fűrészes. A levélfelület fényes, ami a növényt még a virágzási időszakon kívül is dekoratívvá teszi.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok közepes méretűek, 5-7 cm átmérőjűek, félig telt vagy rózsaformájúak, 12-15 sziromlevéllel. Színük élénk cseresznyepiros, mélyrózsaszín vagy bíborrózsaszín, a szirmok töve felé gyakran halványabb rózsaszín árnyalattal. A virág közepén feltűnő, aranysárga porzók állnak, amelyek gyönyörű kontrasztot alkotnak a rózsaszín szirmokkal. A virágok enyhén illatosak, illatuk kellemes, édeskés. A virágzási időszak ősszel kezdődik és a téli hónapokban is tart; a Smithsonian Gardens adatbázisa szerint október-december a fő virágzási idő, míg más források szerint a virágzás akár februárig is eltarthat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyet kedvel. A reggeli napot és a szórt fényt jól viseli, de a déli erős napfénytől és a forró, délutáni naptól védeni kell. A sasanqua fajták a japán kaméliáknál (Camellia japonica) több napot is elviselnek, de a legszebb virágzást világos, de nem tűző napos helyen hozzák. A túlzott árnyékban a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5), humuszban gazdag, jó vízáteresztő, laza talajt igényel. A meszes talajokban a növény nem fejlődik megfelelően, a levelei megsárgulnak (klorózis). Ültetés előtt a talajt érdemes tőzeggel, savanyú hatású komposzttal vagy rododendronfölddel javítani.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, egyenletes talajnedvességet kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket gyakrabban kell öntözni. Kerülni kell a pangó vizet és a talaj teljes kiszáradását. A növény nem tűri a szárazságot, de a túlöntözés gyökérrothadáshoz vezethet. A legjobb, ha a talaj felső 5-8 cm-e (kb. 3 hüvelyk) kiszárad a következő öntözés előtt.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a virágzás után érdemes savanyú hatású, kaméliáknak vagy rododendronoknak való műtrágyával megtámogatni. A túlzott nitrogéntartalmú trágyák károsíthatják a növényt. A tápanyag-utánpótlást márciusban (a növekedés megindulásakor) és közvetlenül a virágzás után érdemes elvégezni.

Metszés: Virágzás után, kora tavasszal lehet metszeni. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a sűrű, bokros növekedés serkenthető. A metszést a következő évi virágbimbók megjelenése előtt kell elvégezni. Metszés után a növény dúsabban bokrosodik.

Telelés: USDA besorolása 7-10 (egyes források szerint 6b-9). A növény akár -10 °C-ig is ellenáll a hidegnek. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhet, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük, mert a kaméliák érzékenyek a hideg, száraz szelekre. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz, lépcsőház) kell teleltetni. A téli időszakban a fagyott talajban a növény nem tud vizet felvenni, ezért az örökzöld levelei kiszáradhatnak (ún. téli aszály). Ennek megelőzésére vastag mulcsréteg (5-10 cm) alkalmazása javasolt.

Kártevők, betegségek: Érzékeny lehet a mézgagombára, fitoftórás gyökérrothadásra, kamélia gubacsra, kamélia levélfoltosságra és a kamélia sárga mozaik vírusra. A virágokat a kamélia sziromrothadás is érintheti.

Kertstílus, ahová illik

Ázsiai kertekbe (japán, kínai): Nélkülözhetetlen eleme az ázsiai hangulatú kerteknek, különösen mivel a sasanqua kaméliák Japán part menti erdeiben őshonosak.

Erdős, természetes hatású kertekbe: Nagyszerűen illik a rododendronok, havasszépek, páfrányok társaságába, különösen nagy, öreg árnyékot adó fák alá.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve a sötétzöld lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós.

Konténeres teraszokra: Tökéletes választás nagyobb cserépbe, dézsába.

Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Rododendron, havasszépe (Kalmia), sikerpenisz (Leucothoe), törpe tűlevelűek (pl. boróka, tuja).

Lombhullató díszcserjék: Japán juhar (Acer palmatum), hortenzia (Hydrangea), árnyliliom (Hosta), harangláb (Heuchera).

Árnyéktűrő évelők: Páfrányok (Dryopteris, Polystichum), tüdőfű (Pulmonaria), japán erdeifű (Hakonechloa macra).

Kora tavaszi hagymások: Krókusz, hóvirág (Galanthus), gyöngyike (Scilla).

Talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

Eredete és története
A 'Kanjiro' kamélia Japánban keletkezett 1954-ben, ismeretlen szülőpárokból. A sasanqua kaméliák a dél-japán part menti erdőkben őshonosak, ahol a fák alatti cserjeszintben nőnek. A holland kereskedők 1869-ben hozták be a fajt Európába. A 'sasanqua' fajták népszerűek a kertészetben, mert korábban (ősszel) virágoznak, mint a japán kamélia (Camellia japonica), és jobban tűrik a naposabb fekvésű helyeket. A japánok a sasanqua kamélia leveleiből teát készítenek, a magjaiból pedig teaolajat (tsubaki oil) préselnek, amelyet főzéshez, kozmetikumokhoz és kenőanyagként használnak. A növény nem mérgező macskákra és kutyákra.
USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Kínai rojtosvirág	**Loropetalum chinense**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A kínai rojtosvirág, Dél-Kínából, Japánból, Tajvanról, Thaiföldről és Vietnámból származó örökzöld cserje. Magyarországon a legismertebb díszváltozata a vörös levelű rojtosvirág (Loropetalum chinense var. rubrum), de a fehér virágú, zöld levelű alapfaj is számos vonzó tulajdonsággal bír.
A kínai rojtosvirág a Kárpát-medence éghajlatán mérsékelten télálló. Hideg, védtelen fekvésben a fiatal hajtások visszafagyhatnak, de a gyökérzet és az idősebb fa általában áttelel. Enyhe mikroklímájú, védett helyekre, városi kertekbe ajánlott. A metszést követően az új hajtások megjelenhetnek a tőből is, ha a fagy teljesen elpusztította volna a föld feletti részt.
Külső megjelenés
A növény sűrűn elágazó, bokros habitusú, kifejlett magassága 2-5 méter, szélessége 1,5-3 méter között mozog, de kedvező körülmények között akár a 8 méteres magasságot is elérheti . A fiatal hajtásokat és a levelek fonákját finom, csillagszőrök borítják, ami érdes tapintást kölcsönöz a növénynek .
A levelek kicsik, 2-5 cm hosszúak, 1,5-2,5 cm szélesek, tojásdad vagy ovális alakúak, bőrszerűek. Felszínük sötétzöld, a fonákjuk a szőrözöttség miatt szürkésbarna, gyakran látványos kontrasztot adva. A levél széle ép (nem fűrészes), csúcsa kihegyezett, alapja egyenetlen (ferde) .
A növény legnagyobb dísze a kora tavaszi, feltűnő virágzás. Március-április hónapokban, néha még a levelek kihajtása előtt vagy azzal egy időben nyílnak a 3-8 darabos csoportokba rendeződő virágok. Minden egyes virág négy keskeny, szalagszerű, fehér szirommal rendelkezik, amelyek 1-2 cm hosszúak, vékonyak, és a távolból nézve olyanok, mintha apró hópehely-csomók tapadnának az ágakhoz . A virágok enyhén illatosak, vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. A virágzást követően apró, gömbölyded, 7-8 mm hosszú, barna szőrös toktermések fejlődnek, amelyekben a fényes, fekete magvak találhatók .
Felhasználás a kertben
. Ez a változat a kisebb kertekbe, városi udvarokba is ideális.

Ázsiai stílusú (kínai, japán) kertekbe nélkülözhetetlen alapnövény.

Természetes hatású kertekben, erdős szegélyekben.

Metszéssel alacsony sövényként vagy formára vágva (pl. gömb alakúra).

Konténeres, dézsás növényként teraszokra, bejáratok mellé.

Szoliterként (magányos faként) a gyep közepén.

Illat
A virágok enyhén illatosak, kellemes, édeskés illatot árasztanak. Az illat nem tolakodó, de közelről érezhető, és vonzza a rovarokat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legsűrűbb a lombozat, és a legbőségesebb a virágzás. Félárnyékban is szépen fejlődik, de a virágzás gyengébb lehet. A vörös levelű változatoknak a színük intenzitásához elengedhetetlen a napos fekvés.

Talaj: A talaj iránt nem túl válogatós, de van egy fontos megkötése: a meszes talajokat nem kedveli. A legjobban az enyhén savanyú (pH 5,5-6,5) kémhatású, jó vízáteresztő képességű, humuszban gazdag talajban érzi magát. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már viszonylag szárazságtűrők, de a hosszan tartó aszályos időszakokban a dekoratív lombozat érdekében érdemes őket megöntözni.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, savanyú talajhoz ajánlott műtrágyával (pl. rododendron- vagy havasszépetrágya) megtámogatni.

Metszés: Jól tűri a metszést. A legjobb időpont a metszésre a virágzás után, késő tavasszal vagy kora nyáron. Ilyenkor lehet a növényt formázni, ritkítani, illetve eltávolítani a sérült vagy elfagyott hajtásokat. Metszéssel sűrű, bozontosabb növekedésre serkenthető.

Telelés és fagytűrés: A kínai csodafűz mérsékelten télálló. A kifejlett, begyökeresedett növények -10°C és -15°C közötti rövid idejű fagyokat elviselhetnek. A

hosszan tartó, -15°C alatti fagyokban a hajtások visszafagyhatnak. Ezért a növényt védett, szélvédett fekvésbe (pl. déli oldal, házfal mellett) érdemes ültetni. Fiatal korában, valamint zordabb teleken a tövek tövét vastagon (20-30 cm) érdemes lombbal vagy szalmával takarni. Konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, de hűvös helyen kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de időnként levéltetvek, pajzstetvek jelenhetnek meg rajta. A pangó vizes talajban gyökérrothadás is előfordulhat.

Kertstílus, ahová illik
A kínai rojtosvirág különösen jól illeszkedik:

Ázsiai (kínai, japán) kertekbe: A levelei textúrája, a tavaszi fehér virágok és a szabálytalan, természetes habitus miatt.

Természetes, vadvirágos kertekbe: Ahol a tavaszi hagymások, páfrányok és más erdei évelők társaságában érzi jól magát.

Erdős szegélybe: Tökéletes választás fák alá, ahol szórt, laza árnyékot kap.

Hangulatos előkertekbe: A bejárat két oldalára ültetve, vagy szoliterként.

Változatos növénytársítások
A sötétzöld lombozata és tavaszi fehér virágai kiválóan kombinálhatók más, hasonló igényű növényekkel :

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Különböző rododendron- (Rhododendron), havasszépe- (Kalmia) és sikerpenisz- (Leucothoe) fajok.

Árnyéktűrő évelők és talajtakarók: Páfrányok (Dryopteris), különböző színű levelű árnyékliliomok (Hosta), tarka levelű tüdőfű (Pulmonaria), gyöngyvirág (Convallaria majalis), meténg (Vinca minor).

Kora tavaszi hagymások: A fa még lombtalan, amikor a krókuszok (Crocus), a törpe nárciszok (Narcissus) és a gyöngyike (Scilla) virágoznak.

Díszfüvek: Tollbuga (Molinia), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), japán erdeifű (Hakonechloa macra).

Vörös levelű csodafűz (L. chinense var. rubrum) : Az alapfaj mellé ültetve a zöld és a bordópiros lombozat gyönyörű kontrasztot alkothat .

USDA besorolása: 8-10 (Magyarországon, a 6-7-es zónákban a növény mérsékelten télálló; szabadföldi nevelése kockázatos, biztonságosan konténerben, teleltethető formában nevelhető).
8a-10a USDA-zóna

Lucques (Lucca) olíva, olajfa	**Olea europaea 'Lucques'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Lucques (Lucca) olíva, olajfa (Olea europaea Lucques) az olajfák egyik legkiválóbb és legkeresettebb asztali fajtája, amely Franciaország déli részéről, Languedoc régióból származik. A Lucques név a Hérault megyében található Luc-sur-Orbieu településre utal, ahol ezt a fajtát hagyományosan termesztik. Ez a fajta a kiváló íz, a különleges formájú termés és a megbízható hozam hármasát kínálja, ami a gasztronómiai célú olajbogyó-termesztés egyik kedvencévé teszi. A Lucques olajbogyóit gyakran a világ legjobb asztali olajbogyójaként emlegetik.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Lucques közepes termetű, 4-6 méter magas és 3-5 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-7 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Lucques igazi büszkeségei: a bogyók közepesen nagyok, 4-6 grammosak, jellegzetesen félhold alakúak vagy enyhén görbültek, oválisak, éréskor zöldek, majd sötétlilára vagy feketére színeződnek. A Lucques egyik legnagyobb különlegessége, hogy hagyományosan zöld állapotban szüretelik, amikor a legjobb az ízük. Húsuk vastag, roppanós, lédús, enyhén édeskés, mandulás, diós jegyekkel, kellemes, nem keserű olajbogyóízzel. A Lucques olajhozama alacsony, ezért olajpréselésre nem ajánlott, kizárólag asztali célra termesztik.
Igényei és gondozási útmutató: A Lucques a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és a kiváló íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Lucques jól tűri a metszést. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a liszttharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Lucques a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, különösen a dél-francia vidék hangulatát. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad. Gasztronómiai kertekben a kiváló minőségű asztali olajbogyó termesztésére kifejezetten ajánlott.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis), oregánó (Origanum vulgare) és szantolina (Santolina chamaecyparissus) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Lucques mellé ültetett más olajfafajták (például Frantoio, Leccino, Pendolino, Cailletier, Grossane) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Lucques részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Lucques kiváló választás azok számára, akik a világ egyik legjobb asztali olajbogyóját szeretnék saját kertjükben termeszteni, és egy különleges, félhold alakú, roppanós, mandulás ízű olajbogyófajtát keresnek, amely a dél-francia kertek hangulatát idézi. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Mézillatú bogyóspuszpáng	Sarcococca confusa	3 950 Ft	3 950 Ft

A mézillatú bogyóspuszpáng (Sarcococca confusa) egy kis növésű, örökzöld cserje, mely különleges vonzerejével és illatával varázsolja el a kertészeket. Tökéletes az árnyékos sarkokban való telepítésre, mivel tűri a félárnyékos környezetet. A tél végén és a tavasz elején megjelenő, kicsi, fehér virágai erőteljes mézillatot árasztanak, ami vonzza a méheket és más beporzókat. Ezeket követik a fényes fekete bogyók, amelyek gyönyörű kontrasztot alkotnak a zöld levelekkel.
A mézillatú bogyóspuszpáng ideális választás mediterrán vagy természetes kertekbe, valamint városi kertekbe, ahol helyet keresnek az árnyékos, nedves helyeken növekvő növények számára. Csoportos ültetésekkel még látványosabb hatást érhetünk el, míg szoliterként is megállja a helyét.
Gondozási útmutató:

Helyválasztás: Árnyékos vagy félárnyékos helyeken a legszebbek, jól bírják a nedves talajt.
Talaj: Jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj a legideálisabb.
Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges különösen száraz időszakokban, de kerüljük a pangó vizet.
Metszés: Forma megtartása érdekében tavasz végén vagy nyár elején végezzen metszést.
Tápanyag: Évente kora tavasszal, a növekedés időszakában tápoldatozzuk.

Zóna: 6a

Mirtuszfüge, Fidzsoa	Acca sellowiana	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Fidzsoa, más néven Mirtuszfüge vagy Brazil guáva, Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi vidékeiről – Brazília, Uruguay, Paraguay, Argentína – származó örökzöld gyümölcscserje. A mirtuszfélék családjába tartozó növény egzotikus megjelenésével és különleges, ananász-eper ízű termésével egyre népszerűbb a hazai kertekben.
Örökzöld, bokros növekedésű cserje vagy kis fa, amely kifejlett állapotban 2-5 méter magas és 2-3 méter széles lehet. Növekedési üteme lassú, ami miatt dézsás tartásra is kiválóan alkalmas. Levelei átellenesek, tojásdadok vagy elliptikusak, 3-7 cm hosszúak, bőrszerűek, felszínük fényes sötétzöld, fonákjuk ezüstösen molyhos, ami jellegzetes, kékeszöld fényt kölcsönöz a növénynek.
A növény virágzása káprázatos látvány. Május-június folyamán a levelek hónaljában nyíló, 3-4 cm átmérőjű, húsos, fehér szirmú virágok jelennek meg. A négy húsos szirom színe krémszínű, középen pedig a feltűnő, hosszú, bíborvörös porzók díszlenek, amelyek a virágot egzotikus megjelenésűvé teszik. A virágok ehetőek, édeskés, kellemes ízűek, salátákba, desszertekbe is felhasználhatók.
A virágokat követően ősszel, október-novemberben érnek meg a termések. A fidzsoa termése tojás vagy körte alakú, 3-6 cm hosszú, felülete zöld, néha lilás beütéssel, gyakran viaszos bevonattal. A termés belseje krémes, áttetsző, lédús, apró magokkal tarkított. Illata intenzív, frissítő, íze az ananász, eper, guáva és menta keverékére emlékeztet. A termést félbevágva kanalazzuk ki, vagy a héjával együtt fogyaszthatjuk.
Igényei és gondozása
A Fidzsoa napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legjobb terméshozamot teljes napsütésben hozza, de félárnyékot is elfogad. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, enyhén savanyú (pH 5,5-6,5) kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.
Fiatal korában fagyérzékeny, ezért az első 2-3 évben téli takarást igényel: a tövét takarjuk be lombbal vagy komposzttal, a hajtásokat pedig fenyőágakkal vagy jutával védjük. Idősebb korában mérsékelten fagyálló, akár -12 °C-ig is ellenállhat, de keményebb teleken a fiatal hajtások visszafagyhatnak.
Délnyugati, déli fekvésű, védett helyre ültessük.
Gondozása egyszerű. Metszést kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhetünk: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat. A termőágakat ne vágjuk vissza, mert a virágok és termések az egyéves hajtásokon képződnek. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk.
Felhasználás a kertben
A Fidzsoa rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Magányosan, szoliterként ültetve egzotikus hangulatot teremt. Dézsában tartva a teraszok, erkélyek dísze lehet, és télen védett helyre vihető. Meleg fekvésű, déli vagy nyugati fekvésű kertekbe, házfalak elé ültetve a fal visszasugárzó melege segíti a teleltetést és a termésérést. Sövényként is nevelhető, mert sűrű lombozata jó takarást nyújt. Örökzöld lombozata egész évben díszít.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, meleg fekvést kedvelő, mediterrán hangulatú növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula, a rozmaring, a kakukkfű és más fűszernövények. Örökzöld cserjékkel, például babérmeggyel, tűztövissel vagy borókákkal kombinálva egész évben díszítő, struktúrált kompozíciót hozhatunk létre. Dézsás társításban jól mutat olajfa, citromfa vagy gránátalma társaságában.
8a-10b USDA-zóna

Nagyvirágú pálmaliliom	Yucca filamentosa	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Nálunk a legáltalánosabban ültetett, felálló levélzetű, erősen foszló levélszél jellemzi. Virágai nálunk június közepétől nyílnak.
A Yucca filamentosa, más néven Nagyvirágú pálmaliliom, egy impozáns dísznövény, amely származási helyén, Észak-Amerikában is kedvelt kertészeti választás. Eltérő tájakat idéző formája, valamint mutatós virágzata miatt előszeretettel ültetik mediterrán és modern kertekbe egyaránt. A növény jellemzője a hosszú, hegyes levelek rozettája, valamint nyár elején megjelenő, magas virágszára, amelyen nagyméretű, krémfehér harang alakú virágok nyílnak. A Yucca filamentosa rendkívül jól tűri a szárazságot és a napos helyeket, ezért ideális választás alacsony karbantartású kertekbe is.
Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Válasszon napos, jól szellőző helyet, ahol a talaj jó vízelvezetésű. A növény szereti a napsütést, de részleges árnyékot is elvisel.

Talajelőkészítés: A pálmaliliom a homokos, kavicsos talajt kedveli. Ügyeljen arra, hogy a talaj ne maradjon túl nedves, ezért érdemes gondoskodni a megfelelő vízelvezetésről.

Ültetés: Az ültetési mélység akkora legyen, hogy a gyökérlabda felső része éppen a talajszint alá kerüljön. Hagyjon legalább 60-90 centiméter távolságot a növények között a megfelelő növekedés érdekében.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Az első évben rendszeresen öntözze, de hagyja a földjét kiszáradni az öntözések között. Ezután a növény jól tűri a száraz időszakokat is.

Tápanyagok: Tavasszal érdemes lassan lebomló műtrágyával megtrágyázni a talajt, hogy elősegítse a növekedést.

Téli gondozás: Hómentes területeken kiültetve télálló, de hideg éghajlaton ajánlott a tövét mulccsal beborítani a fagyok ellen.

6a USDA-zóna

Nemes babér	**Laurus nobilis**	3 950 Ft	3 950 Ft

A Laurus nobilis, vagy babérfa, mérsékelt éghajlaton őshonos, és számos kerti környezetben virágzik. Lassú növekedésű, sűrű lombozata és elegáns, kúpos alakja teszi alkalmasá a kertek, teraszok és erkélyek díszítésére. A sötétzöld, bőrös levelek széles kulináris felhasználásra is alkalmasak, és különleges aromát kölcsönöznek az ételeknek. A babérfa kifejlett példányai virágokkal borítottak, melyek kellemesen illatosak. A növény hosszú életű és tűrőképes, ideális kertekbe, cserjés területekre vagy edényes ültetéshez egyaránt. A napos vagy félárnyékos helyet kedveli, és jól alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz. A babérfa nem csupán dísznövény, hanem a konyhában is nélkülözhetetlen. Friss vagy szárított leveleit felhasználva ízesítőként szolgálnak számos ételben, levesekben és mártásokban. Ezáltal a Laurus nobilis nemcsak a kertek szépségét növeli, hanem a kulináris élményeket is gazdagítja. Fedezze fel a babérfa varázslatos világát, és tegye kertjét még gazdagabbá ezzel az egyedülálló és hasznos növénnyel!
8a-10b USDA-zóna

Novita babérmeggy	**Prunus laurocerasus 'Novita'**	3 450 Ft	3 450 Ft

A 'Novita' babérmeggy gyönyörű örökzöld növény, amely a hagyományos babérmeggy (Prunus laurocerasus) hibrid faja, és az egyik legnépszerűbb választás a sövények és zöldfalak létrehozásához. A 'Novita' növény bőséges, sötétzöld, fénylő levelekkel rendelkezik, amelyek egész évben díszítik a kertet. A levelek ovális alakúak és simák, ami egyenletesen és sűrűn nővő. Ezáltal a 'Novita' tökéletesen alkalmas a sűrűséget és a magasságot biztosító sövények kialakítására. Ez a növény a teljes napsütéstől a félárnyékos helyekig jól érzi magát, és tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a homokos és agyagos talajokat is. Rendkívül ellenálló és tűrőképes a szennyezett városi környezettel és a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. A Prunus laurocerasus 'Novita' növény ideális választás sövények, kerítések vagy zöldfalak létrehozásához, amelyek kívül-belül megfelelő védelmet és szépséget nyújtanak. Emellett a sűrű növekedési habitusa miatt akadályozza a behatolást, ezáltal intimitást teremt a kertben. Összességében a Prunus laurocerasus 'Novita' egy gyönyörű és tartós örökzöld növény, amely a kertekben funkcionális és esztétikai előnyöket nyújt. Az elegáns sötétzöld levelek és a sűrű növekedés miatt ez a fajta tökéletes választás lehet sövények, kerítések vagy zöldfalak kialakításához.

Nyugati szamócafa	**Arbutus unedo**	3 900 Ft	4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Arbutus unedo, más néven Nyugati szamócafa, különlegesen díszítő örökzöld cserje vagy kis fa, amely a Mediterrán térségben és az Atlanti-óceán partvidékén őshonos. A növény jellegzetes megjelenésének köszönhetően ideális választás lehet a kertekben és parkokban.
Kifejlett állapotában akár 5-10 méter magasságig is megnőhet. Lombozata sötétzöld, fényes és bőrnemű, ami egész évben vonzó megjelenést kölcsönöz a növénynek. Tavasztól nyár végéig apró, krémszínű vagy rózsaszín virágokkal díszített. Ezek a virágok gyakran vonzzák a méheket és más beporzókat.
Gyümölcsei körülbelül diónyi méretűek és pirosak, majd sárgára érnek. A gyümölcs érettségi ideje ősszel van, és ízletes, édeskés, enyhén fanyar íze miatt sokan szívesen fogyasztják frissen vagy például lekvár és kompót készítéséhez.
Gondozási útmutató:

Talaj és ültetés: Ültessük a Nyugati szamócafát jó vízáteresztésű talajba. A tavasz vagy ősz a legjobb időpont az ültetésre.

Napfény: A növény szereti a napfényt, de jól tűri az enyhe árnyékot is, különösen a forró nyári hónapokban.

Öntözés: A Nyugati szamócafa mérsékelt öntözést igényel. Nyáron tartsuk a talajt enyhén nedvesen, de kerüljük a túlzott öntözést, ami károsíthatja a gyökereket.

Trágyázás: Az év elején, tavasszal vagy kora nyáron trágyázzuk meg a növényt általános célú lassú felszabadulású műtrágyával.

Metszés: Az Arbutus unedo kevésbé igényel metszést, de az elhalt vagy beteg ágakat távolítsuk el rendszeresen. Az alakító metszést a tél végén vagy tavasszal végezzük.

Gyümölcsszedés: Az érett gyümölcsöket óvatosan szedjük le ősszel. A friss gyümölcsöt akár nyersen is fogyaszthatjuk, vagy felhasználhatjuk különböző ételek és italok készítéséhez.

A Nyugati szamócafa egy gyönyörű dísznövény, amely emellett finom gyümölcsöt is kínál. Ha megfelelő gondozás mellett, sokáig élvezhetjük a növény látványát és ízletes gyümölcseit is.
8a-10b USDA-zóna

Örökzöld bangita	**Viburnum tinus**	3 950 Ft	4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Viburnum tinus (Örökzöld bangita) a Földközi-tenger térségéből származik, ahol mind az európai, mind az afrikai oldalon megtalálható. Az egyik legrégebben ültetett dísznövénye a nyugat-európai, főleg az angol kerteknek. Nem tévedés, már 500 éve is ültették Angliában. Mindez nem véletlen, mert egy kifejezetten dekoratív megjelenésű, akár 3-4 m magasra megnövő örökzöld cserje, melynek fehér virágai tél végén-kora tavasszal szinte teljesen beborítják az egész növényt. Nálunk csak védett helyre érdemes ültetni a szabadba, de kiváló megoldás teraszokra dézsás növényként is!

Külső tulajdonságok

Magasság és forma: 2–3 méter magasra és hasonló szélességre nő, sűrű, felálló vagy kerekded habitussal.

Levelek: Bőrszerű, fényes sötétzöld, ovális vagy lándzsa alakú, 4–10 cm hosszú. Az alsó levélfonákban szőrcsomók (domatia) találhatók, amelyek ragadozó atkák számára nyújtanak menedéket.

Virágok: Rózsaszín rügyekből nyílnak fehér, illatos virágok, amelyek tömött ernyős virágzatokban (5–10 cm átmérőjű) nyílnak.

Termés: Metálkék, majd éréskor fekete színű, 5–7 mm-es bogyók, amelyek madarak számára vonzóak, de emberek számára mérgezőek lehetnek.

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félig árnyékos helyeket kedvel. Teljes árnyékban gyengébben virágzik.

Talaj: Jól vízelvezető, laza talajt preferál (agyon, homokon vagy közepes talajon is megfelelően nő). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, de a kifejlett növények szárazságot is jól tolerálnak.

Táplálás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott műtrágya vagy komposzt alkalmazható a egészséges növekedés érdekében.

Metszés: Ritkán igényel metszést. Ha szükséges, tavasszal, a virágzás után visszavágható a forma megőrzése vagy a sűrűség növelése érdekében.

Télállóság: -10°C-ig teljesen télálló, de fiatal növényeket érdemes mulccsal védeni a talajfagy ellen.

Ültetési javaslatok

Időzítés: Tavasz vagy ősz ideális, amikor a talaj nedves és a növény kevésbé aktív.

Távolság: Sövényként ültetve 1-1,5 méteres távolságot ajánlunk a zárt hatás érdekében.

Hely: Használható sövényként, határok kialakítására, vagy akár erdei kerti környezetben i

Alkalmazási javaslatok

Sövényként: Gyors növekedése és sűrű ágrendszere miatt kiváló élő kerítés vagy zaj- és szélfogó.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliterként: Egyedülálló téli virágzása és éves megjelenése miatt feltűnő fókuszpontot teremt a kertben.

Csoportos ültetés: Más örökzöldekkel (pl. tuják) kombinálva kontrasztos hatást érhetünk el3.

Városi környezet: Jól tolerálja a szárazságot és a szennyezett levegőt36.

A bangita madárbarát növény, bogyói madarak számára vonzóak, és leveles ágai menedéket nyújthatnak a kisebb állatok számára38.
Az örökzöld bangita nemcsak díszít, hanem praktikus funkcióval is bír: például por- és zajvédelmet nyújt, és gyorsan növekvő habitusa miatt rövid idő alatt zárt sövényt alkot.

7b-10a USDA-zóna

Oszlopos arizóniai ciprus	**Cupressus arizonica 'Fastigiata'**	8 500 Ft	8 500 Ft

Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna

Oszlopos olajfa	**Olea europaea 'Pyramidalis'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Az Oszlopos olajfa (Olea europaea Pyramidalis) az olajfák egyik legkülönlegesebb fajtája, amely Olaszországból származik, és oszlopos, ciprusra emlékeztető habitusáról nevezetes. Ez a fajta a kiváló forma, a szűk növekedés és a megbízható szélállóság hármasát kínálja, ami a mediterrán kertek és a szűk helyek egyik legkedveltebb olajfajtájává teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az oszlopos olajfa a hagyományos olajfáknál jóval szűkebb termetű. Kifejlett magassága 5-7 méter, szélessége mindössze 1-1,5 méter. Habitusa oszlopos, karcsú, a ciprushoz hasonlóan szűk, sűrű, függőlegesen megnyúlt koronával. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek. A levelek sűrű állásúak, ami a fa kompakt megjelenését erősíti. A virágok tavasszal nyílnak: aprók, fehérek, illatosak. A termések kicsik, ovális alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek, de a fa fő értéke nem a termés, hanem a látványos forma.
Igényei és gondozási útmutató: Az oszlopos olajfa a legszebb formáját teljes napos, meleg fekvésben hozza. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos vagy kavicsos talajokat kedveli. A pangó vizet nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban szárazságtűrő. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal gondoskodhatunk. Metszése minimális, mivel a fa természetesen is megtartja oszlopos formáját. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, a fiatal fákat érdemes az első években téli takarással védeni. Konténerben nevelve fagymentes, hűvös helyen teleltethető.
Kertstílus és növénytársítások: Az oszlopos olajfa különleges formája miatt rendkívül sokoldalúan használható. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, függőleges karaktert adva. Szűk helyekre, kis kertekbe, előkertekbe, fasorokba és sövénynek kifejezetten ajánlott, mivel keskeny habitusa miatt nem terjeszkedik. Tengerparti kertekben kiváló szélvédő sövényként is funkcionál. Déli fekvésű teraszokon nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a szürkészöld lombozat és a szigorúan függőleges forma izgalmas textúrát ad.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: A fa tövébe ültetett levendula, rozmaring, kakukkfű és zsálya erősíti a mediterrán hangulatot. Ciprussal: A hasonló oszlopos forma miatt egységes, függőleges akcentusú kompozíciót alkot. Magyaltölggyel: A magyaltölgy sötétzöld lombozata mellett a fa ezüstös-zöld színe gyönyörű kontrasztot ad. Alacsony talajtakarókkal: A fa alá ültetett kakukkfű vagy varjúháj takarja a csupasz talajt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok vagy nárciszok tavasszal vidám színfoltot jelentenek.
Az oszlopos olajfa kiváló választás azok számára, akik szűk helyre, fasorba, sövénybe vagy tengerparti kertbe keresnek mediterrán hangulatú, oszlopos növekedésű, szélálló olajfát. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Oszlopos tiszafa	**Taxus baccata 'Fastigiata'**	5 950 Ft	6 350 Ft

Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétlaki növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Parry agavé	**Agave parryi**	4 550 Ft	4 950 Ft

A Parry agavé, egy varázslatos növény, amely a sivatagok vadregényes szépségét idézi meg.
Közepes méretű agávé, amely lassan növekszik, de idővel impozáns méreteket érhet el. A növény húsos, hegyes levelei kerekdedek és vastagok, gyönyörű ezüstszürke vagy kékes színűek. Az átlagosan 30-60 cm hosszúságú levelek végén apró tüskék találhatók, ami tovább emeli a növény sivatagi báját.
Az Agave parryi közepén magasodó, impozáns virágzatot hoz létre, amely kerekded gömb alakot ölt, és látványos sárga vagy sárga-zöld virágokkal pompázik. A virágzat a növény magasságától függően akár 3 méter magasra is emelkedhet, ami igazi látványosságot nyújt.
Gondozás: Az Agave parryi egy viszonylag könnyen gondozható növény, amely jól alkalmazkodik a szárazságtűrő és meleg klímához.

Agave parryi igényli a napfényt, a virágzat kifejlődéséhez erős fény szükséges. A növény jól tűri a meleg, száraz éghajlatot, de hideg éjszakákat kerülni kell, mert ez károsíthatja a növényt.

Az agavék kevesebb vízre vágynak, és az Agave parryi sem kivétel. Öntözni csak akkor kell, amikor a talaj teljesen kiszáradt. Azonban ügyelni kell arra, hogy a pangó víztől megóvjuk a gyökérzónát.

Csodálatos választás lehet sziklakertekbe, mediterrán stílusú kertekbe, vagy szárazságtűrő kertekbe, ahol a sivatagi varázslatot szeretnénk megidézni.

7b-9b USDA-zóna

Pink Blush japán szentfa	**Nandina domestica 'Pink Blush'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Pink Blush japán szentfa a Nandina domestica egyik legkedveltebb, színes lombozatú kompakt változata. Nevéhez híven („rózsaszín pirulás”) a fajta a növény különböző életszakaszaiban mutatja a rózsaszín és a piros különböző árnyalatait, így egész évben változatos színfoltot biztosít a kertben.
Külső megjelenés
A Pink Blush japán szentfa kompakt, bokros növekedésű, feltörő, bambuszra emlékeztető szárakkal rendelkezik. Kifejlett magassága és szélessége 0,6-1 méter között alakul, ami ideálissá teszi kis kertekbe, előkertekbe és konténerekbe. A növekedési erélye közepes.
A növény legnagyobb dísze a lombozat évszakonként változó színjátéka:

Tavasszal: Az új hajtások élénk rózsaszín színben fakadnak, a fiatal levelek márványozott, pettyezett mintázatot mutatnak rózsaszín és zöld árnyalatokkal.

Nyáron: Az idősebb levelek sötétzöld színűvé válnak, miközben a fiatal hajtásokon továbbra is megjelenik a rózsaszín foltozottság.

Ősszel és télen: Az egész növény intenzív bordóvörös vagy piros színbe borul, ami a hideg idő beköszöntével egyre mélyül. Ez a téli szín a kert egyik legfeltűnőbb dísze lehet.

A levelek szárnyalt összetettek, lándzsás levélkékből állnak, hasonlóan a többi japán szentfához. Tavasszal a növény apró, fehér virágokat hozhat kúpos bugavirágzatban, amelyeket a nyár végén, ősszel apró, élénkpiros bogyós termések követhetnek. A termések a madarak kedvelt csemegéi.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy napos helyet egyaránt kedvel. A legélénkebb, legintenzívebb rózsaszín és őszi piros színt napos fekvésben hozza. Félárnyékban a lombozat színe kevésbé élénk, a rózsaszín foltok halványabbak lehetnek.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag talajt igényel, bár a legtöbb talajtípushoz alkalmazkodik (homok, vályog, agyag). A pH tekintetében nem válogatós: a savanyú, a semleges és a lúgos (meszes) talajokat is tolerálja. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrők.

Tápanyag-utánpótlás: Alacsony tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható.

Metszés: A Pink Blush kompakt, természetesen szép formájú, ezért rendszeres metszést nem igényel. A metszést elviseli, de nem szükséges a forma megtartásához. Szükség esetén késő télen vagy kora tavasszal lehet formázni.

Telelés: USDA besorolása 6-10. A növény a 6-os zónában (ahová Magyarország nagy része is tartozik) félévelő lehet, télen a levelek egy részét vagy egészét hullathatja, sőt a szárak is visszafagyhatnak a talajszintig, de tavasszal újra kihajt. Védett, szélvédett fekvésbe (házfal mellé) ültessük, és a fiatal növényeket télen vastag lombtakaróval mulcsozzuk. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, pince) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, kártevők nem támadják. A szarvasok és nyulak is kerülik. Lúgos (meszes) talajban a levelek klorózisosak (sárgulhatnak) lehetnek.

Kertstílus, ahová illik
A Pink Blush japán szentfa a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Ázsiai (japán, kínai, zen) kertekbe: A növény textúrája és évszakos színváltása tökéletesen illik az ázsiai kertek esztétikájába.

Modern, letisztult kertekbe: Egységes, kompakt formája miatt ideális választás.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Természetes, erdős kertekbe: A természetes színátmeneteket mutató lombozata harmonikusan illeszkedik.

Városi kertekbe, előkertekbe: Kompakt mérete és alacsony igényei miatt kisebb kertekbe is beilleszthető.

Konténeres teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe: Tökéletes választás dézsákba, cserepekbe, mivel lassú növekedésű és jól bírja a szűk helyet.

Szegélynövényként, alacsony sövényként: Metszés nélkül is sűrű, színes szegélyt alkothat.

Változatos növénytársítások
A Pink Blush élénk rózsaszín és bordóvörös lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel:

Sötét lombozatú növények: Vörös levelű borbolya (Berberis), sötét törpe boróka, japán vértfű (Imperata cylindrica) – a sötét színek kiemelik a növény világosabb rózsaszín árnyalatait.

Lila és kék virágú évelők: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia) – a lila-kék színek a rózsaszínnel harmonikus, romantikus kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – az ezüstös szürke kiemeli a rózsaszín és piros árnyalatokat.

Sárga levelű növények: Arany borbolya (Berberis thunbergii 'Aurea'), Sundance mexikói narancsvirág (Choisya 'Sundance') – a sárga és a rózsaszín élénk, vidám párost alkot.

Díszfüvek: Tollbuga (Molinia), kínai ezüstpázsit (Miscanthus), japán erdeifű (Hakonechloa macra) – a füvek laza, mozgó habitusa oldja a növény tömött formáját.

Alacsony talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

USDA besorolása: 6-10 (Magyarországon a 6b-7b zónákban a növény szabadföldben is nevelhető, de védett, szélvédett helyre és vastag téli mulcsrétegre van szüksége, mivel a levelei a téli hidegben elfagyhatnak. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes helyen kell teleltetni).

Poco Orange fáklyaliliom	**Kniphophia x 'Poco Orange'**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Poco Orange fáklyaliliom egy tömör, bozontos növekedésű évelő növény. Fürtöket alkotó, fűszerű, sötétzöld levelei rövidek, akár 40 centiméter magasra is megnőnek.
Legszembetűnőbb jellemzője a narancssárga virág, amely a levelek fölött magasodik, akár 50 centiméter magasra is megnőhet. A virágzat tömött, 10-12 centiméter hosszú fürt, amely égő fáklyára vagy vörös izzóra emlékeztet. A virágzati időszak rendkívül hosszú, júliustól októberig tart, és folyamatosan jelennek meg az új virágok.
Gondozási útmutató

Fényigény: A teljes napsütés az ideális számára, de forró éghajlaton elviseli a könnyű délutáni árnyékot is.

Talajigény: A jól vízelvezető, laza szerkezetű, humuszban gazdag talajt részesíti előnyben. A pangó vizet, különösen télen, egyáltalán nem tűri.

Vízigény: Közepes vízigényű. A szárazságot jól tűri, de a rendszeres öntözés elősegíti a gazdag virágzást.

Metszés: A elvirágzott szárak eltávolítása ösztönzi a következő virágok képződését. A leveleket késő ősszel vagy kora tavasszal vágjuk vissza.

Télállóság: Meglehetősen jó fagytűrő, -23°C-ig

. Nedves talajon téli védelem ajánlott.

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával vagy komposzttal támogatható.

Ültetési javaslat
A Poco Orange fáklyaliliom rendkívül sokoldalúan használható fel. Alacsony termete miatt kiválóan alkalmazható szegély- és sövényültetésre, kis kertekbe és kövezett utak szegélyezésére is. Díszes megjelenése miatt szoliter növényként is kiemelkedő hatású, akár egy gyepben vagy nyílt területen. Konténeres nevelésre is kiválóan alkalmas, így terasz vagy erkély díszítésére is felhasználható.

Poppin Purple afrikai szerelemvirág	**Agapanthus 'Poppin Purple'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

'Poppin Purple' afrikai szerelemvirág, Dél-Afrikából származó, rendkívül dekoratív évelő növény, amely a mediterrán kertek egyik meghatározó dísze. A 'Poppin Purple' fajta feltűnő, mélylila virágzataival a nyár közepétől késő őszig varázsol intenzív színfoltot a kertbe. Neve - „Poppin” - a virágok élénk, szinte „kipattanó” színére utal.
Évelő, bokros növekedésű, tőlevélrózsás növény, amely kifejlett állapotban 50-70 cm magas és 40-50 cm széles. Levelek vékonyak, 30-50 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, dús, sűrű lombtömeget alkotnak. A levelek örökzöldek, bár hidegebb teleken részben visszafagyhatnak.
A növény igazi dísze a nyári virágzat. Júliustól egészen szeptemberig, a nyár közepétől késő őszig emelkednek ki a lomb közül a vaskos, 40-60 cm hosszú virágszárak, melyek csúcsán 10-15 cm átmérőjű, ernyős virágzatok nyílnak. Az ernyőket számos - akár 30-50 darab - csillag alakú, mélylila, ibolyáslila színű virág alkotja. A virágok színe intenzívebb és sötétebb, mint a hagyományos kék agapantuszoké, ami különösen feltűnővé teszi a növényt. A virágok hosszan tartóak, vágott virágként is kiválóak, csokrokban akár egy hétig is eltarthatók.
Igényei és gondozása
A 'Poppin Purple' agapantusz napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza; félárnyékban virágzása mérsékeltebb lehet, és a virágok színe is halványabb lehet. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, homokos-vályogos kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, a gumós gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak.
Hazánkban a fagyérzékenysége miatt a legbiztonságosabb konténerben, dézsában tartani, és télen fagymentes, világos helyen (5-10 °C) teleltetni. Védett, déli fekvésű, házfal melletti kertekbe azonban ki is ültethető, ilyenkor téli takarást igényel: a tövét vastagon takarjuk be lombbal, komposzttal, a leveleit pedig fenyőágakkal vagy jutával védjük.
Gondozása egyszerű. A virágzás után az elnyílt virágszárakat vágjuk vissza. A rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja, de a túlöntözéstől óvakodjunk. Tavasszal és nyár elején tápanyag-utánpótlásról gondoskodjunk kálium- és foszforban gazdag műtrágyával. 3-4 évente tavasszal tőosztással szaporíthatjuk és frissíthetjük fel.
Felhasználás a kertben
A 'Poppin Purple' agapantusz kiválóan alkalmas konténeres, dézsás tartásra, ahol teraszok, erkélyek, bejáratok dísze lehet. Intenzív lila színe miatt különösen jól mutat világos, fehér vagy szürke hátterek előtt. Mediterrán hangulatú kertekben, déli fekvésű ágyásokban, házfalak tövében csoportosan ültetve mutat a legjobban. Vegyes évelőágyások középső sorába ültetve magasságával és intenzív színével struktúrát ad a kompozíciónak. Vágott virágnak is kiváló, elegáns csokrok alapanyaga lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes kihasználni a mélylila virágok kontrasztteremtő képességét. Kiváló partnerei lehetnek a sárga virágú növények, például napvirággal (Helianthemum) vagy cserjés ligetszépével (Oenothera fruticosa) élénk, kontrasztos kompozíciót hozhatunk létre. Fehér virágú évelőkkel, mint a fehér harangvirág (Campanula) vagy a gyűszűvirág (Digitalis) fehér változata, elegáns, visszafogott együttest alakíthatunk ki. Ezüstös lombú növényekkel, például levendulával (Lavandula) vagy molyhos madárhúrral (Cerastium tomentosum) ültetve a lila virágok még intenzívebben érvényesülnek. Díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a kínai ezüstfű (Miscanthus), ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk.
USDA 8a

Rainbow kamélia	**Camellia sasanqua 'Rainbow'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Rainbow' kamélia a Sasanqua fajcsoportba tartozó, látványos és illatos őszi virágzású fajta. Nevét („szivárvány”) a virágok színátmenetéről kapta, mivel a fehér szirmok széle rózsaszínben vagy pirosban játszik. Az eredeti fajtát a kaliforniai Nuccio faiskola választotta ki az 1950-es években Japánból származó növények közül, és 1956-ban jegyezték be hivatalosan. A sasanqua kaméliák őshazája Japán part menti erdei, ahol a fák alatti cserjeszintben nőnek.
Külső megjelenés
A 'Rainbow' kamélia erős növekedésű, felálló, laza koronájú örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága elérheti a 4-8 métert is, bár Magyarországon jellemzően 4-6 méter között marad, szélessége 2,5-4 méter között alakul. A növekedési erélye erős, a végső méretét 10-20 év alatt éri el.
A fiatal levelek jellegzetesen lilás vagy vöröses árnyalatúak, ami tavasszal különösen mutatós. A beérett levelek sötétzöldek, fényesek, bőrszerűek, oválisak vagy elliptikus alakúak, 5-8 cm hosszúak, szélük finoman fűrészes. A levélfelület fényes, a fonák világosabb zöld.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok közepes méretűek, 5-7 cm átmérőjűek, egyszerű vagy fél-telt formájúak, általában 5-7 sziromlevéllel. A szirmok alapszíne fehér, és minden szirom szélén feltűnő rózsaszín vagy piros szegély (edging) húzódik, amely a virág közepé felé haladva elhalványul. A virágok aranysárga porzócsokra (a feltűnő, hosszú porzószálak) kiemelkedő dísze a virágnak, és vonzza a beporzó rovarokat. A virágok enyhén, de határozottan illatosak, kellemes, virágos, édeskés illatuk van. A virágzás ősszel kezdődik (októbertől) és a kora téli hónapokig (decemberig) tart, amikor a kertben kevés más növény virágzik.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyet kedvel. A reggeli napot és a szórt fényt jól viseli, de a déli erős napfénytől és a forró, délutáni naptól védeni kell. A sasanqua fajták a japán kaméliáknál (Camellia japonica) több napot is elviselnek, de a legszebb virágzást világos, de nem tűző napos helyen hozzák. A teljes napfényben a levelek megéghetnek.

Talaj: Savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5), humuszban gazdag, jó vízáteresztő, laza, üde talajt igényel. A legjobb a homokos vályog, de a laza agyag és a tőzegtalaj is megfelelő, ha jó a vízelvezetése. A meszes talajokban a növény nem fejlődik megfelelően, a levelei megsárgulnak (klorózis). Ültetés előtt a talajt érdemes savanyú hatású komposzttal, tőzeggel vagy rododendronfölddel javítani.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, egyenletes talajnedvességet kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket gyakrabban kell öntözni. Kerülni kell a pangó vizet és a talaj teljes kiszáradását. A legjobb, ha a talaj felső 5-8 cm-e (kb. 3 hüvelyk) kiszárad a következő öntözés előtt.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a virágzás után érdemes savanyú hatású, kaméliáknak vagy rododendronoknak való műtrágyával megtámogatni (pl. erikaceák műtrágyája). A tápanyag-utánpótlást márciusban (a növekedés megindulásakor) és közvetlenül a virágzás után érdemes elvégezni. A túlzott nitrogéntartalmú trágyák károsíthatják a növényt.

Metszés: Virágzás után, kora tavasszal lehet metszeni. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a sűrű, bokros növekedés serkenthető. Metszést követően a növény dúsabban bokrosodik. A metszést a következő évi virágbimbók megjelenése előtt kell elvégezni.

Telelés: USDA besorolása 7-9 (RHS H4, -5°C és -10°C közötti hőmérsékletet is elvisel). A sasanqua kaméliák a japán kaméliáknál kissé érzékenyebbek a hidegre. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhetnek, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük, mert a kaméliák érzékenyek a hideg, száraz szelekre. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz, lépcsőház) kell teleltetni. A téli időszakban a fagyott talajban a növény nem tud vizet felvenni, ezért az örökzöld levelei kiszáradhatnak (ún. téli aszály). Ennek megelőzésére vastag mulcsréteg (5-10 cm) alkalmazása javasolt.

Kártevők, betegségek: A kaméliák általában ellenállóak, de érzékenyek lehetnek a mézgagombára, a fitoftórás gyökérrothadásra, a kamélia gubacsra és a kamélia levélfoltosságra. A virágokat a kamélia sziromrothadás is érintheti.

Kertstílus, ahová illik

Ázsiai kertekbe (japán, kínai): Nélkülözhetetlen eleme az ázsiai hangulatú kerteknek.

Erdős, természetes hatású kertekbe: Nagyszerűen illik a rododendronok, havasszépek, páfrányok társaságába.

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve a sötétzöld lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós.

Konténeres teraszokra: Tökéletes választás nagyobb cserépbe, dézsába (minimum 7 literes konténerbe), de ilyenkor a téli védelemről gondoskodni kell.

Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Rododendron, havasszépe (Kalmia), sikerpenisz (Leucothoe), törpe tűlevelűek (pl. boróka, tuja).

Lombhullató díszcserjék: Japán juhar (Acer palmatum), hortenzia (Hydrangea).

Árnyéktűrő évelők: Páfrányok (Dryopteris, Polystichum), árnyékliliomok (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria), japán erdeifű (Hakonechloa macra).

Kora tavaszi hagymások: Krókusz, hóvirág (Galanthus), gyöngyike (Scilla).

Talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

Eredete és története
A 'Rainbow' fajtát a kaliforniai Nuccio faiskola választotta ki az 1950-es években egy Japánból származó, C. sasanqua csoportba tartozó növények közül. A fajtát hivatalosan 1956-ban jegyezték be, az 'J#8' jelzésű tételből. Nevét a virágok színátmenetéről kapta („szivárvány”), mivel a fehér szirmok széle rózsaszínben játszik. A fajta eredeti japán neve nem ismert. Létezik a 'Rainbow' fajtából egy 'Rainbow Variegata' ('Rainbow Variegated') néven ismert, levelében tarka változat is, amelyet Németországban nemesítettek; ennek levelei sötétzöldek, ezüstszürke szegéllyel, de a virágai megegyeznek az alapfajtáéval.
USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Rosa selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Rosa'**	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Rosa selyemmirtusz Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, 'Rosa' változat a faj rózsaszín virágú, nemesített formája. A fajta neve („Rosa” = rózsaszín) a virágok rózsaszín színére utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, rózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot.
Külső megjelenés
A selyemmirtusz 'Rosa' közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-4 méter, szélessége 1,5-3 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-t is nőhet. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek viszonylag kicsik, 3-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, tojásdadok vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-30 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Rosa' fajta virágának színe rózsaszín, a halványrózsaszíntől (pasztell rózsaszín) a középrózsaszínig, néha enyhén lilás árnyalattal. A virágok közepe sárgás vagy zöldessárga. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák. A nyitott virágok a napos időben a leglátványosabbak, de a krepp-papír szerű szirmok még részleges árnyékban is dekoratívak.
Termés
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő, laza, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, kijelölt cserjéknek (pl. rózsa vagy virágos cserjék számára kifejlesztett) műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), mielőtt a növény kihajtana. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, sérült, keresztben növő, egymást dörzsölő ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást, mert a selyemmirtusz az új hajtásokon virágzik.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés: A selyemmirtusz 'Rosa' mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a fiatal növények és a hajtásvégek érzékenyebbek a fagyra. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország északi, keleti részein vagy a hideg, szeles télen a fiatal növényeket takarni (vastag lombtakaró, szalmával, fenyőgallyakkal takarni a gyökérterületet). A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A fagyott hajtásokat tavasszal, a metszéskor vágjuk vissza. A növény a gyökérzettől újrahajthat.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de bizonyos problémák előfordulhatnak:

Lisztharmat: A leggyakoribb betegség, különösen párás, szellőzetlen körülmények között. Fehér, lisztszerű bevonat a leveleken. Megelőzhető szellős hely ültetéssel, a levelek beázásának elkerülésével.

Levélfoltosság: Különböző gombák okozhatják, a leveleken barna vagy fekete foltok jelennek meg.

Levéltetű, pajzstetű, takácsatka: Ritkán, de megjelenhetnek. Ellenük használhatunk rovarölő vagy atkaölő szereket.

Felhasználás a kertben
A selyemmirtusz 'Rosa' a méretének, színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a rózsaszín virág más színekkel is jól kombinálható

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, házikertekbe – a délies hangulatot erősíti

Sorfa utcákba, parkokba, közterületekre – a hámló kéreg és a virág miatt dekoratív

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de teleltetésről gondoskodni kell

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet, a szeles körülményeket

Bonszai alapanyagnak – a kis méret, a hámló kéreg, a virág és az őszi szín miatt bonszainak is nevelhető

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat

Változatos növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A selyemmirtusz 'Rosa' rózsaszín virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók: Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák – a fehér és a rózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus), orvosi zsálya (Salvia officinalis), perovszkia (Perovskia) – a rózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mediterrán hangulatú összképet adnak Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia), aranycserje (Forsythia) – a rózsaszín és a sárga vidám, kontrasztos, napsütötte hatást keltenek Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj (Sedum) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a rózsaszín virágokat és a sötétzöld lombot Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca), árvalányhaj (Stipa) – a füvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját Ősszínű díszcserjék: Sárga levelű növények, vörös levelű juharok, sulyomcsersznye (Prunus) – a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel Más selyemmirtusz fajták – különböző színű (fehér, rózsaszín, lila, piros) selyemmirtusz fajták egymás mellé ültetve szivárványszerű hatást keltenek Télálló pálmák, ciprusok, borókák, magyalfák (Ilex) – a mediterrán, szubtrópusi hangulatot erősítik USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna - pl. Budapest, Dél-Dunántúl, Sopron, Szombathely környéke) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna - pl. Észak-Magyarország, Alföld, Dunántúli-középhegység) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba).			
Sárgatarka levelű japán babérsom	**Aucuba japonica 'Crotonifolia'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Sárgatarka levelű japán babérsom (Aucuba japonica 'Crotonifolia') – Az árnyékos kertek aranyos ékköve
A sárgatarka levelű japán babérsom a japán babérsom (Aucuba japonica) egyik legszebb, legsötétebb tarka levelű változata. A fajta a 19. század óta ismert a kertészetekben, nevét a hasonlóan tarka levelű dísznövényről, a krotonról kapta. A növény a Földközi-tenger térségében és az Egyesült Államok déli államaiban is népszerű, de a Brit-szigeteken is kiválóan érzi magát.
Külső megjelenés
A sárgatarka levelű japán babérsom erőteljes, sűrű, bokros növekedésű, kifejlett magassága és szélessége 1,5-2,5 méter (akár 3 méter) között alakul. Növekedési erélye lassú, a végső méretet 10-20 év alatt éri el. A növény levelei nagyok, bőrszerűek, fényesek, 10-15 cm hosszúak, ép szélűek, tojásdadok vagy elliptikusak. A levél színe sötétzöld, a felületen sűrűn elszórt, mély sárga vagy aranysárga foltokkal, pettyekkel, amelyek a levélnek márványos, pettyes megjelenést kölcsönöznek. A foltozottság a növény egyik legfőbb dísze, és a fényviszonyoktól függően változhat – árnyékban a legszebb, a legsötétebb a lombozat színe.
A növény kétlaki, vagyis a hím- és nőivarú virágok külön egyedeken fejlődnek. A virágok tavasszal (április-májusban) nyílnak, aprók, jelentéktelenek, bíborvörösek, a levélhónaljakban ülnek. A terméskötődéshez szükség van egy hímivarú megporzó példányra. A megtermékenyült virágokból ősszel élénkpiros, fényes, 1-1,5 cm átmérőjű bogyós termések fejlődnek, amelyek egész télen át díszítik a növényt, és a madarak kedvelt csemegéi. Fontos tudni: a bogyók emberi fogyasztásra nem alkalmasak, fogyasztásuk gyomorpanaszokat okozhat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy árnyékos helyet kedvel, ahol a levelek tarkasága a legszebben érvényesül. A tűző napon a levelek megéghetnek, különösen a világosabb foltos részek, ezért a növényt a déli, erős napfénytől védeni kell. A növény jól tűri a teljes árnyékot is, ahol kevés más növény érzi jól magát.

Talaj: A talaj iránt nem válogatós, de a legjobban a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, nedves, humuszos talajban érzi magát. A pH tekintetében toleráns: a savanyútól a lúgos (meszes) talajokig is megél. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot és a gyökérversenyt is jól viseli.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrők, a természetes csapadék általában elegendő számukra, de a hosszan tartó aszályos időszakokban érdemes őket megöntözni. A talajt soha ne hagyjuk teljesen kiszáradni.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható a dús lombozat érdekében.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést, de jól tűri a metszést. Metszéssel formázható, sűríthető, illetve a túl hosszú, elszáradt hajtások visszavághatók. A metszés legjobb időpontja a kora tavasz, mielőtt a növény kihajtana. A visszavágás hatására a növény sűrűbben bokrosodik.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény akár -15°C-ig ellenáll a hidegnek, így Magyarország nagy részén gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel. A fiatal növényeket az első teleken érdemes vastag lombtakaróval takarni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, kártevők és betegségek ritkán támadják meg. A pangó vizes talajban a gyökérrothadás előfordulhat.

Felhasználás a kertben
A sárgatarka levelű japán babérsom a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Árnyékos kertekbe, erdős szegélyekbe – ahol a napfény hiánya miatt más növények nem érzik jól magukat, itt a babérsom kiemelkedően teljesít

Alapozó ültetésbe – házak, kerítések tövébe ültetve a tarka lombozatával kiemeli az épített elemeket

Sövénynek, szélfogónak – sűrűn ültetve a sötétzöld, tarka lombozatú sövényként is funkcionál

Szoliterként – magányosan, a gyep közepén vagy egy fa alatt is feltűnő

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténeres teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültethető Városi és tengerparti kertekbe – jól bírja a légszennyezettséget és a sótartalmat Változatos növénytársítások A sárgatarka levelű japán babérsom sötétzöld, aranyfoltos lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló igényű növényekkel: Páfrányokkal – a páfrányok finom, szeldelt levelei tökéletesen kiegészítik a babérsom tömeges, fényes lombozatát Árnyékliliomokkal (Hosta) – a különböző színű és méretű Hosta fajták a babérsom alatti talajtakaróként szolgálhatnak Tüdőfűvel (Pulmonaria) – tarka levelű, kora tavaszi virágzása színt visz a kompozícióba Borostyánnal (Hedera helix) – a babérsom tövében, a talajt takarva kiváló társ Rododendronokkal, havasszépekkel – a babérsom a savanyú talajt kedvelő, örökzöld cserjék társaságában is jól érzi magát Kora tavaszi hagymásokkal (krókuszok, nárciszok) – a hagymások a babérsom lombfakadása előtt, kora tavasszal még elegendő fényhez jutnak a tövében USDA besorolása: 6-9 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban a növény teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is nevelhető, de ott fiatal korában takarást igényelhet).			
Starry Night afrikai szerelemvirág	Agapanthus 'Starry Night'	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Starry Night afrikai szerelemvirág a Dél-Afrikából származó Agapanthus nemzetség egyik leglenyűgözőbb, sötét színű nemesített változata. A fajta a Franciaországban működő nemesítő, Antoine Breuvard munkájának eredménye, aki a kompakt termetű, bőségesen virágzó, sötét színű fajták nemesítésére specializálódott. Nevét a virágok mély, csillagos éjszakát idéző színéről kapta.
Külső megjelenés
A Starry Night afrikai szerelemvirág kompakt, bokros növekedésű évelő. Kifejlett magassága 50-70 cm (a virágzati szárakkal együtt), szélessége 40-50 cm körül alakul. A növény sűrű, szíj alakú, sötétzöld, fényes levelekből álló rozettát képez. A lombhullató fajták közé tartozik, ami azt jelenti, hogy télen elveszíti leveleit, de ennek köszönhetően jobban tűri a hideget, mint az örökzöld rokonai.
A növény legnagyobb dísze a nyár közepén, júniustól szeptemberig nyíló, feltűnő virágzata . A 10-15 cm átmérőjű, gömb vagy félgömb alakú ernyős virágzatok számos (akár 30-50) darab tölcsér alakú, mély sötétkék vagy kékeslila virágból állnak össze . A virágok színe a legsötétebb kék árnyalatok közé tartozik az afrikai szerelemvirágok között, szinte éjszakai égboltra emlékeztet. A virágok a hosszú (50-70 cm), erős, egyenes szárak csúcsán nyílnak, amelyek a nehéz virágfejeket is jól tartják. A fajta kifejezetten bőségesen virágzik, már fiatal korban is több virágszárat fejleszt.
Virágzás utáni időszak
Az elnyílt virágzatok eltávolítása serkenti az újabb virágok képződését. Ha nem vágjuk le őket, a maghüvelyek ősszel és télen is díszíthetnek.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg fekvésű helyet igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napfényben hozza . Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, a szárak megnyúlhatnak.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, humuszos talajt kedvel . A pangó vizet egyáltalán nem tűri. A homokos, jó vízelvezetésű talajokban érzi magát a legjobban.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már rövid ideig tartó szárazságot is elviselnek, de a legjobb virágzást egyenletes talajnedvesség mellett hozzák .

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes komposzttal vagy lassú oldódású, káliumban gazdag műtrágyával megtámogatni a bőséges virágzás érdekében . Fontos, hogy a trágya ne legyen túl magas nitrogéntartalmú, mert az a lombozat rovására mehet .

Metszés: A növény nem igényel rendszeres metszést. Az elnyílt virágzatokat és az elszáradt leveleket késő ősszel vagy tavasszal lehet eltávolítani . A növényt 3-4 évente tavasszal érdemes osztani, hogy megőrizze vitalitását .

Telelés: A Starry Night afrikai szerelemvirág lombhullató fajta, ami jobb télállóságot biztosít számára, mint az örökzöld változatoknak . A kifejlett, jól begyökeresedett példányok általában -10°C és -15°C között ellenállnak a hidegnek . A tartós, -10°C alatti fagyokban azonban a növény föld feletti része elfagyhat, de a gyökérzet mélyen a földben általában áttelel, és tavasszal újrahajt. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellett) érdemes ültetni, és télen vastag lombtakaróval takarni. Konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. pince, garázs) kell teleltetni, 5-10°C között, kevés öntözéssel .

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló. A pangó vizes talajban gyökérrothadás előfordulhat. A meztelen csigák és a levéltetvek időnként károsíthatják. Fontos tudni, hogy a növény enyhén mérgező macskákra és kutyákra, ha a leveleit vagy a nedvét elfogyasztják .

Felhasználás a kertben
A Starry Night afrikai szerelemvirág rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Konténeres növényként: Tökéletes választás teraszokra, erkélyekre, bejárati ajtók mellé.

Szegélynövényként: Ágyások szegélyezésére, előterébe ültetve kiváló.

Vágott virágnak: Hosszú, erős szárai és tartós virágai miatt kedvelt csokoralapanyag.

Tengerparti és városi kertekbe: Jól bírja a sótartalmat és a szennyezett levegőt.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Kertstílus, ahová illik

Mediterrán kertekbe: Mélykék virágai és szíjas levelei tökéletesen illenek a mediterrán hangulatba.

Modern, letisztult kertekbe: Kompakt, formás megjelenése miatt ideális választás.

Városi kertekbe, előkertekbe: Igénytelensége és kompakt mérete miatt kiváló.

Konténeres kertekbe, teraszokra: Cserepes nevelésre kifejezetten alkalmas.

Változatos növénytársítások
A Starry Night mély, sötétkék virágai kiválóan kombinálhatók más növényekkel:

Fehér virágú évelők: Őszirózsa, gyöngyvirág – a sötétkék és a fehér harmonikus, elegáns párost alkot.

Sárga virágú évelők: Kúpvirág, napvirág – a komplementer színek (sárga és kék) vibráló kontrasztot adnak.

Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz, perovszkia – az ezüstös szürke kiemeli a sötétkék virágokat.

Díszfüvek: Tollbuga, japán vértfű – a füvek laza habitusa oldja a liliom tömött formáját.

Alacsony talajtakarók: Árnyéki meténg – a növény tövében takarhatja a talajt.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os zóna) konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan) .

Tarkalevelű ezüstfa	**Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'**	4 550 Ft	4 550 Ft

Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombozatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranysárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombozatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna

Törpe gránátalma	**Punica granatum 'Nana'**	3 250 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Punica granatum 'Nana', vagy Törpe gránátalma, egy népszerű, kis méretű díszcserje, amelyet különösen dekoratív megjelenése és könnyű kezelhetősége miatt kedvelnek. Ez a kompakt változat mindössze 60-90 cm magasra nő, sűrű, dús lombozattal és csodálatosan feltűnő narancsvörös virágokkal, amelyek késő tavasztól őszig virágoznak. Bár ezek a virágok apró méretű gyümölcsöket is hozhatnak, amelyek ehetőek, de leginkább dekoratív célt szolgálnak. A Törpe gránátalma vonzó zöld levelei és kompakt növekedési habitusa ideálissá teszik konténeres növényként, alacsony sövényként vagy színes cserjeként a kertben. Szépsége és nyári-őszi virágzása számtalan kertész kedvenc választásává teszi.
Gondozási útmutató: A Punica granatum 'Nana' viszonylag könnyen gondozható, de néhány alapvető követelményt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt igényel a legjobb virágzás érdekében, de részleges árnyékot is tolerálhat.
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. A jó vízelvezetés elengedhetetlen a gyökerek egészségéhez.
Öntözés: Mérsékelt öntözést igényel, a talaj legyen egyenletesen nedves, de kerüljük a túlöntözést, ami gyökérrothadáshoz vezethet.
Tápanyag: Tavasszal ajánlott lassan felszabaduló műtrágyával vagy szerves trágyával dúsítani a talajt a virágzás és növekedés serkentésére.
Metszés: Formázó metszést érdemes végezni kora tavasszal, mielőtt az új növekedés megindul. Az elhalt, sérült vagy túl sűrű részeket távolítsuk el, hogy szép, formás növényt kapjunk.
Télállóság: Mérsékelt éghajlaton télálló, de hidegebb helyeken érdemes védeni a gyökereket és a növényt téli takarással vagy cserépben nevelve a védett helyen teleltetni.

Felhasználási javaslat:

Konténernövény: Kiválóan alkalmas teraszokra, erkélyekre is, ahol színt és életet hoz a környezetbe.
Alacsony sövény: Kompakt méretével és sűrű lombozatával ideális alacsony sövényként, amely természetes határvonalat képez.
Színes akcentus: Szép virágzása és dekoratív gyümölcsei révén ültethető kertekbe, virágágyásokba és sziklakertekbe.
Bonsai: A Törpe gránátalma kis mérete és formálhatósága miatt népszerű választás bonsaiként is.

Twister szerelemvirág®	**Agapanthus 'Twister'®**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ezt az afrikai szerelemvirágot (Agapanthus 'Twister'®) a kétszínű (kék, fehér) virágai igazán különlegessé teszik a többi szerelemvirág között. Nagyméretű trombitái gazdagon nyílnak egész nyáron. Nálunk csak dézsás növényként tartható. 8b-10a USDA-zóna

Változékonylevelű illatcserje	**Osmanthus heterophyllus**	4 450 Ft	4 950 Ft

Távol-Keletről származó örökzöld cserje, vagy kisebb fa. Nálunk ritkán nő 2 méter fölé, de a hazájában 5-6 méteresre is megnő. Fogazott levelei a magyaléra emlékeztetnek, de az idő előrehaladtával a levélszél fogazottsága eltűnik. Ősz második felében tömegével nyílnak apró fehér virágai, melyek illata beteríti az egész kertet! Kiváló választás sövénynövénynek is! 7a-9b USDA-zóna

Vörös méhbalzsam	**Monarda didyma**	2 750 Ft	2 750 Ft

Észak-Amerikából származó évelő növény. Környezeti hatásoknak jól ellenáll, kifejezetten szívós, "talpra esett" növény. Nálunk szokatlan megjelenésű, kifejezetten látványos ajakos virágai bohócsapkára emlékeztetnek. Kedvező körülmények között 50-60 cm átmérőjűre fejlődik, virági pedig 70-80 cm magasra szöknek. Jól társítható vegyes színösszetételű ágyásokban fészkes virágzatúakkal, pl.: kúpvirággal, vagy margarétákkal, telepíthetünk mellé hasonló magasságú füzéres virágzattal rendelkezőket, pl.: zsályákat, vagy akár díszfüveket. Virágzása nyár derekára, végére esik. Levelei fűszeres, citromos illatúak, ősszel bepirosodnak. A kakukkfűhöz hasonló illóolajakat tartalmaz, ezért hasonló egészségügyi panaszokra alkalmazták korábban a gyógyászatban is.

Wagner kenderpálma	**Trachycarpus wagnerianus**	17 500 Ft	17 500 Ft

Az alapfajtól levélzetének spirális szerkezetében tér el. A levéllemezek 'ujjai' szabályos sugárirányban rendezettek, merevek, a végük sosem hajlik le. A levelek a kifejlett növényeken hamvas, kékes árnyalatúak. Lélegzetelállítóan gyönyörű növény! Ellenállósága, fagytűrése a Trachycarpus fortunei-éhez hasonló.
A Wagner kenderpálma lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy kontrollált körülmények között neveljék, akár cserépben is. Maximális magassága elérheti a 8-12 métert, de ez évtizedek alatt valósul meg. Levélzetét sűrű, fényes, kékeszöld levelek alkotják, melyek ellenállnak az erős szélnek és viszonylag kis méretüknek köszönhetően nem törik le könnyen. A fajta virága nem különösebben feltűnő, de érdekes struktúrát ad a növénynek.
Gondozási útmutató
Fényigény: A Wagner kenderpálma részleges árnyékban vagy közvetlen napfényben is jól fejlődik. Fiatal korában érdemes inkább árnyékosabb helyre tenni, míg megerősödik.
Öntözés: Mérsékletesség ajánlott; hagyja, hogy a földje az öntözések között kicsit megszáradjon. Túlöntözés esetén az erős nedvesség gyökérrothadást okozhat.
Talaj: Jól lecsapolódó, tápdús talajt igényel. A tömött, agyagos talaj kerülendő.
Hőmérséklet: A Wagner kenderpálma meglepően jól tűri a hideget, akár -10°C-ig is ellenálló, de fiatal korban védelemre szorul a fagyokkal szemben.
Tápoldatozás: Tavasztól őszig, havonta tápoldatozás szükséges, hogy támogassa a növekedését és a sűrű, egészséges levélzet kifejlődését.
 7a-9a USDA-zóna

Zöld cipruska	**Santolina rosmarinifolia**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Santolina rosmarinifolia – mediterrán örökzöld félcserje, rozmaringra hasonlító levelekkel és sárga virágokkal. Tökéletes szárazságtűrő kertekbe, szegélyekbe vagy fűszerkertbe!
A növény jellemzői

Magasság: 30-60 cm, terjedés: 40-100 cm.

Levelek: Keskeny, tűszerű, világoszöld vagy sárgászöld árnyalatúak, erős illatúak. Fiatal hajtásai fehér molyhúak.

Virágok: Sárga, gömb alakú virágzatok június-augusztusban, méheket és pillangókat vonzanak.

Tenyészhely: Teljes nap (legalább 6 óra napfény), száraz, jó vízelvezetésű talaj. Agyagos vagy köves talajt is tűri.

Ültetés és gondozás

Talajigény: Szegényes, laza talaj a legjobb. Kerülje a túl nedves vagy vízzel telített talajt.

Vízellátás: Fiatal növényeket rendszeresen öntözze, míg idősebbek teljesen szárazságtűrőek.

Metszés: Tavasszal visszavágásra van szükség az egészséges növekedés és bokrosodás érdekében. A virágzatokat hervadás után vágja le.

Télállóság: -10 °C-ig tűri, de erős teleken takarás javasolt.

Felhasználás

Dísznövényként: Sziklakertben, mediterrán ágyásokban, formára nyírt alacsony sövényként.

Fűszerként: Levelei olívás ízt adnak salátáknak, pizzáknak vagy koktéloknak.

Gyógyhatás: Hagyományosan torokgyulladás és rovarharapások enyhítésére használják.

Ültetési társítás

Mediterrán növények: Levendula, rozmaring, kakukkfű.

Dísznövények: Echinacea, Perovskia, Festuca.

DÍSZCSERJÉK

Közönséges puszpáng	**Buxus sempervirens**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Buxus sempervirens Európából és Nyugat-Ázsiából származik, és évszázadok óta a formális kertek alappillére. Levelei kicsik, elliptikusak, sötétzöld színűek, évszakokon át változatlanul díszítenek. Lassú növekedésű, de idővel sűrű, tömör bokrot alkot. Apró, sárgásfehér virágai tavasszal nyílnak, méheket vonzva. Kiválóan alkalmazható sövényként, vagy szoborként. Tűrőképes a szárazsággal, a félárnyékkal és a városi környezettel szemben.
KÜLÖNLEGESSÉG: A Soproni Botanikus Kertből szaporított több éve bizonyító fajta, mely rezisztens a puszpángmolyra!!
Gondozási útmutató:

Helyzet: Napos, félárnyékos vagy teljes árnyékos terület egyaránt megfelelő. A napos helyeken a lomb sűrűbb marad.

Talaj: Jó vízelvezetésű, semleges vagy enyhén lúgos talaj. Kerüljük a vízálló talajt, mert gyökérrothadást okozhat.

Öntözés: Fiatal példányokat rendszeresen öntözzünk. Felnőtt növények szárazságtűrőek, de hosszú aszályban öntözzük.

Metszés: Formázást tavasszal vagy nyár elején végezzük. Kerüljük a túl radikális metszést, mert lassan regenerálódik.

Téli védelem: Fagyálló (-20°C-ig), de fiatal példányokat téli mulccsal (faforgács) védjük a száraz fagyoktól.

Szaporítás: Zölddugványokkal nyár végén vagy ősszel.

Alacsony jázmin	**Jasminum humile**	2 950 Ft	2 950 Ft

Az alacsony jázmin, (Jasminum humile) 1-1,5 méter magas télizöld cserje, ami azt jelenti, hogy enyhébb teleken a lombját megtartja, de nagyobb fagyok esetén levelei, és fiatal hajtásaitelveszítheti. Ezért védett fekvésbe, enyhe mikroklímájú helyre érdemes telepíteni. Az enyhe klíma mellett jó vízelvetésű talajt igényel, Az agyagos kötött talajokban nem érzi jól magát. Enyhén illatos virágai nyáron, június-júliusban nyílnak. Virágzástkövetően érdemes metszeni, de nem csak a hajtásvégeken vágjuk vissza a növényt, hanem ritkíthatjuk is. 3-4 éves idősebb ágakat metszük ki a többi közül. Hangulatos növény kerítések, épület lábazatok, egyéb épületek mellett.Szeret valaminek nekitámaszkodni, szabad állásban kissé szétesö a szerkezete. Javasoljuk romantikus falusi kertekbe, városi kiskertekbe, mediterrán jellegű kertekbe félárnyékos, szórt árnyékos részekre.
USDA zóna: 7b

Alba Nivea selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'**	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Alba Nivea selyemmirtusz, Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, 'Alba Nivea' változat a faj fehér virágú, nemesített formája. A fajta neve („Alba” = fehér, „Nivea” = hófehér) a virágok tiszta, hófehér színére utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, hófehér virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot. A közönséges név („selyemmirtusz”) mellett ismert még „indiai selyemmirtusz”, „görög ciprus” vagy „krepp mirtusz” néven is, utalva a virágszirmok finom, selymes, ráncolt (krepp-papír szerű) textúrájára.
Külső megjelenés
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-4 méter, szélessége 1,5-3 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-t is nőhet. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek viszonylag kicsik, 3-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, tojásdadok vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-30 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Alba Nivea' fajta virágának színe tiszta, hófehér, a virágok közepe néha sárgás vagy zöldessárga. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák. A nyitott virágok a napos időben a leglátványosabbak, de a krepp-papír szerű szirmok még részleges árnyékban is dekoratívak.
Termés
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő, laza, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, kijelölt cserjéknek (pl. rózsa vagy virágos cserjék számára kifejlesztett) műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), mielőtt a növény kihajtana. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, sérült, keresztben növő, egymást dörzsölő ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást, mert a selyemmirtusz az új hajtásokon virágzik.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés: A selyemmirtusz 'Alba Nivea' mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a fiatal növények és a hajtásvégek érzékenyebbek a fagyra. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország északi, keleti részein vagy a hideg, szeles télen a fiatal növényeket takarni (vastag lombtakaró, szalmával, fenyőgallyakkal takarni a gyökérterületet). A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A fagyott hajtásokat tavasszal, a metszéskor vágjuk vissza. A növény a gyökérzettől újrahajthat.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de bizonyos problémák előfordulhatnak:

Lisztharmat: A leggyakoribb betegség, különösen párás, szellőzetlen körülmények között. Fehér, lisztszerű bevonat a leveleken. Megelőzhető szellős hely ültetéssel, a levelek beázásának elkerülésével.

Levélfoltosság: Különböző gombák okozhatják, a leveleken barna vagy fekete foltok jelennek meg.

Levéltetű, pajzstetű, takácsatka: Ritkán, de megjelenhetnek. Ellenük használhatunk rovarölő vagy atkaölő szereket.

Felhasználás a kertben
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' a méretének, színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a fehér virág más színekkel is jól kombinálható

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, házikertekbe – a délies hangulatot erősíti

Sorfa utcákba, parkokba, közterületekre – a hámló kéreg és a virág miatt dekoratív

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de teleltetésről gondoskodni kell

Bonszai alapanyagnak – a kis méret, a hámló kéreg, a virág és az őszi szín miatt bonszainak is nevelhető

Változatos növénytársítások
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' fehér virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus), orvosi zsálya (Salvia officinalis) – a fehér és a lila-kék színek harmonikus, friss, elegáns párost alkotnak, és a mediterrán hangulatot erősítik

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia) – a fehér és a sárga vidám, napsütötte összképet ad

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Rózsaszín és piros virágú növények: Csodamogyoró (Hamamelis), törpecseresznye (Prunus glandulosa) – a kontrasztos színek izgalmas, élénk hatást keltenek

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a sötétzöld lombot

Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca) – a füvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját

Ősszínű díszcserjék: Sárga levélű növények (pl. aranyvessző), vörös levelű juharok – a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel

Télálló pálmák, ciprusok, borókák – a mediterrán, szubtrópusi hangulatot erősítik

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna - pl. Budapest, Dél-Dunántúl) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április-május) tehető ki a szabadba).

Arany kúszó kecskerágó	**Euonymus fortunei 'Sunspot'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Aranyló színfolt a kertben: Euonymus fortunei 'Sunspot'
Az Euonymus fortunei 'Sunspot' a kúszó kecskerágó egyik leglátványosabb, tarka levelű változata. Ez az örökzöld talajtakaró nem csupán funkcionális növény, hanem igazi dísze a kertnek: leveleinek közepén ragyogó aranysárga folt hívja fel magára a figyelmet, amely napfényben szinte világít. Sötétzöld levélszélekkel keretezett, ovális-elliptikus levelei egész évben üde színt adnak az ágyásoknak, sőt, a téli hideg hatására gyakran enyhén rózsaszínes vagy bordó árnyalatot is ölthetnek.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Sunspot' habitusa a körülményektől függően változó: fiatalon inkább kúszó, később terebélyesedő, kissé felálló formájú lehet. Talajtakaróként a földön kúszva sűrű, szőnyegszerű borítást ad. Idősebb korában, vagy ha támasztékot talál, akár alacsony falakra, kerítésekre is felkúszhat.

Magasság: A növény végső magassága általában 40-100 cm között alakul.

Szélesség: Terjedése jelentős lehet, elérheti a 100-240 cm-t is, ami kiváló talajtakaróvá teszi. Nyáron megjelenő virágai jelentéktelenek, zöldes színűek, de ősszel néha narancsvörös álterméseket hozhat, amelyek madárcsalogatóként is szolgálnak.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: A tarka levelű növények általában több fényt igényelnek a színük megtartásához. A 'Sunspot' napos vagy félárnyékos helyen fejlődik a legszebben. Naposabb helyen a levél közepén lévő arany folt sokkal élénkebb és intenzívebb lesz. Árnyékban a levél kizöldülhet, és visszaüt a zöld változatra.

Talaj: Nem igényes, az átlagos kerti talajokat jól tolerálja. A jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, humuszos talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a begyökeresedésig. Idősebb korában közepes vízigényű, a hosszan tartó szárazságot megszenvedheti, de általában jól tűri a rövidebb aszályos időszakokat is.

Télállóság (USDA-zóna): A növény besorolása szerint USDA 5-9 zónákban teleltethető, ami azt jelentené, hogy Magyarország nagy részén télálló. Azonban megjegyzendő, hogy nem olyan télálló, mint más fajták, és a fiatal növények védelmet igényelhetnek a téli szelek ellen. Ezért a leghidegebb tájakon vagy szélsőségesen kontinentális éghajlaton érdemes számára szélvédett, napos helyet választani, és a fiatal töveket az első években takarással védeni.

Metszés: Metszése tavasszal vagy nyár elején, a kívánt formára igazítva végezhető. Visszavágással sűrűbb növekedésre ösztönözhetjük. Időnként előfordulhat, hogy egy-egy hajtás "visszazöldül" (reverzió), azaz elveszíti a sárga színt. Ezeket a teljesen zöld hajtásokat érdemes minél előbb eltávolítani, hogy ne terjedjenek el, és ne nyomják el a tarka változatot.

Ellenállóság: A kecskerágó fajtákhoz hasonlóan fogékony lehet a takácsatkákra és a kecskerágó-pajzstetűre. A jó, szellős elhelyezés sokat segíthet a megelőzésben.

Kertstílus és növénytársítások:
Rendkívül sokoldalúan felhasználható növény a ragyogó lombozata miatt:

Talajtakaró: Nagy felületek gyommentes borítására ideális. Fák, bokrok alatt, lejtőkön, nehezen megművelhető helyeken.

Szegélynövény: Ágyások, utak szegélyezésére alacsony, örökzöld sövényként.

Sírkert: Örökzöld mivolta és dekoratív megjelenése miatt gyakori választás temetőkbe.

Konténeres növény: Erkélyen, teraszon cserépben is tartható, ahol lelógó hajtásaival díszít.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Sziklakert, évelőágyás: Színes foltot biztosít más évelők között.

Ajánlott növénytársítások:

Sötétlombú növények: Az aranysárga levélfoltok fantasztikusan kiemelkednek a sötétzöld vagy bordó levelű növények közül. Társítsuk bordó levelű borbolyával (Berberis) vagy sötétzöld örökzöldekkel (pl. tuja, hamisciprus).

Kék és lila virágú évelők: A sárga és lila klasszikus kontraszt. Ültessünk mellé levendulát (Lavandula), macskamentát (Nepeta) vagy kék árnyékliliomot (Hosta).

Fehér virágú növények: Elegáns, világító kombinációt alkot a fehérrel, például fehér kecskerágóval vagy fehér évelőkkel.

Tavaszi hagymások: A sárga lombozatú növények között gyönyörűen mutatnak a kék és lila hagymások, mint a jácint vagy tulipánok.

Zóna:5a

Aranyfoltos japán babérsom	**Aucuba japonica 'Picturata'**	18 900 Ft	18 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel az Aranyfoltos japán babérsom (Aucuba japonica 'Picturata') egyedülálló szépségét! Ez az örökzöld díszcserje aranyozott levelével tökéletes választás árnyékos kertrészek díszítéséhez, konténeres elhelyezéshez vagy színes sövények kialakításához. Erős gyökerű, egész évben ültethető növényeinket gondosan szállítjuk! A nyári öntözést meghálálja.
Termékjellemzés és gondozási útmutató
Külső jellemzők

Méret: 1,5-2 m magas, 1-1,5 m széles

Levelek: Nagy, bőrös, sötétzöld alapon arany sárga középponti folttal

Virágok: Apró, bíborvörös virágok tavasszal

Termés: Vörös bogyók ősszel (nőivarú egyedek)

Előnyös tulajdonságok

Örökzöld: Egész évben díszít

Árnyéktűrő: Kiválóan alkalmazható árnyékos helyeken is

Légzszennyezés-tűrő: Alkalmazható városi környezetben

Fagytűrő: -15°C-ig ellenáll

Ültetési javaslatok

Talaj: Nedves, jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj

Fényigény: Árnyékos vagy részleges árnyékos helyek

Ültetési idő: Tavasztól őszig

Tőtávolság: 80-100 cm sövényként való alkalmazáshoz

Gondozás

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot nem kedveli

Metszés: Tavasszal könnyen formálható

Trágyázás: Tavasszal lassú oldódású trágya ajánlott

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tervezési javaslatok			
Társítás: Harmonizál Hortenzsiával, Hóstával vagy Rhododendronnal			
Ajánlott helyek:			
Árnyékos kertrészek			
Konténeres elhelyezés			
Előtetők és udvarok			
7a-9b USDA-zóna			
Aranylevelű fagyal	Ligustrum ovalifolium 'Aureum'	3 250 Ft	3 550 Ft
Az Aranylevelű fagyal, a közönséges fagyal egyik leglátványosabb, tarka levelű változata. Francia nemesítésű fajta, amelyet 1860-ban hoztak forgalomba, és azóta is az egyik legkedveltebb díszcserje a kertekben, köszönhetően feltűnő lombozatának és strapabíró természetének. Felálló, sűrűn elágazó, bokros habitusú örökzöld vagy félörökzöld cserje, amely kifejlett állapotban 2-4 méter magas és 1,5-2,5 méter széles. Növekedési üteme közepes, évente 15-25 cm-t gyarapodik, sövényként kifejezetten gyorsan záródik. A növény legfőbb dísze a rendkívül dekoratív lombozat. A tojásdad vagy elliptikus, 3-7 cm hosszú, bőrszerű, fényes levelek sötétzöld alapon széles, aranysárga vagy aranyzöld szegéllyel rendelkeznek. Napos helyen a szegély intenzívebbé, szinte élénk aranysárgává válik, míg félárnyékban a tarka mintázat halványabb lehet. Egyes levelek akár teljesen aranysárgák is lehetnek, ami mozgalmas, vidám összhatást kelt. A levelek a tél folyamán is a növényen maradnak, bár keményebb teleken részben hullathatja őket. Június-július folyamán a hajtások végén kis, 5-10 cm hosszú bugákban nyílnak az apró, fehér, erősen illatos virágok. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat is vonzzák. A virágzást követően ősszel apró, gömbölyded, fényes fekete bogyók fejlődnek, melyek a madarak kedvelt táplálékai, de emberre nézve enyhén mérgezőek. Igényei és gondozása Az Aranylevelű fagyal napos vagy félárnyékos fekvést kedvel. A legszebb, legintenzívebb arany szegélyt teljes napsütésben hozza; félárnyékban a tarka mintázat kevésbé lesz feltűnő, a levelek zöldebbé válnak. Talaj tekintetében nem igényes, a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású kerti talajokban fejlődik a legszebben. A pangó vizet nem tűri, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli, bár ilyenkor lombozata veszíthet élénkségéből. Gondozása rendkívül egyszerű. Metszéssel jól formálható, ezért sövényként és topiáriumba is kiválóan alkalmas. Metszését kora tavasszal, a rügyfakadás előtt, vagy nyár közepén végezhetjük; a nyári metszés után a növény ismét sűrűn kihajt. Sövényként évente kétszer is nyírhatjuk. A városi környezetet, légszennyezést jól tolerálja, így forgalmas utak mellé is ültethető. Télállósága közepesen jó, keményebb teleken a fiatal hajtások visszafagyhatnak, de tavasszal megbízhatóan újrahajt. Felhasználás a kertben Az Aranylevelű fagyal rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Kiválóan alkalmas színes sövénynek, akár nyírt, akár szabadon növekvő formában, mert élénk lombozatával vidám színfoltot varázsol a kertbe. Magányosan, szoliterként ültetve is mutatós, különösen a sötétzöld örökzöldek előtt. Vegyes cserjefalakban, háttérnövényként vagy éppen feltűnő színes elemként is megállja a helyét. Városi kertekbe, előkertekbe, közterületekre is ideális választás a jó légszennyezés-tűrése miatt. Formára nyírva, topiáriumként akár előkert dísze is lehet. Növénytársítási ötletek Társításakor érdemes kihasználni a levelek élénk aranysárga színének kontrasztteremtő képességét. Kiváló partnerei lehetnek a sötétzöld vagy kékeszöld lombú örökzöldek, mint a tuják, borókák vagy a babérmeggy, amelyek hátterében a sárga szegély még látványosabb. Lila virágú évelőkkel, például levendulával vagy zsályával ültetve színben is harmonikus, mediterrán hangulatú kompozíciót hozhatunk létre. Piros vagy bordó levelű cserjékkel, mint a borbolya vagy a vérsom, kombinálva élénk, figyelemfelkeltő együttest alakíthatunk ki. Díszfüvekkel, például tollborzfűvel vagy kínai ezüstfűvel társítva a sárga lombozat és a fűzöld levelek lágy, természetes összképet alkotnak.			
Aranylombú hólyagvesszős	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'	2 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Dart's Gold' fajta egy kompakt, zárt felépítésű lombhullató cserje, amely 1,5-2 méter magasra és hasonló szélességre nő meg. Levelei háromkaréjúak, tavasszal élénk aranysárgák, nyáron citromsárgára váltanak, ősszel pedig aranybarnás színt öltenek. A kora nyárban megjelenő virágai aprók, fehér vagy halványrózsaszínűek, ernyős virágzatokban, melyeket vörös terméshüvelyek követnek. A virágok kontrasztot alkotnak a sárga levelekkel, ami különleges látványt nyújt.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos helyen a legszebb arany színeződést éri el, félárnyékos helyen a levélzöldülhet

Talajigény: Igénytelen, minden talajtípuson jól nő, de a jó vízelvezetésű, közepesen nedves talajt preferálja

Vízigény: Közepes vízigényű, a rövid szárazságot jól tűri, de a tartós szárazságot nem kedveli

Metszés: Jól tűri a metszést, tavasszal ajánlott metszeni a szép formájú és dús növekedés érdekében

Télállóság: Kiváló télállóságú, -30°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Nem feltétlenül szükséges, de tavaszi trágyázás elősegítheti a dús növekedést és intenzív levélszínt

Ültetési javaslat

Szoliter növényként: Díszcserjeként lenyűgöző hatású

Sövényként: Közepes magasságú, színes sövény kialakítására ideális

Színes kontrasztok: Sötét lombú növények mellé kifejezetten ajánlott

Csoportos ültetés: Térhatárolóként vagy kiemelőként

Társítás: Bordó levelű fajtákkal, örökzöldekkel, kék virágú növényekkel kifejezetten jól mutat

Városi környezet: Szennyezett levegőt jól tűri

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Városi kertek

Falusi kertek

Alacsony karbantartású kertek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Színes kompozíciók			
4a-8b USDA-zóna			
Aranylombú terülő boróka	**Juniperus x media 'Old Gold'**	3 950 Ft	3 950 Ft
Középerős növekedési erélyű, kissé lazább gallyrendszerű amerikai fajta. Idősebb hajtásai sárgászöldek (a fonákuk kékeszöld), a fiatal hajtásrészek azonban az első évben rikító, világos kénsárgák. Idősebb korára 2,5-3 méteres szélességet és derékig érő magasságot is elérhet. Napos helyre való, jó tűrőképességű, ellenálló változat, talajtakarásra, rézsűkre, sziklakertekbe is ültethető. Zóna:5a			
Aranysárga mexikói narancsvirág	**Choisya ternata 'Sundance'**	3 900 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Sundance mexikói narancsvirág a mexikói narancsvirág (Choisya ternata) egyik legnépszerűbb, arany levelű változata, amely teljesen természetes mutációként jött létre. Nevéhez híven a növény a kert „napfényes sarkát” idézi aranysárga lombozatával. A fajta az RHS Az Év Növénye díjat is elnyerte 2002-ben. Mexikó és az USA déli része (Texas) száraz, mészkőhegységeinek napsütötte erdős lejtőiről származó alapfaj egyik legszebb kultúrváltozata.
Külső megjelenés
A Sundance sűrű, bokros növekedésű, kerekded formájú örökzöld cserje. Kifejlett magassága és szélessége hasonlóan 1,5-2,5 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de gondozással egészségesen fejlődik.
A növény legnagyobb dísze a lombozat: a fényes, bőrszerű levelek a friss hajtásokon ragyogó aranysárgák, ami a legtöbb éghajlaton egész évben megmarad. Idősebb levelei citromsárga vagy zöldes-sárga árnyalatúak lehetnek, ami a növény egyik sajátossága. Félárnyékban a levelek színe világosabb, kevésbé intenzív sárga vagy zöldes színűvé válik. A levelek tenyeresen összetettek, 3-7 darab, lándzsás vagy ovális alakú levélkéből állnak, amelyek az alapfajhoz hasonlóan megdörzsölve erős, citrusfa-szerű illatot árasztanak. Ez az illat a puszpáng egyik lehetséges, illatos helyettesítőjévé teszi.
A virágok késő tavasszal (április-május) és kora ősszel (szeptember) nyílnak. A virágok fehérek, csillag alakúak, 3-6-os csoportokban jelennek meg a hajtások végén. Illatuk kellemes, jázminra emlékeztető, az alapfajnál enyhén erősebb, de nem intenzív.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel. A legszebb, intenzív aranysárga lombozatot napos fekvésben hozza. A tűző, déli napfénytől a levelek a legforróbb nyári hónapokban megéghetnek. Félárnyékban a lombozat zöldesebb árnyalatú lesz.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású (pH 6,5-7,0) talajt kedvel. A meszes talajokat jól tűri. A pangó vizet azonban nem tűri; a gyökérrothadás elkerülése érdekében a talajt ültetés előtt komposzttal és durva homokkal lazítsuk.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb lombozatot egyenletes talajnedvesség mellett hozzák. Kerülni kell a pangó vizet.

Tápanyag-utánpótlás: Alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor egy kevés komposzt vagy érett szerves trágya keverhető a talajhoz. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés általános célú, lassú oldódású műtrágyával megtámogatható a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: Metszést nem igényel, de jól tűri. Metszhető sövénynek, formára, vagy a növény megfiatalítása, valamint a bokrosabb növekedés serkentése érdekében. A legjobb időpont a metszésre a virágzás után, kora nyáron (június), vagy késő télen (február). Metszés után a növény dúsabban bokrosodik.

Telelés: USDA besorolása 7-10. A fiatal, frissen ültetett növények a legérzékenyebbek a hidegre; az első télen szükség lehet védelemre. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhet, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló. A csigák, a hervadás, gyökérrothadás, a puszpáng-tűpajzstetű és a Choisya levélsodródás előfordulhat. A pangó vizes talajban a gyökérrothadás a leggyakoribb probléma. A levéltetvek és a meztelen csigák is károsíthatják.

Kertstílus, ahová illik
A Sundance sokoldalúságának köszönhetően számtalan kertstílusba beilleszthető:

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve az aranysárga lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Alacsony sövénynek, szegélynek: Metszéssel sűrű, alacsony, örökzöld sövénnyé nevelhető, a puszpáng egyik legjobb helyettesítője.

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós, feltűnő színfoltot adva.

Konténeres teraszokra, erkélyekre: Tökéletes választás dézsákba, cserepekbe, mivel lassú növekedésű.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Sziklakertekbe, mediterrán kertekbe: Származási helyének (Mexikó) hangulatát idézi.

Változatos növénytársítások
A Sundance aranysárga lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel:

Lila és kék virágú évelők: Levendula, macskamenta, perovszkia – a lila-kék színek az aranysárgával vibráló, élénk kontrasztot alkotnak.

Sötét lombozatú növények: Vörös levelű borbolya, sötét törpe boróka, japán vértfű – a sötét színek kiemelik a Sundance világos lombozatát.

Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz – az ezüstös szürke tompítja a sárga intenzitását, harmonikus összképet adva.

Rózsák: Világos színű rózsák (fehér, krém) mellett a sárga lombozat elegáns hátteret biztosít.

Díszfüvek: Tollbuga, kínai ezüstpázsit – a füvek laza habitusa oldja a cserje tömött formáját.

USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Aranytarka fagyal	**Ligustrum ovalifolium 'Aureovariegatum'**	3 350 Ft	3 350 Ft

Az örökzöld fagyal nagyon mutatós, aranysárgával tarkázott lombszínű változata. Elsőrendű sövénynövény, szoliternek, de még edényes növénynek is nagyon szép! A tarka levelű fagyaloknál az időnként megjelenő teljesen zöld levelű hajtásokat tőből távolítsuk el. Emellett időnkénti nyírásuk elősegíti az intenzíven tarkázott, csillogóan fénylő lombozatú fiatal hajtások fejlődését.

6a-8b USDA-zóna

Aranytarka kékszakáll	**Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Az Aranytarka kékszakáll (Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet') egy igazi ékszer a kertben, amely lenyűgöző látványt nyújt egész nyáron át. A növény színes levelei aranytarka és zöld színűek, melyek a napfényben csodálatosan ragyognak. A nyári hónapokban a Caryopteris 'Summer Sorbet' élénk kék virágokat hoz, melyek vonzzák a pillangókat és méheket. Ez a cserje közepes méretűre nő, így alkalmas kisebb és nagyobb kertekbe egyaránt, akár szoliter növényként, akár csoportos ültetések részeként.
Felhasználási javaslat: Az Aranytarka kékszakáll kiváló választás lehet kertek, parkok és egyéb tájképek díszítésére. Különösen jól mutat csoportos ültetésekben vagy sziklakertekben, ahol színes látványt nyújt egész nyáron át. Emellett vonzza a pillangókat és méheket, így hozzájárul a kert biológiai sokféleségéhez is.
Gondozási útmutató: Az Aranytarka kékszakáll könnyen gondozható cserje, mely kedveli a napos vagy félárnyékos elhelyezést és a jó vízelvezetésű talajt. Rendszeres öntözésre van szüksége, különösen a forró nyári hónapokban. Tavasszal ajánlott metszeni, hogy alakítsuk és karbantartsuk a növény formáját, valamint elősegítsük a bőséges virágzást.

Aurora illatos bangita	**Viburnum carlesii 'Aurora'**	5 950 Ft	6 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Aurora a koreai származású Viburnum carlesii (illatos bangita) egyik legkedveltebb, legillatosabb fajtája. Nevét a hajnali rózsaszínes fényről kapta, utalva a virágok színváltozására. Kifejlett magassága és szélessége is 1,5-2 méter, így kerekded, sűrű bokrú cserjeként szoliterként, csoportos ültetésben vagy sövényként is megállja a helyét.
Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a kora tavaszi virágzás (április-május). A bimbók mély rózsaszínűek, majd kinyílva hófehér virágok lesznek, amelyek később visszarózsaszínűsödnek – így egy-egy virágfürtön egyszerre látható a rózsaszín bimbó, a fehér nyíló és a rózsaszínes hervadó virág. A virágok 5-8 cm átmérőjű, gömb alakú, tömör fürtökben (ernyős bugákban) nyílnak. Illatuk rendkívül intenzív, édeskés, szegfűszegre emlékeztető – a kert egyik legillatosabb tavaszi cserjéje. A levelek tojásdadok, 5-10 cm hosszúak, felszínük ráncos, sötétzöldek, fonákukon szürkészöldek, ősszel cseresznyevörös-bordó színt öltenek.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb a virágzás; félárnyékban is szépen fejlődik, de virágzása kissé gyengébb lehet.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: fiatalon és tartós szárazság idején rendszeres öntözést igényel. Idősebb korban közepes vízigényű; a talajt tartsd egyenletesen nedvesen.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával. Virágzás után egy kis komposzt segíti a következő évi virágbimbók képződését.

Metszés: virágzás után közvetlenül (május-június) könnyű formázó metszés végezhető. A régi, elöregedett ágakat 3-4 évente a talaj szintjén távolítsd el. Késő őszi vagy téli metszést kerüld, mert azzal a következő tavaszi virágbimbókat vágnád le.

Telelés: teljesen télálló, Magyarország minden régiójában külön védelmet nem igényel.

Kertstílus, ahová illik Romantikus kert, angol vidéki kert, házikert, illatos kert, természetes hatású kertek, vegyeságyások, előkertek, vadvirágos rétek szegélye.
Változatos növénytársítások

Tavaszi hagymások: krókusz, gyöngyike, törpe nárcisz, kora tavaszi tulipán, jácint – ezek a talajszinten virágoznak, amíg a bangita bokor felettük nyílik.

Késő tavaszi és nyári évelők: pünkösdi rózsa (bazsarózsa), díszhagyma (Allium), árnyékliliom, tollbuga.

Lila levelű cserjék: törpe borbolya (pl. 'Atropurpurea'), sötét levelű vérszilva – a zöld lombozattal és rózsaszínes virágokkal kontrasztot alkotnak.

Fehér virágú növények: gyöngyvirág, párnás őszirózsa.

Illatos növények: levendula (a bangita elvirágzása után veszi át az illatozást), illatos jezsámen.

Díszfüvek: tollbuga, kék csenkesz.

Alacsony talajtakarók: árnyéki meténg, pachysandra.

USDA besorolása: 4-7 (Magyarország egész területén, 4b-7 zónában kiválóan nevelhető, a leghidegebb tájakon is megbízhatóan télálló).

Babe® selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Babe®'	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Babe® Selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Babe®') – A kompakt, halványrózsaszín virágú törpe selyemmirtusz
A selyemmirtusz Babe®, Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta, amely a Mighty Myrtles sorozat tagja. A fajta neve („Babe”) a kompakt, törpe méretre utal. Ez a növény a nyár második felétől kora őszig halványrózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, kompakt mérete miatt pedig kiválóan alkalmas kis kertekbe és konténeres nevelésre.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A selyemmirtusz Babe® a faj egyik legkompaktabb, legsűrűbb növekedésű változata. Kifejlett magassága 40-60 cm, szélessége 30-50 cm között alakul, ami kiválóan alkalmassá teszi kis kertekbe és konténeres nevelésre. Növekedési erélye közepes, habitusa sűrű, bokros. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek közepes méretűek, 3-7 cm hosszúak, oválisak vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fényes, fonáka világosabb. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára vagy vörösre színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, tömött, bugaszerű fürt. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Babe®' fajta virágának színe halványrózsaszín, a pasztell, áttetsző halványrózsaszíntől a közepes, meleg rózsaszín árnyalatig. A szín a napfény hatására különösen szépen érvényesül. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart (júliustól szeptemberig), a növény bőségesen, hosszan virágzik. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A selyemmirtusz Babe® napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 6,0-6,5) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni a szerkezet javítása és a pH beállítása érdekében.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 2-3 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés és alakítás: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, fagykárosodott, sérült, keresztező, egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Telelés és fagytűrés: A selyemmirtusz Babe® mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -15°C és -18°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval, szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte teljesen szárazon kell tartani; 4-6 hetente egyszer, nagyon kevés vizet adjunk neki, csak annyit, hogy a földje teljesen ne száradjon ki.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A selyemmirtusz Babe® kompakt méretének, halványrózsaszín színének és hosszú virágzási idejének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Kis kertekbe, előkertekbe – a kompakt méret (40-60 cm) miatt ideális választás.

Szoliterként – egy-egy példány a teraszon, a bejáratnál is feltűnő.

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható.

Dézsás növényként teraszokra, erkélyekre, balkonládákba, tetőkertekbe – a tökéletes konténeres növény, mivel nem nő nagyra.

Mediterrán hangulatú kertekbe – a délies hangulatot erősíti.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A selyemmirtusz Babe® halványrózsaszín virágai, sötétzöld lombja és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák – a fehér és a halványrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak.

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia atriplicifolia) – a halványrózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mediterrán hangulatú összképet adnak.

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia) – a halványrózsaszín és a sárga vidám, kontrasztos, napsütötte hatást keltenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj (Sedum) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a halványrózsaszín virágokat.

Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), árvalányhaj (Stipa tenuissima), csenkesz fajták – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a selyemmirtusz Babe® mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajthat.)

Belle Etoile jezsámen	**Philadelphus 'Belle Etoile'**	14 900 Ft	16 650 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Belle Etoile jezsámen egy laza, íves habitusú, lombhullató díszcserje, amely 120-150 cm magasra és szélesre nő. Fő értéke a nagy, egyszerű, csillag alakú fehér virágok, amelyeknek közepén halványlila folt található. A virágok május-június hónapokban nyílnak, és intenzív, édes, citrusos illatuk messzire elárad. A tojásdad alakú, világoszöld levelek sűrűn borítják a vesszőket, a cserje egész vegetációs időszakban dekoratív marad.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félig árnyas helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, átlagos kerti talaj

Távolság: 120-150 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliterként, vegyes cserjebeültetésekben, illatos kertekben, háttérnövényként

Gondozási útmutató

Metszés: A virágzás után, június-júliusban végezzük el

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Csak elültetés után és tartós szárazság idején

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon egyszerűen tartható, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Illatos kertek

Vegyes cserjebeültetések

Városi kertek

Tájképi beültetések

Hangulatos kerti sarkok

Berlingot Menthe selyemmirtusz	**Lagerstroemia 'Berlingot Menthe'**	4 950 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Berlingot Menthe kínai selyemmirtusz (Lagerstroemia 'Berlingot Menthe') egy 3-4 méter magasra megnövő fácska vagy nagy bokor. Védett helyre ültetve könnyen eléri ezt a magasságot, és hozzáértő metszéssel egy hatalmas rózsaszín virágfelhővé válik a nyár közepére. Kis faként nevelve törzsének szép kérge is jól látható, egészséges, üde lombozata őszre narancsos, rézes színben pompázik. Kár hogy nem örökzöld, de semmi sem lehet tökéletes. Meghálálja a gondoskodást, de nem kényes növény. Az átlagosnál szárazabb körülményeket is jól viseli. Betegségekre nem fogékony. Fiatal korában érdemes védeni a téli hideggel szemben, amíg meg nem erősödik.
A legtöbb kerttípusba javasolható. Buja virágpopájával jól illik a romantikus falusi kertekhez, de szoliterként ültetve egy modern kert ékköve is lehet. Származása miatt ültethetjük keleties stílusú kertekbe, de a mediterráneumban való közismertsége miatt a mediterrán kertekbe is telepíthetjük, noha több csapadékra, és gondoskodásra van szüksége, mint mondjuk egy leandernek.
USDA zóna: 7b

Bíbordó leander	**Nerium oleander 'Bibirdó'**	9 900 Ft	11 000 Ft
Bíborpiros korallberkenye	**Photinia fraseri 'Red Robin'**	3 950 Ft	4 350 Ft

Három méter magasra megnövő, felálló ágú, sűrű lombú, örökzöld cserje. Fényes sötétzöld levelei fiatalon lilás bíborpirosak. Virágzatai késő tavasszal nyílnak. A mediterrán térségben, illetve Nyugat-Európában tavasszal, kihajtáskor gyönyörű, szinte lángoló vörös sövényeket látni belőle, védettebb helyen nálunk is nagyon szépen fejlődik.
Kompakt mérete és gyors növekedése miatt ideális választás kertek, sövények és konténerek számára.
A Bíborpiros Korallberkenye napos vagy félárnyékos helyen is jól fejlődik, és szereti a jó vízelvezetésű talajt. A rendszeres metszés segít megőrizni formáját és ösztönzi az új hajtásokat. Ez a növény kevés gondoskodást igényel, és rendkívül ellenálló a környezeti stressz tényezőivel szemben.
A bőséges fehér virágzás beporzókat vonz, amikor virágzik, ezáltal növelve a kert biodiverzitását. A növény jól alkalmazkodik a városi környezethez is, légszennyezettséggel szembeni ellenálló képessége magas.
Gondozási útmutató: A 'Red Robin' a legjobb színeit teljes napfényben mutatja, de jól tűri az enyhe árnyékolást is. A jól lecsapolt, termékeny talajt kedveli, de alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz is. Rendszeres metszéssel ösztönözhető a bokor sűrűsödése és az élénk új levelek növekedése. Rendszeres öntözést igényel, különösen a száraz időszakokban.
Ajánlott kertstílus: Ideális választás formális, modern, és mediterrán kertstílusokhoz egyaránt. Jól használható sövényként, szoliter növényként vagy csoportos ültetésben is.
Ültetési javaslatok: Amennyiben sövényként ültetjük, 1-1.5 méteres távolságot ajánlott tartani az egyes növények között. Szoliterként vagy csoportos ültetésben a növények közötti távolságot megnövelhetjük, hogy tér legyen a bőséges növekedéshez.
Társított növények: Jól kombinálható más örökzöld növényekkel, valamint lágyszárú évelőkkel, mint a Lavandula (levendula) vagy Salvia (zsálya).

7a-10a USDA-zóna

Big Bang japán gyöngyvessző	**Spiraea japonica 'Big Bang'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Big Bang japán gyöngyvessző egy tömör, gömbölyded habitusú lombhullató cserje, amely 60-80 cm magasra és szélesre nő. Fő értéke a narancs-arany színű levelek, amelyek tavasszal sárgászöldek, nyáran arany sárgák, ősszel pedig narancsvörösek. Június-augusztus hónapokban lapos, rózsaszín virágzatok nyílnak, amelyek kontrasztot alkotnak a színes levélzettel. A lándzsa alakú levelek élesen fogazott szélűek és sűrűn borítják a vesszőket.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon

Talaj: Jól vízáteresztő, átlagos kerti talaj

Távolság: 70-90 cm-es távolsággal

Használat: Alapcserje, határok, színes cserjebennek, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal (március) erősen visszavágva

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot jól tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon egyszerűen tartható, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Városi kertek

Színes alapcserjés beültetések

Konténeres kertészet

Modern kertek

Alacsony sövények

Parkok és közterületek

Black Knight nyáriorgona	**Buddleia davidii 'Black Knight'**	3 750 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítőértéke a 20-25cm hosszú sötétlila virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.

Blushing Pearl gyöngycserje	**Exochorda racemosa 'Blushing Pearl'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Blushing Pearl gyöngycserje (Exochorda racemosa Blushing Pearl) a rózsafélék családjába tartozó, Közép-Ázsiában és Kínában őshonos lombhullató díszcserje nemesített változata. Az Exochorda név a görög exo (külső) és chorde (húr, zsinór) szavakból ered, utalva a termések jellegzetes, felrepedő toktermésére. A Blushing Pearl név - amely piruló gyöngyöt jelent - tökéletesen leírja a fajta legfőbb jellemzőjét: a rózsaszín bimbókból nyíló, gyöngyházfehér virágokat. Ez a fajta a bőséges, látványos tavaszi virágzás, a finom színjáték és a megbízható növekedés hármasát kínálja.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Blushing Pearl közepes termetű, 1,5-2 méter magas és 1,2-1,8 méter széles, bokros, szétterülő, ívesen hajló ágú habitusú lombhullató cserje. A hajló ágak a virágzás idején különösen mutatósak, mivel a virágfürtök a lehajló ágakon lógnak. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 4-8 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. Ősszel a levelek sárgás vagy enyhén bordós árnyalatot öltenek. A virágok a növény igazi ékkövei: április-május környékén, a lombfakadás idején vagy közvetlenül azután nyílnak. A virágok a Blushing Pearl legnagyobb különlegessége: a bimbók mély rózsaszínűek, majd a virágok kinyílva fehér vagy halvány rózsaszín színűek, a szirmok külső oldalán gyakran rózsaszínes csíkokkal vagy árnyalattal. A virágok ötszirmúak, csésze alakúak, 3-4 cm átmérőjűek, és a hajtások végén 5-10 cm hosszú, fürtös virágzatokba rendeződnek. A virágok a gyöngyvirágra emlékeztetnek, innen kapta a cserje a magyar nevét is. Illatuk kellemes, finom, nem tolakodó.
Igényei és gondozási útmutató: A Blushing Pearl a legszebb virágdíszét teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, a rózsaszín árnyalatok intenzívebbek. Félárnyékban a virágok színe halványabb, de a növény kevesebb gondozást igényel. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete megfelelően ki nem fejlődik. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése a virágzás után, közvetlenül a virágok elhervadásával végezhető el. Ekkor távolítsuk el az elvirágzott hajtásokat, valamint ritkítsuk meg a túl sűrű koronát. Ha idősebb korban megritkul a virágzás, végezhetünk fiatalító metszést, amelynek során a legöregebb ágakat a talaj közelében visszavágjuk. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -25 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a pajzstetvek okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat és a levélfoltosság fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Blushing Pearl finom rózsaszín-fehér virágzása miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a finom, pasztelles színeivel a lágy, nőies hangulatot erősíti. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás. Előkertekben és vegyes évelőágyásokban szoliterként vagy csoportosan is mutatós. Japán kertekben a finom virágok a keleties esztétikához is illenek. Városi kertekben a légszennyezést is jól tűri.
Változatos növénytársítások: Orgona: A lila orgona (Syringa vulgaris) mellett a Blushing Pearl fehér-rózsaszín virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak. Jázmin: Az illatos jázmin (Philadelphus coronarius) fehér virágai mellett a gyöngycserje rózsaszínes árnyalatai harmonikus kompozíciót alkotnak. Teltvirágú gyöngyvirágcserje: A fehér virágú Deutzia mellett a Blushing Pearl rózsaszínes árnyalatai szépen érvényesülnek. Díszalma: A díszalma (Malus) rózsaszín vagy fehér virágai mellett a cserje virágzása tökéletesen összhangban van a fa virágzásával. Díszfüvekkel: A tollborzfű vagy a törpe pampuszfű lágy, mozgó hátteret biztosít a cserje keményebb formáihoz. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok, nárciszok vagy krókuszok tavasszal, a gyöngycserje virágzásával egy időben színesítik a tájat. Levendulával: A levendula lila virágai és ezüstös lombozata mellett a Blushing Pearl fehér-rózsaszín virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak.
A Blushing Pearl kiváló választás azok számára, akik egy finom, rózsaszín-fehér virágú, bőségesen nyíló tavaszi cserjét keresnek, amely a kert egyik fő attrakciója lehet a tavaszi hónapokban, és a virágzás utáni metszéssel könnyen formázható. USDA besorolása: 4-8.

Bódító illatcserje	**Osmanthus fragrans**	3 950 Ft	4 950 Ft

Gyönyörű örökzöld cserje, vagy idővel akár kisebb fa, mely rendkívül illatos, fehér virágaival kétszer is kényeztet minket, először kora tavasszal, majd ősszel még nagyobb számban! Termései 1- 1,5 cm-es sötétlilás bogyók. Hazánkban kevéssé elterjedt, de mostanra egyre többen ismerik, és keresik, hiszen tudható, hogy védett helyeken nálunk is szépen díszít, nem kell tartani az elfagyásától. 7b-9b USDA-zóna

Bolwilleri Csoda mogyoró	**Corylus avellana 'Bolwilleri Csoda'**	7 900 Ft	7 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Bolwilleri Csoda mogyoró (Corylus avellana 'Bolwilleri Csoda') lombhullató cserje vagy kis termetű fa, amely 3–5 méter magasra és 2–4 méter szélesre nő. Koronája kezdetben felálló, majd szélesedő, laza szerkezetű. Levelei kerekdedek, szélük fűrészes, tavasszal világoszöldek, ősszel aranysárgára színeződnek. Kora tavasszal (február–március) hosszú, sárga barkákban nyílnak a porzós virágok, amelyek a tél végi kert egyik első színfoltjai. A termős virágok aprók, pirosasak, és a rügyekből később fejlődnek ki a nagy, ízletes mogyorótermések. A fajta nevét a kiváló termésminőségéről és bőséges hozamáról kapta. A termések augusztus végén – szeptemberben érnek, és éréskor a barkákból kihullva szedhetők.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; a bőséges terméshez legalább napi 6 óra közvetlen napfény szükséges.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű talajt kedvel. A meszes, agyagos és homokos talajokat is elviseli, de a pangó vizet nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; az első években rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot is jól tűri. Aszályos időszakban a termés mennyisége és minősége csökkenhet.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, a legtöbb magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültethető, napos, védett helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy érett trágyát a jobb talajszerkezet és tápanyagellátás érdekében.

Öntözés: Az első 2–3 évben rendszeresen öntözze, különösen száraz nyarakon. Később a természetes csapadék általában elegendő, de a termésfejlődés idején (június–augusztus) a rendszeres vízellátás javítja a hozamot.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya vagy érett komposzt támogatja a növekedést és a terméshozamot. Túlzott nitrogéntrágyázás a lomb növekedését serkenti a termés rovására.

Metszés: A mogyoró termése a fiatal hajtásokon képződik, ezért a metszést a téli nyugalmi időszakban (február–március) végezze. Távolítsa el az elhalt, beteg vagy keresztező hajtásokat, és ritkítsa a koronát a jobb fény- és levegőáramlás érdekében. A töven képződő sarjhajtásokat rendszeresen vágja vissza, hogy a növény fa alakban nevelhető legyen. Ha cserjeként tartja, a sarjhajtásokat hagyhatja, de 5–7 évente fiatalítsa meg a bokrot.

Betegségek és kártevők: A mogyoró általában egészséges, de a mogyoróbarkó és a mókusok, madarak károsíthatják a termést. A lisztharmat és a levélfoltosodás ritkán jelentkezik. A pangó víz gyökérrothadást okozhat.

Betakarítás: A termések akkor érettek, amikor a barka megsárgul, és a mogyoró könnyen kihullik. Szedje fel a lehullott terméseket naponta, hogy elkerülje a penészedést és a kártevőket. A terméseket szellős, száraz helyen szárítsa meg, majd hűvös, száraz helyen tárolja.

Kerti stílus
Ez a mogyorófajta kiváló választás gyümölcsösökbe, konyhakertekbe, madárbarát kertekbe és természetközeli kertekbe. Cserjeként sövényként is nevelhető, így egyszerre nyújt takarást és termést. Kis fává nevelve szoliterként is megállja a helyét a kertben. Jól mutat cottage- és vidéki kertekben, valamint erdőszéli, természetes hatású kompozíciókban. Mivel korán virágzik, a téli-tavaszi kert egyik első színfoltja.
Növénytársítások

Gyümölcsfák és bogyósok: alma, körte, szilva, ribizli, egres – hasonló igényűek, és együtt változatos termést kínálnak.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Nitrogénkötő növények: borsó, bab, here, lucerna – javítják a talajt a mogyoró körül.

Hagymás és évelő növények: tavaszi hagymások (nárcisz, tulipán, krókusz) és árnyéktűrő évelők (kankalin, ibolyák) színesítik a mogyoró alatti talajfelszínt.

Fűszernövények: rozmaring, kakukkfű, zsálya – szárazságtűrők, és jól mutatnak a mogyoró tövében.

Madárbarát cserjék: galagonya, kökény, bodza – menedéket és táplálékot nyújtanak a madaraknak, és növelik a kert biológiai sokféleségét.

USDA télállósági zóna: 4-8.

Bordólevelű japán lonc	**Lonicera japonica 'Purpurea'**	5 350 Ft	5 350 Ft

A Bordólevelű japán lonc látványos örökzöld cserje, melynek a leginkább szembetűnő jellemzője az élénk bordó levelek. A levelek színe a növény különleges vonzerejét fokozza, és a kert díszítésében egyedi kontrasztot nyújt más növények hátttereként. A fajta jellegzetességei közé tartoznak az apró krémszínű virágok és az elbűvölő illatuk, melyek vonzzák a méheket és a pillangókat.
Gondozás: A Lonicera japonica 'Purpurea' gondozása viszonylag könnyű, és a megfelelő körülmények között hosszú éveken át élvezheti szépségét.
1. Fény és hely: Az egész napos vagy félárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A megfelelő fényviszonyok elősegítik a lombozat intenzív színét és az egészséges növekedést.
2. Talaj: A jó vízáteresztő képességű, tápanyagokban gazdag talaj segíti a növény megfelelő fejlődését. Kerti földet keverjen össze komposzttal vagy falevélhumusszal a talaj szerkezetének javítása érdekében.
3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözésre van szüksége a növénynek, hogy kifejlessze gyökérzetét. Miután megerősödött, ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg mérsékelten.
4. Metszés: A metszést tavasszal vagy kora nyáron végezze el a formázás és a méret visszafogása érdekében. Elhervadt vagy beteg hajtásokat bármikor eltávolíthatja.

Zóna:5a

Bordópiros levelű rózsalonc	**Weigela 'Alexandra'**	5 250 Ft	5 250 Ft

Az Alexandra rózsalonc a legszebb piros levelű rózsalonc! Rendkívül dús virágzású, alacsony termetű fajta. Szépséges tölcséres virágai sötétrózsaszínűek. Alacsony termete miatt sokféle felhasználása javasolható. Pl.: alacsony nyíratlan sövényként, de kisebb kertek szoliter növényei is lehet. Kerítések előterébe, vagy más rózsaloncok, és nyár elején virágzó vegyes cserjefoltba is telepíthető. Sőt nagyobb évelőágyakba is el lehet helyezni.
Fényigény: Napos meleg helyet szzeret
Vízigény: Félárnyékos helyeken szárazságtűrő, de napon azért igényli az öntözést, egyébként a szép lombja lógni fog.
Talajigény: Nem válogat a talajokban
Zóna:5b

Bravo japán kecskerágó	**Euonymus japonicus 'Bravo'**	9 900 Ft	9 900 Ft

A Bravo japán kecskerágó (Euonymus japonicus 'Bravo') a japán kecskerágó egy fehértarka levelű változata. Azonban összességében igen jól sikerült fajta, hiszen ilyen kontrasztos levélszínekkel legfeljebb a kúszó kecskerágóknál találkozhatunk. Valódi ékszere lehet a kertnek, mely már messziről felhívja magára a figyelemet. Talajban nem válogat, szereti a jó termőhelyi viszonyokat, sok napsütést, és ha rendszeresen meg van öntözve. Felálló ágrendszerű, sűrű, növésű cserje, mely nyírható, formázható. 7a-9b USDA-zóna

Carolina Beauty selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Carolina Beauty'**	3 750 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Lagerstroemia indica 'Carolina Beauty': sötétvörös nyári virágok, narancssárga őszi lombszín, hámló kérggel. Télálló díszfa mediterrán kertbe, terasz mellé. Magyarországon konténeresen kapható! Nagyjából 5-6 méteres magasságig növő növény. Termetét tekintve a fajták között a nagyobbak közé tartozik és formája a vázához hasonlítható leginkább. Virágai nyár közepétől őszig pirosba fordulnak, egyedülálló színvilágot kölcsönözve a növénynek.

Virágzás: Mélyrózsaszín vagy sötétvörös virágok július-augusztusban, akár októberig is eltartó bugákban.

Levelek: Sötétzöld, ovális formájú, őszi színezetben élénk narancssárgára változik.

Kérg: Sima, szürkésbarna, idővel hámló, télen látványos szerkezetet alkot.

Méret: 4–6 méter magasra és 2.5–4 méter szélesre nő, vázas formájú.

Élettartam: Több évtizedes, lassú növekedésű.

3. Gondozási Útmutató

Fényigény: Teljes nap (napi 6–8 óra) – elengedhetetlen a bőséges virágzáshoz.

Talaj: Jól átjárható, közepesen termékeny talajt kedvel. Tűri a szárazságot, de nehéz agyagtalajt javítsuk homokkal vagy komposzttal.

Öntözés: Fiatalon rendszeresen, gyökeresedés után csak hosszú aszályban. Állóvíz elkerülendő!

Télvédelem: -10°C-ig télálló. Magyarországon melegebb régiókban (pl. déli lejtők) telel problémamentesen, fiatal példányokat téli takarással (faforgács, növénytakarékszövet) javasolt védeni.

Metszés:

Időpont: Késő tél (február) vagy kora tavasz (március), mielőtt kihajt.

Módszer: Tavalyi hajtások visszametszése 2-3 rügyre (10–15 cm). Gyenge, befelé növő ágak eltávolítása. Idős növényeknél évente 1-2 öreg ág cseréje fiatal tőhajtásokra.

Társítási Javaslat
A 'Carolina Beauty' vörös virágai kiemelkednek:

Kontrasztos színek: Sárga virágú növényekkel (pl. rudbeckia, aranyeső) vagy ezüstlombúakkal (molyhos ezüstfa).

Mediterrán keverék: Lavendula, perovszkia, vagy rozmarin fűszernövényekkel.

Örökzöld háttér: Sötétzöld tűlevelűek (pl. tuja, boróka) előterében ültetve.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Őszi színek: Narancssárga lombja kiválóan harmonizál vörös japán juharral vagy sárga gesztenyével.			
7b-10b USDA-zóna			
Carre Rouge korallberkenye	**Photinia fraseri 'Carre Rouge'**	14 900 Ft	15 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A korallberkenye közepes vagy nagytermetű, sűrűn elágazó, felálló hajtásrendszerű, levelei kihajtáskor nagyon szép vörösek! Sűrű lombozatú örökzöld cserje. A levelei kissé hullámosak, felületük fényes. kihajtás után vörös színűek, színüket sokáig megtartják, majd később zölddé válnak.
Gondozási útmutató
A 'Carre Rouge' egy viszonylag kis gondozási igényű, egyszerűen nevelhető növény, ha alapvető igényeit figyelembe vesszük.

Fényigény: A napos vagy félárnyékos helyezést preferálja

. Minél több napot kap, annál intenzívebb lesz fiatal leveleinek színe. Teljes árnyékban ritkásabbá válik és kevésbé színes

Talajigény: A jól vízáteresztő, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talaj az ideális számára

. Nem kedveli az agyagos, pangó vizet, de a meszes talajt elviseli

Vízigény: Közepes vízigényű

. Fiatalon és az ültetés utáni első években rendszeres öntözést igényel, de a kifejlett növények jó szárazságtűrőképességgel bírnak

Metszés: Jól tűri a metszést

. A metszés serkenti a friss, piros hajtások képződését. Sövényként évente akár többször is nyírható. A virágzás csökkentésére (pl. a virágok kellemetlen illata miatt) tavasszal, virágzás előtt lehet metszeni

Trágyázás: Tavasszal a talajtól függően célszerű lassan oldódó, komplett műtrágyával vagy jól érlelt komposzttal támogatni a növekedését

Ültetési javaslatok:

Ez a cserje rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Sövényként: Kiváló választás sűrű, közepes magasságú sövény kialakítására

. Tőtávolságnak 60-80 cm-t ajánlanak.

Szoliterként

Cserepekben: jól érzi magát konténerben, így kiváló választás terasz vagy erkély díszítésére is

Társítás: A színes lombját kiemelhetik alacsonyabb, lombhullató cserjék vagy más örökzöldök

. Jól mutat például egy lila júdásfa vagy sárga terméső som mellett
Ajánlott kerttípusok:
A 'Carre Rouge' jól illeszkedik az alábbi kerttípusokba:

Modern kert

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Városi kert			
Mediterrán kert			
Alacsony karbantartású kert			
Chocolate Summer japán borbolya	**Berberis thunbergii 'Chocolate Summer'**	4 450 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Chocolate Summer japán borbolya (Berberis thunbergii 'Chocolate Summer') a Thunberg-borbolya egyik legszebb levelű fajtája. Lombhullató, felálló, oszlopos növekedésű cserje, amely 10 év alatt mintegy 120 cm magasra és 60 cm szélesre nő. Levelei kerekdedek, aprók, tavasszal bíborrózsaszín árnyalatban fakadnak, majd nyáron mély csokoládébarna-bíbor színűvé válnak, amely napos helyen különösen intenzív. A hajtások élénkpirosak, ami szép kontrasztot ad a sötét lombozathoz. Késő tavasszal apró, halványsárga virágok nyílnak, amelyek vonzzák a beporzó rovarokat, majd nyár végére fényes, élénkpiros bogyók díszítik a bokrot. A fajta tövises hajtásai miatt kiválóan alkalmas sövényképzésre is.
Igényei

Fény: Napos vagy enyhén félárnyékos fekvés; a legszebb lombszínt napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri, de sokféle talajtípuson megél, kivéve a vízállásos helyeket.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt jól érzi magát.

Vízigény: Közepes; a rendszeres öntözést az első évben meghálálja, később a szárazságot is jól tűri. Száraz talajon azonban hajlamos lehet a lisztharmatra.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, városi környezetet és sós levegőt is elvisel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültethető, napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején hetente egyszer mélyen locsolja meg.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya támogatja a növekedést. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az első évben ne metssze, hogy a növény megerősödjön. A következő telek végén kezdje el a formázást: a téli metszés serkenti a sűrűbb, bokrosabb növekedést. Az idősebb példányok tövig visszavághatók a fiatal, élénkebb hajtások és a szebb lombszín érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért ügyeljen a talaj vízáteresztésére.

Betegségek és kártevők: Általában egészséges, de száraz, napos helyen lisztharmat jelentkezhet. A tövises hajtások miatt kártevők ritkán támadják meg.

Kerti stílus
Ez a fajta rendkívül sokoldalú. Kiváló alacsony sövényként, amely évelőágyakat szegélyez, és szoliterként is figyelemfelkeltő színfoltot ad a kertben. Jól mutat modern, minimalista kertekben, ahol a sötét lombozat és a strukturált forma érvényesül, de városi kertekben, kavicsos ágyásokban és természetközeli, szárazságtűrő kompozíciókban is megállja a helyét. Tövises hajtásai miatt védő sövényként is használható.
Növénytársítások

Színkontrasztot adó évelők: ezüstös levelű növények, mint a Stachys byzantina (bársonyos gyapjúvirág) vagy a Festuca glauca (kék csenkesz), kiemelik a sötét lombozat szépségét.

Fűfélék: Miscanthus sinensis (kínai ezüstfű) és Calamagrostis fajok lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Hagymás növények: tavaszi hagymások, mint a Narcissus (nárcisz) és Tulipa (tulipán), korai színfoltot hoznak a borbolya alá.			
Sövénytársak: Taxus baccata (tiszafa) vagy Buxus sempervirens (puszpáng) társaságában kontrasztos, rendezett sövénykompozíciót alkot.			
Szárazságtűrő társak: Lavandula (levendula), Santolina (gyapjúvirág) és Perovskia (kék illatosító) hasonló igényűek, és nyáron gazdagítják a kertet.			
USDA télállósági zóna: 4-8.			
Citromsárga bogyójú tűztövis	**Pyracantha 'Soleil d Or'**	4 250 Ft	4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Pyracantha 'Soleil d Or' (Citromsárga bogyójú tűztövis) az egyik legszebb citromsárga termésű fajtája a tűztöviseknek.
A tűztövis kiváló választás biztonsági sövényként, mert tüskéi hatékonyan tartják távol a behatolókat, ugyanakkor látványos dísznövény is egyszerre.
Külső tulajdonságok

Magasság és forma: 2-3 méter magasra és hasonló szélességre nő, sűrű, felálló vagy íves habitussal

Levelek: Kis, sötétzöld, lándzsa alakú, bőrszerű levelek, melyek évközben nem hullanak

Virágok: Összetett ernyős virágzatok május-júniusban, krémes fehér színben

Termés: Bőséges aranysárga bogyók szeptembertől a tél végéig, madarak kedvence

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félig árnyékos helyeket kedvel

Talaj: Jó vízelvezető talajt preferál, de alkalmazkodik szinte minden talajtípushoz

Öntözés: Csak fiatal növényeknél szükséges rendszeres öntözés, érett példányok szárazságtűrők

Metszés: A formára nyírás a virágzás után javasolt, de nem feltétlenül szükséges

Télállóság: Teljesen télálló, -20°C-ig megtűri a hideget

Ültetési javaslatok

Távolság: Sövényként 1-1,5 méteres távolsággal ajánlott

Hely: Napos helyeken a legszebb bogyókat hozza

Alkalmazási lehetőségek

Sövényként: Tűskéi miatt kiváló védősövény

Falmászás: Kiválóan tud kapaszkodni falakon, kerítéseken

Szoliterként: Díszes megjelenése miatt hangsúlyos elem a kertben

Madárbarát kert: Bogyói télen ételt nyújtanak a madaraknak

Fontos megjegyzések

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tüskék: Erős tüskéi miatt óvatos munkát igényel			
Metszés: Virágzás után ajánlott metszeni a következő évi bogyótermés érdekében			
Betegségek: Rezisztens a lisztharmat és a tűzoltó betegség ellen			
7a-9b USDA-zóna			
Claveys Dwarf ükörkelonc	**Lonicera xylosteum 'Claveys Dwarf'**	2 950 Ft	2 950 Ft
Amerikában a Clvesy's Ravinia kertészetben fejlesztették ki ezt a kertészeti változatot, a Lonicera tatarica és a Lonicera xylosteum keresztezésével. Sűrű, tömött növekedésű lombhullató bokor, mely 1,5-1,7 méteres gömbölyded cserjévé fejlődik. Levelei kékeszöld színűek, őszi lombszíne sárga. Hajtásvégeken fejlődő virágok krémfehérek - krémsárgák, májustól júniusig nyílnak. Később bordó bogyóival díszít, melyek ember számára enyhén mérgezőek, de a madarak elhordják. Nagyon ellenálló, nehéz körülmények között is fejlődő növény, melyet sűrű ágrendszere miatt sövénnyé is szoktak formázni. USDA zóna: 5a			
Concorde bordólevelű japán borbolya	**Berberis thunbergii 'Concorde'**	6 950 Ft	7 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Concorde bordólevelű japán borbolya egy sűrű, gömbölyű habitusú cserje, amely 40-60 cm magasra és 50-70 cm szélesre nő. Fő értéke a sötét bordóvörös színű, apró levelek, amelyek egész évben intenzív színűek maradnak. A levelek tojásdad alakúak és sűrűn borítják a tüskével borított ágakat. Április-májusban kisméretű, sárga virágok nyílnak, amelyeket ősszel élénkpiros, hosszú ideig tartó bogyók követnek. A növény rendkívül tömör növekedése miatt kiválóan alkalmas alacsony sövénynek és színes határoknak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félárnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, átlagos kerti talaj

Távolság: 40-50 cm-es távolsággal

Használat: Alacsony sövény, színes határok, alapcserje, sziklakertek, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Ritkán igényel metszést, tavasszal alakítható

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Átlagos vízigényű, a szárazságot jól tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Színes alapcserjés beültetések

Városi kertek

Alacsony sövények

Sziklakertek

Konténeres beültetés

Coppertop korallbangita	Viburnum odoratissimum 'Coppertop'	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Coppertop korallbangita egy felálló, tömör növekedésű örökzöld cserje, amely 200-300 cm magasra és 150-200 cm szélesre nő. Fő értéke a nagy, fényes levelek, amelyek frissen kihajtva élénk rézvörös színűek, majd idővel sötétzöldre változnak. Április-májusban nagy, kúpos, fehér virágzatok nyílnak, amelyek édes, illatos illatot árasztanak. A virágokat később piros bogyók követik, amelyek éréskor feketévé válnak. A növény gyors növekedésű és sűrű habitust alakít ki.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félárnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag talaj

Távolság: 150-200 cm-es térhagyás ajánlott

Használat: Sövény, szoliter cserje, csoportos ültetés, városi zöldterületek

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal, ha szükséges a forma kialakítása

Télvédelem: -15°C-ig télálló, fiatal növényeket fagyos teleken érdemes védeni

Öntözés: Átlagos vízigényű, a szárazságot rövid ideig tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Jól alkalmazkodik, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Városi kertek

Sövényültetések

Mediterrán stílusú kertek

Parkok és közterületek

Hangulatos kertek

Térhatároló ültetések

Coral Beauty madárbirs	Cotoneaster 'Coral Beauty'	2 750 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Coral Beuaty madárbirs (Cotoneastr 'Coral Beauty) egy modern hibrid madárbirs fajta, melyről a legtöbb jót el lehet mondani, amit a madárbirsekről szoktunk. Egyrészt örökzöld, tavasszal szinte fehérlik a virágoktól, őszre pedig számos bordó almácskát érlel, mely ugyancsak jelentős díszítő értékkel bír egész télen keresztül. Sűrű ágrendszerrel fedi le a talajt, mely azonban nem simul teljesen a talajfelszínhez, hanem attól kissé elemelkedve kusza, 20-30 cm vastag szőnyeget képez. A madarak imádják.
Érdemes időnként öntözni, ezért egy csepegtető cső nem árt, ha van alatta. De esőztetni is lehet, leginkább az esti órákban. Félárnyékban is szépen fejlődik, így fák alá, vagy keleti kitettségű rézsűbe is telepíthető. A sűrűbb takaró érdekében nyírhatjuk, de nem sövénnyírót javaslunk, hanem inkább metszőollóval kell a felfelé növő hajtásokat erősebben, 1-2 rügyre visszavágni. Ügyesebb kertészek egyébként karóval felegyenesítve egy erősebb hajtást kis bonszáj jellegű fácskát is tudnak faragni belőle.
Télálló, strapabíró növény!

Cserszömörce	**Cotinus coggygria**	3 450 Ft	3 450 Ft

Melegkedvelő cserje, mely általában 3-4 méter magasra nő. Júniusi virágzást követően igen látványos, hatalmas, vattacukorszerű, pelyhes terméspamacsok díszítik.
Érthetetlen hazánk kertjeiben miért nélkülözik ennyire. Hiszen gyönyörűen néz ki, érdekes a termése, ősszel
levelei narancsos és bíborvörös színekben pompáznak, jól bírja a városi szennyezett levegőt és minden talajtípuson jól fejlődik.
Felhasználását tekintve igen hasznos növénynek tekinthetjük, mert ipari bőrcserző- anyagot nyernek ki a növényből, ezenkívül fertőtlenítőszert készítenek belőle, innen jön a latin elnevezése a 'Cotinus' is, ami szájvizet jelent. Származási helyének éghajlata a szárazföldi (kontinentális) mérsékelt öv, forró száraz nyárral és hideg, kemény téllel.
Erdős puszták, füves puszták öve. A Cotinus coggygria (Cserszömörce) napos, meleg helyen érzi jól magát, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul.
5b-9b USDA-zóna

Csíkos kecskerágó	**Euonymus europaeus**	3 950 Ft	4 250 Ft

Az Euonymus europaeus, vagy közismert nevén közönséges kecskerágó, egy évelő cserje vagy kis fa, amely elsősorban Európában és Nyugat-Ázsiában honos. Ez a növény több szempontból is érdekes és hasznos lehet a kertészeti alkalmazásokban. Lássuk részletesebben:
Botanikai jellemzők:

Levelek: A kecskerágó levelei oválisak vagy hosszúkásak, sötétzöld színűek és ősszel gyönyörű sárga, narancs vagy bíbor színekre váltanak.
Virágok: Nyáron apró, zöldessárga virágokat hoz, amelyek kevésbé feltűnőek, de közelről szépek és különlegesek.
Termések: Őszre a növény jellegzetes, négykamrás, rózsaszín vagy vörös terméseket érlel, amelyek narancssárga magházat tartalmaznak. Ezek a termések esztétikusak, de fontos tudni, hogy mérgezőek lehetnek.
Kéreg: Szürke vagy barnás, ami télen is érdekes látványt nyújt.

Környezeti igények:

Fényigény: A közönséges kecskerágó fényigényes, de félig árnyékos helyen is jól megél.
Talajigény: A talajjal szemben nem igényes, jól fejlődik különféle talajtípusokban, de a jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talajt kedveli.
Vízigény: Mérsékelt vízigényű, de száraz időszakban szükséges az öntözés.
Fagytűrés: Jól tűri a hideget, ezért alkalmas a mérsékelt éghajlatú területeken való termesztésre.

Kerti alkalmazások:

Sövény: Kiválóan alkalmas sövényként, mivel sűrű lombozata és gyors növekedése révén jól alakítható.
Dísznövény: Az őszi lombozata és attraktív termései miatt kiemelkedő dísznövény egy színes őszi kertben.
Vadállatok vonzása: A termései madarak számára vonzóak, így kertünkben elősegíthetik a madarak megtelepedését.

Gondozási tippek:

Metszés: Tavasszal érdemes metszeni, hogy sűrűbb és szebb lombot kapjunk.
Kártevők és betegségek: Általában ellenálló, de időnként megtámadhatják a levéltetvek vagy a lisztharmat.

Az Euonymus europaeus tehát sokoldalú és viszonylag könnyen gondozható növény, amely kiválóan alkalmas változatos kertészeti célokra. Nagy értéke van díszként, sövényként és ökológiai szempontból is.

3b-9b USDA-zóna

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Csillagjázmin	**Trachelospermum jasminoides**	3 750 Ft	3 750 Ft
A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. Az ország kevésbé enyhe telű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett neveljük! 7b-9b USDA-zóna			
Dame Blanche illatos jezsámen	**Philadelphus 'Dame Blanche'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Dame Blanche (magyarul „Fehér Hölgy”) az illatos jezsámenek egyik legnépszerűbb, bőségesen virágzó fajtája, amelyet francia nemesítők hoztak létre. Kifejlett magassága 1,2-1,8 méter, szélessége 1-1,5 méter, így közepes méretű cserjeként háttérbe, sövénybe vagy akár szoliterként is megállja a helyét. Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a júniusban nyíló, hófehér, 3-4 cm átmérőjű virágok, amelyek egyszerűek vagy félig teltek, és a hajtások végén 3-7 tagú fürtökben nyílnak. Illatuk rendkívül intenzív, édeskés, a trópusi virágokra emlékeztető – virágzás idején több méterről is érezhető. A levelek közepes méretűek (4-7 cm), világoszöldek, tojásdadok, finoman fogazott szélűek. Ősszel a lombszín meleg sárgára változik. A hajtások egyenesen felfelé törnek, majd ívesen lehajlanak, ami a bokrot elegáns, kissé bókoló megjelenést kölcsönöz.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb és legillatosabb a virágzás; túl sok árnyékban kevesebbet nyílik.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag vagy gazdag, meszes vagy semleges kémhatású (pH 6,5-7,5). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: fiatalon és tartós szárazság idején rendszeres öntözést igényel. Idősebb korban mérsékelten szárazságtűrő.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy általános célú műtrágyával. A túlzott nitrogénadagolás a virágzás rovására mehet.

Metszés: virágzás után közvetlenül (június-július) kell metszeni. Az elvirágzott hajtásokat vágd vissza erős oldalhajtásokig (kb. egyharmadukkal). A régi, elöregedett ágakat 3-4 évente a talaj szintjén távolítsd el a fiatal, erős hajtások ösztönzése érdekében.

Telelés: teljesen télálló, külön védelmet nem igényel.

Kertstílus, ahová illik Romantikus kert, angol vidéki kert, házikert, illatos kert, vegyeságyás középső sora, vadvirágos rét szegélye, falusi kertek, természetes hatású kertek.
Változatos növénytársítások

Kék és lila virágú évelők: levendula (angol vagy francia), macskamenta, perovszkia, császárvirág, ibolya, harangláb.

Rózsák: nemes rózsák (fehér, halványrózsaszín, sárga vagy barack színben), futórózsák.

Pünkösdi rózsák (bazsarózsa): későn nyíló fajták, amelyek a jezsámen után virágoznak.

Díszfüvek: tollbuga, japán vértfű, kék csenkesz.

Fehér virágú évelők: gyöngyvirág, árnyékliliom, párnás őszirózsa, kankalin.

Tavaszi hagymások a tövébe: krókusz, gyöngyike, nárcisz, jácint.

Őszi évelők a folytatáshoz: őszirózsa, kőtörőfű, lángvirág.

USDA besorolása: 4-8 (Magyarország egész területén, 5b-7 zónában kiválóan nevelhető).

Desperados japán borbolya	**Berberis thunbergii 'Desperados'**	4 950 Ft	5 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Desperados japán borbolya egy tömör, gömbölyded formájú lombhullató cserje, amely 80-100 cm magasra és szélesre nő. Levelei élénk aranysárga színűek, kicsik és lekerekítettek, amelyek egész nyáron ragyogó színűek maradnak. Tavasszal apró, sárga virágok nyílnak, amelyeket ősszel piros bogyók követnek. Ágai sűrűn elhelyezkedő tüskékkel rendelkeznek, ami hatékony védelemként szolgál.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos helyen a legszebb sárga színeződést éri el

Talajigény: Jól vízelvezető talajt kedvel, de igénytelen a talajtípusra

Vízigény: Alacsony vízigényű, jól tűri a szárazságot

Metszés: Jól formázható, tavasszal ajánlott metszeni

Télállóság: Kiváló télállóságú, -30°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként ragyogó színfolt

Színes sövényként kiváló választás

Társítás: Piros és zöld levelű növényekkel

Kontrasztos kompozíciókba tökéletes

Alacsony sövényként is alkalmazható

Ajánlott kerttípusok

Színes kertek

Modern kertek

Városi kertek

Kontrasztos kompozíciók

Kis kertek

Diamant Rouge bugás hortenzia	Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge'	4 250 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Diamant Rouge bugás hortenzia (Hydrangea paniculata Diamant Rouge) a bugás hortenzia fajták egyik legdrámaibb színű képviselője. A Diamant Rouge név – amely franciául vörös gyémántot jelent – tökéletesen leírja a virágok őszi, mélyvörös-bordó színét, amely a kert igazi ékkövévé teszi ezt a növényt. Ez a fajta a látványos színváltozás, a bőséges, hosszan tartó virágzás és a megbízható télállóság hármasát kínálja.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Diamant Rouge közepes termetű, 1,2-1,5 méter magas és 1-1,2 méter széles, sűrű, bokros, kerekded habitusú cserje. Habitusa kompakt, a szárak erősek, nem dőlnek meg a virágzatok súlya alatt. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 6-10 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. Ősszel a levelek is szép sárgás vagy vöröses árnyalatot ölthetnek. A virágok a növény igazi ékkövei: július-augusztus környékén nyílnak, és akár októberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok kúp alakúak, közepesen nagyok vagy nagyok, 20-25 cm hosszúak. A Diamant Rouge legnagyobb különlegessége a színváltozás: a virágok kezdetben fehérek vagy zöldesfehérek, majd rózsaszínbe, később élénk pirosba, végül őszre mély vörösbe vagy bordóba váltanak. A színváltozás a napos helyen a leglátványosabb. A virágok meddők, nem képeznek magot, így a virágzási energia teljes mértékben a látványos virágfejekre fordítódik.
Igényei és gondozási útmutató: A Diamant Rouge a legszebb virágdíszét és a legdrámaibb színváltozását teljes napos helyen hozza. Napos helyen a vörös színek intenzívebbek, a virágzása bőségesebb. Félárnyékban a színváltozás kevésbé látványos, a vörös árnyalatok halványabbak. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri, de a nagyon meszes talajban a vörös szín fakóbb lehet. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a hajtásokat akár 15-30 cm magasságig is visszavághatjuk. A bugás hortenzia az új hajtásokon virágzik, így a radikális visszametszés serkenti a nagy virágzatok képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Diamant Rouge drámai színváltozása miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a fehér-rózsaszín-vörös virágzataival a változatos, elegáns hangulatot erősíti. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a mélyvörös őszi szín izgalmas, modern akcentust ad. Városi kertekben és előkertekben a légszennyezést is jól tűri, így alapozó növényként vagy sövényként is megállja a helyét. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás.
Változatos növénytársítások: Ezüstlevelű növényekkel: A levendula (Lavandula angustifolia) lila virágai és ezüstös lombozata, vagy az üröm (Artemisia) ezüstszürke levelei mellett a Diamant Rouge vörös színe gyönyörű kontrasztot alkot. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Sárga virágú évelőkkel: Az aranyvessző (Solidago) vagy a napraforgó (Helianthus) sárga virágai mellett a vörös szín különösen látványos. Páfrányokkal: A félárnyékos helyre ültetett páfrányok (Dryopteris, Polystichum) finom textúrájukkal szépen kiegészítik a hortenzia nagy leveleit. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa) vagy nárciszok (Narcissus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Vörös levelű növényekkel: A japán juhar (Acer palmatum) vagy a vöröslevelű díszszilva (Prunus cerasifera Nigra) mellett a hasonló színek egymást erősítik.
A Diamant Rouge kiváló választás azok számára, akik egy drámai színváltozással rendelkező, különleges hortenziát keresnek, amely a nyári fehér virágoktól az őszi mélyvörös színig változik, és a kert egyik fő attrakciója lehet a nyár második felétől egészen a fagyokig. USDA besorolása: 4-8.

Eichholz madárbirs	**Cotoneaster dammeri 'Eicholz'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csípjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.
A cserje tavasszal apró, fehér vagy rózsaszín virágokkal díszül. A virágzást követően piros vagy narancssárga bogyókat hoz, amelyek különleges kontrasztot képeznek a sötétzöld levelekkel. Az Eichholz madárbirs terjedő, szőnyegszerű növekedést mutat, amely különféle talajtakaró felhasználásokhoz kiválóan alkalmazkodik. Könnyen formázható, így szép szélességet és teret foglal el a kertben.Ez a madárbirsfajta jól alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékosabb területeken mutatja meg legjobban szépségét. Az Eichholz madárbirs számos talajtípust tolerál, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben. A pH-érték szempontjából nem igényes, ami tovább növeli a kerti alkalmazhatóságát.
A talajtakaró jellege miatt az Eichholz madárbirs kiváló választás lehet dombos kertekben, sziklakertekben vagy olyan területeken, ahol a talajt kell borítani. Emellett ideális dísznövényként is funkcionálhat, kiegészítve más cserjék vagy évelők társaságát.Az Eichholz madárbirs ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi vonzó megjelenését.

Empire Blue nyáriorgona	**Buddleia davidii 'Empire Blue'**	3 050 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Nyáriorgona (Buddleia davidii 'Empire Blue') egy különlegesen mutatós és gyorsan növekvő cserje, amely jól ismert élénk kék fürtös virágairól, amelyek a nyári hónapokban bőségesen pompáznak. A növény 1,5-2 méter magasra nő, és sűrű, zöld levelekkel rendelkezik, amely szép hátteret biztosít a virágoknak. Az 'Empire Blue' fajta az egyik legkedveltebb kertészeti változat a gazdag virágzás és a kifejezetten vonzó színei miatt.
A virágzás ideje júniustól szeptemberig tart, és a virágok gomolygó fészkes formájúak, amelyek aromájuk miatt vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat. Ez különösen fontos, mert segít növelni a biodiverzitást a kertben.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Nyáriorgona napfénykedvelő növény, amely legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a bőséges virágzás érdekében.
Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legideálisabb, de a növény különböző talajviszonyok között is jól fejlődik, beleértve a homokos talajt.
Öntözés: A fiatal növényeknek rendszere öntözés szükséges, különösen az ültetést követő időszakban. Az idősebb növények viszonylag jól bírják a szárazságot.
Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott műtrágyát alkalmazni, amely serkenti a növény fejlődését és a virágzást.
Téliesítés: A Buddleia davidii fagyérzékeny lehet, így a tél folyamán ajánlott takarás a gyökerek védelme érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

A Nyáriorgona kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, ahol színt és textúrát ad a kompozíciónak.
Szegélyezésre, kerítések és utak mentén is fantasztikusan mutat, ezzel hosszú ideig dekorálva a kertet.
Parkokban és kertekben is megállja a helyét, hiszen a virágok szépen vonzzák a beporzókat.

A Nyáriorgona (Buddleia davidii 'Empire Blue') nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is elnyeri a kertészek tetszését, így ideális választás mindenki számára, aki szeretné feldobni a kertjét.

Eternal® selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Eternal®'	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Eternal® selyemmirtusz Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, törpe növekedésű, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta. A fajta neve („Eternal” = örök) a virágok rendkívül hosszú, akár 3-4 hónapos nyílási időszakára utal. Ez a növény a nyár második felétől egészen az őszig, akár októberig hozza lilásrózsaszín virágfelhőit, emellett kompakt mérete miatt a legkisebb kertekben és erkélyeken is megfér
Külső megjelenés
A selyemmirtusz 'Eternal®' a faj egyik legkompaktabb, legsűrűbb növekedésű változata. Kifejlett magassága mindössze 50-70 cm, szélessége 40-60 cm között alakul, ami kiválóan alkalmassá teszi kis kertekbe és konténeres nevelésre. Növekedési erélye közepes, habitusa sűrű, szabályos, szinte párnaszerű. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek kicsik, 3-5 cm hosszúak, elliptikusak vagy tojásdadok, átellenes állásúak, a levél széle ép. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára vagy vörösre színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 10-20 cm hosszú, tömött, bugaszerű fürt. A virágok aprók, 2-3 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Eternal®' fajta virágának színe lilásrózsaszín, a halványabb, pasztell lilásrózsaszíntől a közepesen intenzív, mélyebb lilásrózsaszín árnyalatig. A színek a napfény hatására különösen élénkké válnak. A virágzási időszak kiemelkedően hosszú: júliustól egészen októberig tart, ami azt jelenti, hogy a növény akár 3-4 hónapon át is virágzik. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, kemény, száraz, barna toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez és a bőséges virágzáshoz. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza, humuszban gazdag, közepesen tápdús, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talajt kedveli. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri. Ültetéskor érdemes a talajt komposzttal, tőzeggel keverni.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. A virágzási időszakban (nyár közepétől őszig) több vizet kíván. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy. Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, sérült, keresztben növő, egymást dörzsölő ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére).

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Telelés: A selyemmirtusz 'Eternal®' mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -15°C és -18°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval,

szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de bizonyos problémák előfordulhatnak:

Lisztharmat: A leggyakoribb betegség, különösen párás, szellőzetlen körülmények között. Fehér, lisztszerű bevonat a leveleken. Megelőzhető szellős hely ültetéssel, a levelek beázásának elkerülésével.

Levélfoltosság: Különböző gombák okozhatják, a leveleken barna vagy fekete foltok jelennek meg.

Levéltetű, pajzstetű, takácsatka: Ritkán, de megjelenhetnek.

Felhasználás a kertben
A selyemmirtusz 'Eternal®' kompakt méretének, lilásrózsaszín színének és hosszú virágzási idejének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Kis kertekbe, előkertekbe – a kompakt méret miatt ideális

Szoliterként – egy-egy példány a teraszon, a bejáratnál is feltűnő

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható

Dézsás növényként teraszokra, erkélyekre, balkonládákba, tetőkertekbe – a tökéletes konténeres növény, mivel nem nő nagyra

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe – a délies hangulatot erősíti

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – a kontrasztos színek miatt

Változatos növénytársítások
A selyemmirtusz 'Eternal®' lilásrózsaszín virágai, sötétzöld lombja és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák, fehér egynyáriak – a fehér és a lilásrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia), aranycserje – a lilásrózsaszín és a sárga vidám, kontrasztos, napsütötte hatást keltenek

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia) – a hasonló tónusú, de eltérő árnyalatú szívek harmonikus, mélységet adó összképet eredményeznek

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), szürke varjúháj (Sedum) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a lilásrózsaszín virágokat Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták, árvalányhaj (Stipa) – a füvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját Más selyemmirtusz fajták – különböző színű (fehér, rózsaszín, piros) selyemmirtusz fajták egymás mellé ültetve szivárványszerű hatást keltenek Alacsony, napos évelők – vörös párnácska (Delosperma), kakukkfű (Thymus), macskagyökér (Valeriana) USDA besorolása: 7b (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajt).			
Etna babérmeggy	**Prunus laurocerasus 'Etna'**	9 350 Ft	9 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Prunus laurocerasus 'Etna' (Etna babérmeggy) az egyik legújabb nemesítésű babérmeggy, mely kiváló tulajdonságaival az eddig legjobbnak tartott babérmeggyeket is túlszárnyalja: igen jó télállóságú (Zóna:6a!), új levelei kihajtáskor bronzos-vörösesek, hófehér virágzatai 20 cm hosszúak! Felfelé törekvő, igen sűrű hajtásrendszerű, legfeljebb 2 méterre növő, széles bokor, egészséges, fénylő sötétzöld lombozattal. Rendkívül igényes megjelenésű sövény nevelhető belőle, de szoliterként is csodálatos!
Az Etna a babérmeggy (Prunus laurocerasus) egyik legkedveltebb, kompakt növekedésű, dekoratív változata. Nevét a tűzhányóról kapta, utalva a fiatal hajtások élénk rézvörös-bronz színére. Kifejlett magassága 1,5-2,5 méter, szélessége 1-2 méter, így közepes termetű örökzöld cserjeként szoliterként, csoportos ültetésben, sövényként vagy akár konténerben is megállja a helyét.
Külső megjelenés A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a fiatal hajtások élénk bronz-sárgás vagy rézvörös színe, amely gyönyörű kontrasztot alkot a fényes, bőrszerű, sötétzöld idősebb levelekkel. A levelek nagyok (8-15 cm hosszúak), elliptikusak vagy tojásdadok, szélük finoman fogazott vagy ép. Tavasszal (április-május) a lombozat fölé apró, fehér, illatos virágokból álló, 5-10 cm hosszú, felálló fürtök emelkednek. A virágokat követően ősszel apró (kb. 1 cm), fényes fekete, csonthéjas termések fejlődnek, amelyek madarakat vonzanak. Fontos tudni: a növény minden része (különösen a levelek és magvak) mérgező!
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos, félárnyékos, de akár árnyékos helyet is jól tűri. Napon a legszebb a lombozat színe és a legsűrűbb a habitus; árnyékban ritkulhat.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, humuszos, meszes vagy semleges kémhatású (pH 6,5-8,0). A savanyú talajt nem kedveli. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: fiatalon rendszeres; idősebb korban közepes vízigényű. A tartós szárazságot mérsékelten tűri, de ilyenkor a levelek széle besodródhat.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, meszes hatású műtrágyával.

Metszés: jól tűri a metszést; formázó metszést tavasszal vagy nyár elején, egészségügyi metszést késő télen végezz. Sövényként évente 1-2 alkalommal visszavágható. Metszés után a növény gyorsan sűrűsödik.

Telelés: teljesen télálló, Magyarország minden régiójában külön védelmet nem igényel. Fiatalon a szélsőséges fagyok ellen takarás javasolt.

Kertstílus, ahová illik Formális kert, angol kert, japánkert, városi kert, előkert, szoliter, sövény, alapozó ültetés, erdős szegély, konténeres terasz.
Változatos növénytársítások

Kék virágú évelők: levendula (a napos oldalra), macskamenta, perovszkia.

Sárga virágú vagy levelű növények: aranyborbolya (Berberis thunbergii 'Aurea'), arany puszpáng, sárga levelű boróka.

Fehér virágú évelők (árnyékba): tüdőfű (Pulmonaria), árnyékliliom (Hosta), gyöngyvirág.

Alacsony örökzöldek: puszpáng, törpe boróka, tűztövis (Pyracantha).

Tavasszal nyíló hagymások a tövébe: krókusz, jácint, gyöngyike.

Talajtakarók: árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix), pachysandra.

6a-9b USDA-zóna

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Eva borostyán	**Hedera helix 'Eva'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Az Adam nevű fajtához igen hasonló, kicsi, fehértarka, de mélyebben karéjos levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra,vagy kerítésekre felfuttatva. Az árnyékos termőhelyről kibújva napos felületeken is szépen teljesít. Fehértarka levelei nem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást is igényel. Emellett sövénynyíróval jól formázható, kaspókba, cserepekbe is ültethető.Növénykazettákban igen jó talajtakaró. Romantikus falusi kertek fontos növénye a borostyán. A tarka levelűek valójában szoliter növényekként is alkalmazhatóak, hiszen amire felfutnak, arratarka színükkel fel is hívják egyúttal a figyelmet. Gondos metszésével pedig így a figyelem központjába kerülő értékes részlet mindig kellemes részlete lehet a kertnek. Régi épületekre, kerti tárolókra, vagy akár nagy sziklákra futtatva romantikus, vadregényes hatást érhetünk el.
Az Eva borostyán gyorsan növekszik és könnyen formázható, így a kerttervezők számára is nagyszerű választás. Ez a fajta borostyán jól alkalmazkodik a különböző növekedési körülményekhez, beleértve a napfényes vagy félárnyékos területeket, valamint a különböző talajtípusokat. A növény ellenálló a szennyeződésekkel és a városi környezet negatív hatásaival szemben, így ideális választás lehet városi kertek vagy parkok számára.

USDA zóna: 6b

Eve Price örökzöld bangita	**Viburnum tinus 'Eve Price'**	3 950 Ft	4 250 Ft

2 m-es örökzöld díszcserje, illatos fehér virágai már az enyhébb téli napokon elkezdenek nyílni. Védett félárnyékos helyre ültessük. Az alapfajnál pár fokkal jobb a hidegtűrése!

Kompakt, gömbölyded formájú örökzöld cserje, sötétzöld, fényes levelekkel (5-8 cm hosszúak). Virágai rózsaszín bimbókból nyílnak fehérre, novembertől februárig díszítenek, majd kékes-fekete bogyós termései következnek.

Méret: Kifejlett állapotban 1,5-2 m magas és széles, lassú növekedésű (teljes méretét 10-20 év alatt éri el).

Szoliterként kiemelkedő a téli kertben.

Örökzöld sövény alkotására tökéletes (jól formázható).

Társnövények:

Tavaszi virágú évelők.

Örökzöldekkel (pl. borostyán, aucuba).

7b-9b USDA-zóna

Eveline® selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Eveline®'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A selyemmirtusz Eveline® Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta. A fajta neve („Eveline”) a halványrózsaszín, finom, elegáns virágokra utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, halványrózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A selyemmirtusz Eveline® közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-3 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-es növekedést is mutathat. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek közepes méretűek, 4-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, elliptikusak vagy tojásdadok, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-25 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. Az 'Eveline®' fajta virágának színe halványrózsaszín, a pasztell, áttetsző halványrózsaszíntől a közepes, meleg rózsaszín árnyalatig. A virágok közepe sárgás vagy zöldessárga. A szín a napfény hatására különösen szépen érvényesül. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A selyemmirtusz Eveline® napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni a szerkezet javítása és a pH beállítása érdekében.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés és alakítás: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, fagykárosodott, sérült, keresztező, egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés és fagytűrés: A selyemmirtusz Eveline® mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval, szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte teljesen szárazon kell tartani; 4-6 hetente egyszer, nagyon kevés vizet adjunk neki, csak annyit, hogy a földje teljesen ne száradjon ki.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A selyemmirtusz Eveline® méretének, finom halványrózsaszín színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként (magányosan ültetve) – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő, különösen a halványrózsaszín virágok miatt.

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható.

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a halványrózsaszín virág más színekkel is jól kombinálható.

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, romantikus kertekbe – a finom szín és a délies hangulat tökéletesen illik.

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de a teleltetésről gondoskodni kell.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet és a szeles körülményeket.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A selyemmirtusz Eveline® halványrózsaszín virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák (Rosa), gyöngyvirágcserje (Deutzia) – a fehér és a halványrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak.

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus officinalis), orvosi zsálya (Salvia officinalis), perovszkia (Perovskia atriplicifolia) – a halványrózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mélységet adó összképet eredményeznek.

Sötétrózsaszín vagy piros virágú növények: Sötétebb rózsaszín selyemmirtusz fajták, piros rózsák – a különböző rózsaszín árnyalatok egymás mellett gazdag, réteges hatást keltenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia arborescens, Artemisia ludoviciana), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
(Sedum pruinatum), bárányfül (Stachys byzantina) - a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern, mediterrán hatást keltenek, és kiemelik a halványrózsaszín virágokat. Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca), árvalányhaj (Stipa tenuissima) - a díszfüvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját. Őszi színű díszcserjék: Sárga levelű növények (pl. aranycserje), vörös levelű juharok - a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel. Más selyemmirtusz fajták - különböző színű (fehér, rózsaszín, lila, piros) selyemmirtusz fajták egymás mellé ültetve szivárványszerű hatást keltenek. USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a selyemmirtusz Eveline® mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna - pl. Budapest, Dél-Dunántúl, Pécs, Villány) takarással, védett helyen áttelelhet a szabadban, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna - pl. Észak-Magyarország, Alföld, Dunántúli-középhegység) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajthat.)			
Fantom bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Phantom'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Fantom' – A bugás hortenziák királynője
A Hydrangea paniculata 'Phantom' egyedülállóan nagy, akár 40 cm hosszú bugavirágairól ismert. Ez a látványos, télálló cserje erős, felálló ágakon hordja sűrűn elhelyezkedő, fehér virágait, amelyek késő nyáron és ősszel enyhe rózsás tónust kapnak. Konténeres növényként szállítjuk, így biztosítva gyors és sikeres beerdősülését.

Színárnyalatok: A nyár közepén nyíló virágzat krémfehér, majd fehér, ősszel pedig halvány rózsaszínbe játszik. A színátmenet hónapokig élvezhető.

Méret: Energetikus növekedésű, felnőtt korában 2-2,5 m magas és 1,5-2 m széles bokorrá fejlődik.

Ültetési távolság: A harmonikus fejlődés érdekében 1,5-2 m távolsággal ültessük.

Kiválóan alkalmazható soliterként, virágzó sövényként vagy nagyobb kertek domináns elemekén
Gondozási útmutató
A Hydrangea paniculata 'Fantom' gondozása

Fényigény: Napos vagy félig árnyás helyen érzi magát a legjobban.

Öntözés: Közepes vízigényű. Szárazságot kerülni kell, különösen nyáron.

Talaj: A laza, nedves, humuszban gazdag, savanyú kémhatású talajt részesíti előnyben.

Trágyázás: Tavasszal hortenziákra specializált trágyával vagy lassú hatású műtrágyával támogatható.

Metszés: Tavasszal (március) erősen visszavágható (2-3 rügyre), mivel az idei év hajtásain hozza a virágot.

Ültetési javaslat
Helyválasztás és ültetési tippek:

Hely: Napos vagy félig árnyás, széltől védett terület.

Ültetés: A konténeres növényt tavasztól őszig ültethetjük.

Távolság: Legalább 1,5-2 m távolságot tartsunk más növényektől.

Ötletek:

Szolitereként ültetve hangsúlyozza virágainak monumentális szépségét.

Több példányból laza, virágzó határoló sövény alakítható ki.

Nagy cserépben terasz- vagy kerti díszként is remekül funkcionál.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hydrangea paniculata 'Fantom' egy igénytelen, de lenyűgöző virágú cserje, mely évtizedekig ékesíti kertekét!

Fehér bőség nyáriorgona	**Buddleia davidii 'White Profusion'**	2 950 Ft	2 950 Ft

1,5-2 méter magasra növő lombhullató cserje, melynek legfontosabb díszítő értéke a 20-25 cm hosszú, fehér virágfüzére. A virágok a hosszú felfelé álló hajtások végén fejlődnek ki. A növény évente növi meg az 1,5 - 2 métert, azonban a szára nem elég erős, ezért tavasszal kihajtás előtt drasztikusan vissza kell vágni 30-40 cm magasságban. Jól társítható más színű nyáriorgonákkal, de valamennyi nyáron virágzó növénnyel szépen mutat. Rendkívül érdeklődnek iránta a pillangók, más nyelven pillangó fának is hívják.

Fehér som	**Cornus alba**	2 850 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A fehér som egy terebélyes, lombhullató cserje, amelyet a kertben minden évszakban találkozhatunk valamilyen dekoratív tulajdonságával. A piros hajtásai ősztól tavaszig feltűnő színfoltot alkotnak, különösen havas téli napon. Levelei sötétzöldek, felül ráncosak, ősszel aranysárgára vagy vörösesbarnára színeződnek. Május-júniusban nyílnak apró, fehér virágai, melyek lapos, ernyőszerű fürtökben állnak. A virágokat nyár végén, ősszel fehér bogyók követik, amelyek madarakat vonzanak.
Gondozási útmutató

Általános igények: A fehér som egy nagyon szívós és igénytelen növény

. Gyors növekedésű, és alacsony karbantartási igényű

Talaj: Szinte bármilyen talajtípusban megél, legyen az agyagos, homokos vagy üde, tápanyagban gazdag talaj

. A jó vízelvezetés előnyös, de elviseli a pangó vizet is.

Öntözés: Közepes vízigényű, de rövid szárazságot is jól tolerál, miután jól begyökeresedett

Metszés: A legszebb télivörös szín érdekében évente kell metszeni

. A legjobb időzítés a késő tél vagy kora tavasz, mielőtt kihajtana. Az öreg hajtásokat érdemes a talajszint közelébe visszavágni, hogy erőteljesen sarjadjon
 Ültetési javaslat
A fehér som rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Szoliter növényként kiemelkedő téli díszértéke teljesen érvényesül

Sövényként ültetve kiváló, sűrű határvonalat alkot. Sövény esetén a tőtávolság 40-60 cm között ajánlott

Csoportos ültetésben nagyobb, télen piros foltot alkot, ami különösen látványos

Természetes stílusú kertekben, esőkertekben és vízpartokon is ideális választás

Ferox Argentea ezüsttövises magyal	**Ilex 'Ferox Argentea'**	5 450 Ft	5 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

7a USDA-zóna
A Ferox Argentea – más néven „ezüsttövises magyal” vagy „sündisznólevelű magyal” – a magyalok (Ilex) egyik legkülönlegesebb, legdekoratívabb, lassú növekedésű változata. A 'Ferox' a latin „vad” vagy „tüskés” szóból ered, utalva a levélfelületen is megjelenő tövisekre. Valószínűleg az Ilex aquifolium (közönséges magyal) egy különleges, régi kertekben fennmaradt mutációja vagy hibridje. Kifejlett magassága 2-4 méter, szélessége 1,5-2,5 méter, így közepes termetű, lassan növő örökzöld cserjeként szoliterként, csoportos ültetésben vagy akár konténerben is megállja a helyét.
Külső megjelenés A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a kicsi (2-4 cm), ovális vagy elliptikus, sötétzöld, fényes levelek, amelyek feltűnő, szabálytalan ezüstfehér vagy krémszínű szegéllyel rendelkeznek. A levél szegélyén a szokásos magyal-töviskészleten túl a levél felső felületén is számos, kisebb-nagyobb, éles tövis található szétszórtan – ez teszi a 'Ferox' csoportot a legtöbb tövissel borított magyallá. A tarka levélszegély tavasszal és nyáron a legélénkebb, télen kissé halványabb lehet. Tavasszal (május-június) a lombozat között apró, fehér, jelentéktelen, mézes illatú virágok nyílnak. A növény általában női ivarú (termékenyülő), így ha a közelben van egy hím porzójú magyal (pl. Ilex aquifolium 'Silver Queen' vagy más hím fajta), ősszel élénkpiros, 6-8 mm átmérőjű, fényes bogyós terméseket hoz, amelyek egész télen díszítenek és madarakat vonzanak. Fontos tudni: a bogyók enyhén mérgezőek!
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos, szélvédett helyet kedvel. Napos helyen a legszebb a levéltarkaság; félárnyékban is szépen fejlődik, de a szegély kevésbé élénk. A tűző naptól a fiatal levelek megéghetnek, ezért a déli, erős napos fekvéstől óvd.

Talaj: jó vízáteresztő, laza, humuszban gazdag, enyhén savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5). A meszes, kötött talajt nem tűri, ilyenkor vashiányos sárgulás (klorózis) jelentkezhet.

Öntözés: fiatalon és tartós szárazság idején rendszeres öntözést igényel. Idősebb korban közepes vízigényű. A pangó vizet nem tűri.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal és kora nyáron lassú oldódású, savanyú hatású műtrágyával (pl. rododendron- vagy havasszépe-trágya) vagy komposzttal.

Metszés: ritkán igényel metszést. Szükség esetén késő télen (február-március) enyhe formázó metszés végezhető. A régi, elöregedett ágakat távolítsd el. Metszés után viselj kesztyűt – a tövisek szúrnak!

Telelés: teljesen télálló, Magyarország minden régiójában külön védelmet nem igényel. Fiatalon a szélsőséges fagyok ellen takarás javasolt. A téli erős, száraz szelektől óvd.

Kertstílus, ahová illik Formális kert, angol vidéki kert, japánkert, gyűjtőkert, szoliter, alapozó ültetés, konténeres terasz
Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: rododendron (törpe fajták), havasszépe (Kalmia latifolia), sikerpenisz (Leucothoe).

Ezüstös levelű növények: üröm, perovszkia (napos oldal), kék csenkesz.

Sötét lombozatú örökzöldek: törpe boróka, puszpáng, tűztövis.

Árnyéki évelők (a magyal tövébe): páfrányok (erdei páfrány, struccpáfrány), árnyékliliom (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria), gyöngyvirág (Convallaria majalis), hunyor (Helleborus).

Díszfüvek: kék csenkesz, törpe tollbuga, japán vértfű.

Tavaszi hagymások a tövébe: krókusz, gyöngyike, törpe nárcisz.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
USDA besorolása: 6-9 (Magyarország egész területén, 6a-7b zónában biztonságosan nevelhető).			
Fodros levelű enyvesmag	**Pittosporum tenuifolium**	4 450 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Fodros levelű enyvesmag (Pittosporum tenuifolium) Új-Zélandról származó, örökzöld cserje vagy kisebb fa. Kifejlett magassága a legtöbb kertészeti fajtánál 2-4 méter, szélessége 1-2 méter, de a törpe változatok mindössze 50-100 centiméterre nőnek. Természetes élőhelyén akár 10 méter magasra is megnőhet. Levelei kicsik, keskenyek, hullámos szélűek, fényesek, világoszöldek; egyes fajtáknál sárgás, krémszínű vagy éppen sötétbíbor színezetűek. Tavasszal apró, illatos, sötétlila virágok nyílnak a hajtások végén, amelyeket később dekoratív toktermések követnek. A növény habitusa sűrű, bokros, finom textúrájú, így kiválóan alkalmas formázásra.
Igényei

Fény: Napos vagy világos félárnyékos fekvés az ideális; a legszebb lombszínt napos helyen hozza, de a forró délutáni napsütéstől védett helyen is szépen fejlődik.

Talaj: Jó vízáteresztő, termékeny, közepesen nedves talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz, agyagos talajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; rendszeres öntözést igényel, különösen az első években és száraz időszakokban. A kifejlett növény bizonyos mértékig szárazságtűrő, de a talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, rövid fagyokat elvisel, de a hosszan tartó, kemény fagyokat és a hideg, szárító szeleket nem. Hazánkban védett, meleg fekvésben vagy konténerben tartható, ahol teleltethető.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos vagy félárnyékos, szélvédett helyre, jó vízáteresztő, komposzttal dúsított talajba. Konténerben is nevelhető, ekkor ültesse jó minőségű, vízáteresztő komposztba.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később hetente egyszer mélyen locsolja meg; aszályos időszakban gyakrabban. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya támogatja a növekedést. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: A formázott sövényként tartott növényeket rendszeresen, de visszafogottan metssze, hogy megőrizze a tömör formát. A metszést tavasszal vagy nyár elején végezze el, mert a növény a metszést jól tűri. Az elhalt vagy sérült hajtásokat tavasszal távolítsa el.

Átteleltetés: Hazánkban a növényt takarással, védett helyen vagy konténerben teleltesse át. A konténeres növényt fagymentes, világos helyen tartsa, és csökkentse az öntözést.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló, de a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A levéltetvek és a pajzstetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább formális és informális sövényként, topiáriumként, mediterrán és cottage kertekben, valamint konténeres dísznövényként illik a kertbe. Finom textúrájú lombozata miatt kiválóan alkalmas modern, strukturált kompozíciókba és tengerparti hatású kertekbe is.
Növénytársítások

Örökzöldek: tiszafa, magyal, puszpáng – sűrű, rendezett sövénykompozíciót alkotnak.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a cserje tömör formáját.

Évelők: levendula, zsálya, kakukkfű – napos, szárazságtűrő társak, amelyek illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a cserje alá.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 8–10 (egyes források szerint 7–10); hazánkban (6–7. zóna) védett fekvésben vagy konténerben tartható.

Fraise Melba bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Fraise Melba'**	3 450 Ft	3 750 Ft
Francis borostyán	**Hedera helix 'Francis'**	3 950 Ft	4 250 Ft

A többi borostyánfajtához képest gyorsabb ütemben fejlődik. Egészséges zöld levelei kevésbé mélyen karéjosak, inkább fodrosak, de ennél a növénynél is több formájú levéllel találkozhatunk egy-egy egyeden. Árnyas, üde talajú termőhelyek növénye, de sokan tartják kaspóban, cserépben érdekes levelei miatt. Ilyen helyzetekben kis állványt érdemes elhelyezni a cserében, amire fel tud kapaszkodni, hogy nagyobb felületen láthassuk a leveleit. A többi borostyánhoz hasonlóan fel tud kapaszkodni drótfonatokra, de falfelületekre is. Fontos tudni, hogy a borostyánok a felszínen látható gyökereikkel csak rátámaszkodnak az őket tartó falra, vagy másik növényre, táplálék felvételére ezek nem alkalmasak. Így ilyen értelemben nem élősködnek más növényeken, ellenben lombjukkal elveszik tőlük a teret, a fényt, ezért térparazitáknak nevezzük őket.
A Francis borostyán gyorsan növekszik és könnyen gondozható. Jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz és növekedési körülményekhez, beleértve a napfényes vagy félárnyékos helyeket. Rendszeres metszéssel könnyen karbantartható és formázható, így a kerttervezők és kertgondozók számára is ideális választás.
USDA zóna: 6b

Genolia oszlopos babérmeggy	**Prunus laurocerasus 'Genolia'**	11 900 Ft	11 900 Ft

A Genolia babérmeggy (Prunus laurocerasus 'Genolia') közismert babérmeggy fajták igényeivel, és tűrőképességével rendelkező fényes örökzöld lombú díszcserje, ám növekedése kifejezetten oszlopos jellegű. Felfelé törő ágai miatt kevésbé terebélyes, emiatt sokkal könnyebb térhatároló sövényként karban tartani. 2,5-3 méteres magasságot is eléri.

Gold Star aranylombú terülő boróka	**Juniperus x media 'Gold Star'**	3 750 Ft	3 750 Ft

Laposan a föld felett szétterülő, viszonylag lassú növekedésű, aranysárga lombozatú talajtakaró boróka. Lombszínében némi kékeszöld árnyalat érzékelhető. Nagyon edzett növény, jól bírja a száraz, meszes talajokat is! Napos helyet szeret, mint a borókák túlnyomó többsége!

5a USDA-zóna

Golden Dream borbolya	**Berberis thunbergii 'Golden Dream'**	6 950 Ft	6 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Golden Dream borbolya (Berberis thunbergii 'Golden Dream') – Az aranysárga levelű, kompakt cserje

A Golden Dream borbolya a borbolyafélék (Berberidaceae) családjába tartozó, Japánban őshonos Berberis thunbergii nemesített változata. A 'Golden Dream' fajtát a kertészeti gyakorlatban az egyik legszebb aranysárga levelű borbolyaként tartják számon, amely a kertben egész évben dekoratív színfoltot biztosít. A fajtát a német H. Kolster nemesítő cég hozta létre, és a kertészeti forgalomban a 'Golden Dream' néven ismert, bár a fajta származása miatt a 'Thunbergii' név is előfordul a leírásokban. Ez a növény a tavaszi aranysárga lombozatával, a nyári zöldes árnyalataival és az őszi élénkpiros bogyóival az egyik legkedveltebb színes levelű cserje a modern kertekben. A könnyű gondozhatósága, a kiváló szárazságtűrése és a sokoldalú felhasználhatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Golden Dream borbolya egy kompakt, sűrűn elágazó, gömbölyded habitusú, lombhullató cserje. Kifejlett magassága és szélessége 60-90 cm között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. Növekedési erélye közepes, a hajtások ívesen hajlanak. A növény hajtásain rövid, vékony tövisek találhatók, amelyek a borbolyák jellegzetességei.

A levelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A levelek kicsik, 1-3 cm hosszúak, tojásdadok vagy spatulásak, szélük ép, a levél felülete sima, fényes. A 'Golden Dream' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek feltűnő aranysárga színe, amely a tavaszi hajtáskor a legélénkebb, intenzívebb árnyalatú. A nyár folyamán a levelek enyhén zöldes árnyalatot kapnak, de a sárga szín domináns marad. A lombozat egész szezonban dekoratív, és a kertben feltűnő, napsütötte színfoltot biztosít.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a termések adják. A virágok a tavasz végén (május-június) jelennek meg, kicsik, sárgák, csésze alakúak, a levelek között helyezkednek el. A virágok jelentéktelenek, de vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, élénkpiros bogyókat fejleszt, amelyek ősszel érnek be, és sokáig a növényen maradnak, téli díszként szolgálva. A termések a madarak számára táplálékot nyújtanak.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, élénkpiros bogyókat fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Golden Dream borbolya napos fekvést igényel a legszebb, legintenzívebb aranysárga lombozatszín eléréséhez. Félárnyékban a levelek színe kevésbé intenzív, zöldesebb árnyalatú lehet.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után jól tűri.

Öntözés: A Golden Dream borbolya közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A Golden Dream borbolya alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat. Fontos: a metszés során viseljünk védőkesztyűt, mert a növény hajtásai töviseket hordoznak.

Telelés és fagytűrés: A Golden Dream borbolya kifejezetten kiváló télállóságú; az USDA 4-8-as zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A Golden Dream borbolya az aranysárga lombozatának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb színes levelű cserje a kertekben és parkokban: Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (60-90 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény. Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát. Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is. Alacsony sövénynek – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt alacsony, díszítő sövény kialakítására is alkalmas. Színes lombozatú kertekbe, vegyeságyásokba – az aranysárga lombozat kiváló színfolt a sötétzöld hátterű ágyásokban. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A Golden Dream borbolya aranysárga lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók: Sötét levelű növényekkel: Sötétvörös vagy bordó levelű cserjékkel (pl. sötét levelű borbolyák, japán borbolya) – a sárga és a bordó szívek kiváló kontrasztot alkotnak. Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek. Lila virágú növényekkel: Levendulával (Lavandula), zsályával (Salvia) – a lila és a sárga szívek harmonikus, friss párost alkotnak. Zöld levelű örökzöldekkel: Tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli az aranysárga lombozatot. USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon a Golden Dream borbolya teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Golden Girl hibrid magyal	**Ilex x meserveae 'Golden Girl'**	5 950 Ft	6 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Golden Girl hibrid magyal egy közepes termetű, meredeken felfelé törő, oszlopos növekedésű örökzöld cserje. Az ágrendszere függőleges irányú, ami keskeny, oszlopszerű habitust eredményez. Levelei hosszúkásak, fényes sötétzöld színűek, bőrszerűek és szélükön enyhén fogazottak. A növény legfeltűnőbb sajátossága a világító sárga bogyói, amelyek élénk kontrasztot alkotnak a sötétzöld levelek között. A bogyók ősz közepétől tavaszig a növényen maradnak. A Golden Girl kiemelkedően jó fagytűrő képességgel rendelkezik, jelentősen ellenállóbb, mint a közönséges magyal fajtái.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, savanyú kémhatású talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, jól alkalmazkodik különböző körülményekhez

Metszés: Alig igényel metszést az oszlopos növekedése miatt

Télállóság: Kiváló fagytűrő, a legkeményebb teleket is jól viseli

Trágyázás: Tavasszal örökzöld trágyával

Ültetési javaslat

Keskeny sövényként ideális választás

Szűk helyekre tökéletes az oszlopos növekedése miatt

Társítás: Piros bogyós magyal fajtákkal kontrasztként

Előkertekbe és szűk utcákra ajánlott

Formális kertekbe kiváló szerkezeti elem

Ajánlott kerttípusok

Kis kertek

Városi kertek

Formális kertek

Oszlopos növényes kompozíciók

Téli díszkertek

Goldfingers mexikói narancsvirág	Choisya 'Goldfingers'	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Goldfingers mexikói narancsvirág (Choisya × dewitteana 'Goldfingers') örökzöld cserje, amely sűrű, lapított gömb alakú, kompakt bokrot képez. 10-20 év alatt éri el végleges méretét: magassága és szélessége általában 1-1,5 méter, kedvező, védett, napos helyen azonban 2 méter körülire is megnőhet. Levelei keskenyek, hosszúkásak, tenyérszerűen összetettek, 3-7 levélkéből állnak, és feltűnő aranysárga színűek – árnyékosabb helyen halványabb zöldessárga árnyalatot vesznek fel. A lombozat enyhe dörzsölésre erős, fűszeres, narancsra emlékeztető illatot áraszt. Késő tavasztól (április végétől) kora nyárig fehér, ötágú csillag alakú virágok nyílnak, amelyek a narancsvirágéhoz hasonló, édes, erős illatot árasztanak. Nyár végén gyakran másodvirágzás is megfigyelhető.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; félárnyékban is megél, de a lombozat aranysárga színe ilyenkor halványabb lesz.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel. A meszes, agyagos, homokos és vályogtalajokat egyaránt elviseli, de a pangó vizet nem tűri.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson is megél.

Vízigény: Közepes; a rendszeres öntözést az első években meghálálja, később a szárazságot is jól tűri. Fiatal korban és konténerben tartva rendszeres vízellátás szükséges.

Télállóság: Fagytűrő, a -23 °C-ot károsodás nélkül elviseli. Fiatal példányoknál és zord teleken érdemes a tövét takarni, illetve védett, meleg helyre telepíteni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, védett helyre, jó vízáteresztő talajba. Konténerben is nevelhető, ekkor ültesse jó minőségű, vízáteresztő komposztba.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején hetente egyszer mélyen locsolja meg. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya támogatja a növekedést és a virágzást. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: A metszésre általában nincs szükség, de a kompakt forma megőrzése és a sűrűbb lombozat serkentése érdekében 3-4 évente végezzen enyhe alakító metszést. A virágzás után metsszen, hogy elkerülje a következő évi virágok eltávolítását. Az elhalt vagy sérült hajtásokat tavasszal távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télálló, de fiatal korban és zord, csapadékos teleken a tövénél takarás segíthet. Konténerben tartva a dézsát védett helyre vigye, és csökkentse az öntözést.

Betegségek és kártevők: Általában egészséges, de a mézharmatgombára érzékeny lehet. A kártevők (levéltetvek, pajzstetvek) ritkán támadják meg.

Kerti stílus
Ez a cserje rendkívül sokoldalú. Kiváló sövényként, amely sűrű, örökzöld lombozatával egész évben takarást nyújt, de szoliterként is figyelemfelkeltő színfoltot ad a kertben. Jól mutat cottage- és informális kertekben, városi és udvari kertekben, tengerparti kertekben, valamint konténerben és teraszon. A napos, védett fekvést kedveli, ezért déli vagy nyugati fekvésű fal mellé is ültethető.
Növénytársítások

Színkontrasztot adó évelők: bíbor levelű növények, mint a Berberis thunbergii 'Chocolate Summer' vagy a Loropetalum fajták, kiemelik az aranysárga lombozat ragyogását.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: Stipa tenuissima (könnyű fű) és Miscanthus fajok lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a cserje tömör formáját.

Hagymás növények: tavaszi hagymások, mint a Narcissus (nárcisz) és Tulipa (tulipán), korai színfoltot hoznak a cserje alá.

Sövénytársak: Ilex (magyal) vagy Taxus (tiszafa) társaságában rendezett, örökzöld sövénykompozíciót alkot.

Illatos társak: Lavandula (levendula) és Rosmarinus (rozmaring) hasonló igényűek, és nyáron gazdagítják a kertet.

USDA télállósági zóna: 6-10.

Goldstar cserjéspimpó	**Potentilla fruticosa 'Goldstar'**	2 250 Ft	2 750 Ft

A Goldstar cserjés pimpó (Potentilla fruticosa 'Goldstar' egy alacsony, max. 80-100cm-re megnövő lombhullató cserje, mely késő tavasztól őszig folyamatosan sárga virágokat hoz, melyek a növény teljes felületén megjelennek. Levelei aprók, élénk zöldek, az egész növény felülete finoman szőrözött. Alkalmas akár szoliterként is, vagy alacsony termete miatt nagyobb cserjefoltok lezárásaként. Jól társítható törpe örökzöldekkel, vagy más apró levelű díszcserjékkel, pl. gyöngyvesszőkkel, kúszó kecskerágókkal, puszpánggal, de évelő ágyásokba is be lehet ültetni és levendulát, sudárzsályát, kasvirágot, törpe sásliliomokat, macskamentást stb. telepíteni körülötte.
Napos, félárnyékos fekvést kedvel, időszakos száraz periódusokat elvisel, érdemes azonban öntözni, azt meghálálja.
A talajok tekintetében nem válogat, egészen jól boldogul a laza vízáteresztőktől kezdve a nehezebb, kötöttebb talajokig mindenhol.
Nem fagyérzékeny
Az egyes virágzási hullámokat követően érdemes metszeni, alakítani a koronáját. Erőteljesebb visszavágásra nincsen szükség, azonban a koronából kiálló, keresztbe növő hajtásokat távolítsuk el.

Goshiki tarka levelű illatcserje	**Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Tarka levelű illatcserje 'Goshiki' fajta egy kompakt, szabályos növekedésű örökzöld cserje, amely 1-1,5 méter magasra és hasonló szélességre nő meg. Levelei a magyaléra emlékeztetnek, bőrszerűek, szúrós szélűek, és látványos keveréke a zöld, krémszínű, rózsaszín és sárga foltoknak. A kora őszben nyíló virágai aprók, fehérek, és rendkívül kellemes, édes illatot árasztanak. A virágzást néha kisméretű, kékes-fekete bogyók követik.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedveli

Talajigény: A jó vízelvezetésű, humuszban gazdag, enyhén savanyú vagy semleges talajt részesíti előnyben

Vízigény: Közepes vízigényű, a szárazságot rövid ideig tűri

Metszés: Alig igényel metszést, de jól formázható, metszése tavasszal ajánlott

Télállóság: -15°C-ig jó télállóságú, magyarországi teleket jól tűri

Trágyázás: Tavasszal lassan ható, komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként: Díszcserjeként kiemelkedő hatású

Alacsony sövényként: Formázott sövényként nagyon dekoratív

Konténeres nevelés: Erkélyre, teraszra kiváló

Társítás: Aztábbiákkal, rododendronokkal, japán juhokkal jól harmonizál

Különleges alkalmazás: Formametszésre is kiválóan alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Japán kertek

Modern kertek

Mediterrán kertek

Városi kertek

Konténeres kertek

Grand Bleu Angol kékszakáll	**Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu'**	4 450 Ft	5 390 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Mintegy 50 cm-re növő, szép lombozatú törpecserje, igen látványos, nagyméretű, sötétkék virágokkal.

6a-9b USDA-zóna

Grefsheim hamvas gyöngyvessző	**Spiraea cinerea 'Grefsheim'**	2 450 Ft	2 450 Ft

A 'Grefsheim' hamvas gyöngyvessző a koratavaszi kertek egyik leglátványosabb, legbőségesebben virágzó cserjéje, amely hófehér virágtömegével hívja fel magára a figyelmet. Közepes termetű, dúsan elágazó, lombhullató cserje, amely kifejlett állapotban 1-1,5 méter magas és 1,2-1,8 méter széles, ívesen lehajló vesszőivel bő, tömött bokrot alkot.
A növény lombozata keskeny, lándzsás alakú, szürkészöld levelekből áll, melyek felülete finoman molyhos, így a névben is szereplő hamvas megjelenést kölcsönzi a cserjének. A levelek a virágzás után, áprilistól májusig jelennek meg. A virágzás a növény igazi attrakciója: április-május folyamán, még a lombfakadás előtt vagy azzal egy időben, az előző évi vesszők teljes hosszában, sűrűn egymás mellett nyílnak az apró, ötszirmú, hófehér virágok. A virágok annyira bőségesen borítják a hajtásokat, hogy a bokor távolról hófödte benyomást kelt.
Igényei és gondozása
A 'Grefsheim' hamvas gyöngyvessző napos vagy félárnyékos fekvést kedvel, de a legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza. Talaj tekintetében nem túl igényes, a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű kerti talajban fejlődik a legszebben. A pangó vizet nem szereti, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli. Gondozása egyszerű, de a metszés időzítése fontos. Mivel a virágok az előző évi hajtásokon nyílnak, a metszést közvetlenül a virágzás után, május végén-június elején végezzük el. Ilyenkor a virágzott hajtásokat vágjuk vissza a bokor belseje felé, hogy sűrűbb, tömöttebb növekedésre ösztönözzük a növényt. A fiatalító metszést (idős, elöregedett vesszők töből történő eltávolítását) is virágzás után végezhetjük. Ha később, ősszel vagy kora tavasszal metszenénk, akkor a következő évi virágokat veszítenénk el.
Felhasználás a kertben
Sokoldalú megjelenésének és korai virágzásának köszönhetően a 'Grefsheim' hamvas gyöngyvessző a kert számos pontján megállja a helyét. Kiválóan alkalmas magányosan (szoliterként) ültetve, ahol tavasszal teljes szépségében kibontakozhat. Csoportosan ültetve igazán látványos virágfüggönyt alkothatunk belőle. Alacsony sövényként vagy szegélynövényként is mutatós utak, teraszok, virágágyások mentén. Vegyes cserjefalakba, évelőágyások hátterébe ültetve korai virágzásával hozza meg a kert tavaszi hangulatát. Természetes hatású kertekbe, falusi kertekbe is ideális választás.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes kihasználni a korai virágzást és a szürkészöld lombozat kontraszteremtő képességét. Kiváló partnerei lehetnek a sárga virágú korai cserjék, mint az aranyvessző (Forsythia) vagy a korai jázmin (Jasminum nudiflorum), ahol a sárga és fehér virágok gyönyörűen kiegészítik egymást. Díszfüvekkel, például tollborzfűvel vagy kínai ezüstfűvel ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk. Levendulával (Lavandula) vagy zsályával (Salvia) társítva a lila virágok szép ellenpontját adják a tavaszi fehér virágtömegnek. Alacsony termetű talajtakarók, mint a kis meténg (Vinca minor), takarják a cserje tövét. Korai hagymásokkal, például nárcisszal, tulipánnal vagy krókusszal ültetve a tövébe, a tavaszi virágzás összjátéka varázslatos.

4a-8b USDA-zóna

Havasi törpefenyő	**Pinus mugo**	3 950 Ft	4 350 Ft

A Havasi törpefenyő (Pinus mugo) egy varázslatos kis örökzöld növény, amely méltán vált az egyik legkedveltebb dísznövénnyé a kertészetekben és kertekben világszerte. Ez a törpefenyő fajta különleges tulajdonságai és lenyűgöző megjelenése miatt vált népszerűvé. A Havasi törpefenyő egy apró növény, amely a magasabb hegycsúcsokon és havas területeken található meg, így neve is innen származik. Az általában alacsonyabbra növő törpefenyőkkel ellentétben, ez a fajta egyedülállóan tömör és kompakt formájú, amely igazán szemet gyönyörködtető látványt nyújt. A lassú növekedésű növény általában körülbelül 1-2 méter magasra növekszik, de egyes példányok akár 3 méteres magasságot is elérhetik, ami azért rendkívül ritka. Az Havasi törpefenyő tűi rövidek és vastagok, sötétzöld színűek, amelyek szépen elrendeződnek a tömör ágakon. Ez a tulajdonság hozzájárul a növény gömb alakú, kompakt megjelenéséhez. Télen sem veszíti el tűlevelét, így egész évben szép és zöld marad, ami nagyszerű kiegészítője lehet kerti tájképnek vagy más növények között. A Havasi törpefenyő rendkívül ellenálló és könnyen gondozható növény. Jól érzi magát napos vagy félárnyékos helyeken, és jól bírja a hideg teleket és a szélsőséges időjárási körülményeket is. A talajjal szemben nem túl igényes, de a jó vízelvezetésű talajokat részesíti előnyben. Rendszeres öntözésre van szüksége az első években, amíg gyökérzete meg nem erősödik. A Havasi törpefenyő egy sokoldalú növény, amely többféle módon felhasználható. Az alacsony növekedésű példányok szépen mutatnak kőkertekben, sziklakertekben vagy kerti konténerekben. Nagyszerűen alkalmazható a kerti határok kialakításában, vagy sziklakertekben. Emellett a Havasi törpefenyő gyakran felhasználják bonsai kerti vagy belső tér díszítésére is, mivel kompakt mérete és lassú növekedése ideálisak a formálásához. A növény hosszú élettartammal rendelkezik, így hosszú távon is élvezhetjük a szépségét és egyediségét. A törpefenyők könnyen fenntarthatók és kevés gondozást igényelnek, így ideális választás azoknak, akik kevésbé tapasztalt kertészek vagy időhiányban szenvedő emberek. A Havasi törpefenyő kis teret foglal el, így kisebb kertekben vagy balkonokon is könnyen elhelyezhető. Végül, de nem utolsósorban, a Havasi törpefenyő egy olyan növény, amely élettel tölti meg a környezetét. Az élénk zöld színe és a kis mérete miatt vonzza a tekintetet, és kisugározza a természet szépségét. A növény által nyújtott frissesség és harmónia a kert vagy a terasz hangulatát fokozza, és egy kellemes, pihentető atmoszférát teremt. Összességében a Havasi törpefenyő egy varázslatos és különleges növény, amely szépsége és sokoldalúsága révén vonzóvá teszi a kerteket és a kerti területeket. Legyen szó kis tájképről, bonsai kertekről vagy kerti határokról, ez a törpefenyő minden környezetben megállja a helyét. Ha egy tartós, könnyen gondozható és impozáns dísznövényre vágyik, a Havasi törpefenyő kiváló választás lehet.

Heavenly Blue kékszakáll	**Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kékszakáll (Caryopteris × clandonensis 'Heavenly Blue') – Az őszi kert élénk kék ékköve
A 'Heavenly Blue' a kékszakáll (Caryopteris × clandonensis) egyik legnépszerűbb és legszebb nemesített változata, amely a késő nyári és őszi kert egyik legértékesebb virágzó cserjéje. A növény két kínai faj (C. incana és C. mongholica) keresztezéséből származik, és hibrid eredetének köszönhetően a legjobb tulajdonságokat ötvözi: kompakt méret, bőséges virágzás és kiváló alkalmazkodóképesség.
Külső megjelenés
A 'Heavenly Blue' kompakt, sűrű, bokros növekedésű, feltörő habitusú cserje. Kifejlett magassága 0,6-1 méter, szélessége 0,8-1 méter között alakul. A hajtások ívesen hajlanak, ami a növénynek laza, mégis rendezett megjelenést kölcsönöz.
A levelek szürkészöldek, lándzsás alakúak, 5-8 cm hosszúak, finoman fogazott szélűek. A levél felülete matt, fonákja világosabb, szürkés árnyalatú. A levelek megdörzsölve aromás, terpentinszerű illatot árasztanak. A lombozat ősszel lehull, de a virágzás idején kiváló hátteret biztosít a virágoknak.
A növény legnagyobb dísze a virágzat. A virágok aprók, csövesek, élénk sötétkék vagy ibolyáskék színűek, sűrű, laza csoportokba tömörülnek a hajtások végén és a levélhónaljakban. A virágokból álló fürtök augusztustól egészen októberig nyílnak, ami különösen értékes, mert ebben az időszakban már kevesebb más növény virágzik a kertben. A virágok a méhek, a poszméhek és a pillangók számára kiváló nektár- és pollenforrást jelentenek.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg fekvésű helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napfény elengedhetetlen a dús virágzáshoz. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, a növény felnyurgulhat.

Talaj: Nem válogatós, de a legjobban a jó vízáteresztő, laza, homokos vagy vályogos, semleges vagy enyhén meszes talajban érzi magát. A pangó vizet és a nehéz, agyagos talajokat nem tűri, különösen télen.

Öntözés: Kimondottan szárazságtűrő. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést nem igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Ültetéskor egy kevés komposzt keverhető a talajhoz. Tavasszal, a metszés után egy kevés általános célú műtrágyával megtámogatható a dús virágzás érdekében.

Metszés: A 'Heavenly Blue' metszése a legfontosabb gondozási feladat. Kora tavasszal (március-áprilisban), a rügyfakadás előtt a növényt erősen vissza kell vágni: a hajtásokat 10-15 cm magasságban, 2-3 rügyre vágjuk vissza. Ez serkenti az új, erős hajtások képződését, a sűrű, bokros növekedést és a bőséges virágzást. A metszés elmaradása esetén a növény felkopaszodik, virágzása gyengébb lesz.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény akár -15°C-ig ellenáll a hidegnek, így Magyarország nagy részén gond nélkül áttelel. A hidegebb, szeles fekvésű területeken érdemes a növényt védett, szélvédett helyre (déli vagy nyugati oldal, házfal mellé) ültetni. A növény fagyok idején a föld feletti része elpusztulhat, de a gyökérzet áttelel, és tavasszal újrahajt, különösen ha a metszést elvégeztük.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de a pangó vizes talajban a gyökérrothadás előfordulhat. Ritkán a poloska vagy a liszteske károsíthatja.

Felhasználás a kertben
A 'Heavenly Blue' a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Kisebb kertekbe, városi udvarokba, előkertekbe – kompakt mérete miatt ideális

Napos szegélyágyásokba, vegyeságyások középső sorába – a késő nyári, őszi virágzó növények társaságában

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – szárazságtűrése és alacsony igényei miatt kiváló

Konténeres teraszokra, erkélyekre – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültethető

Tömeges csoportos ültetésre – a virágok egységes kék színfoltot alkotnak

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Méh- és pillangóbarát kertekbe – virágai értékes nektárforrást jelentenek a beporzóknak

Változatos növénytársítások
A 'Heavenly Blue' élénk kék virágai és szürkészöld lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló igényű növényekkel:

Sárga virágú évelők: Kúpvirág, napvirág – a komplementer színek (sárga és kék) vibráló kontrasztot alkotnak

Fehér virágú növények: Őszirózsa, párnás őszirózsa – a fehér és a kék harmonikus, elegáns párost alkot

Ezüstös levelű növények: Levendula, üröm, perovszkia – a különböző ezüstös árnyalatok textúrákban gazdag összképet adnak

Lila virágú évelők: Macskamenta – a hasonló színek harmonikus, összefüggő virágmezőt alkotnak

Díszfüvek: Tollbuga, kék csenkesz – a füvek laza, mozgó habitusa tökéletesen kiegészíti a növény tömöttebb formáját

USDA besorolása: 6-9 (Magyarország nagy részén, a 6a-7b zónákban a növény teljesen téli álló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is nevelhető, de ott védettebb fekvésbe és téli takarást igényelhet).

6a-9b USDA-zóna

Hófehér gyöngycserje	**Exochorda macrantha 'The Bride'**	3 450 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hófehér gyöngycserje (Exochorda macrantha 'The Bride') a rózsafélék családjába tartozó, lombhullató díszcserje, amely Közép-Ázsiában és Kelet-Ázsiában őshonos. A The Bride név – amely menyasszonyt jelent – tökéletesen leírja a növény tavaszi virágzását: a hajtásokat teljes hosszukban beborító, tiszta fehér virágfürtök olyanok, mint egy menyasszonyi fátyol vagy mint a frissen hullott hó. Ez az egyik legkedveltebb tavaszi virágzójú cserje, amely a kert egyik fő attrakciója lehet április-májusban.
Kifejlett mérete és megjelenése: A The Bride közepes termetű, 1-1,5 méter magas és 1,5-2 méter széles, szétterülő, bokros habitusú cserje. Ágai ívesen hajlanak, ami a virágzás idején különösen mutatós, mivel a hajló ágakon lógó virágfürtök még látványosabbak. Levelei közepes méretűek, lándzsás vagy tojásdad alakúak, 4-8 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. Ősszel a levelek sárgás vagy enyhén narancsos árnyalatot öltenek. A virágok a növény igazi ékkövei: április-május környékén nyílnak, a lombfakadás idején vagy közvetlenül azután. A virágok nagyok, 3-4 cm átmérőjűek, ötszirmúak, tiszta fehérek, és a hajtások végén hosszú, tömött fürtökbe rendeződnek, amelyek a hajtás szinte teljes hosszát beborítják. A virágok közepén sárga porzók csoportosulnak, ami finom színfoltot ad. A virágok enyhén illatosak, vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. A virágzás után apró, csillag alakú toktermések fejlődnek, amelyek szintén díszíthetnek.
Igényei és gondozási útmutató: A The Bride a legszebb virágdíszét teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, a növekedése sűrűbb. Félárnyékban a virágzás mérsékeltebb lehet, de a növény így is szépen fejlődik. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, semleges vagy enyhén meszes talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete megfelelően ki nem fejlődik. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat, de a bőséges virágzáshoz érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése a virágzás után, közvetlenül a virágok elhervadásával végezhető el. Ekkor távolítsuk el az elvirágzott hajtásokat, valamint ritkítsuk meg a túl sűrű koronát. Ha idősebb korban megritkul a virágzás, végezhetünk fiatalító metszést, amelynek során a legöregebb ágakat a talaj közelében visszavágjuk. Teleltetésre nincs szükség, mivel teljesen fagytűrő, akár -25 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a pajzstetvek okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat és a levélfoltosság fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A The Bride sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a bőséges, fehér virágzásával a lágy, elegáns hangulatot erősíti. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás. Városi kertekben és előkertekben a légszennyezést is jól tűri, így alapozó növényként vagy sövényként is megállja a helyét. Hagyományos kertekben a régi idők hangulatát idézi.
Változatos növénytársítások: Lila virágú növényekkel: A lila orgona (Syringa vulgaris), a lila iszalag (Clematis viticella) vagy a levendula (Lavandula angustifolia) mellett a The Bride fehér virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak. Aranyesővel: Az aranyeső (Laburnum anagyroides) sárga, lógó virágfürtjei mellett a fehér virágok elegáns, harmonikus kompozíciót alkotnak. Rózsaszín virágú növényekkel: A rózsaszín virágú mandula (Prunus triloba) vagy a rózsaszín gyöngyvirágcserje (Deutzia) mellett a fehér és rózsaszín finom, romantikus hangulatot kelt. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a cserje keményebb formáihoz. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa), nárciszok (Narcissus) vagy jácintok (Hyacinthus) tavasszal, a The Bride virágzásával egy időben vagy közvetlenül előtte színesítik a tájat. Örökzöldekkel: A sötétzöld tuják (Thuja) vagy borókák (Juniperus) mellett a fehér virágok ragyogóan érvényesülnek.
A The Bride kiváló választás azok számára, akik egy látványos, bőségesen virágzó, igénytelen tavaszi cserjét keresnek, amely a kert egyik fő attrakciója lehet április-májusban, és a menyasszonyi fátyolhoz hasonló fehér virágzatával hívja fel magára a figyelmet. USDA besorolása: 4-8.

Hófehér nipponi gyöngyvessző	**Spiraea nipponica 'Snowmound'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Hófehér nipponi gyöngyvessző (Spiraea nipponica 'Snowmound') egy felfelé törő vesszőjű, 1-1,5 méteres cserje, lombozata enyhén kékes árnyalatú, dús hófehér tavaszi virágzásával az egyik legszebb gyöngyvessző, mely szoliternek, sövénynek egyaránt remekül felhasználható. Nagyobb tereken más cserjefoltok előterébe is telepíthető, kisebb helyeken pedig a hátsó sorba is kerülhet háttér növényként. Magasabb évelők közé is beültethető, mert növekedése jól kontrollálható erősebb nyári visszametszéssel. A gyöngyvesszők tavasszal, nyár elején nyílnak, ezért érdemes megvárni a metszéssel az elvirágzásukat.
Talajok tekintetében nem igényes.
Napon szeret elhelyezkedni, de erős napsütéses, száraz nyarakon érdemes keveset öntözni.
Az év nagy részében gondozás mentes.
Sűrű ágrendszere miatt a madarak, különösen a rigók szeretnek elbújni alattuk.

Zóna:4a

Hólyagvessző	**Physocarpus opulifolius**	3 250 Ft	3 250 Ft

A Physocarpus opulifolius (Hólyagvessző) 2-3 m magas félgömb alakú, lombhullató cserje, melynek lenyűgöző fehér virágai kora nyáron nyílnak. Virágai mellett, a szép, szabályos ívű ágazata, lombjának sárga őszi színe a magyarázat arra, hogy miért olyan népszerű kerti növény az USA-ban. Nagyon ellenálló növény!

5b-9a USDA-zóna

Hósziromcserje	**Rhodotypos scandens**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hósziromcserje (Rhodotypos scandens) dekoratív cserje, amely bőséges virágzásával vonzza a figyelmet. Magassága 1-2 méterre tehető, és sűrű, bokros habitusú, ami igazán vonzóá teszi a különböző kertekben.
A levelek fényes zöldek, és a cserje tavasszal megjelenő fehér virágai szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak. Ezek a virágok a nyár elején nyílnak, és különösen kellemes illatuk van, vonzva a méheket és a pillangókat, ezzel segítve a kert biodiverzitását.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Hósziromcserje napsütéses vagy részben árnyékos helyet kedvel. A legjobb virágzást a teljes napfény biztosítja.
Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legideálisabb, de a növény jól tolerálja a különböző talajviszonyokat, beleértve az agyagos talajt is.
Öntözés: A fiatal növények rendszeres öntözése javasolt a gyökérzet kialakulása érdekében. Az idősebb növények jól bírják a szárazabb időszakokat is.
Trágyázás: Tavasszal kiegyensúlyozott tápanyagú műtrágya használata előnyös a bőséges virágzáshoz.
Téliesítés: A Rhodotypos scandens télálló, azonban az őszi hónapokban érdemes visszavágni az ágakat a friss hajtások érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

A Hósziromcserje szoliter cserjeként is remekül mutat a kert közepén, vagy más dísznövények mellett, kiemelve a virágzás szépségét.
Kiváló szegélyezésre kerítések és utak mentén is, mivel vonzza a beporzókat, és szép látványt nyújt.
Parkokban és kertekben egyaránt megállja a helyét, ahol aromás virágai és szép lombozata gazdagítja a tájat.

A Hósziromcserje (Rhodotypos scandens) nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával és gazdag virágzásával is elkápráztatja a kertészeket, így ideális választás bárki számára, aki szeretné gazdagítani kertjét.

5a-9b USDA-zóna

Húsos som	Cornus mas	2 950 Ft	2 950 Ft

A Cornus mas (Húsos som) terebélyes, 3-5 méteres bokor, kora tavasszal, lombfakadás előtt nyíló sárga virágzatai igen mutatósak. Korai virágzása miatt az első mézelő növény egyike. Skarlátpiros színű, fényes termései édes-savanykásak, túléretten nyersen is fogyasztható, de finom lekvárt, szörpöt, bort és pálinkát is készíthetünk belőle. Régóta része az emberi táplálkozásnak, sok C-vitamint tartalmaz, ezért aszalva télen felér egy C-vitamin bombával. Edzett, tűrőképes növény, meleg fekvést, meszes talajt kedvel. Fája igen tömör, jól esztergálható, keresett cikk. Sövénynek is alkalmas. Érdekessége, hogy nálunk honos faj, amiről egyes földrajzi neveink is árulkodnak, gondoljunk csak Somogy megyére vagy Som községre. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul.

5a-9b USDA-zóna

Ice Crystal tölgylevelű hortenzia	Hydrangea quercifolia 'Ice Crystal'	3 950 Ft	3 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Ice Crystal tölgylevelű hortenzia (Hydrangea quercifolia Ice Crystal) a tölgylevelű hortenzia fajták egyik legkedveltebb képviselője. Az Ice Crystal név – amely jégkristályt jelent – tökéletesen leírja a virágzatok megjelenését: a nagy, fehér, kúp alakú virágfürtök olyanok, mintha jégkristályok borítanák a növényt. Ez a fajta a látványos virágzás, a különleges, őszi színekben pompázó lombozat és a megbízható növekedés hármasát kínálja.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az Ice Crystal közepes termetű, 1,2-1,5 méter magas és 1,2-1,5 méter széles, sűrű, bokros, kerekded habitusú lombhullató cserje. Levelei a növény legnagyobb díszei: nagyok, 10-20 cm hosszúak, mélyen karéjosak, a tölgylevélre emlékeztetnek. A levelek színe nyáron sötétzöld, ősszel látványos színpompába váltanak: élénk sárga, narancs, piros és bordó árnyalatokban pompáznak. Ez a fajta az egyik legszebb őszi lombszínű cserje. A virágok a növény másik fő díszei: június-július környékén nyílnak, és akár szeptemberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok nagyok, kúp alakúak, 15-25 cm hosszúak, a virágzatot apró, termékeny virágok és nagyobb, meddő virágok egyaránt alkotják. A virágok kezdetben fehérek, majd idővel rózsaszínes árnyalatot kapnak. A virágok szárazon is a növényen maradhatnak, télen is díszítve a kertet.
Igényei és gondozási útmutató: Az Ice Crystal a legszebb virágdíszét és a legszebb őszi lombszínét teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, az őszi színek intenzívebbek. Félárnyékban a levelek színe finomabb, a növény kevesebb gondozást igényel. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 5,5-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat kevésbé tűri, a nagyon meszes talajban a levelek sárgulhatnak (klorózis). Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást és a szép lombozatot. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése a virágzás után, késő nyáron vagy kora ősszel végezhető. A tölgylevelű hortenzia a régi fán virágzik, ezért a metszést óvatosan végezzük: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat, de a nagyobb visszametszést kerüljük, mert az csökkentheti a következő évi virágzást. Teleltetésre nincs szükség, mivel jó télállósággal rendelkezik, akár -25 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: Az Ice Crystal sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a nagy, fehér virágzataival és az őszi lombszínével a lágy, elegáns hangulatot erősíti. Természetes kertekben és erdőszéli kertekben a tölgylevélre emlékeztető lombozatával a természetes, erdei hangulatot idézi. Vegyes évelőágyásokban alapozó növényként vagy szoliterként is megállja a helyét. Japán kertekben a finom virágok és az őszi színek a keleties esztétikához illenek.
Változatos növénytársítások: Páfrányokkal: A félárnyékos helyre ültetett páfrányok (Dryopteris, Polystichum) finom textúrájukkal szépen kiegészítik a hortenzia nagy leveleit. Árnyékliliomokkal: Hosta fajták mellett a félárnyékos ágyások egyik legszebb kompozícióját alkothatja. Japán juharral: A japán juhar (Acer palmatum) őszi vörös színe mellett az Ice Crystal sárga-narancs lombozata gyönyörű kontrasztot alkot. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Rododendronnal: A rododendron (Rhododendron) tavaszi virágai mellett az Ice Crystal nyári virágzása és őszi lombszíne egész évben érdekessé teszi a kompozíciót. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa) vagy nárciszok (Narcissus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Vörös levelű növényekkel: A vöröslevelű díszszilva (Prunus cerasifera Nigra) vagy a japán juhar vörös levelű fajtái mellett az Ice Crystal zöld lombozata és fehér virágai szépen érvényesülnek.
Az Ice Crystal kiváló választás azok számára, akik egy különleges levelű, őszi színekben pompázó, bőségesen virágzó hortenziát keresnek, amely a kert egyik fő attrakciója lehet a nyári virágzás idején és az őszi lombszínben egyaránt. USDA besorolása: 5-9.

Illatos jezsámen	**Philadelphus coronarius**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A közönséges jezsámen egy robosztus, élénkzöld levelű cserje, amely 3-4 méteres magasságot és hasonló szélességet ér el. Levelei ellentétes elhelyezkedésűek, tojásdadok, szélük finoman fogazott. A virágok krémszínűek vagy tisztán fehérek, egyszerűek, 1-1,5 cm átmérőjűek, és rendkívül édeskés, intenzív illatot árasztanak. A növény hajtásai idősen a kérge hosszában repedezni kezd.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeken egyaránt jól fejlődik

Talajigény: Meglehetősen igénytelen, de a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagdús talajt preferálja

Vízigény: Közepes vízigényű, fiatalon rendszeres öntözést igényel, de érett korában rövid szárazságot is jól tolerál

Metszés: A virágzás után ajánlott metszeni, mert a virágokat az előző évi hajtásokon hozza

Télállóság: Nagyon jó, magyarországi teleket problémamentesen átvészel

Ültetési javaslat

Egyedül: Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Csoportban: Nyíratlan sövényként vagy térelválasztóként ideális

Különleges helyek: Illata miatt kiemelten ajánlott ültetni pihenőhelyek, padok, teraszok mellé

Kombinációk: Kiválóan harmonizál más tavaszi virágú cserjékkel és évelőkkel

Ajánlott kerttípusok

Falusi kertek

Illatos kertek

Természetes stílusú kertek

Városi zöldterületek

Tájképi kertek

5a USDA-zóna

Illatos lonc	Lonicera fragrantissima	3 200 Ft	3 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Kínából származó cserje, mely akkor virágzik (nálunk is) amikor a természet még nagyban alszik. Hófehér, émelyítően illatos virágai tél végén (február elejétől) nyílnak. Rendkívüli szívóssága miatt is kiváló sövénynövény!
A Lonicera fragrantissima általában nem igényel túl sok gondoskodást. Jól alkalmazkodik a különböző talaj- és éghajlati viszonyokhoz, és kevésbé érzékeny a betegségekre.
Az Illatos lonc tehát egy sokoldalú és vonzó növény, amely kellemes illata, téli virágzása és alacsony karbantartási igénye révén ideális választás lehet különböző kerti területek számára.

6a-9b USDA-zóna

Issai lilabogyó	**Callicarpa dichotoma 'Issai'**	5 950 Ft	6 350 Ft

Boltíves ágrendszer jellemzi ezt a gyönyörű, 1,5-2 m magasra megnövő cserjét, melynek levendula színű bogas virágai nyár elején nyílnak. Élénk lila bogyók díszítik ősszel. Minden lilabogyók leggyönyörűbbike!

6b USDA-zóna

Japán gyöngyvessző	**Spiraea japonica**	2 450 Ft	2 450 Ft

A Spiraea japonica (Japán gyöngyvessző) a Távol-Keleten (Japán, Korea, Kína) honos lombhullató cserje nagyon gyorsan népszerűvé vált a Föld mérsékelt övi területei, amit nagyon szép, sötét rózsaszínű virágainak és kiváló ellenálló képességének köszönhet.
Alacsony karbantartású, gyönyörű virágzó cserje, amely ideális választás bármilyen kertbe. Ez a díszcserje kompakt és sűrű lombozatával, valamint apró, rózsaszín virágzatával emeli ki magát, amelyeket nyáron bőségesen hoz. Jól alkalmazkodik különféle talajtípusokhoz, és ellenálló a különböző időjárási viszonyokkal szemben, így a kezdő kertészek számára is ideális választás. Tavasszal és ősszel is mutatós, mivel leveleinek színe változatos árnyalatokban pompázik.
Gondozási útmutató:

Ültetés: Olyan helyre ültesse, amely jól vízelvezetett és napos, de elviseli a félárnyékot is. Az ideális talaj enyhén savanyú vagy semleges pH-értékű.
Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen az ültetés után az első évben, hogy jól gyökerezzen. Az idősebb növények már jobban tolerálják a szárazságot.
Metszés: Az új hajtások serkentése érdekében évente kora tavasszal végezze el a metszést, vágja vissza a növényt egyharmadára vagy akár felére.
Tápanyag-ellátás: Tavasszal alkalmazzon kiegyensúlyozott, lassan oldódó műtrágyát.
Kártevők és betegségek: Általában ellenálló, de figyeljen a levéltetvekre. Szükség esetén használjon megfelelő rovarölő szert.

6a-9b USDA-zóna

Japán lonc	**Lonicera japonica**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Japán lonc (Lonicera japonica) – illatos kúszónövény kertekbe
A japán lonc (más néven japán futólonc) Kelet-Ázsiából származó, rendkívül népszerű kúszónövény, amelyet elsősorban illatos virágai és gyors növekedése miatt ültetnek. Támasz mellett 4–8 méter magasra is felkapaszkodhat, míg támasz nélkül talajtakaróként, a földön kúszva is szépen terjed. A növény azonban hajlamos a túlzott terjedésre, érdemes a növekedésére odafigyelni.
Külső megjelenés A japán lonc levelei egyszerűek, átellenes állásúak, tojásdadok, 3–8 cm hosszúak. Felszínük fényes sötétzöld, fonákjukon világosabbak, fiatalon mindkét oldalukon szőrösek. A növény enyhe teleken örökzöld, hideg teleken azonban leveleit hullathatja. Virágai május–augusztus között nyílnak, eleinte fehérek, később sárgássá válnak, így a hajtásokon egyszerre megfigyelhető mindkét szín. A virágok csövesek, kétajkúak, jellegzetes, igen erős, édes illatot árasztanak, különösen az esti órákban. Termése ősszel beérő, fényes, kékesfekete bogyó, amely azonban erősen mérgező.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Félárnyékban a legszebb a lombszíne és a legbőségesebb a virágzás.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású (pH 6,0–7,5). Átlagos kerti talajban is megél, de laza, humuszos közegben fejlődik a legszebben.

Öntözés: közepes vízigényű; a fiatal növényeket és a tartósan száraz időszakokat kivéve nem igényel rendszeres öntözést. A jól meggyökeresedett példányok a rövid aszályt is elviselik.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával érdemes megtámogatni a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: kora tavasszal (február–március) ajánlott. A túl hosszú, sűrű vagy elöregedett hajtásokat vissza lehet vágni, hogy a növény formáját megtartsuk és a virágzását serkentsük. Metszés nélkül idővel alulról felkopaszodhat.

Telelés: kimondottan téléálló, Magyarország egész területén megbízhatóan áttelel. Enyhe teleken leveleit is megtartja.

Kártevők, betegségek: időnként lisztharmat vagy levéltetvek támadhatják meg.

Kertstílus, ahová illik Romantikus, természetes hatású kertek, falusi kertek (cottage garden), erdős szegélyek. Kiválóan alkalmas pergolák, lugasok, kerítések, falak befuttatására, de akár talajtakaróként is használható.
Változatos növénytársítások

Más kúszónövények: futórózsák, iszalag (Clematis fajták) – eltérő virágzási idővel egész szezonban díszíthetnek.

Lila virágú évelők: levendula, macskamenta, perovszkia – a japán lonc fehér virágaival szép kontrasztot alkotnak.

Rózsák: a japán lonc és a rózsák egymást erősítve is szépen mutatnak egy pergolán.

Alacsony, árnyéktűrő évelők (a növény tövéhez): páfrányok, tüdőfű, árnyékliliom.

Tavaszi hagymások: krókusz, nárcisz – a lonc lombfakadása előtt még érvényesülhetnek.

Figyelmeztetés: A japán lonc bogyós termése mérgező! Fogyasztása emberben és állatokban hányingert, hányást, hasmenést okozhat. Kisebb kertekben érdemes a terjedését rendszeres metszéssel korlátozni.
USDA besorolása: 4-9 (egyes források szerint 5-9; Magyarország egész területén, a 4b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).

Japán orbáncfű	Hypericum patulum	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Japán orbáncfű Kelet-Ázsiából, Japánból, Kínából és a Himalája vidékéről származó, rendkívül dekoratív, sokáig virágzó díszcserje. A Hypericum nemzetség egyik legkedveltebb képviselője, amelyet aranysárga virágai és igénytelensége miatt szívesen ültetnek kertekbe.
Örökzöld vagy félörökzöld, bokros növekedésű cserje, amely kifejlett állapotban 0,5-1,2 méter magas és 0,8-1,5 méter széles. Ágai vékonyak, rugalmasak, ívesen lehajlanak, ami a növénynek széles, terebélyes, természetes megjelenést kölcsönöz. Fiatal hajtásai zöldek, később barnásvörösre színeződnek, a kéreg idősebb korban vékony csíkokban hámlik.
Levelei a növény egyik díszei. A levelek tojásdadok vagy lándzsásak, 3-8 cm hosszúak, 1-3 cm szélesek, ép szélűek, felszínük sötétzöld, fényes, fonákjuk világosabb. A levelek átellenesen helyezkednek el a száron, a levéllemez finoman áttetsző pontokkal (illóolajtartókkal) tarkított, ami a fény felé tartva jól látható.
A növény igazi dísze a hosszan tartó, bőséges virágzás. Június végétől egészen szeptemberig, a nyár közepétől kora őszig folyamatosan hozza a hajtások végén, egyesével vagy laza csoportokban nyíló, 3-5 cm átmérőjű, csésze alakú virágait. Az öt szirom aranysárga, élénk, selymes fényű, a virág közepén pedig számos, feltűnő, hosszú porzó található, amelyek a sziromnál is hosszabbak, és a virágnak pomponszerű megjelenést kölcsönöznek. A porzók színe élénksárga, a portokok narancssárgák.
A virágokat követően ősszel gömbölyded, 1-1,5 cm átmérőjű toktermések fejlődnek, melyek kezdetben zöldek, majd barnára érnek, és a téli hónapokban is díszítenek.
Igényei és gondozása
A Japán orbáncfű napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt jól tűri, de a legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza. Félárnyékban is szépen fejlődik, de virágzása mérsékeltebb lehet. Talaj tekintetében nem igényes, a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag kerti talajokban fejlődik a legszebben. A pangó vizet nem tűri, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli. A meszes talajokat is jól tolerálja.
Gondozása egyszerű. Metszését kora tavasszal, a rügyfakadás előtt, vagy virágzás után végezhetjük. A virágzás utáni enyhe visszavágás serkenti a sűrűbb elágazódást és a másodvirágzást. Ha a bokor túl öreg vagy elvénült, akár tövig is visszavágható, amire jól újrasarjad. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága jó, hazánkban a legtöbb területen gond nélkül teleltethető, bár keményebb teleken a fiatal hajtások visszafagyhatnak, de tavasszal megbízhatóan újrahajt. Betegségekkel és kártevőkkel szemben általában ellenálló.
Felhasználás a kertben
A Japán orbáncfű rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Kiválóan alkalmas sziklakertekbe, ahol kövek közé ültetve laza, természetes formájával lágyítja a kemény vonalakat. Évelőágyások előterébe ültetve alacsony termetével szegélynövényként funkcionálhat, hosszan tartó virágzásával pedig színt visz az ágyásba. Rézsűkön, lejtőkön, kavicságyásokban is jól mutat, mert a jó vízelvezetésű talajt kedveli. Talajtakarónak is alkalmas, mert sűrűn elágazódva, idővel összefüggő foltokat alkot. Konténerbe, balkonládába ültetve teraszok, erkélyek dísze lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos vagy félárnyékos helyet kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula (Lavandula) és a zsálya (Salvia) lila virágai, amelyek színben is gyönyörűen kiegészítik az aranysárga orbáncfű virágokat. Díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a kék csenkesz (Festuca glauca), ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk. Alacsony termetű talajtakarókkal, mint a varjúháj (Sedum) vagy a kakukkfű (Thymus), kombinálva szárazságtűrő, sziklakereti kompozíciót hozhatunk létre. Sötét lombú növényekkel, például bíborvörös levelű díszcsalánnal (Lamium) vagy sötét tűlevelűekkel, az aranysárga virágok még jobban érvényesülnek.

Japán vérborbolya	**Berberis thunbergii 'Atropurpurea'**	2 950 Ft	2 950 Ft

A Japán vérborbolya (Berberis thunbergii 'Atropurpurea') egy alacsony, kompakt cserje, amely 1-1,5 méter magasra nő. Jellemzője a sötétvörös, lila árnyalatú levelek, amelyek különösen vonzóvá teszik a növényt az őszi hónapokban, amikor a színek felerősödnek. Tavasszal apró, sárga virágai nyílnak, amelyek gazdagítják a növény látványát, és vonzzák a méheket. A Japán vérborbolya jól ellenáll a különböző talaj- és környezeti viszonyoknak, de a legjobban a napsütéses vagy enyhén árnyékos helyeken fejlődik. Alacsony vízigénye miatt rendkívül karbantartásbarát növény, ami miatt népszerű választás kertekben és parkokban.
Gondozási útmutató
A Japán vérborbolya gondozása a következő lépések alapján történhet:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű; a talaj hidratáltságát rendszeresen ellenőrizzük. A túlzott víz elkerülése fontos, mivel a gyökérrothadást okozhat.
Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.
Metszés: A sövény kialakítása érdekében érdemes évente egyszer, tavasszal metszést végezni, hogy serkentsük az új hajtások fejlődését és megőrizzük a növény formáját.
Napsütés: A teljes napsütést preferálja, de a részleges árnyékban is megél.

Ültetési javaslat
A Japán vérborbolya ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legmegfelelőbb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Különösen, ha sövényt szeretnénk kialakítani, gondoskodjunk arról, hogy a növények között megfelelő távolságot hagyjunk.

5b-9b USDA-zóna

Jean May kamélia	**Camellia sasanqua 'Jean May'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Jean May kamélia a Sasanqua fajcsoportba tartozó, népszerű és megbízható fajta, amelyet Ralph May nemesített a floridai Gerbing Camellia Nurseries-ben ismeretlen szülőpárokból. Nevéhez híven („Jean May”) a fajta a téli időszak egyik legszebb virágzójává teszi a kertet.
Külső megjelenés
A Jean May kamélia kompakt, bokros növekedésű, felálló habitusú örökzöld cserje. Kifejlett magassága 2-3 méter, szélessége 2-3 méter között alakul, idősebb korban szélesedő formát ölt. Növekedési erélye közepes, de fiatalon gyorsan fejlődik.
A levelek sötétzöldek, fényesek, elliptikus alakúak, 5 cm hosszúak és 2 cm szélesek. A levélváll kihegyezett, a levél széle sekélyen fűrészes, a levélerek alig kivehetők.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok közepes méretűek, körülbelül 8 cm átmérőjűek, telt vagy rózsaformájúak. Színük kagylórózsaszín (shell pink) vagy arcpiros (blush), a virág közepe felé mélyülő rózsaszín árnyalattal, a szirmok széle felé pedig csaknem fehérre halványodva. A szirmok hosszúkásak, kb. 5 × 2 cm-esek, a külső szirmok szélükön enyhén fogazottak. A virág közepén kevés sárga porzós szál található, amelyek majdnem teljesen elrejtőznek a telt szirmok között. A virágok illatosak, illatuk enyhén édeskés.
Virágzási idő
A Jean May kamélia virágzása ősszel kezdődik és a téli hónapokban is tart, egészen kora tavaszig. A virágzási időszak a termesztési körülményektől függően változhat, de általában októbertől márciusig nyílik. A virágok a hűvös, téli hónapokban is sokáig díszítenek.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyet kedvel. A reggeli napot és a szórt fényt jól viseli, de a déli erős napfénytől és a forró, délutáni naptól védeni kell. A túlzott árnyékban a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5), humuszban gazdag, jó vízáteresztő, laza talajt igényel. A meszes talajokban a növény nem fejlődik megfelelően, a levelei megsárgulnak (klorózis). Ültetés előtt a talajt érdemes tőzeggel, savanyú hatású komposzttal vagy rododendronfölddel javítani.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, egyenletes talajnedvességet kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket gyakrabban kell öntözni. Kerülni kell a pangó vizet és a talaj teljes kiszáradását.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a virágzás után érdemes savanyú hatású, kaméliáknak vagy rododendronoknak való műtrágyával megtámogatni. A túlzott nitrogéntartalmú trágyák károsíthatják a növényt.

Metszés: Virágzás után, kora tavasszal lehet metszeni. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a sűrű, bokros növekedés serkenthető.

Telelés: USDA besorolása 7-10. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhet, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Érzékeny lehet a mézgagombára, fitoftórás gyökérrothadásra, kamélia gubacsra, kamélia levélfoltosságra és a kamélia sárga mozaik vírusra.

Kertstílus, ahová illik

Ázsiai kertekbe (japán, kínai): Nélkülözhetetlen eleme az ázsiai hangulatú kerteknek.

Erdős, természetes hatású kertekbe: Nagyszerűen illik a rododendronok, havasszépek, páfrányok társaságába.

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve a sötétzöld lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós.

Sövénynek: Metszéssel sűrű, örökzöld sövénnyé nevelhető.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténeres teraszokra: Tökéletes választás nagyobb cserépbe, dézsába.

Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Rododendron, havasszépe (Kalmia), sikerpenisz (Leucothoe).

Lombhullató díszcserjék: Japán juhar (Acer palmatum), hortenzia (Hydrangea).

Árnyéktűrő évelők: Páfrányok (Dryopteris), árnyékliliomok (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria).

Kora tavaszi hagymások: Krókusz, hóvirág (Galanthus), gyöngyike (Scilla).

Talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

Eredete és története
A 'Jean May' fajtát Ralph May állította elő a floridai Fernandina Beach-ben található Gerbing Camellia Nurseries-ben ismeretlen származású magoncokból. A fajta nevét valószínűleg a nemesítő családtagja után kapta. Az American Camellia Society (Amerikai Kamélia Társaság) hivatalos adatbázisában is szerepel, és széles körben elismert, kiváló kerti teljesítményű fajta.
USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Júlia borbolya	**Berberis julianae**	3 250 Ft	3 250 Ft

A Júlia borbolya sűrű, örökzöld cserje, amely kitűnően alkalmazkodik a változó körülményekhez. A növény egyéb vonzó tulajdonságai között találhatók az élénk sárga virágok és a kis kék bogyók, amelyek ősztől hosszan díszítik a bokrot.
Gondozás: A Berberis julianae gondozása viszonylag egyszerű, és jól alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz.
1. Fény és hely: Az összességében napos vagy félárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A jó fényviszonyok elősegítik a dús lombozat és a virágzás kialakulását.
2. Talaj: A Júlia borbolya kedveli a jó vízáteresztő képességű, laza talajokat.
3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözést igényel, hogy a gyökerek jól kifejlődjenek. Miután megerősödött, a növény ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg, ha szükséges.
4. Metszés: Az idősebb hajtásokat évente egy alkalommal lehet metszeni a formázás vagy a méret visszafogása érdekében.
5. Táplálás: Tavasszal és nyáron tápanyagdús műtrágyával trágyázza meg a növényt, hogy segítse a növekedést és a virágzást.
6. Betegségek és kártevők: A Júlia borbolya általában ellenálló a legtöbb betegséggel és kártevővel szemben. Azonban rendszeresen ellenőrizze a növényt, hogy időben észrevegye a potenciális problémákat.
A Berberis julianae (Júlia borbolya) egy igazán gyönyörű és strapabíró növény, amely értékes dísze lehet kertjének. A megfelelő gondozással hosszú éveken keresztül örömét lelheti a látványában és az általa nyújtott kellemes környezetben.
6a-9b USDA-zóna

Kaleidoszkóp abélia, tárnicslonc	**Abelia × grandiflora 'Kaleidoscope'**	4 450 Ft	4 830 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Kaleidoscope változat tökéletes választás minden kertész számára, aki alacsony karbantartású, de évszakonként változó színeket keres.
Rövid Termékjellemzők

Magasság és szélesség: 0,5-1,5 méter magas és széles, kompakt habitusú.

Levelek: Tarka levelei évszakonként változnak: tavasszal sárgászöld, nyáron arany, ősszel narancsvörös és vörös árnyalatúak.

Virágok: Apró, fehér vagy halványrózsaszín virágok június-október között, méheket és pillangókat vonzza.

Télállóság: USDA 5-9 zónák (-23°C-ig), de hidegebb területeken téli védelem ajánlott.

Részletes Leírás és Gondozás
Megjelenés és Évszakos Változások

Tavaszi levelek: Élénk sárgászöld középponttal és arany széllel.

Őszi színek: Narancs, vörös és bíbor árnyalatok, melyek a legmelegebb időjárásban sem perzselődnek.

Kéreg: Vörös szárak teszik dekoratívvá télen is.

Ültetési Javaslatok

Hely: Teljes napsütés a legélénkebb színekért, de félárnyékot is tűri.

Talaj: Jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj. Tűri a homokos vagy agyagos talajt is.

Távolság: Ültessen 1-1,5 méter távolságban más növényektől.

Társítás: Kombinálható Spiraea-val, Salvia-val vagy Hosta-kkal a színkontrasztért.

Gondozási Útmutató
Öntözés és Trágyázás

Öntözés: Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön (hetente 1-2 alkalommal). Felnőtt példányok szárazságtűrőek, de hosszú aszályban öntözzön.

Trágyázás: Tavasszal alkalmazzon lassan felszívódó műtrágyát (pl. 10-10-10) vagy komposztot.

Metszés

Időzítés: Virágzás után (őszi végén vagy kora tavasszal).

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Módszer: Távolítsa el az elhalt ágakat, és formázza a növényt. Kerülje a túlzott metszést.

Betegségek és Kártevők

Lisztharmat: Megelőzésre ültessen légáramlásos helyre. Fertőzés esetén szerves gombaölőszerek használata javasolt.

Levéltetvek: Nedvesítse a leveleket szappanos vízzel.

Felhasználási Területek

Díszsövény: Alacsony, formális vagy informális sövényként.

Konténeres ültetés: Erkélyek vagy teraszok díszítésére.

Szoliter vagy tömeges ültetés: Látványos színekért virágágyásokban.

Fontos Megjegyzések

Toxicitás: Nem mérgező háziállatokra vagy emberekre.

Szaporítás: Ágdugványokkal vagy tőosztással.

Téli védelem: Hidegebb régiókban mulcsozzon a gyökérzet körül.

Kanjiro kamélia	**Camellia sasanqua 'Kanjiro'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Kanjiro kamélia a Sasanqua fajcsoportba tartozó, kivételesen mutatós és megbízható fajta, amelyet Japánban nemesítettek 1954-ben ismeretlen szülőpárokból. Ez a népszerű fajta az egyik legélénkebb színű sasanqua kamélia, amely ősszel és télen hozza látványos virágait, amikor a kertben kevés más növény virágzik.
Külső megjelenés
A Kanjiro kamélia sűrű, felálló, enyhén csüngő (majdnem szétterülő) habitusú örökzöld cserje. Kifejlett magassága jellemzően 2,5-3 méter, de egyes források szerint akár 4-8 métert is elérhet, szélessége 1,8-2,5 méter között alakul. Növekedési erélye közepes.
A levelek sötétzöldek, fényesek, bőrszerűek, ovális vagy elliptikus alakúak, 3-5 cm hosszúak, szélük finoman fűrészes. A levélfelület fényes, ami a növényt még a virágzási időszakon kívül is dekoratívvá teszi.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok közepes méretűek, 5-7 cm átmérőjűek, félig telt vagy rózsaformájúak, 12-15 sziromlevéllel. Színük élénk cseresznyepiros, mélyrózsaszín vagy bíborrózsaszín, a szirmok töve felé gyakran halványabb rózsaszín árnyalattal. A virág közepén feltűnő, aranysárga porzók állnak, amelyek gyönyörű kontrasztot alkotnak a rózsaszín szirmokkal. A virágok enyhén illatosak, illatuk kellemes, édeskés. A virágzási időszak ősszel kezdődik és a téli hónapokban is tart; a Smithsonian Gardens adatbázisa szerint október-december a fő virágzási idő, míg más források szerint a virágzás akár februárig is eltarthat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyet kedvel. A reggeli napot és a szórt fényt jól viseli, de a déli erős napfénytől és a forró, délutáni naptól védeni kell. A sasanqua fajták a japán kaméliáknál (Camellia japonica) több napot is elviselnek, de a legszebb virágzást világos, de nem tűző napos helyen hozzák. A túlzott árnyékban a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5), humuszban gazdag, jó vízáteresztő, laza talajt igényel. A meszes talajokban a növény nem fejlődik megfelelően, a levelei megsárgulnak (klorózis). Ültetés előtt a talajt érdemes tőzeggel, savanyú hatású komposzttal vagy rododendronfölddel javítani.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, egyenletes talajnedvességet kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket gyakrabban kell öntözni. Kerülni kell a pangó vizet és a talaj teljes kiszáradását. A növény nem tűri a szárazságot, de a túlöntözés gyökérrothadáshoz vezethet. A legjobb, ha a talaj felső 5-8 cm-e (kb. 3 hüvelyk) kiszárad a következő öntözés előtt.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a virágzás után érdemes savanyú hatású, kaméliáknak vagy rododendronoknak való műtrágyával megtámogatni. A túlzott nitrogéntartalmú trágyák károsíthatják a növényt. A tápanyag-utánpótlást márciusban (a növekedés megindulásakor) és közvetlenül a virágzás után érdemes elvégezni.

Metszés: Virágzás után, kora tavasszal lehet metszeni. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a sűrű, bokros növekedés serkenthető. A metszést a következő évi virágbimbók megjelenése előtt kell elvégezni. Metszés után a növény dúsabban bokrosodik.

Telelés: USDA besorolása 7-10 (egyes források szerint 6b-9). A növény akár -10 °C-ig is ellenáll a hidegnek. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhet, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük, mert a kaméliák érzékenyek a hideg, száraz szelekre. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz, lépcsőház) kell teleltetni. A téli időszakban a fagyott talajban a növény nem tud vizet felvenni, ezért az örökzöld levelei kiszáradhatnak (ún. téli aszály). Ennek megelőzésére vastag mulcsréteg (5-10 cm) alkalmazása javasolt.

Kártevők, betegségek: Érzékeny lehet a mézgagombára, fitoftórás gyökérrothadásra, kamélia gubacsra, kamélia levélfoltosságra és a kamélia sárga mozaik vírusra. A virágokat a kamélia sziromrothadás is érintheti.

Kertstílus, ahová illik

Ázsiai kertekbe (japán, kínai): Nélkülözhetetlen eleme az ázsiai hangulatú kerteknek, különösen mivel a sasanqua kaméliák Japán part menti erdeiben őshonosak.

Erdős, természetes hatású kertekbe: Nagyszerűen illik a rododendronok, havasszépek, páfrányok társaságába, különösen nagy, öreg árnyékot adó fák alá.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve a sötétzöld lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós.

Konténeres teraszokra: Tökéletes választás nagyobb cserépbe, dézsába.

Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Rododendron, havasszépe (Kalmia), sikerpenisz (Leucothoe), törpe tűlevelűek (pl. boróka, tuja).

Lombhullató díszcserjék: Japán juhar (Acer palmatum), hortenzia (Hydrangea), árnyliliom (Hosta), harangláb (Heuchera).

Árnyéktűrő évelők: Páfrányok (Dryopteris, Polystichum), tüdőfű (Pulmonaria), japán erdeifű (Hakonechloa macra).

Kora tavaszi hagymások: Krókusz, hóvirág (Galanthus), gyöngyike (Scilla).

Talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

Eredete és története
A 'Kanjiro' kamélia Japánban keletkezett 1954-ben, ismeretlen szülőpárokból. A sasanqua kaméliák a dél-japán part menti erdőkben őshonosak, ahol a fák alatti cserjeszintben nőnek. A holland kereskedők 1869-ben hozták be a fajt Európába. A 'sasanqua' fajták népszerűek a kertészetben, mert korábban (ősszel) virágoznak, mint a japán kamélia (Camellia japonica), és jobban tűrik a naposabb fekvésű helyeket. A japánok a sasanqua kamélia leveleiből teát készítenek, a magjaiból pedig teaolajat (tsubaki oil) préselnek, amelyet főzéshez, kozmetikumokhoz és kenőanyagként használnak. A növény nem mérgező macskákra és kutyákra.
USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Karcsú oszlopos közönséges boróka	**Juniperus communis 'Sentinel'**	4 450 Ft	4 750 Ft

A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napos sziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna

Kerek levelű japán fagyal	**Ligustrum japonicum 'Rotundifolium'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A kerek levelű japán fagyal a japán fagyal (Ligustrum japonicum) egyik legkedveltebb, kompakt, törpe változata. Ez a kiválóan várostűrő örökzöld cserje azoknak a kertészeknek ajánlott, akik egy alacsony növekedésű, sűrű, fénylő levelű növényt keresnek formális kertekbe, szegélyekbe vagy akár konténerbe. A 'Rotundifolium' név a latin "rotundus" (kerek) szóból ered, utalva a növény feltűnően kerekded, rövid leveleire.
Külső megjelenés
A kerek levelű japán fagyal lassú növekedésű, sűrű, zárt koronájú cserje. Kifejlett magassága általában 1-1,5 méter, szélessége hasonló mértékben gömbölyded vagy széles bokorrá áll össze, bár kedvező körülmények között idővel akár a 2 métert is elérheti. A fiatal hajtások zöldek vagy barnászöldek, vékonyak, de erőteljesek.
A növény legnagyobb dísze a fényes, bőrszerű, sötétzöld levelek. A levelek feltűnően kerekdedek vagy széles tojásdadok, 2-5 cm hosszúak, a hagyományos japán fagyal levelénél jóval rövidebbek és szélesebbek, szélük ép, finoman visszahajló. A levél felülete annyira fényes és tömör, mintha viasszal vonták volna be, ami textúrájában a babérmeggyhez hasonlít. A levelek átellenes állásúak, sűrűn borítják a hajtásokat, ami a növényt rendkívül tömötté, szinte "párnás" megjelenésűvé teszi.
Nyár elején, június-július hónapokban a lombozat közé apró, fehér, illatos, bugás virágzatok bukkannak elő. A virágok hasonlítanak a közönséges fagyal virágaihoz, intenzív, édeskés illatuk van, amely vonzza a méheket és más rovarokat. A virágzást követően ősszel a növény apró (6-8 mm átmérőjű), gömbölyded, fényes fekete vagy kékesfekete bogyókat (csonthéjas terméseket) fejleszt. Ezek a bogyók a madarak kedvelt táplálékai, de az ember számára mérgezőek.
Igényei és gondozási útmutató
A Ligustrum japonicum 'Rotundifolium' rendkívül alkalmazkodóképes, ami a nemzetség egyik legismertebb tulajdonsága. A hagyományos fagyalnál (L. vulgare) azonban egy fokkal érzékenyebb a téli hidegre és a pangó vízre.

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napos fekvésben a legsűrűbb a lombozat és a legszebb a levelek fényessége. Félárnyékban is szépen fejlődik, bár a lombozat lazább lehet.

Talaj: Nem túl válogatós, de a legjobban a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tűri, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli. Ültetés előtt a talajt érdemes komposzttal lazítani.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már jobban tűrik a szárazságot, de a legdúsabb lombozatot egyenletes talajnedvesség mellett hozzák.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával (pl. szarvforgács) megtámogatni. A túlzott nitrogén műtrágyázást kerülni kell.

Metszés: Kiválóan tűri a metszést és a nyírást. Formázó metszést késő télen vagy kora tavasszal (március-április) lehet végezni. Alacsony sövényként vagy topiáris formák (pl. gömb) kialakítására is alkalmas. Metszés nélkül is szép, természetes formát tart.

Telelés és fagytűrés: A Ligustrum japonicum alapfajhoz képest a 'Rotundifolium' egy fokkal érzékenyebb a téli fagyokra. Magyarországon a legtöbb régióban (az ország nagy részén 5b-6b zónában) a növény télállónak számít, ha védett, szélvédett helyre ültetjük. A nagyon hideg, szélsőségesen zord, jeges szeleknek kitett területeken (pl. északkeleti alföld) a hajtások visszafagyhatnak. Ilyen helyekre konténerben javasolt, ahol teleltethető. Fiatal növényeket az első teleken vastag lombtakaróval érdemes védeni.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló. Levéltetvek néha megjelenhetnek rajta, de komolyabb problémát nem okoznak. A pangó vizes talajban gyökérrothadás előfordulhat.

Kertstílus, ahová illik
A kerek levelű japán fagyal az örökzöld, strukturált kertek kedvelt eleme:

Formális kertekbe (francia, olasz): Metszéssel tartható geometrikus formában (gömb, kocka, alacsony sövény). Sűrű, zöld falat képezhet.

Angol- és japánkertekbe: Természetes formájában is elegáns, sötétzöld fényessége szép háttér.

Városi udvarokba, előkertekbe: Jól bírja a szennyezett levegőt, alacsony növekedésével nem nő ki a térből.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szoliter növényként: A sötétzöld, fényes lombozatú, kerek bokor a gyep közepén egy különleges hangsúlyt ad. Alacsony sövénynek, szegélynek: Kiválóan alkalmas ösvények, teraszok, ágyások szegélyezésére. Konténeres teraszokra: Lassú növekedése és tömött formája ideálissá teszi dézsás, cserepes nevelésre is (pl. bejárati ajtó két oldalára). Változatos növénytársítások A kerek levelű japán fagyal sötétzöld, fényes lombozata kiváló háttér más növények számára, vagy kontrasztos elemként is használható: Lila és arany levelű növények: A vörös díjszilva, az aranyszínű borbolya (pl. Berberis thunbergii 'Aurea') vagy az arany puszpáng gyönyörűen világít a sötétzöld fagyal mellett. Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz, perovszkia – a ezüstös szürke erősíti a fagyal sötétségét. Kék, lila virágú évelők és cserjék: A levendula, macskamenta, kék hortenzia (Hydrangea macrophylla) szép társak lehetnek. Alacsony talajtakarók: A növény tövében a pachysandra, árnyéki meténg vagy borostyán adhat zárást. Hasonló igényű örökzöldek: Puszpáng, magyal, kislevelű babérmeggy – ezekkel vegyes örökzöld csoportot, vagy sövényt lehet kialakítani. Páfrányok és árnyéki évelők: Félárnyékos helyen a növény tövébe a tüdőfű, árnyékliliom szépen mutat. USDA besorolása: 7-10 (Az USDA zóna besorolása alapján a növény a 7-es zónától (Krím, Dél-Magyarország védett részei) nevelhető biztonságosan szabadban. A kontinentális éghajlatú, 5b-6b zónákban (az ország nagyobb részén) a növény szabadföldi teleltetése kockázatos; fiatalon, vagy extrém hideg teleken károsodhat. Ilyen területeken konténerben, téli védelemmel vagy fagymentes helyen teleltetve tartható.)			
Kereklevelű örökzöld babérmeggy	**Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kereklevelű örökzöld babérmeggy (Prunus laurocerasus 'Rotundifolia') – Az erőteljes, örökzöld sövénynövény
A kereklevelű örökzöld babérmeggy a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó, Délkelet-Európából, a Balkánról és a Kaukázusból származó, örökzöld cserje. A 'Rotundifolia' fajtajelzés a levelek lekerekítettebb, szélesebb formájára utal, innen ered a magyar név is. Ez a növény sűrű, örökzöld lombozatával, gyors növekedésével és sokoldalúságával az egyik legkedveltebb sövénynövény a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, kiváló árnyéktűrése és a városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A kereklevelű örökzöld babérmeggy egy erőteljes növekedésű, sűrűn elágazó, örökzöld cserje. Kifejlett magassága 4-8 méter, szélessége 2,5-4 méter között alakul. Koronája széles tojásdad, sűrű, idős korban a növény szétterülőbbé válhat. Növekedési erélye erőteljes, évi 30-60 cm-es gyarapodással, és a végleges méret eléréséhez 5-10 év szükséges. A fiatal hajtások sárgászöldek, a kéreg barna vagy szürkés.
A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek elliptikusak vagy visszás-tojásdadok, 12-17 cm hosszúak és 6-8 cm szélesek, bőrszerűek, sötétzöldek, enyhén fényes felületűek, szélük finoman fűrészes. A levelek a tápanyagszegény vagy meszes talajokon világosabb zöld színűvé válhatnak. A lombozat egész évben a növényen marad, ami a növényt télen is dekoratívvá teszi.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a levélhónaljakban kialakuló, 5-15 cm hosszú, felálló fürtökben helyezkednek el. A virágok aprók, fehérek, csésze alakúak, kellemes, édes illatúak. A virágzási időszak a tavasz közepén van: Magyarországon jellemzően májusban, de néha késő nyáron egy második, kevésbé bőséges virágzás is előfordulhat. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, cseresznyeszerű terméseket fejleszt, amelyek eleinte pirosak, majd éréskor feketére színeződnek. A termések a madarak számára táplálékot nyújtanak. Fontos tudni: a növény minden része mérgező, különösen a magvak, ezért a növényt gyermekek és háziállatok közelében fokozott körültekintéssel ültessük. A növény félfás dugványozással szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kereklevelű örökzöld babérmeggy napos vagy félárnyékos, de árnyékos fekvést is jól tűri. A mély árnyékot is tolerálja, ami más örökzöld cserjéknél ritka. A téli napégés és a kiszárító szelek ellen védett helyet érdemes választani.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó, termékeny, semleges vagy enyhén lúgos talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli. A meszes talajokon a levelek sárgulhatnak.

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőek, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy adag lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágyát, vagy egy réteg (3-5 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva. A tápanyaghiányos talajon a levelek világosabb zöld színűvé válhatnak.

Metszés és ápolás: A kereklevelű örökzöld babérmeggy metszése fontos a sűrű habitus és a kívánt forma fenntartása érdekében, különösen sövényként történő nevelés esetén. A metszést késő tavasszal vagy kora nyáron (június-július) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Sövénymetszés: Sövényként ültetve a növényt évente 1-2 alkalommal nyírjuk vissza a kívánt magasságra és formára.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növényeket erőteljesen is visszavághatjuk tavasszal, hogy serkentsük az új, fiatal hajtások képződését. A régi fás részekből a növény kihajt, ami a babérlevelű cserjésmeggy egyik előnye.

Telelés és fagytűrés: A kereklevelű örökzöld babérmeggy mérsékelten télálló; rövid ideig elviseli a -15°C-ig terjedő hőmérsékletet is. Magyarország nagy részén (USDA 6-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a fiatal példányok tövét télen mulccsal takarni. Hideg, szeles teleken visszafagyhat, de tavasszal rendszerint újra kihajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A kereklevelű örökzöld babérmeggy a sűrű, örökzöld lombozatának, gyors növekedésének, árnyéktűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb sövénynövény a kertekben és parkokban:

Sövényként, védősövényként – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt kiváló választás örökzöld, térelválasztó sövények kialakítására.

Szoliter növényként – a sűrű habitus és a szép lombozat miatt kiváló magányos díszelem.

Városi kertekbe, tengerparti kertekbe – jól tűri a városi környezetet, a kipufogógázokat és a sós permetet.

Erdőszéli kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok és bogyók vonzzák a madarakat és a beporzó rovarokat.

Konténerekbe, dézsákba – kiválóan nevelhető konténerben is, különösen a kisebb kertekben vagy teraszokon.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kereklevelű örökzöld babérmeggy sötétzöld lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Virágos cserjékkel és évelőkkel: Hortenziával, rododendronnal, páfrányokkal – a sötétzöld háttér kiemeli a virágok élénk színét.

Más örökzöldekkel: Tűlevelűekkel, babérmeggy más fajtáival – a különböző színű és habitusú örökzöldek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

Lila virágú évelőkkel: Levendulával, macskamentával – a lila és a sötétzöld szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral – a babérlevelű cserjésmeggy sötétzöldje kiemeli az őszi lombszín élénk árnyalatait.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a kereklevelű örökzöld babérmeggy mérsékelten télálló; az USDA 7-es, 8-as és 9-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) védett, szélvédett helyen, takarással nevelhető. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -15°C-ig terjedő hőmérsékletet is, de a tartós fagyok károsíthatják.)

Kerti madárbirs	Cotoneaster horizontalis	3 450 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A kerti madárbirs egy alacsony, elterülő növekedésű lombhullató cserje, amelyet apró, fényes zöld leveleiről, halványpiros vagy fehér virágairól és feltűnő, télire piros bogyóiról ismerhetünk fel. Magassága általában 0.5-1 méter között van, szélessége azonban akár 3 métert is elérheti. Apró, elliptikus vagy kerekded, fényes zöld levelei ősszel élénk vörös és bordó árnyalatokba öltöznek. Május-júniusban nyílik számtalan apró, halványpiros vagy fehér virága, melyeket a nyár végén élénkpiros, 5-6 mm átmérőjű bogyók követnek. Ezek a madarak számára értékes táplálékot jelentenek, és gyakran a tél végéig a cserjén maradnak

.

Gondozási útmutató

A kerti madárbirs egy igénytelen és könnyen nevelhető növény.

Fényigény: A napos és a félárnyékos helyeket egyaránt kedveli. A napos helyeken fog a leggazdagabban virágozni és érni a termése.

Talajigény: Nagyon igénytelen a talajjal szemben. A jól vízelvezető laza, közepesen nedves talajt részesíti előnyben, de elviseli a száraz, szegényes talajt is

Vízigény: Közepes vízigényű. Miután jól meggyökeresedett, szárazsággal szemben tűrőképes

Metszés: Alig igényel metszést. Ha szükséges, formáját a virágzás után, nyáron lehet karbantartani

Télállóság: Jó télállóságú, az 5-7-es USDA zónákban (kb. -23°C-ig) biztonsággal tartható.

Ültetési javaslat

Ez a cserje rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Talajtakaróként: Kiváló választás rézsűk és lejtők beültetésére, ahol talajeróziót is gátol

Sziklakertbe: Alacsony növekedése és dekoratív megjelenése miatt ideális választás

Falak, kerítések mellé: A jellegzetes "halcsont" ágazata különösen jól mutat, ha falakra vagy kerítésekre kúszik

Erdei kert peremébe: Természetes hatású kertrészekbe kiválóan illeszkedik

Ajánlott kerttípusok

A Cotoneaster horizontalis jól illeszkedik az alábbi kerttípusokba:

Sziklakertek

Természetes hangulatú kertek

Alacsony karbantartású kertek

Városi kertek 6a-8b USDA-zóna

Kerti mahónia	**Mahonia aquifolium**	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Mahonia aquifolium (Kerti mahónia) Alaszka déli partvidékétől Kalifornia északi részéig fordul elő a természetben, de a leggyakrabban Oregon államban találkozhatunk vele. Hivatalosan is Oregon állam növénye, még az állam címerében is láthatjuk! Embermagasságúra is megnövő örökzöld cserje, szárnyasan összetett, kissé fogazott szélű, fénylő sötétzöld, télre kissé bepirosodó levelekkel. Aranysárga virágai áprilisban tömött fürtökben nyílnak, még szebbé varázsolva ezzel a növényt. Kedvelt vágózöld.
Gondozási útmutató:

Helyzet: Félárnyékos vagy napos helyen fejlődik optimálisan.

Talaj: Vízáteresztő, humuszban gazdag, kissé savas talajt részesíti előnyben.

Öntözés: Fiatalon rendszeresen öntözzük, később már jól tűri a szárazságot.

Metszés: Virágzás után nyár elején visszametszhető, forma megtartásához.

Tápanyagellátás: Tavasszal lassan felszabaduló műtrágyával támogatható.

Téli védelem: Felnőtt példányok teljesen télállók, fiatalokat téli takarással védjük.

6b-9b USDA-zóna

Keskenylevelű portugál babérmeggy	Prunus lusitanica 'Angustifolia'	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A keskeny levelű portugál babérmeggy a klasszikus portugál babérmeggy elegáns, finomabb megjelenésű változata, amely keskenyebb leveleivel és természetes sűrűségével tűnik ki. Kifejlett magassága 3-5 méter, szélessége 2-3 méter, így kisebb termetű fák mellett, magas sövényként vagy szoliterként is megállja a helyét.
Külső megjelenés A növény legjellemzőbb tulajdonsága a keskeny, lándzsás, 5-8 cm hosszú, fényes sötétzöld levelek, amelyek feltűnő vöröses-bordó levélnyélen ülnek – ez az egész évben megfigyelhető dekoratív részlet. A fiatal hajtások világoszöldek, majd besötétednek. Tavasz végén (május-június) apró, fehér, illatos virágokból álló, felálló, 10-15 cm hosszú fürtök nyílnak. A virágokat követő sötétlila, bogyószerű termések ősszel érnek be, és vonzzák a madarakat. A kéreg sötétszürke, idősen finoman repedezett.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet részesít előnyben; a tűző napot is jól tűri, de a mély árnyékban ritkul a lombozata.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag, meszes vagy semleges kémhatású (pH 6,5-8,0). Savanyú talajba ültetés előtt meszezni szükséges.

Öntözés: fiatalon és száraz időszakokban rendszeres öntözést igényel. A pangó vizet nem tűri, de a teljes kiszáradástól is óvni kell.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, meszes hatású műtrágyával. Ősszel káliummal dúsított tápanyag segíti a téli ellenállóságot.

Metszés: jól tűri a metszést és a nyírást. Formázó metszést késő télen vagy tavasszal, sövénynyírást évente 1-2 alkalommal (nyár elején és/vagy késő nyáron) végezz.

Telelés: teljesen télálló, de a fiatal növényeket erős, szélsőséges fagyok esetén takarni érdemes.

Kertstílus, ahová illik Formális kert, franciakertek (parterre), angol vidéki kertek, mediterrán kert, japánkert, hangulatos udvarok, magas sövények, szélfogó sövények, alárendelt struktúraelem nagyobb fák mellett.
Változatos növénytársítások

Fehér, kék vagy lila virágú évelők: levendula (francia vagy angol), kakukkfű, macskamenta, perovszkia.

Ezüstös vagy szürke levelű növények: üröm, selyemkörte, törpe ezüstfű, sziklaőr.

Alacsony örökzöldek: puszpáng, törpe boróka, kúszó fanyarka, tűztövis.

Rózsák: nemes rózsák (fehér, krém vagy halványrózsaszín színben), futórózsák.

Tavaszi hagymások: krókusz, gyöngyike, törpe nárcisz, jácint.

Árnyéktűrő talajtakarók (a tövénél): borostyán, árnyéki meténg, pachysandra.

Díszfüvek: törpe tollbuga, kék csenkesz. 7b-9b USDA-zóna

Kilimanjaro redős levelű bangita	Viburnum plicatum 'Kilimanjaro'	3 450 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Késő tavasszal és kora nyáron a fát fehér, csipkés alakú virágok borítják, amelyek a párhuzamosan egymás fölött futó ágakon jelennek meg, érdekes vízszintes tagoltságot adva a növénynek. Ezek a virágok rózsaszín-piros nyári bogyóknak adják át a helyüket, amelyek ősszel feketévé válnak, lakomát nyújtva a madaraknak. A mélyen erezett levelek ősszel vörös-lilára változnak. A 'Kilimanjaro' felegyenesedő, fához hasonló növekedést mutat, mint a legtöbb Viburnum. Ideális kis kertekbe, és 2015-ben elnyerte az RHS Chelsea Flower Show „Az év növénye” díjat.
A Viburnum plicatum 'Kilimanjaro' a legtöbb talajtípusban jól érzi magát, de a legjobban a mérsékelten termékeny, humuszban gazdag, jó vízelvezetésű talajban fejlődik. Könnyen termeszthető, és teljes napsütésben vagy részleges árnyékban is jól fejlődik. (A termés lenyelés esetén enyhe gyomorpanaszokat okozhat.)
Ez a növény kevés metszést igényel. A kibújó függőleges hajtásokat nyáron, virágzás után vissza lehet vágni a kiindulási pontjukig, a sérült vagy elhalt ágakat pedig virágzás után vissza lehet vágni az egészséges rügyig.
Rendszeresen öntözze a növényt a vegetációs időszakban, amíg teljesen meg nem erősödnek. Tavasszal vigyen fel jól komposztálódott trágyát vagy kerti komposztot a növény tövére. Öntözze a , és mulccsal takarja le a talajt, hogy megakadályozza a kiszáradását.
USDA zóna: 5b
A redős levelű bangita eredetéről:
A Viburnum egy körülbelül 150 lombhullató, örökzöld és félig örökzöld cserje- és néhány fafajból álló nemzetség, amely főként az északi mérsékelt égövi régiókból származik, Délkelet-Ázsiába és Dél-Amerikába nyúlva. Vonzó virágaik, színes termésük és vonzó lombozatuk miatt termesztik őket. Egyes fajoknak ehető termése vagy illatos virága van. Nagyon vonzó, sokoldalú kerti növények.
A Viburnum plicatum egy sűrű ágrendszerű lombhullató cserje, amely jellemzően 2-4,5 méter magasra nő meg. Ovális, fogazott, erősen erezett, sötétzöld levelei (akár 10 cm hosszúak is) felső felületük redőzött. A levelek ősszel bordóvöröstől lilásvörösig változnak. Ennek a cserjének két különböző formája kapható általában a kereskedelemben: Viburnum plicatum f. plicatum, amely vátozat steril, hógolyószerű, gömb alakú virágzatokat (5-8 cm átmérőjű fürtök) és illattalan, mutatós fehér virágokat hoz tavasszal az ágak mentén, utólagos termés nélkül. Valamint a Viburnum plicatum f. tomentosum, a vadon élő rokon taxon, amely termékeny, lapos tetejű virágfürtöket (5-10 cm átmérőjű fürtök) mutat, amelyek a lépcsőzetes vízszintes ágak mentén, dupla szálú formában virágoznak, minden fürt külső gyűrűjében nagy, mutatós, steril virágok veszik körül, a középső apró, nem mutatós, termékeny virágokat, amelyek megtermékenyítéskor tojás alakú gyümölcsöket és életképes magot hoznak. A f. plicatum virágzási ideje általában körülbelül két héttel később következik be, mint az f. tomentosumé. A f. plicatum kifejlett magassága Akár 4,5 méter magasra is megnőhet, de az f. tomentosum kifejlett magassága jellemzően nem haladja meg a 3 métert. A virágszerkezet, a virágzási idő, a magasság és az elágazási habitus kivételével mindkét forma nagyon hasonló, és a kereskedelemben számos különböző fajtanév alatt forgalmazzák.

Kínai fagyal	Ligustrum sinense	2 950 Ft	3 350 Ft

A Kínai fagyal, más néven Kislevelű fagyal, rendkívül alkalmazkodóképes, gyors növekedésű cserje, amely sűrű lombjával és bőséges virágzatával hódít a kertekben. Kifejlett állapotban 2-4 méter magasra növő, lombhullató vagy enyhe teleken félörökzöld cserje, amely idővel széles, tömött bokrot alkot. Megjelenésében finomabb, elegánsabb a hazai fagyalnál. Fiatal hajtásait apró, sárgás szőrök borítják, ami jellegzetes, enyhén molyhos tapintást kölcsönöz a növénynek. Levelei kicsik, 2-5 cm hosszúak, tojásdadok vagy lándzsásak, élénkzöld színűek, átellenesen helyezkednek el a vékony ágakon. Május-június folyamán a hajtások végén laza, 5-10 cm hosszú bugákban nyílnak az apró, fehér virágok. Virágzata kisebb, mint a közönséges fagyalé, de annál bőségesebb és illatosabb. A virágokat követően ősszel apró, gömbölyded, kékes-fekete termések fejlődnek, amelyek a madarak kedvelt táplálékai.
Igényei és gondozása
A Kínai fagyal rendkívül alkalmazkodóképes és hálás növény, ami a kezdő kertészek kedvence lehet. Napos vagy félárnyékos fekvésben egyaránt jól fejlődik, de a legszebb virágzást napos helyen hozza. Talaj tekintetében nem válogatós: a jó vízelvezetésű, akár szárazabb, meszes vagy enyhén savanyú talajokon is kiválóan érzi magát. A pangó vizet nem kedveli, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli.
Gondozása egyszerű, metszéssel jól formálható. Sövényként, alacsony cserjefalként kiválóan használható, mert a visszavágást jól tűri, és sűrűn elágazódik. Metszését kora tavasszal, a rügyfakadás előtt, vagy virágzás után végezzük. A városi környezetet, légszennyezést is jól tolerálja, így forgalmas utak mellé is ültethető.
Felhasználás a kertben
Sokoldalú megjelenésének és strapabíró természetének köszönhetően a Kínai fagyal a kert számos pontján megállja a helyét. Kiválóan alkalmas sövénynek, akár nyírt, akár szabadon növekvő formában. Védőcserjefalként is funkcionálhat, mert sűrű ágrendszerével jó takarást nyújt. Városi kertekbe, forgalmas utak mellé, ipari területek környékére is ideális választás a jó légszennyezés-tűrése miatt. Magányosan állva is mutatós, különösen virágzáskor. Hátsó sorokba ültetve remek háttérnövény, amely struktúrát ad az ágyásoknak.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes kihasználni a sűrű, zöld lombozat kontraszteremtő képességét. Kiváló partnerei lehetnek a díszfüvek, mint a kínai ezüstfű vagy a tollborzfű, amelyek lágyítják a cserje merevebb vonalait. Örökzöld tujákkal, borókákkal kombinálva télen-nyáron átívelő, struktúrált kompozíciót hozhatunk létre. Virágos évelőkkel, például levendulával, zsályával vagy harangvirágokkal ültetve színes, vonzó ágyásokat alakíthatunk ki. Alacsony termetű talajtakarók, mint a kis meténg, takarják a cserje tövét.

Kínai magyal	Ilex pernyi	5 450 Ft	6 790 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kínai magyal egy közepes termetű, sűrűn ágas örökzöld cserje, amely 3-4 méter magasra és 2-3 méter szélesre nő. Levelei jellegzetes rombusz alakúak, bőrszerűek, fényes sötétzöld színűek, és mindkét végükön éles tüskével rendelkeznek. A levelek kicsik, 2-4 cm hosszúak, és spirálisan helyezkednek el az ágakon. A növény kétlaki, ami azt jelenti, hogy a hím és női virágok külön egyedeken találhatók. A női példányok hím pollenző jelenlétében hozzák bő termésű, élénkpiros bogyóit, amelyek ősszel érnek és télen is a növényen maradnak.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, savanyú vagy semleges kémhatású talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, jól tűri a szárazságot

Metszés: Jól formázható, tavasszal ajánlott metszeni

Télállóság: Kiváló télállóságú, -25°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal örökzöld trágyával

Ültetési javaslat

Sűrű sövényként kiváló választás

Szoliter növényként díszes megjelenésű

Társítás: Más örökzöldekkel, rododendronokkal

Alakítható cserjeként is alkalmazható

Madárbarát kertekbe ideális

Ajánlott kerttípusok

Formális kertek

Városi kertek

Sövényes kertek

Madárbarát kertek

Télálló kertek

Kínai rojtosvirág	Loropetalum chinense	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A kínai rojtosvirág, Dél-Kínából, Japánból, Tajvanról, Thaiföldről és Vietnámból származó örökzöld cserje. Magyarországon a legismertebb díszváltozata a vörös levelű rojtosvirág (Loropetalum chinense var. rubrum), de a fehér virágú, zöld levelű alapfaj is számos vonzó tulajdonsággal bír.
A kínai rojtosvirág a Kárpát-medence éghajlatán mérsékelten télálló. Hideg, védtelen fekvésben a fiatal hajtások visszafagyhatnak, de a gyökérzet és az idősebb fa általában áttelel. Enyhe mikroklímájú, védett helyekre, városi kertekbe ajánlott. A metszést követően az új hajtások megjelenhetnek a tőből is, ha a fagy teljesen elpusztította volna a föld feletti részt.
Külső megjelenés
A növény sűrűn elágazó, bokros habitusú, kifejlett magassága 2-5 méter, szélessége 1,5-3 méter között mozog, de kedvező körülmények között akár a 8 méteres magasságot is elérheti . A fiatal hajtásokat és a levelek fonákját finom, csillagszőrök borítják, ami érdes tapintást kölcsönöz a növénynek .
A levelek kicsik, 2-5 cm hosszúak, 1,5-2,5 cm szélesek, tojásdad vagy ovális alakúak, bőrszerűek. Felszínük sötétzöld, a fonákjuk a szőrözöttség miatt szürkésbarna, gyakran látványos kontrasztot adva. A levél széle ép (nem fűrészes), csúcsa kihegyezett, alapja egyenetlen (ferde) .
A növény legnagyobb dísze a kora tavaszi, feltűnő virágzás. Március-április hónapokban, néha még a levelek kihajtása előtt vagy azzal egy időben nyílnak a 3-8 darabos csoportokba rendeződő virágok. Minden egyes virág négy keskeny, szalagszerű, fehér szirommal rendelkezik, amelyek 1-2 cm hosszúak, vékonyak, és a távolból nézve olyanok, mintha apró hópehely-csomók tapadnának az ágakhoz . A virágok enyhén illatosak, vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat. A virágzást követően apró, gömbölyded, 7-8 mm hosszú, barna szőrös toktermések fejlődnek, amelyekben a fényes, fekete magvak találhatók .
Felhasználás a kertben
. Ez a változat a kisebb kertekbe, városi udvarokba is ideális.

Ázsiai stílusú (kínai, japán) kertekbe nélkülözhetetlen alapnövény.

Természetes hatású kertekben, erdős szegélyekben.

Metszéssel alacsony sövényként vagy formára vágva (pl. gömb alakúra).

Konténeres, dézsás növényként teraszokra, bejáratok mellé.

Szoliterként (magányos faként) a gyep közepén.

Illat
A virágok enyhén illatosak, kellemes, édeskés illatot árasztanak. Az illat nem tolakodó, de közelről érezhető, és vonzza a rovarokat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legsűrűbb a lombozat, és a legbőségesebb a virágzás. Félárnyékban is szépen fejlődik, de a virágzás gyengébb lehet. A vörös levelű változatoknak a színük intenzitásához elengedhetetlen a napos fekvés.

Talaj: A talaj iránt nem túl válogatós, de van egy fontos megkötése: a meszes talajokat nem kedveli. A legjobban az enyhén savanyú (pH 5,5-6,5) kémhatású, jó vízáteresztő képességű, humuszban gazdag talajban érzi magát. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már viszonylag szárazságtűrők, de a hosszan tartó aszályos időszakokban a dekoratív lombozat érdekében érdemes őket megöntözni.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, savanyú talajhoz ajánlott műtrágyával (pl. rododendron- vagy havasszépetrágya) megtámogatni.

Metszés: Jól tűri a metszést. A legjobb időpont a metszésre a virágzás után, késő tavasszal vagy kora nyáron. Ilyenkor lehet a növényt formázni, ritkítani, illetve eltávolítani a sérült vagy elfagyott hajtásokat. Metszéssel sűrű, bozontosabb növekedésre serkenthető.

Telelés és fagytűrés: A kínai csodafűz mérsékelten télálló. A kifejlett, begyökeresedett növények -10°C és -15°C közötti rövid idejű fagyokat elviselhetnek. A

hosszan tartó, -15°C alatti fagyokban a hajtások visszafagyhatnak. Ezért a növényt védett, szélvédett fekvésbe (pl. déli oldal, házfal mellett) érdemes ültetni. Fiatal korában, valamint zordabb teleken a tövek tövét vastagon (20-30 cm) érdemes lombbal vagy szalmával takarni. Konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, de hűvös helyen kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de időnként levéltetvek, pajzstetvek jelenhetnek meg rajta. A pangó vizes talajban gyökérrothadás is előfordulhat.

Kertstílus, ahová illik
A kínai rojtosvirág különösen jól illeszkedik:

Ázsiai (kínai, japán) kertekbe: A levelei textúrája, a tavaszi fehér virágok és a szabálytalan, természetes habitus miatt.

Természetes, vadvirágos kertekbe: Ahol a tavaszi hagymások, páfrányok és más erdei évelők társaságában érzi jól magát.

Erdős szegélybe: Tökéletes választás fák alá, ahol szórt, laza árnyékot kap.

Hangulatos előkertekbe: A bejárat két oldalára ültetve, vagy szoliterként.

Változatos növénytársítások
A sötétzöld lombozata és tavaszi fehér virágai kiválóan kombinálhatók más, hasonló igényű növényekkel :

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Különböző rododendron- (Rhododendron), havasszépe- (Kalmia) és sikerpenisz- (Leucothoe) fajok.

Árnyéktűrő évelők és talajtakarók: Páfrányok (Dryopteris), különböző színű levelű árnyékliliomok (Hosta), tarka levelű tüdőfű (Pulmonaria), gyöngyvirág (Convallaria majalis), meténg (Vinca minor).

Kora tavaszi hagymások: A fa még lombtalan, amikor a krókuszok (Crocus), a törpe nárciszok (Narcissus) és a gyöngyike (Scilla) virágoznak.

Díszfüvek: Tollbuga (Molinia), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), japán erdeifű (Hakonechloa macra).

Vörös levelű csodafűz (L. chinense var. rubrum) : Az alapfaj mellé ültetve a zöld és a bordópiros lombozat gyönyörű kontrasztot alkothat .

USDA besorolása: 8-10 (Magyarországon, a 6-7-es zónákban a növény mérsékelten télálló; szabadföldi nevelése kockázatos, biztonságosan konténerben, teleltethető formában nevelhető).
8a-10a USDA-zóna

Kínai szarvas magyal	Ilex cornuta	5 950 Ft	6 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A kínai szarvas magyal egy tömör, sűrűn ágas örökzöld cserje, amely 2-3 méter magasra nő, az európai magyalnál szerényesebb mérettel. Levelei kicsik, örökzöldek, a fajra jellemző egyedi alakúak - mintha hiányoznának a levelek csúcsai, és két-két szarvacskába végződnének. Lombja rendkívül sűrű és tömött, kemény, szúrós fogású, amit a kártevők szívesen kerülnek. A növény öntermékeny, így egyedül is hoz termést. Bogyói élénkpirosak, télre a bokor egészét lepik el, és sokáig a növényen maradnak, jelentős téli díszértéket biztosítva.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető talajt igényel, de száraz helyeken is képes szép maradni

Vízigény: Alacsony vízigényű, kiváló szárazságtűrő

Metszés: Jól formázható, tavasszal ajánlott metszeni

Télállóság: Kifejezetten kemény növény, jó télállóságú

Általános tulajdonságok: Ellenállóbb az európai magyalnál, betegségekre és kártevőkre kevésbé fogékony

Ültetési javaslat

Alacsony áthatolhatatlan örökzöld sövény kialakítására kiváló

Szoliter növényként díszes megjelenésű

Társítás: Más örökzöldekkel, mediterrán növényekkel

Formára nyírt cserjeként is alkalmazható

Madárbarát kertekbe ideális a bogyói miatt

Ajánlott kerttípusok

Kis kertek

Városi kertek

Alacsony sövényes kertek

Mediterrán kertek

Igénytelen kertrészek

Kökény	Prunus spinosa	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Rendkívül igénytelen, jó szárazságtűrő, tövises ágú cserje. Termése ehető. A Prunus spinosa, más néven Kökény, sokoldalú kerti növény, amely a rózsafélék családjába tartozik. Ez a kis fa vagy bokor rendkívül népszerű a kertészek és természetkedvelők körében, mivel számos előnnyel rendelkezik. A kökény cserje mérete általában 2-4 méter magas, így kiválóan alkalmas kertekbe és parkokba, de még kisebb területeken is elfér. A növény levelei elliptikusak és sötétzöldek, amelyek kellemes látványt nyújtanak az év többi részében. Azonban igazi csodát jelent a tavaszi virágzása. A kökény virágai apró, fehér vagy rózsaszín szirmokkal rendelkeznek, és tömegesen borítják a növényt. A virágzás ideje alatt a kökény gyönyörű látványt nyújt, és vonzza a méheket és más beporzó rovarokat. Ezáltal hozzájárul a biodiverzitás támogatásához a kertben. Az igazi érték azonban a Kökény termésében rejlik. A kökény termései, apró, kerek, sötétlila színűek, és az ősszel érik el teljes érettséget, ilyenkor édesek lesznek. Ezek az ízletes gyümölcsök gazdagok C-vitaminban és antioxidánsokban, és számos egészségügyi előnnyel járnak. A kökénygyümölcsök felhasználhatók lekvárok, szirupok, likőrök és más finom ételek és italok készítéséhez. A Prunus spinosa könnyen gondozható és ellenálló növény. Általában szereti a napos vagy félárnyékos helyeket és a jó vízelvezetéssel rendelkező talajt. Az elültetést követően a megfelelő öntözés és a rendszeres metszés segíti a növény egészséges növekedését és a termés bőségét. Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy a kökény egy hasznos növény a kertben, mivel védőtövises ágai kiválóan alkalmasak sövények kialakítására, amelyek hatékonyan határolják a területeket és biztosítják a magánéletet. Állatok kívűl tartására is rendkívűl alkalmas természetes telekhatárt alakíthatunk ki belőle.

Közönséges kutyabenge	**Frangula alnus**	3 550 Ft	3 550 Ft

A Frangula alnus (közönséges kutyabenge) egy hazai gyógynövény és díszcserje.
A kutyabenge egy viszonylag igénytelen növény, amely könnyen alkalmazkodik.

Fényigény: Napostól a félárnyékos helyekig egyaránt megél, bár a tűző napot célszerű elkerülni.

Talajigény: A nedves, jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben

. Jól alkalmazkodik különböző talajtípusokhoz, de a savanyú vagy semleges kémhatást kedveli.

Vízigény: Közepes vízigényű, és jól tűri az átmeneti elárasztást, ami vízparti kertekbe is idealmá teszi.

Metszés: Alakformálásra jól alkalmazható, de nem igényel rendszeres metszést.

Télállóság: Nagyon jó télállóságú, a USDA 3-as zónájától (akár -40 °C-ot is kibír) tartható.

Ültetési javaslat
A növény rendkívül sokoldalúan használható fel. Nedves talajú kertekben, vízpartokon, esőkertekben kiváló, ahol talajeróziót is gátol. Díszcserjeként vagy sűrű sövény kialakítására is alkalmas; sövény esetén 2-3 növényt ültessen méterenként. Bogyói hosszú ideig a növényen maradnak, így madárbarát kertek kialakításához is kiváló választás
.Fontos tudnivalók

Gyógyhatás és mérgezősség: A növény kérgét szárítva és egy év után hashajtóként használják. Frissen MÉRGEZŐ, huzamos fogyasztása nem ajánlott. A bogyók emésztőrendszeri problémákat okozhatnak.

inváziós növény

Kúszó svéd madárbirs	**Cotoneaster suecicus 'Skogholm'**	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kúszó svéd madárbirs (Cotoneaster suecicus 'Skogholm') egy gyorsan növekvő, kissé íves ágú, kúszó habitusú cserje, amely akár 1 méter magasságot is elérhet, de főleg vízszintes irányban terjeszkedik (akár 2-3 méteres szélességig is). Levelei sötétzöldek, tojásdad formájúak, ősszel vörösre színeződnek. Apró, fehér vagy rózsaszínes virágai május-júniusban nyílnak, melyeket később élénk piros, madarak által kedvelt bogyók követnek. Ellenálló a szárazsággal és a szennyezett levegővel szemben, így kiválóan alkalmazható városi környezetben is.

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félig árnyékos helyeket kedvel.

Talaj: Minden talajtípusban megfelelően fejlődik, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben.

Öntözés: Átlagos vízigényű, de rövid szárazságot jól tolerál.

Metszés: Nem igényel rendszeres metszést, de ha szükséges, tavasszal visszavágható.

Télállóság: Jó télállóságú, -25°C-ig megtűri a hideget.

Alkalmazási javaslatok

Talajtakaró: Gyorsan növekvő, sűrű habitusa miatt kiválóan alkalmazható talajtakaróként.

Lejtők stabilizálása: Mély gyökérrendszere révén hatékonyan stabilizálja a lejtőket.

A Cotoneaster suecicus 'Skogholm' nemcsak díszít, hanem hasznos is: gyümölcsei madárvilág vonzására alkalmasak, és sűrű növekedésével gátolhatja a gyomok terjedését is

Dísznövény: Dekoratív megjelenése miatt kertek díszítésére is ideális.

Madárbarát kert: Bogyói madárvonzó hatásúak.

Labdarózsa	Viburnum Opulus 'Roseum'	3 450 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Viburnum opulus 'Roseum' az egyik legismertebb és legkedveltebb "labdarózsa", amely a 16. század óta díszíti a kerteket. Nem véletlenül ilyen hosszú a népszerűsége: hihetetlenül látványos, szabályos gömbökbe rendeződő virágai, igénytelensége és évszakos változatossága miatt bármely kert ékköve lehet. Késő tavasszal hozza el fő attrakcióját, majd ősszel lombszínével nyújt még egyszer feledhetetlen látványt.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Roseum' habitusa terebélyes, felálló, bokros, később szétterülő, sűrű ágrendszerű cserje. Levelei a juharleveléhez hasonlóak, 3-5 karéjosak, élénkzöldek, ősszel pedig vöröses-narancsos-bordós színekbe váltanak, ami ősz végén is díszíti a kertet. Május-júniusban nyíló virágai a növény legfőbb díszei: hatalmas, 6-8 cm átmérőjű, tömött, gömb alakú bugák, amelyeket számos sterilebb virág alkot. A virágok színe a nyílás során változik: kezdetben zöldesfehérek, majd hófehérré válnak, végül a virágzás vége felé halványrózsaszínes árnyalatot öltenek, innen ered a 'Roseum' (rózsás) fajtanév is. Mivel a virágok sterilek, nem hoznak termést.

Magasság: A virágzó növény magassága elérheti a 3-4 métert is.

Szélesség: Terjedése is hasonló, 3-4 méter körül alakul, így nagy, impozáns bokorrá fejlődik.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban. Napos fekvésben virágzik a legdúsabban, de a világos, szűrt árnyékot is meghálálja.

Talaj: Jól alkalmazkodó, de a nedves, de jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, humuszos vályogtalajt kedveli. Szinte bármilyen kerti talajban megél, a pangó vizet azonban nem tolerálja.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a begyökeresedésig. Idősebb korában közepes vízigényű, a hosszan tartó aszályos időszakokban hálás a locsolásért, mivel a hőséget és a szárazságot nem kedveli.

Télállóság (USDA-zóna): A növény rendkívül télálló, USDA 3-8 zónákban teleltethető biztonsággal. Magyarország teljes területén megbízhatóan áttelel.

Metszés:

Tavaszi metszés: Kora tavasszal (március-áprilisban) érdemes eltávolítani a sérült, fagyott vagy beteg ágakat.

Virágzás utáni metszés: Ha szükséges, a virágzás után (júniusban) alakíthatjuk, ritkíthatjuk a bokrot. A labdarózsa jól tűri a metszést, akár erőteljes, fiatalító vágást is. Szakértők szerint érdemes 2-3 legidősebb ágat tőből eltávolítani, hogy a bokor megújuljon, és a növény alja se kopaszodjon fel.

Tápanyagutánpótlás: Kora tavasszal érdemes komposzttal vagy lassú oldódású, általános műtrágyával kijuttatni a növekedés és virágzás serkentése érdekében. Tavasszal érdemes a tövét elmulcsolni.

Ellenállóság: Általában ellenálló, de levéltetvek és a bangita-bogár (viburnum beetle) ritkán megtámadhatják. A túlöntözés és a pangó víz gyökérrothadást okozhat.

Kertstílus és növénytársítások:
Alacsony, terülő habitusa, feltűnő virágzata és őszi színe miatt sokféleképpen felhasználható:

Magányos növény (szoliter): Gyepben vagy kavicságyásban magányosan ültetve hatalmas látványosság virágzáskor.

Sövény vagy térelválasztó: Magas sövényként vagy térelválasztóként is ültethető.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Vegyes cserjecsoportok: Más cserjékkel, évelőkkel kombinálva szép hátteret biztosít.

Vágott virág: Virágzatai vázában is sokáig elállnak, kiváló vágott virág.

Előkert, alapozás: Nagyobb előkertekbe, házfalak mellé ültetve impozáns megjelenésű.

Vidéki és házikókertek, vadvirágos kertek: Tökéletesen illik a romantikus, természetközeli kertekbe.

Ajánlott növénytársítások:

Korai hagymások és évelők: A labdarózsa virágzása előtt a tövébe ültetett tulipánokkal vagy gyöngyikével (Muscari) vidám színfoltokat hozhatunk létre.

Később virágzó évelők: A virágzás után a lombszín és struktúra adja a hátteret, például a magas díszfüveknek (mint a pampafű vagy a kínai ezüstfű) vagy a bazsarózsának (Paeonia) .

Fehér virágú növények: A labdarózsa fehér virágaival más fehér virágú növények, mint a fehér orgona vagy a gyöngyvirágcserje szépen összhangban vannak.

Sötétlombú növények: A bordós őszi lombszín még jobban kiemelkedik a sötétzöld örökzöldek, például a tiszafa vagy a babérmeggy előtt.

Rózsák: A labdarózsa mögé ültetett, később nyíló rózsák (pl. a 'The Fairy' vagy 'Sea Foam') szépen kiegészíthetik a virágzási időszakot.

Lemon-Lime japán szentfa	**Nandina domestica 'Lemon-Lime'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Lemon-Lime japán szentfa a Nandina domestica egyik legújabb és legkedveltebb kompakt változata. Nevéhez híven a fajta a citrom és lime friss, üde színeit hozza a kertbe, anélkül, hogy a hagyományos japán szentfákra jellemző őszi piros színt mutatna. Ez a növény tökéletes választás azok számára, akik szeretnék élvezni a Nandina előnyeit (örökzöld lombozat, igénytelenség) anélkül, hogy aggódniuk kellene a nem kívánt terjedés miatt, mivel ritkán virágzik.
Külső megjelenés
A Lemon-Lime japán szentfa kompakt, bokros növekedésű, feltörő, bambuszra emlékeztető szárakkal rendelkezik. Kifejlett magassága és szélessége 0,5-1 méter között alakul, ami ideálissá teszi kis kertekbe, előkertekbe és konténerekbe. A növekedési erélye közepes, a végső méretet 5-10 év alatt éri el.
A növény legnagyobb dísze a lombozat kétszínű textúrája. A levelek szárnyalt összetettek, lándzsás levélkékből állnak. A friss, új hajtások feltűnő citromzöld vagy lime-zöld színűek. Az idősebb, belső levelek sötétzöld színűek, ami kontrasztos, gazdag texturális hatást kelt. A növény egész évben megőrzi ezt a színjátékot, a fiatal hajtások élénk zöldje a legtöbb éghajlaton nem színeződik pirosra ősszel és télen, bár hidegebb éghajlaton néhány levél bronzos vagy rózsaszínes árnyalatokat ölthet. Félárnyékban a levelek színe tompább, sötétebb zöld lehet. A növény nem virágzik rendszeresen, ami előnyös lehet azok számára, akik szeretnék elkerülni a magoncokkal való terjedést.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy napos helyet egyaránt kedvel. A legélénkebb, legintenzívebb lime-zöld színt napos fekvésben hozza. Teljes árnyékban is nő, de a lombozat színe kevésbé élénk, sötétebb zöld lesz.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag talajt igényel, bár a legtöbb talajtípushoz alkalmazkodik (homok, vályog, agyag). A pH tekintetében nem válogatós: a savanyú, a semleges és a lúgos (meszes) talajokat is tolerálja. A pangó vizet, a nagyon nedves talajt nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrők.

Tápanyag-utánpótlás: Alacsony tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható.

Metszés: A Lemon-Lime kompakt, természetesen szép formájú, ezért rendszeres metszést nem igényel. A metszést elviseli, de nem szükséges a forma megtartásához. Szükség esetén késő télen vagy kora tavasszal lehet formázni.

Telelés: USDA besorolása 6-10. A növény -10°F-ig (-23°C-ig) ellenáll a hidegnek. Magyarországon a 6b-7b zónákban a növény szabadföldben is nevelhető, de védett, szélvédett fekvésbe (házfal mellé) ültessük, és a fiatal növényeket télen vastag lombtakaróval mulcsozzuk. A 6-os USDA zónában a növény félévelő lehet, télen a levelek egy részét vagy egészét hullathatja, sőt a szárak is visszafagyhatnak a talajszintig, de tavasszal újra kihajt. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, pince) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, kártevők nem támadják. A szarvasok és nyulak is kerülik. Lúgos (meszes) talajban a levelek klorózisosak (sárgulhatnak) lehetnek.

Inváziós potenciál: A hagyományos japán szentfákkal ellentétben a Lemon-Lime ritkán virágzik, ezért nem kell tartani a nem kívánt terjedéstől, így nem számít inváziós fajnak. A növény a fagyos teleken a leveleit elveszítheti, de a gyökérzet általában áttelel, és tavasszal újrahajt.

Kertstílus, ahová illik
A Lemon-Lime japán szentfa a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Ázsiai (japán, kínai, zen) kertekbe: A növény textúrája és színe tökéletesen illik az ázsiai kertek esztétikájába.

Modern, letisztult kertekbe: Egységes, kompakt formája miatt ideális választás.

Természetes, erdős kertekbe: A felhőszerű lombozata természetes hatást kelt.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Városi kertekbe, előkertekbe: Kompakt mérete és alacsony igényei miatt kisebb kertekbe is beilleszthető.

Konténeres teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe: Tökéletes választás dézsákba, cserepekbe, mivel lassú növekedésű és jól bírja a szűk helyet.

Szegélynövényként, alacsony sövényként: Metszés nélkül is sűrű, örökzöld szegélyt alkothat.

Változatos növénytársítások
A Lemon-Lime élénk, lime-zöld és sötétzöld lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel:

Sötét lombozatú növények: Vörös levelű borbolya (Berberis), sötét törpe boróka, japán vértfű (Imperata cylindrica) – a sötét színek kiemelik a növény világos lombozatát.

Lila és kék virágú évelők: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia) – a lila-kék színek az élénk lime-zölddel harmonikus, friss kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – az ezüstös szürke tompítja a zöld intenzitását, elegáns összképet adva.

Díszfüvek: Tollbuga (Molinia), kínai ezüstpázsit (Miscanthus), japán erdeifű (Hakonechloa macra) – a füvek laza, mozgó habitusa oldja a növény tömött formáját.

Alacsony talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

USDA besorolása: 6-10 (Magyarországon a 6b-7b zónákban a növény szabadföldben is nevelhető, de védett, szélvédett helyre és vastag téli mulcsrétegre van szüksége, mivel a levelei a téli hidegben elfagyhatnak. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes helyen kell teleltetni).

Leyland-ciprus (legnagyobb)	**Cupressocyparis leylandii**	9 900 Ft	10 500 Ft

A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robosztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna

Li kínai datolya	**Ziziphus jujuba 'Li'**	9 950 Ft	9 950 Ft

Egy újabb „rejtély-növény”, ugyanis teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem terjedt el, hiszen teljesen télálló és klímánk egyéb adottságai is tökéletesen megfelelnek számára. A kínai datolya, mint neve is mutatja, Kínából származik, ahol már 4000 (!) évvel ezelőtt termesztették és ahol jelenleg már 400 fölött van fajtáinak száma. Napjainkban Oroszországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Dél-Európában és az USA délnyugati részén is számottevő mennyiségben termesztik. Az alapfaj termése kicsi, nem lédús, teljes érésben inkább cukrozott fűrészpornak tűnik, ez lehet az oka, hogy nem sokan kívánták meg eddig nálunk. Nemesített fajtái viszont finomak, lében gazdagabbak, édesek, termesztésre tényleg érdemesek lennének, nem utolsósorban gazdag C-vitamin tartalmuk miatt is. Az ázsiai kultúrákban teáját évezredek óta gyógyításra is használják, pl. torokfájás esetén. A növény kezdetben kis kerekded cserje, majd kisebb fává is cseperedhet. Lombozata igen mutatós, viszonylag kis levelei csillogóan fénylő élénkzöldek. Virágai kicsik, zöldessárgák, enyhén illatosak, késő tavasztól kora nyárig nyílnak. A késő tavaszi fagyok nem ártanak neki, mert lombfakadása is elég késői. Termesztésére bármilyen átlagos adottságú terület megfelelő, sőt a szárazságot kifejezetten jól tűri! A ’Li’ az egyik legkorábban érő fajta, már augusztus közepén szedhető. Gömbölyű termései zöldessárgák, nagy méretűek, elsősorban friss fogyasztásra ajánlhatók. Fája keskeny, felfelé törekvő, sűrűn ágas, kissé tövises. 6a-9b USDA-zóna

Limelight bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Limelight'**	8 900 Ft	9 100 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hydrangea paniculata 'Lime Light' egyedi színvilágáról híres, mely a sárgászöldtől a fehérig változik. Ez a látványos, télálló cserje erős, felálló ágakon hordja nagy, kúp alakú virágait. Konténeres növényként szállítjuk, biztosítva gyors begyökeresedését.

Színárnyalatok: A nyár elején friss citromzöld virágai nyár közepén fehérré válnak, majd ősztől enyhe rózsás árnyalatot kapnak.

Méret: Energetikus növekedésű, 2-2,5 m magas és 1,5-2 m széles bokorrá fejlődik.

Ültetési távolság: 1,5-2 m távolsággal ültetve optimálisan fejlődik.

Kiválóan alkalmazható soliterként, virágzó sövényként vagy nagyobb kertek domináns elemeként.
Gondozási útmutató
A Hydrangea paniculata 'Lime Light' gondozása

Fényigény: Napos vagy félig árnyás helyen érzi magát a legjobban.

Öntözés: Közepes vízigényű. Szárazságot kerülni kell, különösen nyáron.

Talaj: A laza, nedves, humuszban gazdag talajt részesíti előnyben.

Trágyázás: Tavasszal hortenziákra specializált trágyával vagy lassú hatású műtrágyával támogatható.

Metszés: Tavasszal (március) erősen visszavágható (2-3 rügyre), mivel az idei év hajtásain hozza a virágot.

Ültetési javaslat
Helyválasztás és ültetési tippek:

Hely: Napos vagy félig árnyás, széltől védett terület.

Ültetés: A konténeres növényt tavasztól őszig ültethetjük.

Távolság: Legalább 1,5-2 m távolságot tartsunk más növényektől.

Ötletek:

Szoliterekként ültetve hangsúlyozza virágainak egyedi színvilágát.

Több példányból laza, virágzó határoló sövény alakítható ki.

Nagy cserépben terasz- vagy kerti díszként is remekül funkcionál.

A Hydrangea paniculata 'Lime Light' egy igénytelen, de lenyűgöző virágú cserje, mely évtizedekig ékesíti kertekét!

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
5a-9b USDA-zóna			
Little Angel törpe hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Little Angel'	11 900 Ft	13 000 Ft
Ősszel a levelek pirosasra színeződnek, így látványos őszi megjelenést biztosít. Jól tűri a napos és félárnyékos körülményeket, kedveli a jó vízelvezetésű talajt. Rendszeres öntözésre van szüksége, és időnként metszést is igényel. A Törpe hóggyagvessző jól mutat természetközeli és modern kertekben egyaránt.			
Little Fresco bugás hortenzia	Hydrangea paniculata 'Little Fresco'	3 450 Ft	3 750 Ft
Little Fraise (Little Fresco) bugás hortenzia (Hydrangea paniculata Little Fresco) a bugás hortenzia fajták egyik legújabb törpe nemesítése. A Little Fraise finom, eperrózsaszín árnyalatú, apró virágfejek a kis epreket idézik. A Little Fresco névváltozat a freskók világára utalhat, a virágok festői szépsége miatt. Ez a fajta a törpe méret, a bőséges, hosszan tartó virágzás és a szép színváltozás hármasát kínálja. Kifejlett mérete és megjelenése: A Little Fresco törpe termetű, 0,8-1 méter magas és 0,8-1 méter széles, tömött, gömbölyded, kompakt habitusú cserje. Habitusa sűrű, a szárak erősek, nem dőlnek meg a virágzatok súlya alatt. Levelei kisebbek, mint a hagyományos bugás hortenziáké, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 4-8 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. A virágok a növény igazi ékkövei: július-augusztus környékén nyílnak, és akár októberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok kúp alakúak, kicsik vagy közepesek, 10-15 cm hosszúak, a virágzat csúcsa felé kissé elvékonyodnak. A Little Fresco legnagyobb különlegessége a színváltozás: a virágok kezdetben zöldesfehérek, majd tiszta fehérré válnak, később a nyár végén finom, pasztelles eperrózsaszín árnyalatot kapnak, végül őszre sötétebb rózsaszínbe, már-már vöröses árnyalatba hajlanak. A virágok meddők, nem képeznek magot, így a virágzási energia teljes mértékben a látványos virágfejekre fordítódik. Igényei és gondozási útmutató: A Little Fresco a legszebb virágdíszét és a legszebb színváltozását teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a rózsaszín árnyalatok intenzívebbek, a virágzása bőségesebb. Félárnyékban a színváltozás finomabb, pasztellesebb. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri, de a nagyon meszes talajban a rózsaszín szín fakóbb lehet. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a hajtásokat akár 10-20 cm magasságig is visszavághatjuk. A bugás hortenzia az új hajtásokon virágzik, így a radikális visszametszés serkenti a nagy virágzatok képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő. Kertstílus és növénytársítások: A Little Fresco törpe mérete és finom színvilága miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Kis kertekben és előkertekben a helyhiány miatt ideális választás, ahol a nagyobb hortenziák már nem férnének el. Sziklakertekben alacsony növekedése miatt remekül használható. Teraszokon és erkélyeken dekoratív cserépben a romantikus hangulatot idézi. Síkertekben és kegyeleti kertekben szerény mérete és finom virágai miatt gyakran választják. Romantikus kertekben a finom, pasztelles rózsaszín virágzataival a lágy, nőies hangulatot erősíti. Konténerben bárhol tartható. Változatos növénytársítások: Alacsony növésű levendulával: A levendula (Lavandula angustifolia) lila virágai és ezüstös lombozata mellett a Little Fresco rózsaszín virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak. Macskamentával: A macskamenta (Nepeta) kékesszürke lombozata és hosszan nyíló, kékes-lila virágai tökéletes kísérői a törpe hortenziának. Törpe díszfüvekkel: A törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis Adagio) vagy a tollborzfű (Pennisetum) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Alacsony borókafélékkel: A kékesszürke vagy zöld alacsony borókák (Juniperus horizontalis, Juniperus procumbens) mellett a Little Fresco élénk virágai különösen jól érvényesülnek. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett alacsony tulipánok (Tulipa), nárciszok (Narcissus) vagy krókuszok (Crocus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Fehér virágú évelőkkel: A fehér árvácska (Viola) vagy a havasi gyopár (Leontopodium) finom, elegáns kompozíciót alkot. Cserépben más növényekkel: Konténerben nevelve társítható árvácskával (Viola), büdöskével (Tagetes) vagy futó muskátlival (Pelargonium) a teraszon vagy erkélyen. A Little Fresco kiváló választás azok számára, akik egy törpe méretű, finom eperrózsaszín virágzatú, bőségesen virágzó hortenziát keresnek, amely kis kertekben, sziklakertekben, sírkertekben és konténerben egyaránt megállja a helyét, és a nyár második felétől őszig díszíti a kertet. USDA besorolása: 4-8.			
Mályvacserje	Hibiscus syriacus	2 350 Ft	2 350 Ft
Termékleírás: Hibiscus syriacus mályvacserje - Varázslatos virágzatú és könnyen gondozható dísznövény. A Hibiscus syriacus, ismertebb nevén mályvacserje lenyűgöző dísznövény, amely pompás virágzata és az egyszerű gondozása miatt egyre népszerűbb választás a kertészeti területeken. Virágzat: A mályvacserje legnagyobb vonzereje a lenyűgöző virágzata. A nyár elejétől őszig hozza pompás, nagy méretű, virágait. Ezek lehetnek fehér, rózsaszín, ibolyakék vagy lila színűek, melyek megjelenése lenyűgöző. A virágok magányosan nyílnak, vagy többes száron csoportosulhatnak, ami látványos hatást kelt. A mályvacserje levelei ovális alakúak és enyhén fogazott szélűek. Színezetük friss állapotban zöld, és az őszi hónapokban sárga-barna színűre változik. A Hibiscus syriacus mályvacserje viszonylag kevés gondoskodást igényel. Napos vagy félárnyékos helyen is szépen fejlődik, bár napos helyeken valószínűleg gazdagabb és bőségesebb lesz a virágzata. A jó vízáteresztő képességű talaj és a rendszeres öntözés segít az egészséges növekedésben. A mályvacserje könnyen kezelhető és szinte semmilyen különleges gondozást nem igényel. Az éves metszéssel korrigálható a formája és az esetleges száraz vagy beteg ágak eltávolíthatók. Szoliterként, bokrok csoportosításaként vagy akár sövényként is ültethető. A kerttervezésben sokoldalú lehetőségeket kínál, mivel számos szín- és formaváltozat érhető el.			
Mézillatú bogyóspuszpáng	Sarcococca confusa	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A mézillatú bogyóspuszpáng (Sarcococca confusa) egy kis növésű, örökzöld cserje, mely különleges vonzerejével és illatával varázsolja el a kertészeket. Tökéletes az árnyékos sarkokban való telepítésre, mivel tűri a félárnyékos környezetet. A tél végén és a tavasz elején megjelenő, kicsi, fehér virágai erőteljes mézillatot árasztanak, ami vonzza a méheket és más beporzókat. Ezeket követik a fényes fekete bogyók, amelyek gyönyörű kontrasztot alkotnak a zöld levelekkel.
A mézillatú bogyóspuszpáng ideális választás mediterrán vagy természetes kertekbe, valamint városi kertekbe, ahol helyet keresnek az árnyékos, nedves helyeken növekvő növények számára. Csoportos ültetésekkel még látványosabb hatást érhetünk el, míg szoliterként is megállja a helyét.
Gondozási útmutató:

Helyválasztás: Árnyékos vagy félárnyékos helyeken a legszebbek, jól bírják a nedves talajt.
Talaj: Jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talaj a legideálisabb.
Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges különösen száraz időszakokban, de kerüljük a pangó vizet.
Metszés: Forma megtartása érdekében tavasz végén vagy nyár elején végezzen metszést.
Tápanyag: Évente kora tavasszal, a növekedés időszakában tápoldatozzuk.

Zóna: 6a

Minnesota Snowflake jezsámen	**Philadelphus 'Minnesota Snowflake'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Minnesota Snowflake az illatos jezsámenek egyik leglátványosabb, legbőségesebben virágzó fajtája, amelyet a Minnesotai Egyetemen nemesítettek ki. Nevét („Minnesotai Hópehely”) a hatalmas számú, hófehér, telt virágairól kapta, amelyek a lombokat szinte teljesen fehér köpennyel vonják be. Kifejlett magassága 1,8-2,5 méter, szélessége 1,5-2 méter, így nagyobb cserjeként háttérbe, magas sövénybe vagy szoliterként is kiválóan mutat.
Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a júniusban nyíló, hófehér, telt virágok, amelyek 4-5 cm átmérőjűek, és a hajtások végén, valamint az oldalhajtásokon csoportosan, akár 5-9 tagú fürtökben nyílnak. A virágszirmok széle finoman csipkézett, ami a hópehelyre emlékeztet. Illatuk rendkívül intenzív, édeskés, a kertben több méterről is érezhető - virágzás idején az egyik legillatosabb cserje a kertben. A levelek középzöldek, tojásdadok, 4-7 cm hosszúak, finoman fogazott szélűek. Ősszel a lombszín sárgásra változik. A hajtások erősek, egyenesen felfelé törnek, majd ívesen lehajlanak a virágok súlya alatt.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb a virágzás és a legerősebb az illat; túl sok árnyékban kevesebbet nyílik.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag vagy gazdag, meszes vagy semleges kémhatású (pH 6,5-7,5). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: fiatalon és tartós szárazság idején rendszeres öntözést igényel. Idősebb korban mérsékelten szárazságtűrő.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy általános célú műtrágyával. A túlzott nitrogénadagolás a virágzás rovására megy.

Metszés: virágzás után közvetlenül (június-július) kell metszeni. Az elvirágzott hajtásokat vágd vissza erős oldalhajtásokig (kb. egyharmadukkal). A régi, elöregedett ágakat 3-4 évente a talaj szintjén távolítsd el, hogy a fiatal, erős hajtásoknak helyet adj.

Telelés: teljesen télálló, a nevében is szereplő Minnesota állam hideg teleit is bírja, így Magyarországon külön védelmet nem igényel.

Kertstílus, ahová illik Romantikus kert, angol vidéki kert, házikert, illatos kert, vadvirágos rét szegélye, vegyeságyás háttere, nagyobb kertek, falusi kertek.
Változatos növénytársítások

Kék és lila virágú évelők: levendula (angol vagy francia), macskamenta, perovszkia, császárvirág, harangláb, ibolya.

Lila vagy bordó levelű növények: vörös díjszilva, sötét levelű vérszilva, törpe borbolya (pl. 'Atropurpurea').

Pünkösdi rózsák (bazsarózsa): későn nyíló fajták, amelyek a jezsámen után virágoznak.

Rózsák: nemes rózsák (fehér, halványrózsaszín vagy piros színben).

Díszfüvek: tollbuga, japán vértfű, kék csenkesz, óriás árvalányhaj.

Fehér virágú évelők: gyöngyvirág, árnyékliliom, párnás őszirózsa.

Tavaszi hagymások a tövébe: krókusz, gyöngyike, nárcisz, jácint.

Őszi évelők a folytatáshoz: őszirózsa, kőtörőfű, lángvirág.

USDA besorolása: 4-8 (Magyarország egész területén, 4b-7 zónában kiválóan nevelhető, a leghidegebb tájakon is megbízható).

Mint Julep boróka	**Juniperus x media 'Mint Julep'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fényes sötétzöld lombszínű, kezdetben alacsonyan szétterülő, később, ahogy ágemeletei egymásra épülnek, 2 méteres magasságot is elérő, majdnem gömbölyded bokor lesz. Gyors növekedésű, edzett, ellenálló, amerikai eredetű fajta. Zóna:5a			
Nagylevelű aranytarka magyal	Ilex 'Golden King'	19 500 Ft	22 400 Ft
A Golden King magyal (Ilex 'Golden King') nagyon látványos megjelenésű örökzöld kisebb fa, vagy nagyobb cserje, melynek leveleinek széle szinte tövismentes, ami a magyaloknál nagyon ritka és a leveleinek a közepe zöld, a levélszél pedig világossárgán foltozott. Tavasszal nyílnak apró hófehér virágai, melyekből nyárra fejlődnek ki az eleganciájához hozzájáruló piros bogyói. 7a-9b USDA-zóna			
Nagytermésű étkezési mogyoró	Corylus avellana 'Bőtermő Nagy'	4 950 Ft	4 950 Ft
Ahogy a neve is utal rá, kifejezetten nagy, gömbölyded termései vannak, ráadásul nagy számban. 5a USDA-zóna			
Nagytermésű som	Cornus mas 'Macrocarpa'	9 900 Ft	9 900 Ft
A közismert húsos som (Cornus mas) gyönyörű, nagytermésű változata, a termés tömege az alapfajéhoz képest legalább kétszeres! A som korán tavasszal virágzik még lombfakadás előtt így adva hazai meleg, napos domboldalakon elhelyezkedő ereinknek gyönyörű színpompát. A termések egész nyáron érnek, és akkor a legfinomabbak, amikor bordóra színeződnek, és elég csak megrázni egy-egy ágat, hogy lehulljanak. A húsos somból idős korára kis fácskát is ki lehet alakítani, melynek nagyon hangulaos girbe-gurba törzse a kis darabokban leváló kéreggel látványos. A termés savanykás, igazi vad gyümölcs, melyet nyersen fogyasztva, vagy akár mártásnak elkészítve is lehet fogyasztanai. Fényigény: napos helyre ültessük Vízigény: szárazságtűrő Talajigény: jó vízáteresztő, átlagos tápértékű talajokat kedvel USDA Zóna:4b			
Nagyvirágú bugás hortenzia	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Nagyvirágú bugás hortenzia (Hydrangea paniculata Grandiflora) a bugás hortenzia fajták egyik legrégebbi és legismertebb képviselője. A Grandiflora név – amely latinul nagyvirágút jelent – tökéletesen leírja a fajta legfőbb jellemzőjét: a virágzatok rendkívül nagyok, látványosak, a nyár második felétől késő őszig díszítik a kertet. Ez a klasszikus fajta a bőséges, hosszan tartó virágzás, a megbízható télállóság és az igénytelenség hármasát kínálja, ami generációk óta a kertek egyik kedvenc hortenziájává teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Grandiflora közepes vagy nagyobb termetű, 2-3 méter magas és 2-2,5 méter széles, bokros, szétterülő habitusú cserje. Idősebb korban akár kis faként is nevelhető, ha az alsó hajtásokat eltávolítjuk. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 8-12 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. A virágok a növény igazi ékkövei: július-augusztus környékén nyílnak, és akár októberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok nagyok, kúp alakúak, 20-30 cm hosszúak, a virágzatot apró, termékeny virágok és nagyobb, meddő virágok egyaránt alkotják. A Grandiflora különlegessége a színváltozás: a virágok kezdetben zöldesfehérek, majd tiszta fehérré válnak, később a nyár végén és ősszel finom, pasztelles rózsaszín árnyalatot kapnak. A virágok szárazon is a növényen maradhatnak, télen is díszítve a kertet.
Igényei és gondozási útmutató: A Grandiflora a legszebb virágdíszét teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, a színváltozás is látványosabb. Félárnyékban a virágok színe finomabb, a növény kevesebb gondozást igényel. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a hajtásokat akár 15-30 cm magasságig is visszavághatjuk. A bugás hortenzia az új hajtásokon virágzik, így a radikális visszametszés serkenti a nagy virágzatok képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Grandiflora sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Hagyományos kertekben és falusi kertekben a régi idők hangulatát idézi, ahol gyakran ültették házak elé, kerítések mellé. Romantikus kertekben és angolkertekben a nagy, fehér-rózsaszín virágzataival a lágy, elegáns hangulatot erősíti. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás. Nagyobb kertekben szoliterként vagy sövényként egyaránt megállja a helyét.
Változatos növénytársítások: Levendulával: A levendula (Lavandula angustifolia) lila virágai és ezüstös lombozata mellett a Grandiflora fehér-rózsaszín virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak. Rózsákkal: A fehér virágú Grandiflora remekül társítható rózsákkal (Rosa), különösen rózsaszín, piros vagy sárga színű fajtákkal. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Teltvirágú gyöngyvirágcserjével: A fehér virágú Deutzia mellett a Grandiflora rózsaszínes árnyalatai harmonikus kompozíciót alkotnak. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa) vagy nárciszok (Narcissus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Páfrányokkal: A félárnyékos helyre ültetett páfrányok (Dryopteris, Polystichum) finom textúrájukkal szépen kiegészítik a hortenzia nagy leveleit.
A Grandiflora kiváló választás azok számára, akik egy megbízható, bőségesen virágzó, klasszikus hortenziát keresnek, amely generációkon át díszítheti a kertet, és a nyár második felétől késő őszig a kert egyik fő attrakciója lehet. USDA besorolása: 3-8.

Nagyvirágú tárnicslonc	**Abelia grandiflora**	4 450 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel a Nagyvirágú tárnicslonc (Abelia × grandiflora) egyedülálló szépségét! Ez a félörökzöld díszcserje hosszú virágzási idővel, illatos virágokkal és könnyű gondozhatósággal díszíti kertjét. Erős gyökerű, egész évben ültethető növényeinket gondosan szállítjuk!
Termékjellemzés és gondozási útmutató
Külső jellemzők

Méret:1,5-2 m magas és széles, íves ágrendszerű

.Levelek: Sötétzöld, fényes, ovális alakúak; ősszel bronzos vagy bíbor árnyalatúak

.Virágok: Halvány rózsaszín vagy fehér, tölcsér alakú, édes illatúak (július-október)

.Növekedés: Tömött és kompakt habitus, íves ágakkal

Előnyös tulajdonságok

Hosszú virágzási idő: Júliustól októberig virágzik

.Pollinátor-barát: Méhek és pillangók kedvence

.Könnyen gondozható: Betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló

.Télállóság: -15°C-ig fagytűrő (enyhébb teleken örökzöld marad)

Ültetési javaslatok

Talaj: Jó vízáteresztő képességű, humuszban gazdag, savanyú vagy semleges pH-jú talaj

.Fényigény: Napos vagy részleges árnyékos helyeket kedvel (napos helyen gazdagabban virágzik)

.Ültetési idő: Tavasz vagy ősz

.Tőtávolság: 1-1,5 m egyedi ültetéshez, 0,8-1 m sövényként

Gondozás

Öntözés: Közepes vízigényű; a talajt érdemes kissé nedvesen tartani

.Metszés: Tavasszal ajánlott visszametszeni az elhalt ágakat és a formázás érdekében

.Trágyázás: Tavasszal lassú oldódású trágya vagy komposzt alkalmazható

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
.Téli védelem: Hidegebb éghajlaton érdemes a tövét mulccsal takarni Tervezési javaslatok Társítás: Harmonizál Lavandulával, Rhododendronnal vagy Hortenziával. Ajánlott helyek: Előkertek és bejáratok mellé Méhlegelők és beporzó-barát kertek .Konténeres elhelyezés teraszokon . 7a-9b USDA-zóna			
Nahno Purple™ nyáriorgona	**Buddleja x 'Nahno Purple'**	4 950 Ft	5 390 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Nahno Purple™ nyáriorgona (Buddleja x 'Nahno Purple') – A kompakt, illatos késő nyári cserje

A Nahno Purple™ nyáriorgona hibrid eredetű lombhullató cserje. A nemzetség magyar neve (nyáriorgona) a virágok orgonára emlékeztető illatára és a nyári virágzási időszakra utal, angol neve (butterfly bush) pedig a pillangók vonzására hívja fel a figyelmet. A 'Nahno Purple' fajta a Nanho Blue és Nanho Purple fajtákhoz hasonlóan a kompakt, sűrű habitusú Buddleja x 'Nanhoensis' csoport tagja. A fajta intenzív ibolyáslila virágaival és sűrű, gömbölyded bokrával az egyik legkedveltebb nyáriorgona a kisebb kertekben és konténerekben. A könnyű gondozhatósága, a kiváló szárazságtűrése és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Nahno Purple™ nyáriorgona egy kompakt, sűrű, gömbölyded habitusú, lombhullató cserje. Kifejlett magassága és szélessége 1-1,5 méter között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. Növekedési erélye közepes, a hajtások egyenesen felállók, ívesen hajlók, a növény nem omlik szét. A hajtások finoman szőrözöttek, a fiatal hajtások világosabb színűek.

A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek átellenesek, lándzsásak, 3-8 cm hosszúak, szürkészöld színűek, a levél széle finoman fogazott, a levélfelület enyhén szőrözött. A lombozat egész szezonban dekoratív, és a virágzás előtt és után is díszítőértéket képvisel.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-25 cm hosszú, sűrű, végálló füzér, amelyen a virágok rétegesen, egymás felett helyezkednek el. A virágok aprók, 1-2 cm átmérőjűek, csöves, tölcsér alakúak, négy szirommal, intenzív ibolyáslila színűek, a virágok közepén narancssárga folttal. A 'Nahno Purple' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok intenzív, tiszta ibolyáslila színe és a rendkívül kellemes, édes illata, amely távolról is érzékelhető, és vonzza a pillangókat, a méheket, a poszméheket és más beporzó rovarokat. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően júliustól szeptemberig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár októberig is meghosszabbítható. A virágok a kertben feltűnő, élénk színfoltot biztosítanak, és a növény a beporzók valóságos mágneseként működik.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Nahno Purple™ nyáriorgona napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást teljes napsütésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat és a meszes talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; a téli nedvesség különösen veszélyes lehet, és gyökérrothadáshoz vezethet.

Öntözés: A Nahno Purple™ nyáriorgona szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, virágzó cserjék számára kifejlesztett műtrágya. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy, és a növény hajlamosabbá válik a szétesésre.

Metszés és ápolás: A Nahno Purple™ nyáriorgona metszése fontos a bőséges virágzás és a növény rendezett megjelenése érdekében. A metszést kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt (február-március) kell elvégezni. Mivel a növény az új hajtásokon virágzik, a visszavágás serkenti az új, erős hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Visszavágás: A hajtásokat érdemes a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra visszavágni. Ez serkenti az új hajtások képződését, és biztosítja a sűrű, bokros habitust.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, fagykárosodott vagy sérült hajtásokat.

Telelés és fagytűrés: A Nahno Purple™ nyáriorgona mérsékelten télálló; az USDA 5-9-es zónákban nevelhető. A gyökérzet az USDA 5-ös zónájáig is ellenáll, de a felszíni hajtások csak az USDA 7-es zónájáig maradnak életben. Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A zordabb teleken a hajtások visszafagyhatnak, de a gyökérzetből tavasszal újrahajt. A téli nedvesség és a pangó víz nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy, ezért a jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos. A konténerben nevelt növényeket télen

védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Nahno Purple™ nyáriorgona az intenzív ibolyáslila virágzásának, kompakt méretének, kellemes illatának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb késő nyári cserje a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (1-1,5 m) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Alacsony sövénynek – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt alacsony, díszítő sövény kialakítására is alkalmas.

Tömeges telepítésbe – a sűrű, bokros növekedés és a hosszú virágzás miatt kiváló választás nagyobb felületekre.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Nahno Purple™ nyáriorgona ibolyáslila virágai és szürkészöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis), kúpvirág (Rudbeckia) – a lila és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a lila virágokat.

Fehér virágú növényekkel: Fehér évelőkkel – a lila és a fehér szívek elegáns, tiszta hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollbuga (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a nyáriorgona tömöttebb, bokros formáját.

Rózsákkal – a nyáriorgona kiváló társnövény a rózsák számára, kitölti a réseket és késői virágzást biztosít.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a Nahno Purple™ nyáriorgona mérsékelten télálló; az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban a gyökérzet áttelelhet, de a hajtások a zordabb teleken visszafagyhatnak. A növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos a sikeres teleltetéshez; a téli nedvesség nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.)

Nanho Blue nyáriorgona	**Buddleja davidii 'Nanho Blue'**	2 950 Ft	3 250 Ft

A Buddleja davidii 'Nanho Blue' a népszerű nyáriorgona, más néven pillangóbokor egyik legkedveltebb, kompakt változata. A 'Nanho' sorozat tagjaként kifejezetten kisebb kertekbe, előkertekbe nemesítették, ahol kevesebb hely áll rendelkezésre, de a növény bőséges virágzása és illata így is érvényesülhet. Hosszú, kék virágfürtjei júliustól az első fagyokig ontják illatukat, és pillangók sokaságát vonzzák a kertbe.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Nanho Blue' habitusa bokros, sűrűn elágazó, felálló, kompakt termetű cserje. Levelei keskenyek, lándzsásak, ezüstös-zöld vagy szürkészöld színűek, finoman molyhosak, ami a növény egészének lágy megjelenést kölcsönöz. Júliustól októberig (akár az első fagyokig) nyíló virágai a növény legfőbb díszei: hosszú, 15-25 cm-es, dús fürtökben nyíló virágzatok, amelyek színe élénk levendulakék vagy ibolyaskék, a virágok középpontjában apró narancssárga "szemmel" . A virágok erőteljes, édeskés, mézre emlékeztető illatot árasztanak, ami rendkívül vonzó a pillangók, méhek és más beporzó rovarok számára .

Magasság: A virágzó növény magassága fajtától és termesztési körülményektől függően 1,5-2 méter között változik .

Szélesség: Terjedése is hasonló, 1,5-2 méter körül alakul, szépen bokrosodó, sűrű formát alkotva .

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos helyen érzi magát a legjobban, a bőséges virágzáshoz legalább napi 6-8 óra közvetlen napfényre van szüksége . Félárnyékot is tolerál, de ilyenkor kevesebb virágot hoz.

Talaj: Jól vízelvezető, laza szerkezetű, közepesen termékeny kerti talajt kedveli. Szinte bármilyen talajtípusban megél, a pangó vizet azonban nem tolerálja! A meszes talajt is elviseli.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon, különösen az első évben, rendszeres öntözést igényel a begyökeresedésig. Idősebb korában közepes vízigényű, a hosszan tartó aszályos időszakokban hálás a locsolásért, de a túlöntözést kerülni kell.

Télállóság (USDA-zóna): A növény jó télállósággal rendelkezik, USDA 5-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Magyarország nagy részén megbízhatóan áttelel, de a leghidegebb tájakon, illetve fiatal korában érdemes a tövét takarással védeni a keményebb fagyok ellen.

Metszés:

Tavaszi metszés: Mivel a virágokat az új hajtásokon hozza, kora tavasszal (február-március) érdemes visszavágni a növényt akár a talaj fölött 20-30 cm-rel, hogy új, friss, erős hajtásokat neveljen, és dúsan virágozzon . Ezzel ösztönözzük a bokros növekedést és a bőséges virágzást.

Elnyílt virágok eltávolítása: Az elnyílt virágokat érdemes rendszeresen eltávolítani, hogy ezzel is ösztönözzük az újabb virágok képződését és meghosszabbítsuk a virágzási időszakot .

Tápanyagutánpótlás: Kora tavasszal érdemes komposzttal vagy lassú oldódású, általános műtrágyával kijuttatni a növekedés és virágzás serkentése érdekében . A túltrágyázást kerülni kell, mert a nitrogén túlsúly a virágzás rovására mehet.

Ellenállóság: Kiváló ellenállóságú, általában kártevők és betegségek nem támadják. Ritkán takácsatkák jelenhetnek meg száraz, meleg nyarakon.

Kertstílus és növénytársítások:
Közepes termete, hosszan tartó virágzása, illata és igénytelensége miatt sokféleképpen felhasználható:

Pillangó- és rovarbarát kertek: A pillangók és méhek egyik legkedveltebb növénye, nélkülözhetetlen a biodiverz kertekben.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Vegyes cserjecsoportok: Más cserjékkel, évelőkkel kombinálva szép hátteret biztosít.

Szegélynövény: Magasabb ágyások, utak szegélyezésére virágzó sövényként.

Konténeres növény: Teraszon, erkélyen nagyobb cserépben, dézsában is tartható.

Városi kertek: Jól tűri a városi klímát.

Vágott virág: Illatos virágai vázában is sokáig elállnak.

Természetes hangulatú kertek: Tökéletes választás vadvirágos, természetközeli kertekbe.

Ajánlott növénytársítások:

Sárga virágú évelők: A kék és sárga klasszikus, élénk kontrasztot alkot. Társítsuk cickafarkkal (Achillea), napvirággal (Helianthus) vagy sárga kasvirággal (Rudbeckia).

Fehér virágú évelők: A kék és fehér elegáns, letisztult kombinációt alkot, például fehér kasvirággal (Echinacea purpurea 'White Swan') vagy fehér fátyolvirággal (Gypsophila paniculata).

Rózsaszín virágú évelők: A kék és rózsaszín lágy, romantikus hangulatot teremt. Társítsuk réti kakukkszeggel (Lychnis flos-cuculi) vagy rózsaszín haranglábbal (Campanula).

Díszfüvek: A könnyed, mozgó díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a kínai ezüstfű (Miscanthus sinensis), szépen kiegészítik a nyáriorgona strukturális habitusát.

Ezüstös lombozatú növények: A kék virágok és az ezüstös levélzet elegáns, modern kombinációt alkot, például gyapjas tisztesfűvel (Stachys byzantina).

Narancssárga virágú japánbirs	**Chaenomeles 'Orange Trail'**	3 450 Ft	3 450 Ft

A Chaenomeles 'Orange Trail' japánbirs egy kifejezetten figyelemfelkeltő cserje. Tavaszi virágzásakor élénk narancssárga virágokat hoz, amelyek csodálatos kontrasztot képeznek a zöld levelekkel. A virágok nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem vonzzák a méheket és más beporzókat is, ezzel segítve a kert biodiverzitását.
Az 'Orange Trail' japánbirs gyümölcse ősszel érik be, sárgás-narancs színű terméseket produkál.
E cserje növekedési formája kompakt és elágazó, ami lehetővé teszi, hogy ideális választás legyen keretek, sövények vagy akár sziklakertbe is. A Chaenomeles 'Orange Trail' növény könnyen gondozható, alkalmazkodik a változó talajviszonyokhoz és jól tolerálja a szárazságot.

Narancsvirágú illatcserje	**Osmanthus fragrans var. aurantiacus 'Rubra'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Narancsvirágú illatcserje 'Rubra' (Osmanthus fragrans var. aurantiacus 'Rubra') – Az aranyszínű, illatos őszi virágú cserje
A narancsvirágú illatcserje 'Rubra' az olajfafélék (Oleaceae) családjába tartozó, Kelet-Ázsiából (Kína, Japán, Himalája) származó, örökzöld cserje vagy kis fa. A faj a „fragrans” (illatos) névvel rendelkezik, ami a virágok rendkívüli illatára utal. A 'Rubra' fajtajelzés a virágok élénk narancssárga színére vonatkozik. Ez a növény a nyár végén és ősszel nyíló, élénk színű és rendkívül illatos virágaival az egyik legkedveltebb díszcserje a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a jó mésztűrése és a kellemes illata miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás. A virágokat a kínai kultúrában teaszirup, édességek és parfümök készítésére is használják.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A narancsvirágú illatcserje 'Rubra' egy sűrű, bokros növekedésű, örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 3-4 méter (a termőhelytől függően elérheti az 5-10 métert is), szélessége 1,5-2,5 méter között alakul. Koronája kerekded, sűrű, ami a növénynek kompakt, elegáns megjelenést kölcsönöz.
A levelek sötétzöldek, fényes felületűek, elliptikusak vagy hosszúkásak, 10-14 cm hosszúak, bőrszerűek, szélük enyhén fűrészes vagy ép. A levelek keresztben átellenes állásúak, és a növény sűrű, zárt lombozatát alkotják.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a levélhónaljakban kialakuló, laza csoportokban (fürtökben) helyezkednek el. A virágok kicsik, csöves, tölcsér alakúak, négy karéjos szirmúak, élénk narancssárga színűek. A 'Rubra' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok rendkívül erős, édeskés, sárgabarack- vagy őszibarackra emlékeztető illata. Az illat intenzívebb, mint a fehér virágú alapfajé, és a környező teret is betölti. A virágzási időszak a késő nyártól a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően szeptembertől novemberig. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, kékesfekete bogyókat fejleszt. A növény dugványozással szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A narancsvirágú illatcserje napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legbőségesebb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. Forró nyári éghajlaton a délutáni árnyék előnyös.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos és agyagos talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében savanyútól a lúgosig sokoldalúan toleráns. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, humuszban gazdag, semleges vagy enyhén savanyú talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után jól tűri.

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőbbek, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy adag lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágyát, vagy egy réteg (3-5 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A narancsvirágú illatcserje alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de jól tűri a metszést, és sövényként vagy formára vágva is nevelhető. A metszést kora tavasszal (február-március) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat.

Sövénymetszés: Sövényként ültetve a növényt a virágzás után nyírjuk vissza a kívánt magasságra és formára.

Telelés és fagytűrés: A narancsvirágú illatcserje mérsékelten télálló; a kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -15°C-ig terjedő hőmérsékletet is. Magyarország nagy részén (USDA 6-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen mulccsal takarni. Hideg, szeles teleken visszafagyhat, de tavasszal rendszerint újra kihajt. Konténerben nevelve a növény télen védett, hűvös (5-10°C), világos helyre vihető.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A narancsvirágú illatcserje a késői, élénk színű és rendkívül illatos virágzásának, örökzöld lombozatának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserje:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliter növényként – a sűrű habitus, a szép lombozat és a látványos virágzat miatt kiváló magányos díszelem, különösen a ház bejáratánál vagy az ablakok közelében, ahol illata élvezhető.

Illatos sövényként – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt kiváló választás virágzó, illatos sövények kialakítására.

Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – kiválóan nevelhető konténerben is, ahol télen könnyen védhető, és illata a teraszon is élvezhető.

Vegyes cserjeágyásokba, alacsony sövényekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok illata vonzza a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A narancsvirágú illatcserje narancssárga virágai és sötétzöld lombozata számos más növénnyel kombinálhatók:

Más örökzöld cserjékkel: Viburnum tinus, Photinia, babérmeggy (Prunus laurocerasus) – a sötétzöld háttér kiemeli a virágok élénk színét.

Lila virágú növényekkel: Levendula (Lavandula) – a lila és a narancs szívek kontrasztos, vibráló hatást keltenek.

Fehér virágú növényekkel: Fehér virágú cserjékkel és évelőkkel – a fehér és a narancs szívek elegáns, tiszta hatást keltenek.

Más olajfa fajtákkal: Osmanthus heterophyllus, Osmanthus ilicifolius – a különböző levelekkel és virágokkal rendelkező olajfafajták egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a narancsvirágú illatcserje mérsékelten télálló; az USDA 7-es, 8-as és 9-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) védett, szélvédett helyen, takarással nevelhető. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -15°C-ig terjedő hőmérsékletet is, de a tartós fagyok károsíthatják.)

Nero fekete berkenye - gyökérnemes	**Aronia melanocarpa 'Nero'**	3 450 Ft	3 450 Ft
Nikko Blush rózsaszín gyöngyvirágcserje	**Deutzia x rosea 'Nikko Blush'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Deutzia x rosea 'Nikko Blush' egy igazi kerti gyöngyszem, amely a híres 'Nikko' gyöngyvirágcserje és a Deutzia x rosea 'Carminea' keresztezéséből született. Ez a bájos hibrid egyesíti a 'Nikko' megbízható, terjedő habitusát a rózsaszín virágok romantikus bájával. Késő tavasszal hozza el varázslatos virágzását, amikor a sötétebb rózsaszín bimbókból kinyíló, lágy pasztellszínű virágok szinte elfeledtetik a lombozatot.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Nikko Blush' egy alacsony, terülő habitusú lombhullató cserje, amelynek ágai kecsesen ívesen lehajlanak, természetes, lágy formát adva a növénynek. Levelei lándzsásak, élénkzöldek, egészséges megjelenésűek. Virágai aprók, csillag alakúak, és a hajtások mentén nyíló tömött fürtökben jelennek meg. A virágok színe egyedi: a bimbók sötétebb rózsaszínek, amelyek kinyílva lágy, pasztell rózsaszínné halványodnak, így a virágzás során gyönyörű színátmenetek figyelhetők meg a növényen. Kifejlett magassága 60-90 cm, szélessége pedig elérheti a 90-120 cm-t, így kiváló talajtakaró vagy szegélynövény.
Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen is szépen fejlődik. A legdúsabb virágzást napos fekvésben hozza, de a melegebb éghajlaton a félárnyékos hely kifejezetten előnyös lehet számára.

Talaj: Nem igényes, az átlagos kerti talajokban jól érzi magát, amennyiben az jó vízáteresztő képességű. A pangó vizet nem tolerálja.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a berácsozódásig. Idősebb korában szárazságtűrő, de a hosszan tartó aszályos időszakokban hálás a locsolásért.

Télállóság (USDA-zóna): A 'Nikko Blush' USDA 4-8 zónákban teleltethető biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén megbízhatóan télálló, különösebb védelem nem szükséges számára.

Metszés: Mivel a virágokat az előző évi hajtásokon hozza, a metszást közvetlenül a virágzás után (június-július fordulóján) kell elvégezni. Ilyenkor a virágzott hajtásokat vághatjuk vissza kb. egyharmadukkal, hogy serkentsük az új hajtások képződését. 2-3 évente az elöregedett, idősebb ágakat tőből is kivághatjuk a növény megfiatalítása érdekében.

Ellenállóság: Kiválóan ellenáll a szarvasok kártételének, és általában a kártevők, betegségek is elkerülik.

Kertstílus és növénytársítások:
Kis mérete és lágy rózsaszín virágai miatt sokféleképpen felhasználható:

Kis kertek, előkertek: Ideális választás, ahol kevesebb a hely, de szeretnénk egy különleges, mégis gondozásmentes növényt.

Szegélyek, alacsony sövények: Tömegével ültetve alacsony, virágzó szegélyt alkothatunk belőle utak, teraszok vagy ágyások mentén.

Talajtakaró: Terjedő habitusával szőnyegszerűen borítja be a talajt, kiválóan alkalmas gyomosodás megelőzésére nagyobb felületeken.

Vegyes évelőágyások: Alacsony termete miatt az ágyások elejébe ültetve remekül érvényesül, és szép átmenetet képez a magasabb cserjék és a talajtakarók között.

Romantikus, házikós kertek: Pasztellszínei és bőséges virágzása illik a lágy, természetes hangulatú kertekbe.

Ajánlott növénytársítások:

Kék és lila virágú évelők: A pasztell rózsaszín gyönyörűen kiegészíti a kék és lila színeket. Társítsuk kék macskamentával (Nepeta), levendulával vagy kék pázsitviolával (Aubrieta).

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fehér virágú növények: Klasszikus elegancia: a fehér gyöngyvirág vagy fehér árnyékliliom (Hosta) kiemeli a 'Nikko Blush' rózsaszínjét.

Sárga levelű dísznövények: Kontrasztos színfoltként ültessük aranylevelű borbolya (Berberis 'Aurea') vagy sárga kecskerágó (Euonymus 'Emerald 'n' Gold') mellé.

Tavaszi hagymások: Virágzási ideje egybeesik a késői tulipánokéval. Válasszunk hozzá fehér vagy lila tulipánokat.

Konténerbe is ültethető: Teraszon, erkélyen cserépben is tartható, ahol közelről élvezhetjük virágpompáját.

. USDA zóna 5b

Nyugati szamócafa	**Arbutus unedo**	3 900 Ft	4 550 Ft

Az Arbutus unedo, más néven Nyugati szamócafa, különlegesen díszítő örökzöld cserje vagy kis fa, amely a Mediterrán térségben és az Atlanti-óceán partvidékén őshonos. A növény jellegzetes megjelenésének köszönhetően ideális választás lehet a kertekben és parkokban.
Kifejlett állapotában akár 5-10 méter magasságig is megnőhet. Lombozata sötétzöld, fényes és bőrnemű, ami egész évben vonzó megjelenést kölcsönöz a növénynek. Tavasztól nyár végéig apró, krémszínű vagy rózsaszín virágokkal díszített. Ezek a virágok gyakran vonzzák a méheket és más beporzókat.
Gyümölcsei körülbelül diónyi méretűek és pirosak, majd sárgára érnek. A gyümölcs érettségi ideje ősszel van, és ízletes, édeskés, enyhén fanyar íze miatt sokan szívesen fogyasztják frissen vagy például lekvár és kompót készítéséhez.
Gondozási útmutató:

Talaj és ültetés: Ültessük a Nyugati szamócafát jó vízáteresztésű talajba. A tavasz vagy ősz a legjobb időpont az ültetésre.

Napfény: A növény szereti a napfényt, de jól tűri az enyhe árnyékot is, különösen a forró nyári hónapokban.

Öntözés: A Nyugati szamócafa mérsékelt öntözést igényel. Nyáron tartsuk a talajt enyhén nedvesen, de kerüljük a túlzott öntözést, ami károsíthatja a gyökereket.

Trágyázás: Az év elején, tavasszal vagy kora nyáron trágyázzuk meg a növényt általános célú lassú felszabadulású műtrágyával.

Metszés: Az Arbutus unedo kevésbé igényel metszést, de az elhalt vagy beteg ágakat távolítsuk el rendszeresen. Az alakító metszést a tél végén vagy tavasszal végezzük.

Gyümölcsszedés: Az érett gyümölcsöket óvatosan szedjük le ősszel. A friss gyümölcsöt akár nyersen is fogyaszthatjuk, vagy felhasználhatjuk különböző ételek és italok készítéséhez.

A Nyugati szamócafa egy gyönyörű dísznövény, amely emellett finom gyümölcsöt is kínál. Ha megfelelő gondozás mellett, sokáig élvezhetjük a növény látványát és ízletes gyümölcseit is.
8a-10b USDA-zóna

Örökzöld bangita	**Viburnum tinus**	3 950 Ft	4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Viburnum tinus (Örökzöld bangita) a Földközi-tenger térségéből származik, ahol mind az európai, mind az afrikai oldalon megtalálható. Az egyik legrégebben ültetett dísznövénye a nyugat-európai, főleg az angol kerteknek. Nem tévedés, már 500 éve is ültették Angliában. Mindez nem véletlen, mert egy kifejezetten dekoratív megjelenésű, akár 3-4 m magasra megnövő örökzöld cserje, melynek fehér virágai tél végén-kora tavasszal szinte teljesen beborítják az egész növényt. Nálunk csak védett helyre érdemes ültetni a szabadba, de kiváló megoldás teraszokra dézsás növényként is!

Külső tulajdonságok

Magasság és forma: 2–3 méter magasra és hasonló szélességre nő, sűrű, felálló vagy kerekded habitussal.

Levelek: Bőrszerű, fényes sötétzöld, ovális vagy lándzsa alakú, 4–10 cm hosszú. Az alsó levélfonákban szőrcsomók (domatia) találhatók, amelyek ragadozó atkák számára nyújtanak menedéket.

Virágok: Rózsaszín rügyekből nyílnak fehér, illatos virágok, amelyek tömött ernyős virágzatokban (5–10 cm átmérőjű) nyílnak.

Termés: Metálkék, majd éréskor fekete színű, 5–7 mm-es bogyók, amelyek madarak számára vonzóak, de emberek számára mérgezőek lehetnek.

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félig árnyékos helyeket kedvel. Teljes árnyékban gyengébben virágzik.

Talaj: Jól vízelvezető, laza talajt preferál (agyon, homokon vagy közepes talajon is megfelelően nő). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, de a kifejlett növények szárazságot is jól tolerálnak.

Táplálás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott műtrágya vagy komposzt alkalmazható a egészséges növekedés érdekében.

Metszés: Ritkán igényel metszést. Ha szükséges, tavasszal, a virágzás után visszavágható a forma megőrzése vagy a sűrűség növelése érdekében.

Télállóság: -10°C-ig teljesen télálló, de fiatal növényeket érdemes mulccsal védeni a talajfagy ellen.

Ültetési javaslatok

Időzítés: Tavasz vagy ősz ideális, amikor a talaj nedves és a növény kevésbé aktív.

Távolság: Sövényként ültetve 1-1,5 méteres távolságot ajánlunk a zárt hatás érdekében.

Hely: Használható sövényként, határok kialakítására, vagy akár erdei kerti környezetben i

Alkalmazási javaslatok

Sövényként: Gyors növekedése és sűrű ágrendszere miatt kiváló élő kerítés vagy zaj- és szélfogó.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliterként: Egyedülálló téli virágzása és éves megjelenése miatt feltűnő fókuszpontot teremt a kertben.

Csoportos ültetés: Más örökzöldekkel (pl. tuják) kombinálva kontrasztos hatást érhetünk el3.

Városi környezet: Jól tolerálja a szárazságot és a szennyezett levegőt36.

A bangita madárbarát növény, bogyói madarak számára vonzóak, és leveles ágai menedéket nyújthatnak a kisebb állatok számára38.
Az örökzöld bangita nemcsak díszít, hanem praktikus funkcióval is bír: például por- és zajvédelmet nyújt, és gyorsan növekvő habitusa miatt rövid idő alatt zárt sövényt alkot.

7b-10a USDA-zóna

Örökzöld orbáncfű	**Hypericum calycinum**	2 250 Ft	2 750 Ft

Az Örökzöld orbáncfű különösen ideális talajtakaráshoz, hiszen gyorsan terjed, és hatékonyan megakadályozza a gyomok növekedését. Akár napos, akár félárnyékos helyen fejlődik, a növény jól tűri a változó talajviszonyokat és a szárazságot is, így rendkívül strapabíró.
Gondozási Útmutató:

Öntözés: Általában mérsékelt vízszükségletű, célszerű a túlzott öntözés elkerülése.
Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet igényel, de a teljes napsütésben a legszebben fejlődik.
Tápanyag: Érdemes tápoldatot alkalmazni tavaszi és nyári időszakban, hogy fokozzuk a virágzást.
Ápolás: A virágzás után ajánlott a visszavágás a sűrűbb növekedés érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

Talajtakaráshoz, kerti szegélyekhez
Sziklakerti elemekhez és alacsony növényalkalmazásokba
Használhatjuk szegélyként
gyomosodás ellen, miközben színt és teksztúrát ad a kerthez

Eurázsia déli részein elterjedt, 30-50 cm magas örökzöld félcserje. Vagyis a tövénél kissé fásodott szára a hajtás vége felé már lágy szárba megy át. Több, nem elágazó hajtása ívesen egymásra hajlik, így habitusa puha hamvaszöld leveleivel egy nagy zöld párnára emlékeztethet. A növény indákkal terjed, jól tűri a szárazságot, ezért száraz, pázsit számára elfoglalhatatlan területeket is szépen lefedi, kiváló talajtakaró. Virágai nyáron, május végétől augusztusig láthatóak, jellegzetes illatúak. Bár levelei egy részét fenntartja télen, egy intenzívebb levélhullás tapasztalható a késő őszi időszakban, ami nem jelent veszélyt a növényre nézve. Gyors terjedése, és igénytelensége miatt inkább nagyobb kertekbe, vagy mostoha tulajdonságokkal bíró felületekre javasolható. Szárazságtűrése mellett egy kis gondozást, öntözést meghálál, ugyanakkor hasznos tavasszal erősebb visszametszése annak érdekében, hogy dúsabb lombozatot neveljen.

6b USDA-zóna

Ostormén bangita, Ostorménfa	**Viburnum lantana**	2 190 Ft	2 650 Ft

A Viburnum lantana (Ostormén bangita, Ostorménfa), mint egy nagy természetes elterjedési területtel bíró európai faj, nagyon jól érzi magát nálunk az egész ország területén. A májusi virágzást követően a nyár végére nagy mennyiségben érleli pirosas, később fekete terméseit, ami jelenti a fő díszértékét.

5a-9b USDA-zóna

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Oszlopos arizóniai ciprus	**Cupressus arizonica 'Fastigiata'**	8 500 Ft	8 500 Ft
Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna			
Palmowa fűz	**Salix × erdingerii 'Palmowa'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Palmowa fűz egy különleges, lombhullató cserje vagy kis fa, amely nevét egzotikus, pálmaszerű megjelenéséről kapta. Ez a gyors növekedésű fűzfa ideális választás azok számára, akik egy mediterrán vagy egzotikus hatású, mégis teljesen télálló növényt keresnek a kertbe.
Külső megjelenés
A Palmowa fűz egy feltűnő megjelenésű, laza, elágazó szerkezetű cserje, amely akár 5-6 méteres magasságot is elérhet, széles, terebélyes koronát nevelve. Idősebb korban akár magas törzsre oltott 'sztobri' formában is megvásárolható, ami egy dekoratív, kis fa hatását kelti.
A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a lombozat: levelei hosszúak, vékonyak, keskenyek, lándzsás formájúak, hasonlóan egy bambuszhoz vagy egy kis pálmalevélhez. A levél színe felül szürkészöld vagy kékeszöld, míg a fonákja ezüstösen csillog, ami egész nyáron át egzotikus, friss megjelenést kölcsönöz a növénynek. Ősszel a lombozat gyönyörű aranysárga, narancssárga árnyalatokba borul.
A fiatal hajtások vékonyak, hajlékonyak, színük vörösesbarna vagy cserzőbarna, ami szintén egy trópusi, bambuszra emlékeztető képet fest. Még télen, lomb nélkül is mutatós a színes hajtásainak és formájának köszönhetően.
Virágzás
A Palmowa fűz kora tavaszi virágzása a legnagyobb dekorációs értéke. Már március-áprilisban, még a levelek megjelenése előtt, a hajtások végén megjelennek a nagy, feltűnő barkák. A barkák kezdetben ezüstszürkék, bársonyosak, majd a porzós barkák a virágpor beérésével élénk sárgára színeződnek. A virágok enyhén illatosak, kellemes, édeskés illatot árasztanak és kiváló méhlegelőként szolgálnak, hiszen ez az egyik legkorábbi tavaszi táplálékforrás a méhek és más rovarok számára.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. A napos fekvésben a legszebb a lombozat színe és a legbőségesebb a virágzás.

Talaj: Nem válogatós, de a legjobban a tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű, de nedvességet megtartó talajban érzi magát. A pangó vizet nem szereti, de rövid ideig tartó elárasztást elviseli. Sótűrő képessége miatt városi környezetben is jól érzi magát.

Öntözés: Közepes vízigényű, de a fiatal növényeknél és vízhiányos időszakokban a mélyebb, átvezető öntözést meghálálja. Különösen fontos a gyökérnövekedés első évében.

Tápanyag-utánpótlás: Kifejezetten tápanyagigényes. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával érdemes megtámogatni a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A Palmowa fűz kiválóan tűri a metszést. A legjobb időpont a metszésre a kora tavasz, virágzás után, mielőtt a levelek teljesen kihajtanának. Az idősebb, elöregedett hajtásokat a talaj közelében vissza lehet vágni, ami serkenti az új, fiatal hajtások növekedését. Metszéssel korlátozható a mérete, illetve sűrű, bokros formára is nevelhető.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény akár -25°C, sőt -30°C-ig is ellenáll a hidegnek, így Magyarország egész területén gond nélkül tartható.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de időnként levéltetvek támadhatják meg. Ritkán előfordulhat lisztharmat is, de komolyabb betegségekre nem hajlamos.

Kertstílus, ahová illik
A Palmowa fűz rendkívül sokoldalú növény, számtalan kertstílusba illeszkedik:

Japánkertekbe, keleties hangulatú kertekbe: Egzotikus levelei és a gondozott formája tökéletesen illeszkedik ezekbe a stílusokba.

Természetes kertekbe, vadvirágos rétek szélére: Laza, levegős habitusa és korai virágzása miatt ideális választás.

Modern, mediterrán kertekbe: A pálmaszerű lombozata mediterrán hangulatot varázsol.

Vízparti kertekbe, patakok, tavak mellé: Mivel szereti a nedves talajt, kiválóan ültethető víz közelébe.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Városi és előkertekbe: Ellenálló a szennyeződésekkel szemben, és gyors növekedésével hamar elfedi a nem kívánt kilátásokat.

Változatos növénytársítások
A Palmowa fűz ezüstös-zöld lombozata és vöröses hajtásai kiválóan kombinálhatók más növényekkel:

Lila és bordó levelű növények: A vörös díjszilva, a sötét levelű vérszilva vagy a törpe borbolya gyönyörű kontrasztot alkot a világos lombozattal.

Tarka levelű növények: Különböző tarka levelű cserjék és évelők tovább fokozzák a változatosságot.

Díszfüvek: A tollbuga, a japán vértfű vagy a kék csenkesz szintén jól passzolnak hozzá, hasonló igényeik miatt.

Árnyéki évelők (a fa alá, tövébe): A laza, áttört koronája alá ültethetők árnyékliliomok, tüdőfű, páfrányok.

Tavasszal virágzó hagymások: A krókuszok, nárciszok a Palmowa fűz barkái alatt a talajszinten is szépen mutatnak.

USDA besorolása: 5-8 (Magyarország egész területén, 5b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).

Parsley Crested borostyán	Hedera helix 'Parsley Crested'	3 950 Ft	4 250 Ft

A Parsley crested borostyán egy különlegesen mutatós kúszónövény leveleivel, amelyek finoman fodrosak, és ezzel szép textúrát adnak a kerthez vagy a belső térhez. A levelek örökzöldek, így egész évben zöldellnek, frissességet és életerőt kölcsönözve a környezetnek.
A Parsley crested borostyán kúszó hajtásai kiválóan alkalmasak falak, kerítések, vagy egyéb felületek beborítására. Levelei változatos helyzettel díszítik a kerteket, ami fiatalos frissességet biztosít. A levelek zöld színe élénkít minden szegletet, míg a kúszónövények edzett természetük révén szinte bármilyen környezetben megélnek.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A részben árnyékos helyet kedvel, de a közvetlen napfényt is elviseli. Az ideális fejlődés érdekében a részleges árnyék a legelőnyösebb.
Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj a legideálisabb. A borostyán jól tűri a különböző talajtípusokat, beleértve a mész- és agyagos talajokat is.
Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges a fiatal növények esetében, hogy segítsük a gyökerek stabilizálását. Az idősebb példányok a szárazabb körülményeket is elviselik, de a tápanyagfelszívás és növekedés érdekében hasznos a rendszeres öntözés.
Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott műtrágya használata a növény aktív növekedési időszakában.
Téliesítés: A Hedera helix 'Parsley Crested' fagyálló, de a legnagyobb hidegben érdemes védett helyre ültetni, hogy megóvjuk a fagyás következményeitől.

Felhasználási lehetőségek:

A Parsley Crested Borostyán kúszó növény ideális szoliter növényként, valamint kerítések, falak vagy pergolák beborítására.
Dekoratív kosarakban vagy balkonládákban is gyönyörűen mutat, elegáns látványt nyújtva.
Kert szépségének fokozására is alkalmas, különböző növényekkel kombinálva érdekes és változatos kompozíciót alkothatnak.

A Parsley crested borostyán könnyen gondozható és vonzó megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni egyaránt a kerteket és az otthonokat.

Pink Beauty babérlevelű bangita	Viburnum nudum 'Pink Beauty'	14 900 Ft	15 200 Ft

A Viburnum nudum, közismert nevén babérlevelű bangita, egy kerekded, több szárú, felfelé terjeszkedő, lombhullató cserje, amely a vadonban jellemzően 1,5-3,6 méter magasra és szélesre nő. Az Egyesült Államok keleti és délkeleti részén, Connecticuttól Floridáig és Louisianáig, alacsony erdőkben, mocsarakban és lápokban őshonos. Májusban-júniusban aromás fehér virágai lapos tetejű fürtökben (5-12 cm széles fürtök) nyílnak. A virágokat tojásdad bogyók fürtjei követik, amelyek színe érésük során változik, a világos rózsaszíntől a mély rózsaszínen át a kékig és a lilás feketéig. A bogyók erősen savasak, de ehetők. Ellipszis vagy hosszúkás, lándzsás, fényes, sötétzöld levelek (akár 10 cm hosszúak is). A lombozat ősszel néha vonzó bordószínűből sötétvörös-lilába változik. Nyár végén és kora őszben gyakran megjelennek ugyanazon a fürtön a mély rózsaszín és a kékeslila árnyalatú bogyók is, feltűnő kontrasztban a lombozattal.
Fényigény: teljes nap, esetleg félárnyék
Talajigény: normál kerti talajt igényel
Vízigény: átlagos
Fagytűrés: télálló
USDA zóna: 5b - 9a

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Pink Blush japán szentfa	**Nandina domestica 'Pink Blush'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Pink Blush japán szentfa a Nandina domestica egyik legkedveltebb, színes lombozatú kompakt változata. Nevéhez híven („rózsaszín pirulás”) a fajta a növény különböző életszakaszaiban mutatja a rózsaszín és a piros különböző árnyalatait, így egész évben változatos színfoltot biztosít a kertben.
Külső megjelenés
A Pink Blush japán szentfa kompakt, bokros növekedésű, feltörő, bambuszra emlékeztető szárakkal rendelkezik. Kifejlett magassága és szélessége 0,6-1 méter között alakul, ami ideálissá teszi kis kertekbe, előkertekbe és konténerekbe. A növekedési erélye közepes.
A növény legnagyobb dísze a lombozat évszakonként változó színjátéka:

Tavasszal: Az új hajtások élénk rózsaszín színben fakadnak, a fiatal levelek márványozott, pettyezett mintázatot mutatnak rózsaszín és zöld árnyalatokkal.

Nyáron: Az idősebb levelek sötétzöld színűvé válnak, miközben a fiatal hajtásokon továbbra is megjelenik a rózsaszín foltozottság.

Ősszel és télen: Az egész növény intenzív bordóvörös vagy piros színbe borul, ami a hideg idő beköszöntével egyre mélyül. Ez a téli szín a kert egyik legfeltűnőbb dísze lehet.

A levelek szárnyalt összetettek, lándzsás levélkékből állnak, hasonlóan a többi japán szentfához. Tavasszal a növény apró, fehér virágokat hozhat kúpos bugavirágzatban, amelyeket a nyár végén, ősszel apró, élénkpiros bogyós termések követhetnek. A termések a madarak kedvelt csemegéi.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy napos helyet egyaránt kedvel. A legélénkebb, legintenzívebb rózsaszín és őszi piros színt napos fekvésben hozza. Félárnyékban a lombozat színe kevésbé élénk, a rózsaszín foltok halványabbak lehetnek.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag talajt igényel, bár a legtöbb talajtípushoz alkalmazkodik (homok, vályog, agyag). A pH tekintetében nem válogatós: a savanyú, a semleges és a lúgos (meszes) talajokat is tolerálja. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrők.

Tápanyag-utánpótlás: Alacsony tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható.

Metszés: A Pink Blush kompakt, természetesen szép formájú, ezért rendszeres metszést nem igényel. A metszést elviseli, de nem szükséges a forma megtartásához. Szükség esetén késő télen vagy kora tavasszal lehet formázni.

Telelés: USDA besorolása 6-10. A növény a 6-os zónában (ahová Magyarország nagy része is tartozik) félévelő lehet, télen a levelek egy részét vagy egészét hullathatja, sőt a szárak is visszafagyhatnak a talajszintig, de tavasszal újra kihajt. Védett, szélvédett fekvésbe (házfal mellé) ültessük, és a fiatal növényeket télen vastag lombtakaróval mulcsozzuk. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, pince) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, kártevők nem támadják. A szarvasok és nyulak is kerülik. Lúgos (meszes) talajban a levelek klorózisosak (sárgulhatnak) lehetnek.

Kertstílus, ahová illik
A Pink Blush japán szentfa a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Ázsiai (japán, kínai, zen) kertekbe: A növény textúrája és évszakos színváltása tökéletesen illik az ázsiai kertek esztétikájába.

Modern, letisztult kertekbe: Egységes, kompakt formája miatt ideális választás.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Természetes, erdős kertekbe: A természetes színátmeneteket mutató lombozata harmonikusan illeszkedik.

Városi kertekbe, előkertekbe: Kompakt mérete és alacsony igényei miatt kisebb kertekbe is beilleszthető.

Konténeres teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe: Tökéletes választás dézsákba, cserepekbe, mivel lassú növekedésű és jól bírja a szűk helyet.

Szegélynövényként, alacsony sövényként: Metszés nélkül is sűrű, színes szegélyt alkothat.

Változatos növénytársítások
A Pink Blush élénk rózsaszín és bordóvörös lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel:

Sötét lombozatú növények: Vörös levelű borbolya (Berberis), sötét törpe boróka, japán vértfű (Imperata cylindrica) – a sötét színek kiemelik a növény világosabb rózsaszín árnyalatait.

Lila és kék virágú évelők: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia) – a lila-kék színek a rózsaszínnel harmonikus, romantikus kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – az ezüstös szürke kiemeli a rózsaszín és piros árnyalatokat.

Sárga levelű növények: Arany borbolya (Berberis thunbergii 'Aurea'), Sundance mexikói narancsvirág (Choisya 'Sundance') – a sárga és a rózsaszín élénk, vidám párost alkot.

Díszfüvek: Tollbuga (Molinia), kínai ezüstpázsit (Miscanthus), japán erdeifű (Hakonechloa macra) – a füvek laza, mozgó habitusa oldja a növény tömött formáját.

Alacsony talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

USDA besorolása: 6-10 (Magyarországon a 6b-7b zónákban a növény szabadföldben is nevelhető, de védett, szélvédett helyre és vastag téli mulcsrétegre van szüksége, mivel a levelei a téli hidegben elfagyhatnak. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes helyen kell teleltetni).

Pink Delight nyáriorgona	**Buddleia davidii 'Pink Delight'**	2 950 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Pink Delight nyáriorgona egy csodálatos, lombhullató díszcserje, amely nemcsak szépségével, hanem ellenállóságával és könnyű gondozásával is meghódítja a kertbarátok szívét. Ez a fajta a nyáriorgonák egyik legszebb rózsaszín változata, amely egész nyáron át tartó virágzással és ellenállhatatlan illattal hálálja meg a törődést.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Pink Delight' gyors növekedésű, felálló, enyhén ívesen hajló ágrendszerű cserje. Levelei lándzsás alakúak, sötétzöldek, fonákuk enyhén szürkészöld. Legfőbb díszei a hajtásvégeken nyíló, hatalmas, akár 40-50 cm hosszú, tömött fürtvirágzatai, amelyek színe a virágzás során is megmaradó, tiszta, élénk rózsaszín. Kifejlett korban 2-3 méter magas és 1,5-2,5 méter széles terjedelmes bokorrá nő.
Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napkedvelő, a bőséges virágzáshoz legalább napi 6-8 óra közvetlen napsütésre van szüksége. Félárnyékban kevesebb virágot hoz.

Talaj: Nem igényes, az általános kerti talajokban jól fejlődik. Ideális esetben jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag közegbe ültessük.

Öntözés: Közepes vízigényű. Ültetés után és tartós szárazság idején rendszeresen öntözzük. A túlöntözést kerüljük.

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású műtrágyával keverjük a talajt a bőséges virágzás érdekében.

Metszés (a dús virágzás kulcsa):

Tavaszi metszés (február-március): Vágjuk vissza az előző évi hajtásokat erőteljesen, akár 20-30 cm-re a talajtól. Erre a tőből új, erős hajtások fejlődnek, amelyek végén a virágok jelennek meg.

Elnyílott virágzatok eltávolítása: Az elszáradt virágfejeket rendszeresen vágjuk le. Ezzel újabb virágok nyílására ösztönözzük a növényt, meghosszabbítva a virágzási időt.

Kertstílus és növénytársítások:
A nyáriorgona sokoldalúan felhasználható, elsősorban a következő stílusú kertekbe illik:

Természetközeli és vadvirágos kertek: Kiváló pillangó- és méhcsalogató, így a biodiverz kertek ékköve.

Vidéki és romantikus kertek: Illatos, rózsaszín virágai jól illenek a laza, lágy vonalvezetésű kertekbe.

Ágyások hátterébe ültetve csodálatos hátteret biztosít.

Ajánlott növénytársítások:

Kontrasztos színek: A 'Pink Delight' rózsaszínje gyönyörűen kiemeli a sötétlila gyöngyikét vagy a sötétlila lombozatú borbolyákat. Remekül mutat mellette a sötétebb virágú nyáriorgona, mint a 'Black Knight'.

Évelő virágok: Ültessük köré korai virágzójú évelőket, például nőszirmokat vagy lángvirágot, így az ágyás folyamatosan virágzó lesz.

Díszfüvek: A nyáriorgona laza szerkezetét remekül kiegészítik a keskeny levelű díszfüvek, mint a kékperje vagy a tollborzfű.

Felhasználható szoliterként (magányosan), laza csoportokban, vagy akár nyírott sövényként is.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fontos megjegyzés: bár a növény kiváló nektárforrás a lepkék számára, hernyók tápnövényeként nem szolgál. Éppen ezért érdemes a kertben olyan őshonos növényeket is telepíteni (pl. cickafark, kasvirág, mézontófű, iszalag), amelyek a lepkék fejlődéséhez is szükségesek.			
Pink Diamond bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'**	4 450 Ft	4 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' egyedülálló színváltozásáról híres, mely a fehértől az élénk rózsaszínig változik. Ez a látványos, télálló cserje erős, felálló ágakon hordja nagy, kúp alakú virágait. Konténeres növényként szállítjuk, biztosítva gyors beerdősülését.

Színárnyalatok: A nyár elején krémfehér virágai nyár közepén rózsaszínűek lesznek, majd ősztől sötét rózsaszínűre mélyülnek.

Méret: Energetikus növekedésű, 2-3 m magas és 1,5-2 m széles cserjévé fejlődik.

Ültetési távolság: 1,5-2 m távolsággal ültetve optimálisan fejlődik.

Kiválóan alkalmazható soliterként, virágzó sövényként vagy nagyobb kertek domináns elemeként.
Gondozási útmutató
A Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' gondozása

Fényigény: Napos vagy félig árnyás helyen érzi magát a legjobban.

Öntözés: Közepes vízigényű. Szárazságot kerülni kell, különösen nyáron.

Talaj: A laza, nedves, humuszban gazdag talajt részesíti előnyben.

Trágyázás: Tavasszal hortenziákra specializált trágyával vagy lassú hatású műtrágyával támogatható.

Metszés: Tavasszal (március) erősen visszavágható (2-3 rügyre), mivel az idei év hajtásain hozza a virágot.

Ültetési javaslat
Helyválasztás és ültetési tippek:

Hely: Napos vagy félig árnyás, széltől védett terület.

Ültetés: A konténeres növényt tavasztól őszig ültethetjük.

Távolság: Legalább 1,5-2 m távolságot tartsunk más növényektől.

Ötletek:

Szolitereként ültetve hangsúlyozza virágainak elegáns szépségét.

Több példányból laza, virágzó határoló sövény alakítható ki.

Nagy cserépben terasz- vagy kerti díszként is remekül funkcionál.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' egy igénytelen, de lenyűgöző virágú cserje, mely évtizedekig ékesíti kertet!

6a-9b USDA-zóna

Pink Marble tarka korallberkenye	**Photinia x fraseri 'Pink Marble'**	3 900 Ft	4 230 Ft

A Photinia x fraseri 'Pink Marble' egy közepes termetű díszcserje, amely elérheti a 2-3 méter magasságot és szélességet. A korallberkenye nevét a levelek új hajtásokban megjelenő élénk rózsaszínű árnyalatáról kapta, melyek idővel zöld árnyalatúvá érnek, de a krémszínű és rózsaszín foltok megmaradnak. Tavasszal dús, fehér virágfürtök jelennek meg, melyek vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.
Gondozási útmutató: A Photinia x fraseri 'Pink Marble' napos vagy félárnyékos helyet igényel a legjobb színkialakulás érdekében. Jól tolerálja a városi környezetet és a szennyezett levegőt is. Preferálja a jól lecsapolt, termékeny talajt. Rendszeres metszéssel ösztönözhető a sűrűbb növekedés és a színes új hajtások megjelenése. Télen mérsékelt vízigényű, de a szárazságok idején növelni kell az öntözést.
Ajánlott kertstílus: Modern, formális és mediterrán kertekben egyaránt jól mutat. Alkalmas sövényként, szoliter növényként vagy akár konténeres növényként is.
Ültetési javaslatok: Ültetéskor hagyjon 1-1.5 méter távolságot a növények között, hogy elég helyük legyen a széles növekedéshez. Ha sövénynek szánja, kisebb távolságot (kb. 75 cm) tarthat.

Polar Bear, Jegesmedve óriásvirágú bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Polar Bear'**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Polar Bear (Jegesmedve) óriásvirágú bugás hortenzia (Hydrangea paniculata Polar Bear) a bugás hortenzia fajták egyik leglátványosabb képviselője. A Polar Bear név – amely jegesmedvét jelent – tökéletesen leírja a virágzatok megjelenését: a hatalmas, fehér, bolyhos virágfürtök a jegesmedve bundájának puhaságát és fehérségét idézik. Ez a fajta a rendkívül nagy virágméret, a bőséges, hosszan tartó virágzás és a megbízható télállóság hármasát kínálja, ami a kertek egyik kedvenc hortenziájává teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Polar Bear közepes termetű, 1,5-2 méter magas és 1,5-2 méter széles, sűrű, bokros, kerekded habitusú cserje. Habitusa kompakt, a szárak erősek, nem dőlnek meg a nagy virágzatok súlya alatt. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 8-12 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. A virágok a növény igazi ékkövei: július-augusztus környékén nyílnak, és akár októberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok óriásiak, kúp alakúak, 30-40 cm hosszúak és 15-20 cm szélesek. A Polar Bear különlegessége a színváltozás: a virágok kezdetben zöldesfehérek, majd tiszta fehérré válnak, később a nyár végén és ősszel finom, pasztelles rózsaszín árnyalatot kapnak, végül zöldes-rózsaszínbe hajlanak a fagyokig. A virágok meddők, nem képeznek magot, így a virágzási energia teljes mértékben a látványos virágfejekre fordítódik.
Igényei és gondozási útmutató: A Polar Bear a legszebb virágdíszét teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, a színváltozás is látványosabb. Félárnyékban a virágok színe finomabb, a növény kevesebb gondozást igényel. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri, de a nagyon meszes talajban a virágok színe fakóbb lehet. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a hajtásokat akár 15-30 cm magasságig is visszavághatjuk. A bugás hortenzia az új hajtásokon virágzik, így a radikális visszametszés serkenti a nagy virágzatok képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Polar Bear sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a hatalmas, fehér-rózsaszín virágzataival a lágy, elegáns hangulatot erősíti. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás. Városi kertekben és előkertekben a légszennyezést is jól tűri, így alapozó növényként vagy sövényként is megállja a helyét. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a nagy, kúp alakú virágfejek izgalmas textúrát adnak.
Változatos növénytársítások: Levendulával: A levendula (Lavandula angustifolia) lila virágai és ezüstös lombozata mellett a Polar Bear fehér-rózsaszín virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Páfrányokkal: A félárnyékos helyre ültetett páfrányok (Dryopteris, Polystichum) finom textúrájukkal szépen kiegészítik a hortenzia nagy leveleit. Árnyékliliomokkal: Hosta fajták mellett a félárnyékos ágyások egyik legszebb kompozícióját alkothatja. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa) vagy nárciszok (Narcissus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Teltvirágú gyöngyvirágcserjével: A fehér virágú Deutzia mellett a Polar Bear rózsaszínes árnyalatai harmonikus kompozíciót alkotnak.
A Polar Bear kiváló választás azok számára, akik egy megbízható, bőségesen virágzó, óriás virágzatú hortenziát keresnek, amely a kert egyik fő attrakciója lehet a nyár második felétől egészen a fagyokig. USDA besorolása: 3-8.

Rainbow kamélia	**Camellia sasanqua 'Rainbow'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Rainbow' kamélia a Sasanqua fajcsoportba tartozó, látványos és illatos őszi virágzású fajta. Nevét („szivárvány”) a virágok színátmenetéről kapta, mivel a fehér szirmok széle rózsaszínben vagy pirosban játszik. Az eredeti fajtát a kaliforniai Nuccio faiskola választotta ki az 1950-es években Japánból származó növények közül, és 1956-ban jegyezték be hivatalosan. A sasanqua kaméliák őshazája Japán part menti erdei, ahol a fák alatti cserjeszintben nőnek.
Külső megjelenés
A 'Rainbow' kamélia erős növekedésű, felálló, laza koronájú örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága elérheti a 4-8 métert is, bár Magyarországon jellemzően 4-6 méter között marad, szélessége 2,5-4 méter között alakul. A növekedési erélye erős, a végső méretét 10-20 év alatt éri el.
A fiatal levelek jellegzetesen lilás vagy vöröses árnyalatúak, ami tavasszal különösen mutatós. A beérett levelek sötétzöldek, fényesek, bőrszerűek, oválisak vagy elliptikus alakúak, 5-8 cm hosszúak, szélük finoman fűrészes. A levélfelület fényes, a fonák világosabb zöld.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok közepes méretűek, 5-7 cm átmérőjűek, egyszerű vagy fél-telt formájúak, általában 5-7 sziromlevéllel. A szirmok alapszíne fehér, és minden szirom szélén feltűnő rózsaszín vagy piros szegély (edging) húzódik, amely a virág közepé felé haladva elhalványul. A virágok aranysárga porzócsokra (a feltűnő, hosszú porzószálak) kiemelkedő dísze a virágnak, és vonzza a beporzó rovarokat. A virágok enyhén, de határozottan illatosak, kellemes, virágos, édeskés illatuk van. A virágzás ősszel kezdődik (októbertől) és a kora téli hónapokig (decemberig) tart, amikor a kertben kevés más növény virágzik.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyet kedvel. A reggeli napot és a szórt fényt jól viseli, de a déli erős napfénytől és a forró, délutáni naptól védeni kell. A sasanqua fajták a japán kaméliáknál (Camellia japonica) több napot is elviselnek, de a legszebb virágzást világos, de nem tűző napos helyen hozzák. A teljes napfényben a levelek megéghetnek.

Talaj: Savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5), humuszban gazdag, jó vízáteresztő, laza, üde talajt igényel. A legjobb a homokos vályog, de a laza agyag és a tőzegtalaj is megfelelő, ha jó a vízelvezetése. A meszes talajokban a növény nem fejlődik megfelelően, a levelei megsárgulnak (klorózis). Ültetés előtt a talajt érdemes savanyú hatású komposzttal, tőzeggel vagy rododendronfölddel javítani.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, egyenletes talajnedvességet kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket gyakrabban kell öntözni. Kerülni kell a pangó vizet és a talaj teljes kiszáradását. A legjobb, ha a talaj felső 5-8 cm-e (kb. 3 hüvelyk) kiszárad a következő öntözés előtt.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a virágzás után érdemes savanyú hatású, kaméliáknak vagy rododendronoknak való műtrágyával megtámogatni (pl. erikaceák műtrágyája). A tápanyag-utánpótlást márciusban (a növekedés megindulásakor) és közvetlenül a virágzás után érdemes elvégezni. A túlzott nitrogéntartalmú trágyák károsíthatják a növényt.

Metszés: Virágzás után, kora tavasszal lehet metszeni. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a sűrű, bokros növekedés serkenthető. Metszést követően a növény dúsabban bokrosodik. A metszést a következő évi virágbimbók megjelenése előtt kell elvégezni.

Telelés: USDA besorolása 7-9 (RHS H4, -5°C és -10°C közötti hőmérsékletet is elvisel). A sasanqua kaméliák a japán kaméliáknál kissé érzékenyebbek a hidegre. Magyarországon a 7-es zónába tartozó területeken (az ország délnyugati, védettebb részein) szabadföldben is áttelelhetnek, de a fiatal növényeket és a zordabb teleken a kifejlett példányokat is érdemes védeni. Védett, szélvédett helyre (házfal mellé, eresz alá) ültessük, mert a kaméliák érzékenyek a hideg, száraz szelekre. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, üvegezett terasz, lépcsőház) kell teleltetni. A téli időszakban a fagyott talajban a növény nem tud vizet felvenni, ezért az örökzöld levelei kiszáradhatnak (ún. téli aszály). Ennek megelőzésére vastag mulcsréteg (5-10 cm) alkalmazása javasolt.

Kártevők, betegségek: A kaméliák általában ellenállóak, de érzékenyek lehetnek a mézgagombára, a fitoftórás gyökérrothadásra, a kamélia gubacsra és a kamélia levélfoltosságra. A virágokat a kamélia sziromrothadás is érintheti.

Kertstílus, ahová illik

Ázsiai kertekbe (japán, kínai): Nélkülözhetetlen eleme az ázsiai hangulatú kerteknek.

Erdős, természetes hatású kertekbe: Nagyszerűen illik a rododendronok, havasszépek, páfrányok társaságába.

Alapozó ültetésbe: Házak, kerítések tövébe ültetve a sötétzöld lombozatával kiemeli az épített elemeket.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliterként: Magányosan, a gyep közepén is mutatós.

Konténeres teraszokra: Tökéletes választás nagyobb cserépbe, dézsába (minimum 7 literes konténerbe), de ilyenkor a téli védelemről gondoskodni kell.

Változatos növénytársítások

Savanyú talajt kedvelő örökzöldek: Rododendron, havasszépe (Kalmia), sikerpenisz (Leucothoe), törpe tűlevelűek (pl. boróka, tuja).

Lombhullató díszcserjék: Japán juhar (Acer palmatum), hortenzia (Hydrangea).

Árnyéktűrő évelők: Páfrányok (Dryopteris, Polystichum), árnyékliliomok (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria), japán erdeifű (Hakonechloa macra).

Kora tavaszi hagymások: Krókusz, hóvirág (Galanthus), gyöngyike (Scilla).

Talajtakarók: Árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

Eredete és története
A 'Rainbow' fajtát a kaliforniai Nuccio faiskola választotta ki az 1950-es években egy Japánból származó, C. sasanqua csoportba tartozó növények közül. A fajtát hivatalosan 1956-ban jegyezték be, az 'J#8' jelzésű tételből. Nevét a virágok színátmenetéről kapta („szivárvány”), mivel a fehér szirmok széle rózsaszínben játszik. A fajta eredeti japán neve nem ismert. Létezik a 'Rainbow' fajtából egy 'Rainbow Variegata' ('Rainbow Variegated') néven ismert, levelében tarka változat is, amelyet Németországban nemesítettek; ennek levelei sötétzöldek, ezüstszürke szegéllyel, de a virágai megegyeznek az alapfajtáéval.
USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Red Rocket borbolya	**Berberis thunbergii 'Red Rocket'**	14 900 Ft	15 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Red Rocket borbolya egy keskeny, függőleges növekedésű lombhullató cserje, amely 1,5-2 méter magasra és csak 50-80 cm szélesre nő. Levelei élénkpiros színűek, kicsik és lekerekítettek, ősszel még intenzívebb vörös árnyalatot öltenek. Ágai sűrűn helyezkednek el és hosszú tüskékkel rendelkeznek. Tavasszal apró, sárga virágok nyílnak, amelyeket ősszel élénkpiros, hosszú ideig tartó bogyók követnek.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos helyen a legszebb piros színeződést éri el

Talajigény: Jól vízelvezető talajt kedvel, de igénytelen a talajtípusra

Vízigény: Alacsony vízigényű, jól tűri a szárazságot

Metszés: Alig igényel metszést az oszlopos növekedése miatt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -30°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Magas, keskeny sövényként ideális választás

Szoliter növényként hangsúlyos szerkezeti elem

Társítás: Ezüst- és zöldlevelű növényekkel

Szűk helyekre és előkertekbe tökéletes

Formális kertekbe kiváló választás

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Városi kertek

Formális kertek

Kis kertek

Sövényes kertek

Redőslevelű bangita	Viburnum plicatum 'Mariesii'	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A ‘Mariesii’ redőslevelű bangita (Viburnum plicatum ’Mariesii’) jellegzetesen réteges vízszintes ágrendszeréről ismert. Széles, sűrű, több szárú, lombhullató cserje, amely jellemzően 3-3,6 méter magasra nő meg, és 4,5 méter szélesre terjeszkedik. Illatmentes virágok lapos tetejű, csipkeszerű fürtökben virágoznak bőségesen az ágak mentén áprilisban vagy májusban. A virágfürtök két sorban vagy csoportban jelennek meg, innen ered a közönséges elnevezés is. Minden virágfürt (8-12 cm széles) apró, nem hivalkodó belső, termékeny virágokkal rendelkezik, a külső gyűrűben pedig tiszta fehér, terméketlen virágok láthatók. A beporzott, termékeny virágok nyáron piros bogyószerű csonthéjas gyümölcsökké alakulnak, amelyek végül feketévé válnak. A gyümölcsök díszítőelemként vonzóak, és táplálékforrást jelentenek a madarak számára. Tojásdadús, fűrészes, sötétzöld levelei (akár 12,5 cm hosszúak) ősszel vöröeslilára színeződnek. A „Mariesii” Charles Maries (1851-1902) chelsea-i kertész emlékét őrzi.
Ez a növény kevés metszést igényel. A kibújó függőleges hajtásokat nyáron, virágzás után vissza lehet vágni a kiindulási pontjukig, a sérült vagy elhalt ágakat pedig virágzás után vissza lehet vágni az egészséges rügyig.
Rendszeresen öntözze a növényt a vegetációs időszakban, amíg teljesen meg nem erősödnek. Tavasszal vigyen fel jól komposztálódott trágyát vagy kerti komposztot a növény tövére. Öntözze a , és mulccsal takarja le a talajt, hogy megakadályozza a kiszáradását.
USDA zóna: 5b
A redős levelű bangita eredetéről:
A Viburnum egy körülbelül 150 lombhullató, örökzöld és félig örökzöld cserje- és néhány fafajból álló nemzetség, amely főként az északi mérsékelt égövi régiókból származik, Délkelet-Ázsiába és Dél-Amerikába nyúlva. Vonzó virágaik, színes termésük és vonzó lombozatuk miatt termesztik őket. Egyes fajoknak ehető termése vagy illatos virága van. Nagyon vonzó, sokoldalú kerti növények.
A Viburnum plicatum egy sűrű ágrendszerű lombhullató cserje, amely jellemzően 2-4,5 méter magasra nő meg. Ovális, fogazott, erősen erezett, sötétzöld levelei (akár 10 cm hosszúak is) felső felületük redőzött. A levelek ősszel bordóvöröstől lilásvörösig változnak. Ennek a cserjének két különböző formája kapható általában a kereskedelemben: Viburnum plicatum f. plicatum, amely vátozat steril, hógolyószerű, gömb alakú virágzatokat (5-8 cm átmérőjű fürtök) és illattalan, mutatós fehér virágokat hoz tavasszal az ágak mentén, utólagos termés nélkül. Valamint a Viburnum plicatum f. tomentosum, a vadon élő rokon taxon, amely termékeny, lapos tetejű virágfürtöket (5-10 cm átmérőjű fürtök) mutat, amelyek a lépcsőzetes vízszintes ágak mentén, dupla szálú formában virágoznak, minden fürt külső gyűrűjében nagy, mutatós, steril virágok veszik körül, a középső apró, nem mutatós, termékeny virágokat, amelyek megtermékenyítéskor tojás alakú gyümölcsöket és életképes magot hoznak. A f. plicatum virágzási ideje általában körülbelül két héttel később következik be, mint az f. tomentosumé. A f. plicatum kifejlett magassága Akár 4,5 méter magasra is megnőhet, de az f. tomentosum kifejlett magassága jellemzően nem haladja meg a 3 métert. A virágszerkezet, a virágzási idő, a magasság és az elágazási habitus kivételével mindkét forma nagyon hasonló, és a kereskedelemben számos különböző fajtanév alatt forgalmazzák.

Rheingold orbáncfű	**Hypericum x inodorum 'Rheingold'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Eredeti előfordulási helye Franciaország, Olaszország, Spanyolország. Egy hibrid faj, ami a bogyós orbáncfű (Hypericum androseamum,) és a nehézszagú orbáncfű (Hypericum hircinum) keresztezéséből származik. Élénkzöld lombú, akár 1 m magas lombhullató cserje. Nyár elején virágzik, sárga virágai feltűnően nagy porzóival megkapó szépségű növénnyé teszik. Ezt követően nyár közepétől tömegesen díszítik apró piros termései. A mediterrán területeken való elterjedése fagyárzékenységra utal, ezért védett, melegebb mikroklímájú helyekre javasolható, Vízigénye átlagosnak mondható.

Robosztus oszlopos tiszafa	**Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Robosztus oszlopos tiszafa svájci eredetű, sötétzöld lombú, gyorsan fejlődő, keskeny oszlopos fajtája, melynek fagytűrése is figyelemre méltó. Rendkívül szép sövény telepíthető belőle!

Külső tulajdonságok

Magasság és forma: Oszlopos habitus, felfelé keskenyedő ágakkal. Kifejlett állapotban 5-7 méter magas és 1-1,5 méter széles lehet.

Levelek: Világoszöld, tűszerű, lapos levelek, amelyek évközben nem változtatják jelentősen színüket. A kéreg vörösesbarna színű.

Termés: Nőivarú példányokon szeptember körül élénkpiros bogyók jelennek meg, amelyek madarak számára vonzóak, de az emberek és háziállatok számára mérgezőek.

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos, világos vagy félárnyékos helyeket kedvel. Teljes árnyékban is túléli, de növekedése lassabb lehet.

Talaj: Jó vízelvezető, tápanyagban gazdag, nedves (de nem pangó) talajt preferál. Tolerálja a savas, semleges és lúgos talajt is.

Öntözés: Közepes vízigényű. Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, míg a kifejlett példányok szárazságot is jól tűrik.

Metszés: Jól viseli a metszést. Az alakmegőrző nyírást május végén és szeptemberben ajánljuk.

Télállóság: Teljesen télálló, fiatal növényeket érdemes szélvédett helyre ültetni.

Ültetési javaslatok

Időzítés: Tavasz vagy ősz ideális, amikor a talaj hőmérséklete kedvező a gyökérfejlődéshez.

Távolság: Sövényként ültetve 1-1,5 méteres távolságot ajánlunk a zárt hatás érdekében.

Hely: Napos vagy félárnyékos hely, jó vízelvezetésű talajjal.

Alkalmazási lehetőségek

Sövényként: Sűrű növekedése miatt kiváló élőkerítés vagy zaj- és szélfogó.

Szoliterként: Egyedi megjelenése miatt hangsúlyos elem a kertben vagy parkban.

Dísznövény: Oszlopos formája kontrasztot teremt más növényekkel kombinálva.

Mérgező hatás: A növény minden része (kivéve a bogyó húsát) erősen mérgező az emberek és háziállatok számára.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Betegségek: Ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de a pangó víz gyökérrothadást okozhat.

Extra tipp: A tiszafa bogyói madárvilág vonzására alkalmasak, és sűrű ágazata menedéket nyújt a kisebb állatok számára.

Zóna:6a

Római mogyoró, Nagytermésű étkezési mogyoró	Corylus avellana 'Római'	4 950 Ft	4 950 Ft

Egy nagyon régi, jól bevált fajta Olaszországból. Termései augusztus végén-szeptember elején érnek. Kettesével hozza egyébként is nagy terméseit. Terméseinek minősége az egyik legjobb a piacon. Idegen megporzásra szorul.

5a USDA-zóna

Rózsaszín dúsvirágú rózsalonc	Weigela 'Pink Poppet'	5 250 Ft	5 250 Ft

A Pink Poppet rózsalon (Weigela 'Pink Poppe') tömör, gömbölyű, lombhullató törpecserje. Tölcsér alakú, világos rózsaszínű virágjai késő tavasszal nyílnak. Tojásdad alakú levelei sötétzöldek. Termése alig látható. Falusi virágos kertekben szinte kötelező elem, de mivel nem túl nagyra nő kisebb városi kertekben, előkertekben is szépen mutat.

Fényigény: napos meleg helyre telepítsük
Vízigény: átlagos vízigényű
Talajigény: talajok tekintetében nem válogat
USDA Zóna:5b (nem fagyérzékeny)

Rózsaszín törpe gyöngyvessző	Spiraea japonica 'Little Princess'	2 450 Ft	2 450 Ft

A japán gyöngyvessző szélesen elterülő, csaknem kúszó, törpe fajtája, melyet júniustól augusztusig több hullámban, 5 cm-es sátorvirágzatban elborítanak rózsaszín virágzatai. 3 cm-es, világoszöld leveleivel pazar összhatást teremtenek. Talajtakarónak, jelképes sövénynek, edényes növénynek kiválóan alkalmas. Zóna:4a

Sárgalombú hólyagvessző	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	3 250 Ft	3 250 Ft

A Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Sárgalombú hólyagvessző) labdarózsára emlékeztető alacsonyabb termetű bokor. Levelei nagyon szép aranysárgák, a nyár folyamán kissé visszazöldülők.

4a-8b USDA-zóna

Sárgatarka mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Lemon Beauty'	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Sárgatarka mirtuszlonc (Lonicera nitida 'Lemon Beauty') egy kis méretű, örökzöld cserje, amely 50-100 cm magasra nő. Levelei tarka színűek, élénk sárga és zöld árnyalatokkal, ami különleges megjelenést kölcsönöz a növénynek. Tavasszal és nyáron apró, illatos virágai nyílnak, amelyek vonzzák a méheket és más beporzókat. Ez a növény különösen jól fejlődik napos vagy félárnyékos helyeken, és jól alkalmazkodik a különféle talajviszonyokhoz, előnyben részesítve a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajokat. A Sárgatarka mirtuszlonc ideális választás alacsony sövényekhez, díszes kertekhez, valamint csoportos ültetésekhez.
Gondozási útmutató:
A Sárgatarka mirtuszlonc gondozása viszonylag egyszerű:

Öntözés: Kizárólag száraz időszakokban szükséges öntözni, hiszen a növény jól bírja a mérsékelt szárazságot. Ügyeljünk a túlzott öntözésre, ami gyökérrothadást okozhat.
Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a különböző talajtípusokat is.
Metszés: Érdemes az őszi hónapokban metszést végezni, hogy a növény szép formát nyerjen és serkentsük az új hajtások fejlődését.
Napsütés: A teljes napsütést vagy félárnyékos helyeket kedveli.

Ültetési javaslat
A Sárgatarka mirtuszlonc ültetésekor válasszunk napos vagy félárnyékos helyet, ahol a talaj jól vízelvezető. Az ideális ültetési időszak tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. A növények között hagyjunk elegendő helyet a fejlődéshez, különösen ha sövényt szeretnénk kialakítani.

6b USDA-zóna

Sárgatarka som	**Cornus alba 'Gouchaultii'**	2 950 Ft	2 950 Ft

A
A Sárgatarka som igen dekoratív cserje, amely nemcsak nyáron, hanem télen is élénk színekkel díszíti a kertet. A növény 2-3 méter magasra növekszik, és terebélyes, széles koronája van. A levelek sárga és zöld színűek, a sárga perem hangsúlyos kontrasztot képez a középső zöld részével, különösen a tavaszi hónapokban.
A virágzási időszak áprilistól májusig tart, és a növény kis, fehér virágokat hoz, amelyek vonzzák a méheket és pillangókat. A piros vesszők télen is látványosak, így a Gouchaultii fajtát egész évben élvezhetjük.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Sárgatarka som részlegesen árnyékos vagy napos helyet kedvel. A legszebb színek elérése érdekében ajánlott legalább napi 6-8 órányi közvetlen napsütés.
Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj az ideális. A növény jól bírja a különböző talajviszonyokat, de a savas vagy semleges pH-érték a legkedvezőbb.
Öntözés: A fiatal növények esetében a rendszeres öntözés javasolt az első évben. A felnőtt növények a szárazabb időszakokat is elviselik, de a bőséges öntözés elősegíti a virágzást.
Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott műtrágyát alkalmazni a növény fejlődésének és virágzásának támogatására.
Téliesítés: télgyálló, de az ősz folyamán ajánlott visszavágni a vesszőket, hogy friss hajtások érkezzenek tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

Ideális szoliter növényként, kiemelkedve a kert középpontjában vagy más dísznövények között.
Kiváló választás szegélyezésre, kerítések mentén vagy csoportos ültetéseknél, mivel élénk színével és textúrájával emeli a tájat.
Kertészeti díszkertben, ahol hozzájárul a biodiverzitás növeléséhez, hiszen virágai vonzzák a beporzókat.

A Sárgatarka som könnyen gondozható és tartós megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné gazdagítani kertjét.

Sárgavesszejű tarackoló som	**Cornus stolonifera 'Flaviramea'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ültetéshez készítse elő a talajt, mely jó vízátersztésű és tápanyagdús legyen. A ültetési lyuknak kétszer akkora méretűnek kell lennie, mint a gyökérlabda, hogy jól el tudjon férni. Ideális ültetési időszak a tavasz eleje vagy az ősz vége, de konténeres növényeket egész évben ültethetünk, kivéve amikor a talj fagyott. Figyeljen arra, hogy elég hely legyen a cserje körül, hogy szabadon terjedhessen. Mulcsozni is érdemes, ez megőrzi a talaj nedvességét és visszafogja a gyomokat. Évente érdemes metszeni, hogy formában tartsuk a növényt és serkentsük a növekedését.
Télen a sárga vesszők csodás látványt nyújtanak, hiszen a hóval borított tájban gyönyörű kontrasztot alkotnak. A színes vesszejű somok szép látványt nyújtanak, és remek módja a színek gazdagításának a kertben. Konténeres beültetéshez is remek választás.
4a-9a USDA-zóna

Satisfaction liliomfa	**Magnolia x 'Satisfaction'**	15 500 Ft	15 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A Satisfaction liliomfa (Magnolia x 'Satisfaction') egy kis, vagy inkább közepes növésű magnólia, közepes, ill. nagyméretű virágokkal. A virágok külső színe rózsaszín - püspöklila áranylatokban játszik, míg a belseje tiszta fehér. A virágok csésze formája a Magnolia x soulangeana-éra hasonlít. Bőségesen, és viszonylag korán virágzik. A lombhullató liliomfák nem fagyérzékeny növények. Átlagos minőségű talajban, sőt kissé kötöttebb agyagos talajokban is jól fejlődnek. A meszes talajféleségeket kerülik. A nyári perzselő napot kevéssé szeretik. Ilyenkor jobb számukra a félárnyék, de a tavaszi időszakban szívesen sütkéreznek. Átlagos vízigényűek, az öntözést azonban meghálálják, és a száraz időszkokat nem kedvelik. Metszést az elvirágzást követően kell elvégezni. Ilyenkor egy kicsit érdemes ritkítani koronát, egységesen jobb térszerkezetet adva neki. USDA Zone: 7b-4a			
Sisakviráglevelű vadszőlő	**Ampelopsis aconitifolia**	3 350 Ft	3 350 Ft
A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség.Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik. Felhasználása azonos az alapfajéval: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.			
Siver Dollar bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Siver Dollar'**	4 450 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Siver Dollar bugás hortenzia (Hydrangea paniculata 'Silver Dollar') különleges, ezüstös fehér bugavirágairól ismert. Ez a látványos, télálló cserje erős, felálló ágakon hordja nagy, kúp alakú virágait. Konténeres növényként szállítjuk, biztosítva gyors begyökeresedést.

Színárnyalatok: A nyár elején ezüstös fehér virágai nyár végén enyhén rózsás árnyalatot kapnak, ősztől krémszínűvé válnak.

Méret: Kompakt növekedésű, 2-2,5 m magas és 1,5-2 m széles bojttá fejlődik.

Ültetési távolság: 1,5-2 m távolsággal ültetve optimálisan fejlődik.

Kiválóan alkalmazható szoliterként, virágzó sövényként vagy kisebb kertekbe is.
Gondozási útmutató
A Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' gondozása

Fényigény: Napos vagy félig árnyás helyen érzi magát a legjobban

Öntözés: Közepes vízigényű. Szárazságot kerülni kell

Talaj: A laza, nedves, humuszban gazdag talajt részesíti előnyben

Trágyázás: Tavasszal bugás hortenziákra való trágyával tápláljuk

Metszés: Tavasszal (március) erősen visszavágható

Ültetési javaslat
Helyválasztás és ültetési tippek:

Hely: Napos vagy félig árnyás hely

Ültetés: Konténeres növényt tavasztól őszig ültethetjük

Távolság: 1,5-2 m távolságot tartsunk

Ötletek:

Szolitereként ültetve

Több példányból virágzó sövény

Nagy cserépben teraszon

A Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' egy igénytelen, de lenyűgöző virágú cserje!

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Skyfall bugás hortenzia	**Hydrangea paniculata 'Skyfall'**	4 950 Ft	5 350 Ft

A Skyfall bugás hortenzia (Hydrangea paniculata Skyfall) a bugás hortenzia fajták egyik legújabb nemesítése, amely a nagy virágméret, a tömött virágzat és a megbízható télállóság kombinációjával tűnik ki. A Skyfall név – amely az égbolt lehullását jelenti – tökéletesen leírja a virágzatok megjelenését: a hatalmas, fehér, felhőszerű virágfürtök mintha az égbolt darabjai hullottak volna a kertbe. Ez a fajta a bőséges, hosszan tartó virágzás, a kompakt méret és a látványos színváltozás hármasát kínálja.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Skyfall közepes termetű, 1,2-1,5 méter magas és 1-1,2 méter széles, sűrű, bokros, kerekded habitusú cserje. Habitusa kompakt, a szárak erősek, nem dőlnek meg a nagy virágzatok súlya alatt. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 6-10 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. A virágok a növény igazi ékkövei: július-augusztus környékén nyílnak, és akár októberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok nagyok, kúp alakúak, 25-30 cm hosszúak, feltűnően tömöttek, a virágokat szorosan egymás mellett hozza. A Skyfall különlegessége a finom színváltozás: a virágok kezdetben zöldesfehérek, majd tiszta fehérré válnak, később a nyár végén és ősszel finom, pasztelles rózsaszín árnyalatot kapnak, végül zöldes-rózsaszínbe hajlanak a fagyokig. A virágok meddők, nem képeznek magot, így a virágzási energia teljes mértékben a látványos virágfejekre fordítódik.
Igényei és gondozási útmutató: A Skyfall a legszebb virágdíszét teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, a színváltozás is látványosabb. Félárnyékban a virágok színe finomabb, a növény kevesebb gondozást igényel. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri, de a nagyon meszes talajban a virágok színe fakóbb lehet. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a hajtásokat akár 15-30 cm magasságig is visszavághatjuk. A bugás hortenzia az új hajtásokon virágzik, így a radikális visszametszés serkenti a nagy virágzatok képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Skyfall kompakt mérete és finom színvilága miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a nagy, fehér-rózsaszín virágzataival a lágy, elegáns hangulatot erősíti. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás. Városi kertekben és előkertekben a légszennyezést is jól tűri, így alapozó növényként vagy sövényként is megállja a helyét. Kis kertekben a kompakt mérete miatt ideális választás. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a nagy, kúp alakú virágfejek izgalmas textúrát adnak.
Változatos növénytársítások: Levendulával: A levendula (Lavandula angustifolia) lila virágai és ezüstös lombozata mellett a Skyfall fehér-rózsaszín virágai gyönyörű kontrasztot alkotnak. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Páfrányokkal: A félárnyékos helyre ültetett páfrányok (Dryopteris, Polystichum) finom textúrájukkal szépen kiegészítik a hortenzia nagy leveleit. Árnyékliliomokkal: Hosta fajták mellett a félárnyékos ágyások egyik legszebb kompozícióját alkothatja. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa) vagy nárciszok (Narcissus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Teltvirágú gyöngyvirágcserjével: A fehér virágú Deutzia mellett a Skyfall rózsaszínes árnyalatai harmonikus kompozíciót alkotnak.
A Skyfall kiváló választás azok számára, akik egy kompakt méretű, bőségesen virágzó, különlegesen nagy és tömött virágzatú hortenziát keresnek, amely a kert egyik fő attrakciója lehet a nyár második felétől egészen a fagyokig. USDA besorolása: 4-8.

Snowbelle illatos jezsámen	**Philadelphus 'Snowbelle'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Snowbelle (magyarul „Hóvirág” vagy „Hószépség”) az illatos jezsámenek egyik legkedveltebb törpe, kompakt fajtája, amelyet az Egyesült Államokban nemesítettek ki. Kifejlett magassága és szélessége is mindössze 0,9-1,2 méter, így kifejezetten kis kertekbe, előkertekbe, szegélyekbe, sőt akár nagyobb cserepekbe, erkélyládákba is ültethető.
Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a június-júliusban nyíló, hófehér, telt virágok, amelyek 3-4 cm átmérőjűek, és a rózsákéhoz hasonló, telt, gömbölyded formát öltenek. A virágok a hajtások végén és az oldalhajtásokon sűrűn, akár 3-5 tagú fürtökben nyílnak. Illatuk kellemesen édeskés, intenzitása közepes vagy erős – a kisebb termet ellenére illatával így is betölti a környezetet. A levelek kicsik (3-5 cm), élénkzöldek, tojásdadok, finoman fogazott szélűek. Ősszel a lombszín sárgásra változik. A bokor természetesen sűrű, jól elágazó, gömbölyded formát ölt anélkül, hogy metszésre szorulna.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb a virágzás és a legerősebb az illat; félárnyékban is szépen fejlődik, de virágzása kissé gyengébb lehet.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag vagy gazdag, meszes vagy semleges kémhatású (pH 6,5-7,5). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: fiatalon és tartós szárazság idején rendszeres öntözést igényel. Idősebb korban mérsékelten szárazságtűrő.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával. A túlzott nitrogénadagolás a virágzás rovására megy.

Metszés: virágzás után közvetlenül (június-július) kell metszeni. Az elvirágzott hajtásokat vágd vissza kb. egyharmadukkal. A régi, elöregedett ágakat 3-4 évente a talaj szintjén távolítsd el. Kis termete miatt a metszés könnyen elvégezhető.

Telelés: teljesen télálló, Magyarország minden régiójában külön védelmet nem igényel.

Kertstílus, ahová illik Romantikus kert, házikert, kis kert, előkert, illatos kert, vegyeságyás előtere, szegélycserje, konténeres terasz, angol vidéki kert, falusi kertek.
Változatos növénytársítások

Kék és lila virágú évelők: levendula (angol vagy francia), macskamenta, perovszkia, császárvirág, harangláb, ibolya.

Törpe rózsák: alacsony, bokros rózsák (fehér, halványrózsaszín, barack vagy sárga színben).

Ezüstös levelű növények: üröm, sziklaőr, törpe ezüstfű, kék csenkesz.

Alacsony díszfüvek: kék csenkesz, törpe tollbuga, japán vértfű.

Fehér virágú évelők: árnyékliliom, párnás őszirózsa, gyöngyvirág.

Tavaszi hagymások a tövébe: krókusz, gyöngyike, törpe nárcisz, jácint.

Talajtakarók: árnyéki meténg, pachysandra, kúszó boróka.

Konténeres társítás: futóhagyma, pozsgások (pl. varjúháj), törpe muskátli.

USDA besorolása: 4-8 (Magyarország egész területén, 4b-7 zónában kiválóan nevelhető, a leghidegebb tájakon is megbízhatóan télálló).

Soktövisű magyal	Ilex aquifolium 'Ferox'	8 900 Ft	8 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A soktövisű magyal egy lassú növekedésű, bokros, örökzöld cserje. Kifejlett korában általában 2-4 méter magasra és hasonló szélességre nő.

Levelei: A növény legszembetűnőbb jellemzői a sötétzöld, bőrszerű levelek. Ezek nemcsak a szélükön tüskések, mint a hagyományos magyalok, hanem a levél felső felületén is számos éles tüske található, főleg a levélcsúcs felé haladva.

Virágai és termése: A 'Ferox' fajta hímivarú, ami azt jelenti, hogy önmagában nem hoz termést. Május-júniusban nyílik apró, fehér virágokkal. Ha azonban egy termő (nőivarú) magyal példány a közelében van, akkor ritkán hozhat néhány élénkpiros bogyót.

Gondozási útmutató:
A soktövisű magyal egy viszonylag igénytelen növény, amely megfelelő körülmények között szépen fejlődik.

Fényigény: A napos és a félárnyékos helyeket egyaránt kedveli. A tűző napot érdemes elkerülni, mert megégetheti a leveleket.

Talaj: A jól vízelvezető, laza szerkezetű és enyhén savas kémhatású talaj az ideális számára. A meszes talajt egyáltalán nem tolerálja, ilyen helyen gyengén fejlődik.

Vízigény: Közepes vízigényű. A talajt érdemes egyenletesen nedvesen tartani, és a szárazabb időszakokban nem szabad hagyni, hogy teljesen kiszáradjon.

Metszés: Jól tűr egy kis formáló metszést, de alapvetően nem igényel rendszeres metszést. Ha szükséges, a késő tél vagy kora tavasz a legjobb időzítés.

Télállóság: Jó télállóságú, érett korában akár -20 °C-ot is kibír.

Ültetési javaslatok
Ez a magyal rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Szoliter növényként: Egyedi megjelenése miatt kiválóan alkalmazható kiemelkedő díszcserjeként a kert szívében vagy egy gyepben.

Sövényként: Tüskéi miatt kiváló választás sűrű, jól át nem járható sövény kialakítására, amely nemcsak szép, hanem funkciós is.

Formára nyírva: Jól formázható, így kúp, gömb vagy oszlop alakban is nevelhető.

Star of Toscana csillagjázmin	Trachelospermum jasminoides 'Star of Toscana'	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Star of Toscana csillagjázmin, népszerű örökzöld kúszónövény, a Trachelospermum jasminoides egyik legújabb, legszebb nemesített változata. Ez a lenyűgöző fajta a klasszikus fehér virágú csillagjázmin minden előnyös tulajdonságát (örökzöld lombozat, bódító illat, igénytelenség) ötvözi a ritka, sárga virágok különlegességével.
Külső megjelenés
A Star of Toscana erős növekedésű, csavarodó hajtású kúszónövény, amely támasz mellett szépen felkapaszkodik, de talajtakaróként is tartható. Kifejlett magassága a támasz magasságától függően 8-12 méter, szélessége 2,5-4 méter között alakul. Növekedési erélye erős, de a kifejlett méretet 5-10 év alatt éri el.
A növény legnagyobb dísze a lombozat és a virágzat együttes hatása. A levelek fényesek, bőrszerűek, lándzsás alakúak, sötétzöldek. A lombozat egész évben díszít, télen gyakran bronzos árnyalatot öltenek a levelek. A fiatal hajtások világosabb zöldek, a levelek fonákja világosabb.
A virágok nyáron, júniustól szeptemberig nyílnak. A virágzat a hajtások végén, csillag alakú, 2-3 cm átmérőjű, krémszínű vagy halványsárga virágokból álló csoportokban jelenik meg. A virágok közepe felé sötétebb sárga árnyalattal. A virágok intenzív, édes, kellemes jázminillatot árasztanak, amely különösen az esti órákban erősödik fel, és az egész kertet betöltheti. A virágok vonzzák a méheket és pillangókat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel, de a legbőségesebb virágzást teljes napfényben hozza. Napos fekvésben a virágok illata is erőteljesebb.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, termékeny, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A savanyú talajokat is tolerálja.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már szárazságtűrők.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést, de jól tűri a metszést. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a túl hosszú hajtások visszavághatók. A legjobb időpont a metszésre kora tavasszal (február-március).

Támrendszer: A növény önmagát is tudja tartani a fiatal, csavarodó hajtások segítségével, de a legjobb eredményt akkor érjük el, ha rácsot, feszített drótkötelet vagy más támrendszert biztosítunk számára.

Telelés: A növény mérsékelten télálló. A kifejlett példányok rövid ideig -10°C-ig, -15°C-ig is ellenállhatnak. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, lépcsőház, üvegezett terasz) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, betegségek és kártevők ritkán támadják meg. A pangó vizes talajban gyökérrothadás előfordulhat. A tejszerű nedv bőrirritációt okozhat, ezért metszéskor viseljünk kesztyűt.

Felhasználás a kertben
A Star of Toscana csillagjázmin a sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokféleképpen felhasználható:

Falak, kerítések, pergolák, lugasok befuttatására

Talajtakaróként – alacsonyan kúszó hajtásaival nagyobb felületeket is beboríthat

Konténeres teraszokra, erkélyekre – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültetve

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Városi udvarokba, előkertekbe – jól bírja a városi körülményeket Változatos növénytársítások A Star of Toscana sárga virágai és sötétzöld lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel: Lila és kék virágú évelők: Levendula, macskamenta, klematisz – a lila-kék színek a sárgával harmonikus kontrasztot alkotnak Fehér virágú növények: Fehér rózsák, gyöngyvirág Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz Díszfüvek: Tollbuga, kínai ezüstpázsit Más kúszónövények: Rózsákkal társítva a különböző virágzási időszakokkal egész nyáron díszíthetnek USDA besorolása: 8-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).			
Sterling Silver kékszakáll	**Caryopteris x clandonensis 'Sterling Silver'**	4 450 Ft	5 390 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Sterling Silver kékszakáll (Caryopteris x clandonensis 'Sterling Silver') – Az ezüstös lombozatú, késő nyári virágú cserje
A Sterling Silver kékszakáll az árvacsalánfélék családjába tartozó, Kelet-Ázsiában őshonos hibrid cserje. A nemzetség magyar neve (kékszakáll) a virágok jellegzetes kék színére utal. A 'Sterling Silver' fajta a Caryopteris incana és a Caryopteris mongholica kereszteződéséből származó clandonensis hibridcsoport tagja. A fajtát Peter Catt angol nemesítő hozta létre a Hampshire-i Liss Forest Nursery-ben, és az 'Lissilv' nemesítési kódon, valamint a STERLING SILVER védjegyezett néven is ismert. Ez a növény a nyár végétől az őszig nyíló, illatos kék virágaival és feltűnő ezüstös lombozatával az egyik legkedveltebb késő nyári cserje a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a kiváló szárazságtűrése és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Sterling Silver kékszakáll egy kompakt, sűrű, gömbölyded habitusú, lombhullató cserje. Kifejlett magassága és szélessége 60-90 cm között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. Növekedési erélye közepes, a hajtások egyenesen felállók, a növény nem omlik szét. A gyökérzet az USDA 5-ös zónájáig ellenáll, de a felszíni hajtások hidegebb éghajlaton visszafagyhatnak.
A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek átellenesek, lándzsásak, 5-8 cm hosszúak, a levél széle fogazott. A 'Sterling Silver' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek ezüstös-szürkészöld vagy ezüstös-kékeszöld színe, amely egész szezonban dekoratív, és a kertben feltűnő, elegáns színfoltot biztosít. A levelek megdörzsölve kellemes, aromás illatot árasztanak. Száraz időben a levelek ezüstösebbek, nedvesen zöldesebb árnyalatúak.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén és a felső levélhónaljakban kialakuló, sűrű, bugás fürtökben helyezkednek el. A virágok aprók, 1-2 cm átmérőjűek, csöves, tölcsér alakúak, illatosak, középkék vagy ibolyáskék színűek. A 'Sterling Silver' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok tiszta, középkék színe, amely a késő nyári és őszi kertben feltűnő, hűsítő hatást kelt, és gyönyörű kontrasztot alkot az ezüstös lombozattal. A virágzási időszak a nyár végétől a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően augusztustól októberig. A virágok a méheket, a poszméheket és a pillangókat vonzzák, a növény pedig a beporzók valóságos mágneseként működik. A virágzás hosszan tartó, és az elnyílt virágok eltávolítása nem szükséges.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, négyrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Sterling Silver kékszakáll napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást és a legintenzívebb ezüstös lombozatszínt teljes napsütésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; a téli nedvesség különösen veszélyes lehet, és gyökérrothadáshoz vezethet. A jó vízelvezetés kiemelten fontos a sikeres teleltetéshez.

Öntözés: A Sterling Silver kékszakáll szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy, és a növény hajlamosabbá válik a szétesésre. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, virágzó cserjék számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A Sterling Silver kékszakáll metszése fontos a bőséges virágzás és a növény rendezett megjelenése érdekében. A metszést kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt (február-március) kell elvégezni. Mivel a növény az új hajtásokon virágzik, a visszavágás serkenti az új, erős hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Visszavágás: A hajtásokat érdemes a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra, vagy a régi, fás részen 2-3 rügyre visszavágni. Ez serkenti az új hajtások képződését, és biztosítja a sűrű, bokros habitust.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, fagykárosodott vagy sérült hajtásokat. A növény akkor is kihajt a gyökérzetből, ha a hajtások teljesen elfagytak.

Telelés és fagytűrés: A Sterling Silver kékszakáll télállósága mérsékelt; az USDA 5-9-es zónákban nevelhető. A gyökérzet az USDA 5-ös zónájáig is

ellenáll, de a felszíni hajtások csak az USDA 7-es zónájáig maradnak életben. Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A zordabb teleken a hajtások visszafagyhatnak, de a gyökérzetből tavasszal újrahajt. A téli nedvesség és a pangó víz nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy, ezért a jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos a sikeres teleltetéshez. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Sterling Silver kékszakáll az ezüstös lombozatának, a kék virágzásának, kompakt méretének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb késő nyári cserje a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (60-90 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe, mediterrán hangulatú kertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Tömeges telepítésbe – a sűrű, bokros növekedés és a hosszú virágzás miatt kiváló választás nagyobb felületekre.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Alacsony sövénynek – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt alacsony, díszítő sövény kialakítására is alkalmas.

Vágott virágnak – a virágok frissen és szárítva egyaránt felhasználhatók csokrokban és virágkötészeti alkotásokban.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Sterling Silver kékszakáll ezüstös lombozata és kék virágai számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis), kúpvirág (Rudbeckia) – a kék és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Rózsákkal – a kékszakáll kiváló társnövény a rózsák számára, kitölti a réseket és késői virágzást biztosít.

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollbuga (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a kékszakáll tömöttebb, bokros formáját.

Lila virágú növényekkel: Izsópfű (Agastache), zsálya (Salvia) – a kék és a lila szívek harmonikus, friss párost alkotnak.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a Sterling Silver kékszakáll mérsékelten télálló; az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban a gyökérzet áttelelhet, de a hajtások a zordabb teleken visszafagyhatnak. A növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos a sikeres teleltetéshez; a téli nedvesség nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.)

Sunrise liliomfa	**Magnolia x 'Sunrise'**	14 900 Ft	16 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Sunrise liliomfa (Magnolia x Sunrise) egy Kínából érkezett új liliomfa fajta. A növény itt kertészetben sem túl nagy, de valójában is "törpének" számíthat, hiszen sűrű, kompakt ágrendszerrel mindössze egy 2-3 méteres kisebb fává nő. Virágai kehely alakúak, belül fehérek, kívül inkább krém színűek, csészéja elján pedig piros háromszög lakú minták láthatóak, mint egy-egy vörös lángnyelv. A lángnyelvek csúcsától pedig vékony piros vonal vezet felfelé a szirmok tetejéhez.
A levelei kis kisebbek ovális fomájúak élénk világoszöld színűek.
Fényigény: Napos, nyáron inkább félárnyékos helyet kedvel, tehát jó helye lehet lombhullató fák koronájának védelmében.
Talajigány: átlagos kerti talajok jók lehtnek, de biztosabb a siker, ha kissé savanyúbb kémhatással bír a talajunk. A jó tápanyagellátottságot jobb növekedéssel hálálja meg.
Vízigény: Nem szereti a hosszabb száraz időszakokat, az öntözést ilyenkor meghálálják a liliomfák, emellett jelentősebb vízigényük nincsen.
Nem fagyérzékeny, -25 C fokot is tűr.
USDA zóna: 5b-7b
A magnóliákat nem nagyon kell metszeni. Idősebb korukban, ha túl sűrű a korona, akkor érdemes őket kicsit ritkítani. A metszést azonban rögtön virágzást követően végezzük el, hogy a következő tavaszra minél több új virágrügy kialakulása legyen zavartalan. A metszés tehát legfelejebb a belső, koronát elsűrüsítő ágak, száraz, beteg, vagy rossz irányba fejlődő ágak eltávolítását kell, hogy jelentse.

Sunsation sárga virágú liliomfa	Magnolia x Sunsation	14 900 Ft	14 900 Ft

A Sunsation liliomfa (Magnolia x Sunsation) első sorban virágszínével, kissé elnyújtott virágzási intervallumával (április - május), és nagy virághozamával tűnik ki a többi liliomfa közül. Dús, kompakt bokorrá fejlődik, idősebb korára alacsony törzzsel bíró kistermetű fává nevelhető. Virágai később nyílnak, mint a többi liliomfáé, tehát kései fajta, mely tulajdonsága segít elkerülnie a fagyokat.
A lombhullató liliomfák nem fagyérzékeny növények.
Átlagos minőségű talajban, sőt kissé kötöttebb agyagos talajokban is jól fejlődnek. A meszes talajféleségeket kerülik.
A nyári perzselő napot kevéssé szeretik. Ilyenkor jobb számukra a félárnyék, de a tavaszi időszakban szívesen sütkéreznek.
Átlagos vízigényűek, az öntözést azonban meghálálják, és a száraz időszkokat nem kedvelik.
Metszést az elvirágzást követően kell elvégezni. Ilyenkor egy kicsit érdemes ritkítani koronát, egységesen jobb térszerkezetet adva neki.

USDA Zone: 7b-4a

Talajtakaró madárbirs	Cotoneaster 'Queen of Carpet'	2 950 Ft	3 450 Ft

A Talajtakaró madárbirs Cotoneaster 'Queen of Carpet' egy alacsony termetű, törpecserje, amely a kertekben és tájképekben gyakran használt dísznövény. Ez a fajta cotoneaster kifejezetten teraszok, járdák vagy sziklakertek alacsony burkolójaként használatos, hiszen sűrű, szőnyegszerű növekedése és szép, élénk színei vonzó megjelenést kölcsönöznek az adott területnek. A Talajtakaró madárbirs cserje apró, ovális alakú levelekkel rendelkezik, amelyek a nyári hónapokban élénkzöld színüek. A levelek kis méretűek és enyhén hullámosak lehetnek. Ősszel a levelek átmenetileg vörösesbarna vagy bronzszínűvé válhatnak, ami további szépséget ad a növénynek. A 'Queen of Carpet' cotoneaster egész évben vonzó virágzással és terméssel büszkélkedhet. Tavasszal a cserje apró, fehér vagy rózsaszínű virágokkal borul be, amelyek méhészeti vonzerőt jelenthetnek. Nyáron ezek a virágok helyet adnak a kis piros vagy narancssárga bogyóknak, amelyek hosszan fennmaradnak, fokozva a növény dekoratív hatását. Ezek a bogyók a madarak számára is vonzóak, ezért a Talajtakaró madárbirs kiváló választás lehet a kertek madárcsalogató növényei között. Viszonylag könnyen gondozható. A növény a napos vagy félárnyékos helyet kedveli, és a jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben. Tolerálja a szárazabb talajt és a meleget is, ezért szárazságtűrő növényként is ültethetjük. Azonban rendszeres öntözéssel és megfelelő tápanyagokkal ellátva optimális növekedést és virágzást érhetünk el nála. A 'Queen of Carpet' cotoneaster tökéletes választás lehet talajtakarónak, vagy a kert alacsonyabb területeinek betöltésére. A sűrű, burkoló növekedése miatt könnyen elnyomja a gyomnövényeket, így csökkenti a gyomirtás szükségességét. Emellett a cserje jól kombinálható más alacsony termetű növényekkel, például boróka félékkel, talajtakaró évelőkkel vagy törpe fenyőfajtákkal, hogy harmonikus és változatos látványt teremtsen a kertben. Télen is mutatós marad, mivel levelei hosszan megmaradnak, és néha még a hó alatt is láthatók lehetnek. Nyári visszavágással vagy ritkítással fenntartható a kompakt alak és a sűrű növekedés. Fontos azonban, hogy ne vágjuk túl mélyre vagy túl gyakran, mivel ez károsíthatja a növényt és csökkentheti a virágzást és a bogyótermést.

Tarka levelű illatcserje	Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'	5 450 Ft	6 290 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Tarka levelű illatcserje (Osmanthus heterophyllus 'Variegatus') – Az örökzöld, tarka levelű illatos cserje
A tarka levelű illatcserje az olajfafélék családjába tartozó, Kelet-Ázsiából (Japán, Korea, Tajvan) származó, örökzöld cserje nemesített változata. A faj a természetben erdőkben, nedves, jó vízelvezetésű talajokon fordul elő, ahol a félárnyékos körülményekhez alkalmazkodott. A 'Variegatus' fajta a kertészeti gyakorlatban az egyik legkedveltebb tarka levelű örökzöld cserje, amelyet a levelek feltűnő krémszínű szegélye és az őszi illatos virágzása tesz különlegessé. A fajta másik elnevezése Osmanthus heterophyllus 'Argenteomarginatus'. Ez a növény a magyalszerű, szúrós leveleivel, a tarka, egész évben dekoratív lombozatával és a késő nyári illatos virágaival az egyik legkedveltebb díszcserje a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a kiváló télállósága és a városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A tarka levelű illatcserje egy lassú növekedésű, sűrű, bokros habitusú, örökzöld cserje. Kifejlett magassága és szélessége 1,5-2,5 méter között alakul, ami sűrű, zárt bokrot eredményez. Növekedési erélye lassú; a végleges méret eléréséhez 10-20 év szükséges. A hajtások sűrűn elágazóak, a növény nem omlik szét. A kéreg szürkésbarna, sima.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A levelek átellenesek, bőrszerűek, a fiatal hajtásokon magyalszerűen szúrósak, az idősebb levelek széle gyakran ép. A 'Variegatus' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek kétszínűsége: a levél középső része sötétzöld vagy szürkészöld, míg a levél széle feltűnő, egyenletes krémszínű vagy fehér, ami a növényt egész évben dekoratívvá teszi. A lombozat egész évben a növényen marad, ami a növényt télen is dekoratívvá teszi.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a levélhónaljakban kialakuló, laza csoportokban helyezkednek el. A virágok aprók, csöves, tölcsér alakúak, négykaréjosak, fehérek, és a 'Variegatus' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok rendkívül kellemes, jázminra emlékeztető illata, amely távolról is érzékelhető, és vonzza a méheket és más beporzó rovarokat. A virágzási időszak a késő nyártól a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően augusztustól októberig. A virágokat követően a növény apró, kékesfekete, gömbölyded bogyókat fejleszt, amelyek a madarak számára táplálékot nyújtanak.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, kékesfekete bogyókat fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A tarka levelű illatcserje napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legintenzívebb lombozatszínt és a bőséges virágzást napos, szellős fekvésben hozza. Félárnyékban a levelek szegélye kevésbé intenzív lehet.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, termékeny, üde talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli.

Öntözés: A tarka levelű illatcserje közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A tarka levelű illatcserje metszése fontos a sűrű habitus és a kívánt forma fenntartása érdekében, különösen sövényként történő nevelés esetén. A metszést tavasszal (március-április) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Sövénymetszés: Sövényként ültetve a növényt évente 1 alkalommal nyírjuk vissza a kívánt magasságra és formára.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat.

Telelés és fagytűrés: A tarka levelű illatcserje kifejezetten kiváló télállóságú, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, télen is dekoratív. Fontos, hogy a növény védett, szélvédett helyen álljon, mert a téli, száraz, hideg szelek károsíthatják a lombozatot.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A tarka levelű illatcserje a tarka lombozatának, az őszi illatos virágzásának, az örökzöld jellegének és a sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserje a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a sűrű habitus és a tarka lombozat miatt kiváló magányos díszelem.

Sövényként, védősövényként – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt kiváló választás örökzöld, térelválasztó sövények kialakítására.

Vegyes cserjeágyásokba, erdőszéli kertekbe, városi kertekbe – jól tűri a városi környezetet, és a tarka lombozat feltűnő színfoltot biztosít.

Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a lassú növekedés és a kompakt méret miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet és a szeles körülményeket.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A tarka levelű illatcserje tarka lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Sötét levelű örökzöldekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a növény krémszínű levélszegélyét.

Virágos cserjékkel és évelőkkel: Hortenziával, rododendronnal – a virágzó cserjék színei kiegészítik a növény strukturális megjelenését.

Lila virágú növényekkel: Levendulával, macskamentával – a lila és a tarka lombozat harmonikus, friss kontrasztot alkotnak.

Arany levelű növényekkel – a krémszínű szegély és az arany lombozat egymás mellett meleg, napsütötte hatást keltenek.

USDA besorolása: H5 (Magyarországon a tarka levelű illatcserje teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -15°C és -20°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Tarka levelű piros rózsalonc	**Weigela 'Brigela'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Rendkívül látványos újdonság, sötétzöld levelei aranysárga szegélyűek, nyár elején tömegesen nyílnak gyönyörű bordó virágai! Zóna:5b

Tarkalevelű ezüstfa	**Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'**	4 550 Ft	4 550 Ft

Az Elaeagnus ebbingei 'Gilt Edge' (Tarkalevelű ezüstfa) egzotikus megjelenésű, dús lombozatú, örökzöld cserje. Levelei fényesek, aranysárga szegélyűek. Védett helyre ültessük, de látványos színhatású lombozatával edényes növénynek is alkalmas. 7a-9b USDA-zóna

Tavaszi bangita	**Viburnum x burkwoodii**	3 450 Ft	3 450 Ft

A Viburnum × burkwoodii, közismert nevén tavaszi bangita, egy sűrűn elágazó, több szárú cserje, amely jellemzően 2,4-3 méter magasra, és 1,5-2,1 méter szélesre nő.Porcelánfehér, de bimbóban rózsaszínű virágai lapos 5-10 cm-es fürtökben nyílnak áprilisban. A virágokat lelógó, piros bogyószerű csonthéjas termések követik, amelyek feketére érnek. A termés nem különösebben hivalkodó. Tojásdad alakú, fényes, sötétzöld levelei (akár 10 cm hosszúak is) ősszel bordóvá válnak, de a meleg déli éghajlaton örökzöldek maradnak. Ez a hibrid a V. utile és a V. carlesii keresztezése. Különleges jelző tiszteleg Albert és Arthur Burkwood testvérek, angol faiskolai termesztők és növényi hibridisták előtt.
USDA 7. és 8. zóna
Könnyen termeszthető átlagos, közepes nedvességtartalmú, jó vízelvezetésű talajban, teljes napsütésben vagy félárnyékban. A nedves vályogtalajokat kedveli, de sokféle talajt tolerál. Az érett növények általában jó szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. Szükség szerint metsszük közvetlenül a virágzás után, azonban az elnyílt virágok metszése megakadályozza a nyári terméshozamot, ami kétségtelenül nem túl látványos ennél a hibridnél. A legjobb keresztbeporzás és a későbbi terméshozam érdekében a cserjéket csoportokban ültessük, ne pedig egyesével. 5b-9b USDA-zóna

Téli jázmin	**Jasminum nudiflorum**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Téli jázmin (Jasminum nudiflorum) egy alacsony, cserjés növény, amely 1-2 méter magasra is megnőhet. Jellemzője a hajlékony, zöld hajtások, amelyek télen virágoznak, éppen amikor a legtöbb növény még nem bontogatja virágait. A sárga, cső alakú virágok kellemes illatúak, és vonzzák a méheket és más pollinátorokat. A Téli jázmin jól alkalmazkodik a különféle talajviszonyokhoz, de a legjobban a jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talajon fejlődik. Szoliter növényként, valamint támrendszerre futtatva, kerítésekre és falakra is ideális választás, amelyedésével szép színfoltot ad a téli tájnak.
Gondozási útmutató
A Téli jázmin gondozása viszonylag egyszerű:

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű, így az öntözést a talaj nedvességétől függően érdemes végezni. A túl szárazságot és a pangó vizet is kerülni kell.
Talaj: Legjobban a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajban fejlődik, de tolerálja a gyengébb talajminőséget is.
Metszés: A virágzás után célszerű a visszametszés, hogy serkentsük az új hajtások fejlődését és a növény formáját megőrizzük.
Napsütés: A Téli jázmin napos vagy félárnyékos helyet kedvel, de a teljes napsütést a legjobban tolerálja.

Ültetési javaslat
A Téli jázmin ültetésekor válasszunk napos vagy félárnyékos helyet, ahol jó vízelvezetésű talaj található. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után alaposan öntözzük meg a növényt. Ha támrendszert szeretnénk kialakítani, gondoskodjunk a megfelelő támasztékról a növény számára.
6a-9b USDA-zóna

Telt rózsaszín virágú kerti hortenzia	Hydrangea macrophylla	4 550 Ft	4 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A telt rózsaszín kerti hortenzia egy tömör, gömbölyded habitusú lombhullató cserje, amely 100-150 cm magasra és szélesre nő. Fő értéke a nagy, többszörösen teljes, gömb alakú rózsaszín virágzatok, amelyek június-szeptember hónapokban nyílnak. A virágok számtalan kis, töltött rózsaszín szirmú virágból állnak, amelyek gazdagon borítják a bokrot. A világoszöld, nagyméretű levelek tojásdad alakúak és élénk zöld színűek. A növény vesszői erősek és felállóak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag, közepesen nedves talaj

Távolság: 120-150 cm-es távolsággal

Használat: Bokorágyások, alapcserje, árnyékos kertek, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal, csak a száraz vagy gyenge hajtások eltávolítása

Télvédelem: Téli védelem ajánlott, különösen fiatal növényeknél

Öntözés: Magas vízigényű, a szárazságot nem tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal speciális hortenzia trágyával

Általános: A virágszín a talaj pH-jától függ, meszes talajon rózsaszín

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Árnyékos kertek

Falusi kertek

Városi kertek

Árnyas virágágyások

Texanum japán fagyal	Ligustrum japonicum 'Texanum'	26 400 Ft	27 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A Texanum japán fagyal sima, bőrszerű levelei miatt igen népszerű sövénynövény. Fehér virágai nyár elején nyílnak és igen kellemes illatot árasztanak, bár nem a virágzás a fő díszítőértéke. Bogyótermése miatt vonzó lehet a madarak számára. Teljes napsütésben vagy félárnyékban érzi jól magát. Télálló, és az átlagos talajtípusokat is jól viseli, amennyiben a talaj jó vízelvezetésű. Rendszeres metszést igényel a kívánt forma megőrzése érdekében, különösen sövényként nevelve. Kertstílus: Alkalmas formális kertekbe mint sövény, de jól mutat mediterrán és modern kertekben is. Használható kerítések mellett vagy térelválasztóként. Ültetési javaslat: A sövényként ültetett Texanum japán fagyal töveit 60-90 cm távolságra ültessük egymástól, hogy sűrű, zárt sort alkothassanak. Ügyeljünk a megfelelő napfény biztosítására és a jó vízelvezetésű talajra. Társított növények: Jól kombinálható más örökzöldekkel, mint a babérmeggy (Prunus laurocerasus), valamint alacsony évelőkkel, mint a levendula (Lavandula) vagy csenkesz (Festuca), amelyek kiegészítik a fagyal zöld színét. USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a Texanum japán fagyal mérsékelten télálló; az USDA 7-es, 8-as, 9-es és 10-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) védett, szélvédett helyen, takarással nevelhető. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok károsíthatják. 7b-9a USDA-zóna			
Tölgylevelű hortenzia	Hydrangea quercifolia	4 700 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Tölgylevelű hortenzia egy széles, bokros növekedésű lombhullató cserje, amely 150-200 cm magasra és 150-250 cm szélesre nő meg. Levelei nagyok, mélyen karéjosak, jellegzetesen tölgylevelű formájúak, melyek sötétzöld színűek és érdes felületűek. Ősszel a levelek ragyogó bíborvörös, narancsvörös és bordó színeket öltenek. Virágzata kúpos, felálló formájú, amely június-augusztus között nyílik. A virágok eleinte fehérek, majd később halványlilás vagy rózsaszínes árnyalatúvá válnak. A virágzatok akár 15-25 cm hosszúak is lehetnek.
Gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyeket kedvel, de reggeli napot jól tűri

Talajigény: Jól vízelvezető, humuszban gazdag, savanyú talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, a szárazságot nem kedveli

Metszés: Alig igényel metszést, tavasszal csak a száraz ágakat kell eltávolítani

Télállóság: Jó télállóságú, de fiatal növényeket télen érdemes védeni

Trágyázás: Tavasszal speciális hortenzia trágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Erdei kertekben ideális választás

Árnyékos kertrészek díszítésére

Háttérnövényként többedmagával

Társítás: Árnyéktűrő évelőkkel, páfrányokkal, rododendronokkal

Őszi színfőként különösen értékes

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek

Erdőszéli ültetések

Természetes kertek

Lakókerti részek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Parkok és nagyobb kertek			
Törpe bangita	Viburnum davidii	9 900 Ft	11 900 Ft

A Törpe bangita egy sűrű, domború habitusú örökzöld cserje, amely 60-100 cm magasra és 100-150 cm szélesre nő. Fő értéke a sötétzöld, bőrszerű, mélyen erezett levelek, amelyek 7-15 cm hosszúak és lándzsa alakúak. Május-júniusban lapos, fehér virágzatok nyílnak, amelyeket szeptembertől hosszú ideig tartó, fémes kék bogyók követnek. A bogyók kialakulásához hím és nőivarú egyedek ültetése szükséges. A növény lassú növekedésű és rendkívül tömör szerkezetű.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag talaj

Távolság: 80-100 cm-es távolsággal

Használat: Talajtakaró, alapcserje, sövény, erdei kertek, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Alig igényel metszést, tavasszal alakítható

Télvédelem: -15°C-ig télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot rövid ideig tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Erdei kertek

Árnyékos kertek

Alapcserjés beültetések

Városi zöldterületek

Parkok

törpe csigolyafűz	Salix purpurea 'Nana'	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A törpe csigolyafűz (Salix prpurea 'Nana) a fűzek kertekben jól alkalmazható faja. Tág tűrőképessége miatt a legtöbb kertbe telepíthető. A növény alacsony, mely kedvező tulajdonság lehet kis cserjefoltokba, közlekedő utak mellett, vagy akár virágágyakon belüli alkalmazás esetén. Egészséges, könnyen fenntarhtó növény, melyet egyébként lehet sövénynyíróval is nyírni, ilyenkor a vesszői erősebben mefásodnak. A talajviszonyok tekintetében nem válogat, nem fagyérzékeny, és betegségek sem károsítják. A legtöbb fűzhöz hasonlóan viszont kedveli a párásabb termőhelyeket, és meghálálja, ha több vizet kap. USDA zóna: 3b-8b			
Törpe gyöngyvirágcserje	Deutzia gracilis 'Nikko'	3 250 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Ha egy alacsony termetű, mégis rendkívül látványos cserjét szeretne ültetni a kertedbe, a Deutzia gracilis 'Nikko' (törpe gyöngyvirágcserje) tökéletes választás. Ez a bájos növény késő tavasszal hozza el varázslatos virágzását: apró, csillag alakú, hófehér virágai olyan sűrűn borítják az ívesen lehajló ágakat, hogy a lombozat szinte teljesen eltűnik alattuk. Nem véletlenül az egyik legkedveltebb törpe díszcserje.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Nikko' egy lassú növekedésű, törpe termetű lombhullató cserje. Növekedési formája jellegzetesen terülő, szétterülő, kissé kúszó: ágai kecsesen ívesen lehajlanak, ami természetes, lágy megjelenést kölcsönöz neki. Levelei lándzsásak, élénkzöldek, ősszel pedig gyönyörű bordós-bíbor színűre színeződnek, így a virágzás után is dísze a kertnek. Kifejlett magassága mindössze 50-60 cm, de szélessége elérheti a 80-100 cm-t is, így kiváló talajtakaró.
Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen is szépen fejlődik. A legdúsabb virágzást napos fekvésben hozza.

Talaj: Nem igényes, az átlagos kerti talajokban jól érzi magát. Fontos, hogy a talaj jó vízáteresztő legyen, mert a pangó vizet nem szereti.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel. Idősebb korában szárazságtűrő, de hosszabb aszályos időszakban hálás a locsolásért.

Metszés: A bőséges virágzás megőrzéséhez érdemes közvetlenül a virágzás után (június-július) visszavágni a virágzott hajtásokat kb. egyharmadukra. Ezzel serkentjük az új hajtások képződését, amelyek a következő évi virágokat hozzák. A túl öreg, elöregedett ágakat 3-4 évente tőből is kivághatjuk.

Télállóság: Teljesen télálló, Magyarországon gond nélkül átvészeli a telet.

Kertstílus és növénytársítások:
Kis mérete és bájos megjelenése miatt sokféleképpen felhasználható:

Kis kertek, előkertek: Helytakarékos, mégis rendkívül dekoratív.

Szegélyek, ágyásszegély: Alacsony termete miatt ideális évelőágyások vagy utak szegélyezésére.

Talajtakaró: Terjedő habitusával gyorsan befedi a talajt, megakadályozva a gyomok növekedését.

Sziklakertek, évelőágyások: Jól illik alacsonyabb évelők közé.

Leplekre emlékeztető virágai miatt remek választás romantikus, falusias kertekbe.

Ajánlott növénytársítások:

Tavaszi hagymások: A 'Nikko' virágzási ideje egybeesik a késői tulipánokéval és a díszhagymákéval. Ültessünk mellé lila díszhagymát (Allium) vagy rózsaszín tulipánokat a szép színkombinációért.

Kék virágú évelők: A hófehér virágok gyönyörűen kiemelik a kék virágú évelőket, mint a kék szarkaláb (Delphinium) vagy a macskamenta (Nepeta).

Páfrányok és árnyékliliomok: Ha félárnyékba ültetjük, társíthatjuk tarka levelű páfrányokkal vagy árnyékliliommal (Hosta) , amelyek lombjaikkal egész nyáron át díszítenek.

Alacsony díszcserjék: Társíthatjuk más alacsony termetű cserjékkel, mint a törpe mandula (Prunus tenella) vagy a törpe hóbogyó (Symphoricarpos) fajtákkal.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténerbe is ültethető: Teraszon, erkélyen cserépben is tartható, ahol közelről élvezhetjük virágpompáját.

5a USDA-zóna

Törpe japán vérborbolya	**Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'**	3 700 Ft	4 500 Ft

Legfeljebb fél méteres magasságot ér el, lombja sűrű, nagyon szép sötétvörös, őszi lombszíne kárminvörös. Alacsony sövénynek, térhatárolónak kiváló. Tavasszal tömegesen nyílnak élénksárga virágai, melyekből fénylő piros bogyók fejlődnek, s ezek télen is sokáig a bokron maradnak. Könnyen nevelhető, talajban nem válogató, hálás, edzett növény, a pangó vizet nem szereti. 1942-től kezdték forgalmazni Hollandiában, majd nagy népszerűségének köszönhetően egész Nyugat-Európában gyorsan elterjedt. Sziklakerteknek is feltűnően szép dísze, a metszést, formára nyírást is kitűnően bírja.

5b USDA-zóna

Törpe tarackos som	**Cornus stolonifera 'Kelsey'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Elsősorban talajtakarásra alkalmas, kékeszöld lombozatú, gömbölyded törpecserje, mely mintegy fél méteres magasságú lesz. Sarjaival, illetve legyökeresedő oldalágaival oldalirányban terjed. Kis fehér virágzatai tavasz végén nyílnak. 5a-8b USDA-zóna

Törpefűz	**Salix subopposita**	4 950 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Törpefűz Dél-Korea és Japán (Honsú és Kiusú szigete) hegyvidéki, nedves rétekről származó, különleges megjelenésű törpe cserje. Ritkaságának és egzotikus megjelenésének köszönhetően a sziklakert-rajongók és a különleges növényeket kedvelő kertészek körében igazi csemegének számít.
Külső megjelenés
A Salix subopposita alacsony, elfekvő vagy laza, alacsonyan feltörő növekedésű cserje, amely kifejlett magassága mindössze 10-40 cm, de szélessége akár az 1,5-2,5 métert is elérheti, így kiváló talajtakaró is lehet. A fiatal hajtások vékonyak, felállóak, kezdetben sűrűn szőrösek, majd idővel barnára színeződnek.
A növény legjellemzőbb tulajdonsága a levelek különleges állása: a lándzsás vagy hosszúkás (1-3 cm hosszú, 0,5-1 cm széles) kékeszöld levelek a száron szinte átellenesen, egymással majdnem szemben helyezkednek el . Ez a ritka tulajdonság a Hebe nemzetségre emlékezteti a szakembereket. A levelek fiatalon selymesen szőrözöttek, később felülről kopaszodnak, fonákjukon azonban megtartják a laza, sárgásszürke szőrözetet . A levél széle ép, töve és csúcsa éles .
Virágzás
A levelek kihajtása előtt, március-április hónapokban hozza apró, de feltűnő barkavirágzatát. A porzós barkák (hím ivarú) 1,5-2,5 cm hosszúak, hengeres-tojásdad alakúak, színük sárgás, néha vöröses jellegzetességekkel . A termős barkák (női ivarú) kisebbek, 1-2 cm hosszúak . A virágok kiváló korai méhlegelőként szolgálnak. Érdekesség, hogy a kertekben főleg a hímivarú példányok terjedtek el.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. A napos fekvésben a legsűrűbb a lombozat és a legbőségesebb a virágzás.

Talaj: nedves, jó vízáteresztő képességű talajt igényel, de meglepő módon a pangó vizet, sőt a rossz vízelvezetésű, mocsaras területeket is jól tűri . A pH tekintetében nem válogatós: savanyú, semleges és lúgos kémhatású talajban is megél .

Öntözés: kimondottan vízigényes. A szárazságot nem tűri, ezért a rendszeres, bőséges öntözés elengedhetetlen, különösen a fiatal növényeknél és a nyári hónapokban.

Tápanyag-utánpótlás: nem tápanyagigényes; a természetes talajerő általában elegendő számára. Sovány talajokon tavasszal egy kevés komposzttal kínálhatjuk meg.

Metszés: rendszeres metszést nem igényel. Késő télen vagy kora tavasszal az elszáradt vagy sérült ágak eltávolíthatók. A túlzott metszést nem kedveli.

Telelés: teljesen télálló, a -15°C-ot is gond nélkül elviseli (RHS H5 besorolás) , így Magyarország egész területén biztonságosan nevelhető.

Kártevők, betegségek: a többi fűzfajhoz hasonlóan érzékeny lehet a levéltetvekre, hernyókra, levélbogarakra, fűzlevéldarazsakra, valamint a fűzrákra, antraknózisra, lisztharmatra és a varasodásra .

Kertstílus, ahová illik
Az átellenes levelű törpefűz mérete és igényei miatt kifejezetten specializált kertrészekbe ajánlott :

Sziklakertekbe (rock garden): a legnépszerűbb felhasználási módja; kövek közé ültetve a japán hegyi rétek hangulatát idézi.

Japánkertekbe, orientális kertekbe: alacsony, párnás növekedése tökéletesen illik a japánkerti esztétikához.

Tőzegágyásokba (peat garden): savanyú talajigénye miatt kiváló választás.

Vízparti részekbe, patakok, tavak mellé: természetes élőhelyén is nedves, mocsaras területeken nő, így ideális víz közelébe.

Talajtakarónak: alacsony növekedése és szélesedő habitusa miatt nagyobb felületek beborítására is alkalmas.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Alacsony fenntartású, természetes kertekbe: ahol a növények maguktól fejlődhetnek, ez a fajta is jól érzi magát.

Változatos növénytársítások
A Salix subopposita kékeszöld lombozata és alacsony termete miatt kitűnően kombinálható más, hasonló igényű növényekkel:

Törpe rododendronokkal és havasszéppel (Kalmia): hasonló savanyú talaj- és nedvességigényük miatt tökéletes társak a tőzegágyásban.

Páfrányokkal: különösen a kisebb termetű fajokkal, amelyek a fűz alá ültetve árnyékot és nedvességet biztosítanak a gyökereknek.

Pozsgásokkal: a varjúháj (Sedum) egyes alacsony fajtái és a kövirózsa (Sempervivum) jól illenek a sziklakerti kompozícióba.

Alacsony díszfüvekkel: a kék csenkesz (Festuca glauca) vagy a törpe sásfajok (Carex) textúrában kiegészítik a fűz lombozatát.

Kőtörőfűvekkel (Saxifraga): a sziklakertben a kövek között a fűz tövébe ültetve talajtakaróként funkcionálhatnak.

Tavaszi hagymásokkal: a krókuszok és a gyöngyike (Scilla) a fűz laza koronája alatt kora tavasszal még bőven kapnak elegendő fényt.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarország egész területén, 5b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Twilight japán szentfa	**Nandina domestica 'Twilight'**	4 950 Ft	5 350 Ft

A Nandina domestica 'Twilight', ismertebb nevén 'Twilight' japán szentfa egy elegáns és dekoratív örökzöld cserje, amely a Nandina domestica egyik tarka fajtája. A növény lombozata igazi látványosság: a levelek alapvetően zöld színűek, azonban fehér foltokkal és szélekkel tarkítottak, amely az év során rózsaszínes és vörös árnyalatokat vehet fel, különösen a fiatal levelek esetében. Ezzel a 'Twilight' színes és dinamikus megjelenést biztosít, ami folyamatosan változó látványt nyújt.
A növény körülbelül 60-90 cm magasra nő, így kompakt méretének köszönhetően jól beilleszthető kisebb kertekbe, előkertekbe és teraszokra is. Teljes napfénytől a részleges árnyékig sokféle fényviszonyt elvisel, és jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, amennyiben a talaj jó vízelvezetésű. A levelek mellett kisebb, fehéres virágok is megjelennek tavasszal, melyeket később kis, piros bogyók követhetnek.
Ültetési javaslat:

Talaj: Jól vízelvezetett talajt kedvel.
Hely: Teljes napfénytől a részleges árnyékig jól érzi magát.
Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel a gyökérzet megerősödése érdekében. Ezt követően mérsékelt öntözést igényel.
Társítás: Jól kombinálható más színes lombú cserjékkel, mint például a heuchera, vagy tavaszi virágos évelőkkel

A Nandina domestica 'Twilight' változatos színekkel és látványos megjelenéssel pompázik az év minden szakában, ezzel igazi különlegességgé válik a kert megjelenésében.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Viráglonc	**Kolkwitzia amabilis**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Virághonc, más néven Kínai virághonc vagy Szépségcserje, Közép-Kína hegyvidékeiről származó, rendkívül látványos lombhullató díszcserje. A loncfélék (Caprifoliaceae) családjába tartozó növényt Giuseppe Giraldi jezsuita misszionárius fedezte fel, és az 1910-es évektől kezdett elterjedni a nyugati kertekben. Nevét Richard Kolkwitz német botanikusról kapta .
Terebélyes, szétterülő habitusú cserje, amely kifejlett állapotban 2-3 méter magasra és ugyanilyen szélesre nő. Ívesen lehajló, vékony ágai akár 2 méternél is hosszabbra nőhetnek, végeik gyakran a talajt súrolják, ami különösen elegáns, könnyed megjelenést kölcsönöz a bokornak. Idősebb példányok kérge jellegzetesen hámlik, világosbarna színű. Levelei kicsik, tojásdadok vagy lándzsásak, színük sötétzöld, fonákjukon puha szőrösek . Ősszel a lombozat vonzó vöröses-sárgás árnyalatot ölt.
A növény igazi attrakciója a késő tavaszi, kora nyári virágzás. Május végétől június közepéig a hajtásokat szinte teljesen elborítják az apró, tölcséres vagy harang alakú virágok, melyek a hajtások végén sűrű fürtökben, párosával nyílnak . A virágok különleges színjátéka, hogy bimbós állapotban sötétrózsaszínűek, kinyílva pedig világosrózsaszínűvé, néha csaknem fehérré fakulnak. A tölcsér torkában élénksárga mintázat díszíti, ami még vonzóbbá teszi a virágokat . Illatuk finoman édeskés, a méheket és más beporzó rovarokat is vonzza.
Igényei és gondozása
A Virághonc rendkívül alkalmazkodóképes és hálás növény, amely kevés gondozással is bőven meghálálja a bizalmat. Napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt kedvel, de a legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza. Talaj tekintetében nem válogatós: a jó vízelvezetésű, átlagos adottságú kerti talajban is szépen fejlődik, a meszes talajt is jól tűri. A pangó vizet nem szereti, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli. Száraz időszakokban azonban meghálálja a rendszeres öntözést.
Gondozása egyszerű. Metszést általában nem igényel, csupán az elöregedett, elszáradt, 3-4 éves vesszőket érdemes időnként eltávolítani a bokor belsejéből. Ha formázni vagy ritkítani szeretnénk, a metszést közvetlenül a virágzás után, nyár elején végezzük el, mert a növény az előző évi hajtásokon hozza virágait . A későbbi, őszi vagy kora tavaszi metszés a következő évi virágokat veszélyeztetné. Tápanyagigénye közepes, tavasszal szervestrágyával támogathatjuk . Télállósága kiváló, akár -29 °C-ig is ellenáll, így hazánkban gond nélkül teleltethető . Várostűrő, a légszennyezést is jól tolerálja .
Felhasználás a kertben
Sokoldalú megjelenésének és látványos virágzásának köszönhetően a Virághonc a kert számos pontján megállja a helyét. Kiválóan alkalmas szoliterként, magányosan ültetve, ahol teljes pompájában kibontakozhat, és messziről magára vonja a figyelmet. Virágos sövényként is remekül funkcionál, ilyenkor 0,5-0,6 méteres tőtávolsággal ültessük . Vegyes cserjecsoportokba ültetve szép hátteret ad más virágzó cserjéknek, vagy éppen maga lehet a csoport fő attrakciója . Természetes hatású, vadvirágos kertekbe, romantikus hangulatú előkertekbe is ideális választás. Nagyobb kertészeti létesítményekben, díszparkokban nagy, színpompás foltok alakíthatók ki belől .
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes olyan növényeket választani, amelyek a Virághonc virágzása után veszik át a főszerepet, vagy színben, formában kiegészítik azt. Kiváló partnerei lehetnek a bugás hortenziák (Hydrangea paniculata) és a nyári orgonák (Buddleja), amelyek a virághonc elvirágzása után biztosítják a kert színpompáját. Gyöngyvesszővel (Spiraea) és jezsámennel (Philadelphus) társítva romantikus, könnyen fenntartható virágos sövényt alakíthatunk ki. Díszfüvekkel, például tollborzfűvel (Pennisetum) vagy mexikói árvalányhajjal (Stipa) ültetve természetes hatású, könnyed kompozíciót hozhatunk létre. Alacsonyabb termetű évelőkkel, mint a levendula (Lavandula) vagy a macskamenta (Nepeta), a Virághonc tövében is mutatós együttest alkothatunk.

Zóna:5a

Vivellii alpesi erika	**Erica carnea 'Vivellii'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Vivellii alpesi erika (Erica carnea 'Vivellii') – Az alacsony, kora tavaszi virágú örökzöld

A Vivellii alpesi erika a hangafélék családjába tartozó, Közép-Európában őshonos, örökzöld törpecserje. A fajtát 1906-ban Svájcban, az Engadin-Alpokban gyűjtötték, és azóta az egyik legkedveltebb alpesi erika a kertekben. Ez a növény a késő téltől a kora tavaszig nyíló, élénk színű virágaival és sötét, egész évben dekoratív lombozatával az egyik legkedveltebb talajtakaró a sziklakertekben és hangakertekben. A könnyű gondozhatósága, a kiváló télállósága és a méhek vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Vivellii alpesi erika egy alacsony, elfekvő vagy felemelkedő hajtású, örökzöld törpecserje. Kifejlett magassága 10-15 cm, szélessége 25-35 cm között alakul. Növekedési erélye lassú, évi 3-5 cm-es gyarapodással, a hajtások sűrűn elágazóak, a talajon elfekvők, ami párnaszerű, szőnyegszerű habitust eredményez.

A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek aprók, tűszerűek, 2-4 mm hosszúak, átellenesek vagy örvös állásúak, fényes sötétzöld színűek. A 'Vivellii' fajta egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy a téli hideg hatására a lombozat bronzos vagy lilás árnyalatot ölt, ami a növényt a hidegebb hónapokban is különösen dekoratívvá teszi. A lombozat egész évben a növényen marad.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, egyoldalú, 5-10 cm hosszú fürtökben helyezkednek el. A virágok aprók, 4-6 mm hosszúak, harang vagy tölcsér alakúak, sötét bíborlila vagy karminpiros színűek, a virágok mélyebb árnyalatai idősebb korban karmazsinvörössé válnak. A virágzási időszak a késő téltől a kora tavaszig tart: Magyarországon jellemzően februártól májusig, a legbőségesebb virágzás márciustól áprilisig figyelhető meg. Ez a kora tavaszi virágzás különösen értékes, mivel ekkor még kevés más növény virágzik a kertben. A virágok a méheket, a poszméheket, a zengőlegyeket és más kora tavaszi beporzó rovarokat vonzzák, és a növény a beporzók számára fontos nektárforrást biztosít.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Vivellii alpesi erika napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legdúsabb virágzást és a legintenzívebb lombozatszínt napos, szellős fekvésben hozza.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, humuszban gazdag, savanyú vagy semleges kémhatású talajban érzi magát. A 'Vivellii' fajta azonban a meszes talajokat is tolerálja, ami az alpesi erikák között ritkaságnak számít. A pangó vizet nem tolerálja; a túlzott nedvesség gyökérrothadáshoz vezethet. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal vagy homokkal keverni a szerkezet és a vízelvezetés javítása érdekében.

Öntözés: A Vivellii alpesi erika közepes vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, de a két öntözés között hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a virágzás után (április-május) adható egy kevés lassan oldódó, hangák számára kifejlesztett műtrágya. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők. A friss istállótrágya használata veszélyes.

Metszés és ápolás: A Vivellii alpesi erika metszése fontos a növény sűrűségének és virágzásának fenntartása érdekében. A metszést a virágzás után, kora tavasszal (április-május) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Visszavágás: A virágzó hajtásokat vágjuk vissza a levélzet szintjéig, hogy serkentsük az új, fiatal hajtások képződését és a bokrosodást.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy kopasz hajtásokat.

Fontos: A metszést csak a zöld, hajtásos részekre korlátozzuk; a régi, fásodott részekből a növény nehezen hajt ki.

Telelés és fagytűrés: A Vivellii alpesi erika kifejezetten kiváló télállóságú; akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad, bár a hidegebb időszakokban a levelek bronzos vagy lilás árnyalatot kaphatnak, ami normális jelenség. A téli szél és a pangó víz nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy, ezért a jó vízelvezetésű talaj és a védett fekvés kiemelten fontos.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Vivellii alpesi erika a kora tavaszi virágzásának, a sötét, egész évben dekoratív lombozatának, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb talajtakaró növény a kertekben és parkokban:

Talajtakaróként napos vagy félárnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Sziklakertekbe, kőkertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Hangakertekbe – más hangafélékkel (pl. Calluna, Erica) együtt harmonikus, színpompás együttest alkot.

Sírkertekbe – az örökzöld lombozat és a kora tavaszi virágzás miatt gyakran választott sírkerti növény.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – kiválóan nevelhető konténerben is.

Vágott virágnak – a virágok frissen vágva is dekoratívak.

Méhlegelőként – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a kora tavaszi beporzók számára.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Vivellii alpesi erika sötétzöld lombozata és bíborvörös virágai számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, savanyú vagy semleges talajú) növénnyel kombinálhatók:

Más hangafélékkel: Calluna vulgaris (közönséges hanga), más Erica fajták – a különböző virágzási időszakok és színek egymás mellett gazdag, hosszan virágzó hatást keltenek.

Törpe tűlevelűekkel: Pinus mugo (törpefenyő), Juniperus (boróka) fajták – a sötétzöld háttér kiemeli a hanga virágait.

Alacsony növekedésű cserjékkel és évelőkkel – a hasonló méretű és igényű növényekkel együtt harmonikus, sziklakereti együttest alkotnak.

Kőzetekkel, kövekkel – a természetes sziklakerti környezetben a növény különösen jól érvényesül.

USDA besorolása: 5-8 (Magyarországon a Vivellii alpesi erika teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Vörösen kihajtó mirtuszlonc	**Lonicera nitida 'Red Tips'**	3 250 Ft	3 250 Ft

Széles, bokros növekedésű, örökzöld levelű cserje. Levelei a hajtások végén pirosak.

6b-9b USDA-zóna

Vörösödő végzetfa	**Clerodendrum bungei**	14 900 Ft	16 800 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A vörösödő végzetfa, más néven „büdöske” vagy „rózsás dicsőségvirág”, a Kínából, Tajvanról és Vietnam északi részéről származó, a lamiaceae (árvacsalánfélék) családjába tartozó lombhullató cserje. Nevét erős, furcsa illatáról kapta – míg virágai kellemesen, édeskésen illatoznak, a levelek dörzsölésre erős, sajátos, néhányak számára kellemetlen szagot árasztanak. Kifejlett magassága 1-2 méter, szélessége sarjazás révén akár 1-2 métert is elérhet.
Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a nyár végén (augusztus-szeptember) nyíló, feltűnő színű virágai. A virágok bíborvörösek, rózsaszínűek vagy rózsaszínes-lilák, a hajtások végén tömött, kerekded, akár 10 cm átmérőjű bugavirágzatokba tömörülnek. A virágok csövén mintegy 3-4 cm hosszú, vékony tubus fejlődik, amelyből öt fehér karéjú, szétterülő szirmocska nyílik ki – ez a szerkezet a korallvirágra emlékeztet. A levelek nagyok, 8-20 cm hosszúak és 5-15 cm szélesek, szív alakúak vagy széles tojásdadok, finoman fogazott szélűek. Felszínük közép- vagy sötétzöld, fonákjuk világosabb. A virágzást követően a növény apró, kékesfekete (sötétlila) bogyós terméseket hoz. Fontos tudni: a növény minden része gyengén mérgező!
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb a virágzás; félárnyékban is szépen fejlődik, de virágzása kissé gyengébb lehet.

Talaj: jó vízáteresztő, de nedvességmegtartó, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású (pH 6,0-7,0). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: közepes vízigényű, a rendszeres, mértékletes öntözést kedveli. A talajt tartsd egyenletesen nedvesen, de a pangó vizet kerüld.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával.

Metszés: kora tavasszal (március) a fagyott, sérült hajtások eltávolíthatók. Virágzás után visszametszhető a kívánt formára. Mivel a virágok az új hajtásokon nyílnak, a metszés nem károsítja a következő évi virágzást.

Gyökérsarjak kezelése: a végzetfa hajlamos a gyökérsarjakkal való terjeszkedésre. Kisebb kertekben ajánlott gyökérzáró gát beépítése vagy rendszeres sarjak eltávolítása, hogy megakadályozzuk a túlzott terjedést.

Telelés: teljesen télálló, Magyarországon a legtöbb régióban külön védelmet nem igényel. A fagyokra a hajtások visszafagyhatnak, de tavasszal a gyökérről újra kihajt.

Kertstílus, ahová illik Természetes hatású kertek („természetes kertek”), erdős szegélyek, vadvirágos kertek, tájkertek, nagyobb cserjecsoportok, illatos kertek (virágai miatt).
Változatos növénytársítások

Árnyéktűrő évelők: páfrányok (erdei páfrány, struccpáfrány), árnyékliliom (Hosta), tüdőfű (Pulmonaria), gyöngyvirág (Convallaria majalis).

Tavasszal nyíló növények: hunyor (Helleborus), krókusz, keltike (Corydalis), törpe nárcisz.

Illatos cserjék: illatos bangita (Viburnum carlesii), orgona (Syringa vulgaris).

Őszi évelők: őszi őszirózsa (Aster), kőtörőfű (Saxifraga).

Díszfüvek: tollbuga (Molinia), japán vértfű (Imperata cylindrica 'Red Baron').

Alacsony talajtakarók: árnyéki meténg (Vinca minor), borostyán (Hedera helix).

7b-10b USDA-zóna

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Watermelon selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Watermelon'**	4 950 Ft	5 350 Ft
A Watermelon selyemmirtusz (Lagerstroemia 'Watermelone') gyors növekedésű selyemmirtusz fajta, mely 3-4 méteres magasságot ér el. A liszharmat ellen kiválóan ellenáll. Ha már megfelelően begyökeresedett, akkor jól tűri a szárazságot. Gyenge minőségű talajokban is megél, akár építési törmelékkel szennyezett városi környezetben is. 20-30 cm-es hatalmas virágzatainak színe valóban a görögdinnye húsához hasonlít a legjobban. Természetesen a megvastagodott törzsön jól látszik a fajra jellemző foltos kéreg, és nem marad el az őszi bronzos levélszíneződés is.			
Weber's Favorit pompás aranyfa, aranyvessző	**Forsythia x intermedia 'Weber's Favorit'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Forsythia x intermedia 'Weber's Favorit', magyar nevén aranyvessző, egy igazi kuriózum az aranyfák között. Míg a hagyományos aranyfák hatalmas bokrokká cseperedhetnek, addig ez a fajta megmarad alacsony, kompakt termetűnek. Március-áprilisban, még a levelek megjelenése előtt hozza el varázslatos virágzását: a sárga, harang alakú virágok olyan sűrűn borítják a vesszőket, hogy a növény messziről egy aranyló dombnak tűnik. Ez a fajta a híres díszcserje-nemesítő, Weber munkásságát dicséri, és kifejezetten kisebb kertekbe, előkertekbe nemesítették ki.
Névhasználati megjegyzés: Sokan tévesen aranyesőnek nevezik ezt a növényt, azonban ez a megnevezés botanikailag helytelen és megtévesztő. A növény helyes magyar neve aranyvessző (illetve aranyfa), mivel vesszőin nyíló aranysárga virágairól kapta a nevét.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Weber's Favorit' egy törpe, lassú növekedésű lombhullató cserje. Habitusa kompakt, gömbölyded, ágai enyhén ívesen lehajlanak, ami természetes, rendezett formát ad a növénynek. Legfőbb dísze a kora tavaszi virágözön. Levelei a virágzás után jelennek meg, egyszerűek, tojásdadok, sötétzöldek, ősszel néha enyhén lilás-bordós árnyalatot ölthetnek. Kifejlett magassága mindössze 80-100 cm, szélessége 100-120 cm, így ideális választás kisebb kertekbe is.
Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy nagyon enyhén félárnyékos helyen érzi magát a legjobban. Napos fekvésben hozza a legdúsabb virágzatot.

Talaj: Kifejezetten igénytelen növény, de a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokat kedveli. Ültetéskor érdemes a talajt komposzttal javítani.

Öntözés: A telepítést követően gondozásra nem szorul. Közepes vízigényű, a már begyökeresedett példányok a rövid szárazságot is jól tűrik.

Télállóság (USDA-zóna): A 'Weber's Favorit' USDA 5a-8b zónákban teleltethető biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén megbízhatóan télálló, különösebb védelem nem szükséges számára.

Metszés: Mivel a virágokat az előző évi hajtásokon hozza, a metszást közvetlenül a virágzás után (április-május fordulóján) kell elvégezni. Ilyenkor a virágzott hajtásokat vághatjuk vissza, hogy serkentsük az új hajtások képződését, amelyek a következő évi virágokat hozzák. Idősebb korban 3-4 évente ritkító metszést is végezhetünk, az elöregedett ágakat tőből kivágva. Kompakt mérete miatt akár nyírott sövényként is tartható.

Kertstílus és növénytársítások:
Alacsony, kompakt mérete és korai virágzása miatt sokféleképpen felhasználható:

Kis kertek, előkertek: Kifejezetten kisebb helyekre nemesítették, ahol a nagy aranyfák már nem férnének el.

Sziklakert: A sziklakertekben ritkaságnak számító aranyvessző itt is megállja a helyét.

Virágzó alacsony sövény: Tömegével ültetve alacsony, virágzó sövényt alkothatunk belőle utak vagy teraszok mentén.

Szegélynövény: Magasabb ágyások szegélyezésére is ideális.

Konténeres növény: Teraszon, erkélyen cserépben is tartható.

Ajánlott növénytársítások:

Korai hagymások: A sárga aranyvessző alatt vagy előtt csodásan mutatnak a kék kisholdviola (Scilla) vagy a fehér és sárga krókuszok (Crocus).

Lila virágú évelők: Színkontrasztként ültessünk mellé később virágzó levendulát (Lavandula) vagy macskamentát (Nepeta).

Örökzöldek: A sárga virágok fantasztikusan kiemelkednek a sötétzöld örökzöldek, például a tuja (Thuja) vagy a hamisciprus (Chamaecyparis) előtt.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Korai évelők: Társíthatjuk tavaszi kankalinnal (Primula) vagy szívlevelű májvirággal (Hepatica).			
Talajtakarók: Alacsony termete miatt jól illik kúszó kecskerágó (Euonymus fortunei) vagykis kék meténg mellé.			
White Ball nyáriorgona	**Buddleja 'White Ball'**	3 750 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A White Ball nyáriorgona egy tömör, gömbölyded növekedésű, kompakt díszcserje, amely 100-120 cm magasra és szélesre nő. Fő értéke a nagy, kúp alakú, tiszta fehér virágzat, amelyek június szeptembere között folyamatosan nyílnak. A sűrűn egymás mellett álló, mézillatú virágok rendkívül vonzóak lepkék, méhek és más rovarnak. A lándzsa alakú, szürkészöld levelek sűrűn borítják a vesszőket.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon, minél több napfényben

Talaj: Jól vízáteresztő, átlagos kerti talaj

Távolság: 100-120 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliterként, vegyes ültetvényekben, rovarrbarát kertekben, konténerben

Gondozási útmutató

Metszés: Kora tavasszal (március) vágjuk vissza erősen, 20-30 cm magasságra

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Csak elültetés után és tartós szárazság idején

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon egyszerűen tartható, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Kistermetű kertek

Beporzóbarát kertek

Városi kertek

Konténeres kertészet

Vegyes cserjebeültetések

Nyári virágzással hangsúlyos kertek

White Ball nyáriorgona (nagy)	**Buddleia x White Ball**	8 950 Ft	8 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

White Ball™ nyáriorgona (Buddleja x 'White Ball') – A kompakt, fehér virágú késő nyári cserje
A White Ball™ nyáriorgona hibrid eredetű lombhullató cserje. A nemzetség magyar neve (nyáriorgona) a virágok orgonára emlékeztető illatára és a nyári virágzási időszakra utal, angol neve (butterfly bush) pedig a pillangók vonzására hívja fel a figyelmet. A 'White Ball' fajta a Ball™ sorozat tagja, amelyet a kivételesen kompakt, gömbölyded habitus és a bőséges virágzás jellemez. A fajta tiszta fehér virágaival és sűrű, gömbölyded bokrával az egyik legkedveltebb nyáriorgona a kisebb kertekben és konténerekben. A könnyű gondozhatósága, a kiváló szárazságtűrése és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A White Ball™ nyáriorgona egy rendkívül kompakt, sűrű, gömbölyded habitusú, lombhullató cserje. Kifejlett magassága és szélessége 60-90 cm között alakul, ami sűrű, bokros, párnaszerű tövet eredményez. Növekedési erélye közepes, a hajtások egyenesen felállók, ívesen hajlók, a növény nem omlik szét. A hajtások finoman szőrözöttek.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek átellenesek, lándzsásak, 3-6 cm hosszúak, szürkészöld színűek, a levél széle finoman fogazott, a levélfelület enyhén szőrözött. A lombozat egész szezonban dekoratív.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 10-20 cm hosszú, sűrű, végálló füzér, amelyen a virágok rétegesen, egymás felett helyezkednek el. A virágok aprók, 1-2 cm átmérőjűek, csöves, tölcsér alakúak, négy szirommal, tiszta fehér színűek, a virágok közepén sárgás folttal. A 'White Ball' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok tiszta, hófehér színe és a kellemes, édes illata, amely távolról is érzékelhető, és vonzza a pillangókat, a méheket, a poszméheket és más beporzó rovarokat. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően júliustól szeptemberig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár októberig is meghosszabbítható. A virágok a kertben feltűnő, elegáns színfoltot biztosítanak, és a növény a beporzók valóságos mágneseként működik.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A White Ball™ nyáriorgona napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást teljes napsütésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat és a meszes talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; a téli nedvesség különösen veszélyes lehet.

Öntözés: A White Ball™ nyáriorgona szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, virágzó cserjék számára kifejlesztett műtrágya. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy.

Metszés és ápolás: A White Ball™ nyáriorgona metszése fontos a bőséges virágzás és a növény rendezett megjelenése érdekében. A metszést kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt (február-március) kell elvégezni. Mivel a növény az új hajtásokon virágzik, a visszavágás serkenti az új, erős hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Visszavágás: A hajtásokat érdemes a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra visszavágni. Ez serkenti az új hajtások képződését, és biztosítja a sűrű, bokros habitust.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, fagykárosodott vagy sérült hajtásokat.

Telelés és fagytűrés: A White Ball™ nyáriorgona mérsékelten télálló; az USDA 5-9-es zónákban nevelhető. A gyökérzet az USDA 5-ös zónájáig is ellenáll, de a felszíni hajtások csak az USDA 7-es zónájáig maradnak életben. Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A zordabb teleken a hajtások visszafagyhatnak, de a gyökérzetből tavasszal újrahajt. A téli nedvesség és a pangó víz nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy, ezért a jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A White Ball™ nyáriorgona a tiszta fehér virágzásának, kompakt méretének, kellemes illatának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb késő nyári cserje a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (60-90 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – a kompakt méret és a szárazságtűrés miatt kiváló választás.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Alacsony sövénynek – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt alacsony, díszítő sövény kialakítására is alkalmas.

Tömeges telepítésbe – a sűrű, bokros növekedés és a hosszú virágzás miatt kiváló választás nagyobb felületekre.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A White Ball™ nyáriorgona tiszta fehér virágai és szürkészöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Lila és kék virágú növényekkel: Levendulával (Lavandula), zsályával (Salvia), macskamentával (Nepeta) – a fehér és a lila szívek elegáns, harmonikus párost alkotnak.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis), kúpvirág (Rudbeckia) – a fehér és a sárga szívek vidám, napsütötte hatást keltenek.

Ezüstös levelű növényekkel: Ürröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollbuga (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a nyáriorgona tömöttebb, bokros formáját.

Rózsákkal – a nyáriorgona kiváló társnövény a rózsák számára, kitölti a réseket és késői virágzást biztosít.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a White Ball™ nyáriorgona mérsékelten télálló; az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban a gyökérzet áttelelhet, de a hajtások a zordabb teleken visszafagyhatnak. A növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos a sikeres teleltetéshez; a téli nedvesség nagyobb veszélyt jelent, mint a fagy. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.)

Wim's Red óriásvirágú bugás hortenzia	Hydrangea paniculata 'Wim's Red	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Wim's Red óriásvirágú bugás hortenzia (Hydrangea paniculata Wim's Red) a bugás hortenzia fajták egyik legdrámaibb színű képviselője. Ez a fajta a látványos színváltozás, a bőséges, hosszan tartó virágzás és a megbízható télállóság hármasát kínálja. A Wim`s Red nevet nemesítőjéről, Wim Snoeijer holland hortenziakertészről kapta, a vörös szín pedig az őszi virágok intenzív árnyalatára utal. Ez az egyik legnépszerűbb vörös színű bugás hortenzia a piacon. Kifejlett mérete és megjelenése: A Wim's Red közepes termetű, 1,5-1,8 méter magas és 1,2-1,5 méter széles, sűrű, bokros, kerekded habitusú cserje. Habitusa kompakt, a szárak erősek, nem dőlnek meg a virágzatok súlya alatt. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy elliptikus alakúak, 6-10 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük finoman fogazott. Ősszel a levelek is szép sárgás vagy vöröses árnyalatot ölthetnek. A virágok a növény igazi ékkövei: július-augusztus környékén nyílnak, és akár októberig is díszíthetik a kertet. A virágzatok nagyok, kúp alakúak, 25-35 cm hosszúak, a virágzat csúcsa felé kissé elvékonyodnak. A Wims Red legnagyobb különlegessége a színváltozás: a virágok kezdetben fehérek vagy zöldesfehérek, majd rózsaszínbe, később élénk pirosba, végül őszre mély vörösbe vagy bordóba váltanak. A színváltozás a napos helyen a leglátványosabb, a vörös szín a virágzat aljától a csúcsa felé haladva jelenik meg. A virágok meddők, nem képeznek magot, így a virágzási energia teljes mértékben a látványos virágfejekre fordítódik. Igényei és gondozási útmutató: A Wim`s Red a legszebb virágdíszét és a legdrámaibb színváltozását teljes napos helyen hozza. Napos helyen a vörös színek intenzívebbek, a virágzása bőségesebb. Félárnyékban a színváltozás kevésbé látványos, a vörös árnyalatok halványabbak, a virágzatok kisebbek lehetnek. Talajban a jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén savanyú vagy semleges (pH 6,0-7,0) talajokat kedveli. A meszes talajokat is jól tűri, de a nagyon meszes talajban a vörös szín fakóbb lehet. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A hosszabb aszályos időszakokban feltétlenül öntözzük. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy hortenzia műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a hajtásokat akár 15-30 cm magasságig is visszavághatjuk. A bugás hortenzia az új hajtásokon virágzik, így a radikális visszametszés serkenti a nagy virágzatok képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a levélfoltosság és a klorózis (vashiány, meszes talajon) fordulhat elő. Kertstílus és növénytársítások: A Wim`s Red drámai színváltozása miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben és angolkertekben a fehér-rózsaszín-vörös virágzataival a változatos, elegáns hangulatot erősíti. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a mélyvörös őszi szín izgalmas, modern akcentust ad. Városi kertekben és előkertekben a légszennyezést is jól tűri, így alapozó növényként vagy sövényként is megállja a helyét. Természetes kertekben a rovarokat vonzó virágai miatt kiváló választás. Változatos növénytársítások: Ezüstlevelű növényekkel: A levendula (Lavandula angustifolia) lila virágai és ezüstös lombozata, vagy az üröm (Artemisia) ezüstszürke levelei mellett a Wim`s Red vörös színe gyönyörű kontrasztot alkot. Aranylevelű növényekkel: Az aranyborbolya (Berberis thunbergii Aurea) vagy az aranylevelű gyöngyvessző (Spiraea japonica Gold Mound) élénk sárga lombozata mellett a vörös szín különösen látványos. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a hortenzia keményebb formáihoz. Sárga virágú évelőkkel: Az aranyvessző (Solidago) vagy a napraforgó (Helianthus) sárga virágai mellett a vörös szín különösen jól érvényesül. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A cserje tövébe ültetett tulipánok (Tulipa) vagy nárciszok (Narcissus) tavasszal, a hortenzia virágzása előtt színesítik a tájat. Vörös levelű növényekkel: A japán juhar (Acer palmatum) vagy a vöröslevelű díszszilva (Prunus cerasifera Nigra) mellett a hasonló színek egymást erősítik. A Wim`s Red kiváló választás azok számára, akik egy drámai színváltozással rendelkező, különleges hortenziát keresnek, amely a nyári fehér virágoktól az őszi mélyvörös színig változik, és a kert egyik fő attrakciója lehet a nyár második felétől egészen a fagyokig. USDA besorolása: 4-8.

Yellow Ripple borostyán	**Hedera helix 'Yellow Ripple'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Lassan növekvő borostyánfajta, melynek levelei mélyen karéjosak, sárga-tarkák. A krémsárga színű csík a karéjok mentén helyezkedik el. A borostyánok levelei sokféle alakúak lehetnek. Akár egy növényen is felfedezhető ez a polimorfizmus. A tarka fajták viszonylag lassan fejlődnek, de amennyiben jó helyre telepítjük könnyen megindulhatnak, és gyorsan benövik a rendelkezésre álló felületet. A borostyánok jól nyírhatóak, formázhatóak. Visszavágáskor jól sarjadnak, így akár áttört kerítések hálók befuttatására, és ilyen formán elválasztó sövény kialakítására is alkalmasak. Jól mutatnak cserépben, balkonládában. Ügyes kertészek kaspókba telepítve könnyen kis színes levlű bokorrá nyeshetik.
Első sorban árnyékos, párás termőhelyek növénye. Ilyen helyen telepítve törekszik a fény felé, a felszínen kúszva, ill. felfelé növekvő tárgyakra, más növényekre felkapaszkodva. Falusi, romantikus kertek fontos növénye, de kisvárosi kertekbe, belső átrium szerű udvarokban is jól használható, akár kevésbé szép lábazatok tartószerkezetek eltakarására.

6a USDA-zóna

Díszfák

Bella perzsa varázsfa	**Parrotia persica 'Bella'**	3 950 Ft	4 450 Ft

Bella perzsa varázsfa egyedi megjelenését az évszakonként változó levélszíne adja, amely különleges színpompát kölcsönöz bármely kertnek. Tél végén vagy kora tavasszal kis, vöröses virágokat hoz, bár ezek nem túl feltűnőek. Jól fejlődik napos vagy félárnyékos helyeken, és a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt kedveli. Télálló, és tolerálja a városi környezetet is. Metszést nem igényel gyakran, de amennyiben szükséges, kora tavasszal végezhető el a ritkítás vagy a formázás.
Kertstílus: Kitűnő választás vegyes ágyásokba, parkokba, vagy szoliter növényként. Jól illik természetes, erdős jellegű kertekbe és formális kertrészekbe is.
Ültetési javaslat: Ügyeljünk a megfelelő napfényre és a vízelvezetésre ültetéskor. Szoliter növényként vagy csoportosan ültetve egyaránt jól mutat, és érdemes elegendő helyet hagyni a növekedéshez.
Társított növények: Jól kombinálható más díszfákkal és cserjékkel, amelyek eltérő lombszínt vagy virágzási időszakot biztosítanak, mint például a japán juharok (Acer palmatum) vagy örökzöldekkel.

Posnania kocsányos tölgy	**Quercus robur 'Posnania'**	9 900 Ft	11 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Posnania kocsányos tölgy (Quercus robur 'Posnania') – A különleges, mélyen karéjos levelű díszfa
A Posnania kocsányos tölgy a bükkfélék családjába tartozó, Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos kocsányos tölgy nemesített, díszlevelű változata. A fajtát Ewa Jerzak szelektálta a Poznań Adam Mickiewicz Egyetem Botanikus Kertjében, a Quercus robur 'Laciniata' magjaiból nevelt palánták közül. A nevet B. Szmit adta a fajtának, Poznań város latin neve (Posnania) után. A fajtát 2011-ben vezették be a kertészeti forgalomba, és elnyerte a "Zieleń to Życie" kiállítás új növény díját.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Posnania kocsányos tölgy egy közepes növekedésű, lombhullató díszfa. Kifejlett magassága 10-15 méter, szélessége 8-10 méter között alakul, de egyes források szerint 10-12 méter magasra nő. Koronája széles, lapos-gömb alakú, meglehetősen sűrű, az ágak szélesen szétterülnek. Növekedési erélye közepes, habitusa fiatalon lazább, idősebb korban egyre tömöttebb és szabályosabb.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei, és a fajta egyedülálló értékét jelentik. A levelek rendkívül hosszúak, 20-25 cm-esre is megnőnek, sötétzöld színűek, finomak és vékonyak, a levélnyélen csüngő állásúak. A levéllemez mélyen és szabálytalanul karéjos, a karéjok száma oldalanként 4-9 lehet, a levél erezete sárga színű, ami szép kontrasztot ad a sötétzöld levélfelülettel. A levelek könnyedségüknél fogva a legkisebb szellőre is mozognak, ami a fának lágy, dinamikus megjelenést kölcsönöz. Ősszel a lombozat élénksárgára színeződik, ami további díszítőértéket ad a növénynek.
A virágzat és a termés a növény másodlagos díszítőelemei. A virágok májusban nyílnak, aprók és jelentéktelenek, díszítőértékkel nem bírnak. A termések makkok, amelyek 3 cm hosszúra nőhetnek, lapos kupacsban ülnek, hosszú kocsányon. A fajta azonban gyengén és ritkán terem.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Posnania kocsányos tölgy napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb lombszínt és a legtömöttebb koronát napos helyen hozza. Fiatal korban a részleges árnyékot is elviseli.

Talaj: A növény nagyon toleráns a talaj típusa, kémhatása és nedvességtartalma irányában. A legjobban a mély, tápanyagban gazdag, humuszos, közepesen nedves, agyagos vagy homokos-agyagos talajban fejlődik, amelynek kémhatása a savanyútól a semlegesig terjed. A szegényes, túl száraz vagy túl nedves talajokon a növekedés gyengébb, a fák deformálódhatnak.

Öntözés: A fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A Posnania kocsányos tölgy jól tűri a metszést. A formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető. Fontos, hogy a fajta hajlamos a késői fagyokra érzékeny lenni a korai lombfakadás miatt.

Telelés és fagytűrés: A fajta teljesen télálló, az USDA 4-es zónájáig nevelhető, akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül áttelel a szabadban. A késői tavaszi fagyok azonban károsíthatják a korán kihajtó leveleket.

Kártevők és betegségek: A kocsányos tölgy általában ellenálló, de a lisztharmatra hajlamos lehet. A megelőzés érdekében a fa számára szellős, napos helyet biztosítsunk. A városi környezetet és a légszennyezést jól tűri.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Posnania kocsányos tölgy a különleges, mélyen karéjos lombozatának, a szabályos koronájának és a kiváló télállóságának köszönhetően az egyik legértékesebb díszfa a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a különleges lombozat miatt kiváló magányos díszelem, amelyet érdemes közelről is megcsodálni.

Parkokba, nagyobb kertekbe, közterületekre – a fa mérete és strukturális megjelenése miatt kiváló választás.

Vegyes faállományokba – a különleges levélforma és az őszi sárga szín kiváló kontrasztot alkot a többi fával.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Lakóövezeti zöldfelületekbe – jól tűri a városi környezetet és a légszennyezést. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A Posnania kocsányos tölgy különleges lombozata és őszi sárga színe számos más növénnyel kombinálható: Zöld levelű fákkal és cserjékkel – a zöld és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak. Vörös levelű növényekkel – a sárga és a bordó szívek egymás mellett feltűnő színpárost alkotnak. Ezüstös levelű növényekkel – a sárga és az ezüstös szívek elegáns, modern hatást keltenek. Virágos cserjékkel és évelőkkel – a virágzó növények színei kiegészítik a fa strukturális megjelenését. USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon a Posnania kocsányos tölgy teljes mértékben télálló; az ország egész területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy. A késői tavaszi fagyok a korai lombfakadás miatt károsíthatják a fiatal hajtásokat.)			
Seriyu japán juhar	**Acer palmatum 'Seriyu'**	4 750 Ft	5 490 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Félárnyékot vagy szűrt napsütést kedvel, de jobban tűr napot más csipkés juharoknál. Forró nyári napokon délutáni árnyék javasolt a levélperzselődés elkerülésére .

Talaj: Jól átázó, humuszban gazdag, enyhén savanyú talaj (pH 5,5–6,5). Tőzeg vagy lombhullató komposzt hozzáadása javítja a talajt .

Vízigény: Közepes igényű. Fiatal példányokat rendszeresen öntözzük, de vízállás kerülendő .

Télállóság: USDA 5–8 zónákban télálló. Fiatal növényeket télen mulccsal vagy fenyőkéreggel védjük .

Ápolási Tippek

Metszés: Alakítsd kora tavasszal, mielőtt kinyílnak a rügyek.

Tápanyagozás: Tavasszal lombtrágyával vagy lassan oldódó műtrágyával.

Szélvédelem: Ültessük védett helyre, mert az erős szél tönkreteheti finom leveleit .

Használat a Kertben

Szoliter növényként: Kiemelkedő választás japán stílusú kertekben, meditációs sarkokban vagy kerti utak mentén .

Konténeres nevelés: Díszítheti a teraszt vagy bejárati utat, ha elegendő vízhez jut .

Társnövények: Kombinálj páfrányokkal, Hosta fajokkal, Astilbe-vel vagy más árnyékot kedvelő növényekkel.

Alba Nivea selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'**	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Alba Nivea selyemmirtusz, Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, 'Alba Nivea' változat a faj fehér virágú, nemesített formája. A fajta neve („Alba” = fehér, „Nivea” = hófehér) a virágok tiszta, hófehér színére utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, hófehér virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot. A közönséges név („selyemmirtusz”) mellett ismert még „indiai selyemmirtusz”, „görög ciprus” vagy „krepp mirtusz” néven is, utalva a virágszirmok finom, selymes, ráncolt (krepp-papír szerű) textúrájára.
Külső megjelenés
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-4 méter, szélessége 1,5-3 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-t is nőhet. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek viszonylag kicsik, 3-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, tojásdadok vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-30 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Alba Nivea' fajta virágának színe tiszta, hófehér, a virágok közepe néha sárgás vagy zöldessárga. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák. A nyitott virágok a napos időben a leglátványosabbak, de a krepp-papír szerű szirmok még részleges árnyékban is dekoratívak.
Termés
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő, laza, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, kijelölt cserjéknek (pl. rózsa vagy virágos cserjék számára kifejlesztett) műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), mielőtt a növény kihajtana. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, sérült, keresztben növő, egymást dörzsölő ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást, mert a selyemmirtusz az új hajtásokon virágzik.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés: A selyemmirtusz 'Alba Nivea' mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a fiatal növények és a hajtásvégek érzékenyebbek a fagyra. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország északi, keleti részein vagy a hideg, szeles télen a fiatal növényeket takarni (vastag lombtakaró, szalmával, fenyőgallyakkal takarni a gyökérterületet). A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A fagyott hajtásokat tavasszal, a metszéskor vágjuk vissza. A növény a gyökérzettől újrahajthat.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de bizonyos problémák előfordulhatnak:

Lisztharmat: A leggyakoribb betegség, különösen párás, szellőzetlen körülmények között. Fehér, lisztszerű bevonat a leveleken. Megelőzhető szellős hely ültetéssel, a levelek beázásának elkerülésével.

Levélfoltosság: Különböző gombák okozhatják, a leveleken barna vagy fekete foltok jelennek meg.

Levéltetű, pajzstetű, takácsatka: Ritkán, de megjelenhetnek. Ellenük használhatunk rovarölő vagy atkaölő szereket.

Felhasználás a kertben
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' a méretének, színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a fehér virág más színekkel is jól kombinálható

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, házikertekbe – a délies hangulatot erősíti

Sorfa utcákba, parkokba, közterületekre – a hámló kéreg és a virág miatt dekoratív

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de teleltetésről gondoskodni kell

Bonszai alapanyagnak – a kis méret, a hámló kéreg, a virág és az őszi szín miatt bonszainak is nevelhető

Változatos növénytársítások
A selyemmirtusz 'Alba Nivea' fehér virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus), orvosi zsálya (Salvia officinalis) – a fehér és a lila-kék színek harmonikus, friss, elegáns párost alkotnak, és a mediterrán hangulatot erősítik

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia) – a fehér és a sárga vidám, napsütötte összképet ad

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Rózsaszín és piros virágú növények: Csodamogyoró (Hamamelis), törpecseresznye (Prunus glandulosa) – a kontrasztos színek izgalmas, élénk hatást keltenek			
Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a sötétzöld lombot			
Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca) – a füvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját			
Ősszínű díszcserjék: Sárga levélű növények (pl. aranyvessző), vörös levelű juharok – a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel			
Télálló pálmák, ciprusok, borókák – a mediterrán, szubtrópusi hangulatot erősítik			
USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna - pl. Budapest, Dél-Dunántúl) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április-május) tehető ki a szabadba).			
Alba Superba liliomfa	**Magnolia Alba Superba**	13 900 Ft	14 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Alba Superba liliomfa egy felálló, széles koronájú lombhullató fa, amely 5-8 méter magasra és 4-6 méter szélesre nő. Fő értéke a nagy, serleg alakú, tiszta fehér virágok, amelyek március-április hónapokban nyílnak, a levelek megjelenése előtt. A virágok akár 15-20 cm átmérőjűek is lehetnek, és kellemes, enyhe illatot árasztanak. A sötétzöld, ovális alakú levelek nyáron sűrű lombot alkotnak, ősszel pedig aranysárgára színeződnek. A fa kérge sima, ezüstszürke színű.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félárnyékos, széltől védett helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, savanyú vagy semleges kémhatású, tápanyagban gazdag talaj

Időzítés: Kora tavasszal vagy ősszel

Távolság: 4-5 méteres térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter fa, parkfák, nagykertek, gyűjteményes liliomfás kertek

Gondozási útmutató

Metszés: Ritkán igényel metszést, csak a száraz vagy sérült ágak eltávolítása

Télvédelem: Teljesen télálló, de a késői tavaszi fagyok károsíthatják a virágokat

Öntözés: Átlagos vízigényű, a szárazságot nem kedveli

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Lassú növekedésű, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Parkok és nagykertek

Hagyományos kertek

Történelmi kertek

Gyűjteményes liliomfás kertek

Előkertek és látványos helyek

Kastélykertek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Alta örökzöld liliomfa	**Magnolia grandiflora 'Alta'**	11 450 Ft	11 450 Ft
Felfelé törekvő, sűrű lombú örökzöld fa, mely formájának köszönhetően ültethető kisebb kertekbe is, sőt az Egyesült Államokban még sövénynek is ültetik. Hosszúkás, sötétzöld leveleinek fonákja rozsdabarna színű. Az egyik legjobb a hidegtűrése (-28 Celsius fokig) az örökzöld liliomfák között! 6a-9b USDA-zóna			
Amerikai ámbrafa	**Liquidambar styraciflua**	3 450 Ft	3 450 Ft
Az amerikai ámbrafa, vagy Liquidambar styraciflua, Észak-Amerikából származó, impozáns megjelenésű fa, amely népszerű választás a parkok és kertek díszítésére. Ez a fa különösen gyorsan növekszik, és akár 20-30 méter magasra is megnőhet. Az ámbrafának jellegzetes Levelei 5-7 karéjos levelei vannak, amelyek sötétzöld színűek tavasszal és nyáron. Ősszel a levelek csodálatos színpompát mutatnak, váltakozva a sárga, narancs és vörös árnyalatok között. Az amerikai ámbrafa ötödik szezonban hozza a jellegzetes, gumós terméseit, amelyek sötétbarna színűek és viszonylag sokáig megmaradnak a fán. A fa gyanta szekréciója miatt illatos és aromás, a fa belseje pedig erős és tartós anyag, ami miatt széles körben használják bútorok, parketták és egyéb faipari termékek előállítására. Az amerikai ámbrafa könnyen alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, és bár a napfényes helyeket kedveli, részlegesen árnyékban is szépen fejlődik. A fa viszonylag ellenálló a legtöbb kártevővel és betegséggel szemben, ezért minimális karbantartást igényel.			
Ann's Delight liliomfa	**Magnolia x 'Ann's Delight'**	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Ann's Delight liliomfa egy tömör, bokros növekedésű lombhullató díszfa, amely 150-200 cm magasra és 120-180 cm szélesre nő meg. Levelei sötétzöldek, elliptikusak, fényes felületűek. Legfőbb díszét a tavasszal megjelenő, élénk bordó virágok képezik. A virágok akár 10-15 cm szélesek is lehetnek, és a lomb fakadása előtt vagy azzal egy időben nyílnak.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, humuszban gazdag, savanyú talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, a szárazságot nem tűri jól

Metszés: Alig igényel metszést, csak a halott ágakat kell eltávolítani

Télállóság: Jó télállóságú, de fiatal növényeket télen érdemes védeni

Trágyázás: Tavasszal speciális liliomfa trágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Kisebb kertekbe ideális választás

Előkert díszítésére

Társítás: Tavaszi hagymás növényekkel, árnyéktűrő évelőkkel

Konténeres nevelésre is alkalmas

Erdei szegélyekbe ültetve

Ajánlott kerttípusok

Kisebb kertek

Előkertek

Lakókertek

Konténeres kertek

Parkok és közterületek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Athene liliomfa	Magnolia x 'Athene'	14 900 Ft	16 700 Ft

A Magnolia 'Athene' egy lombhullató díszcserje vagy kis fa, amely 4-5 méteres magasságot és hasonló szélességet ér el . Koronája ernyőszerű, széles formájú

.

Legszembetűnőbb tulajdonsága a nagyméretű virága. A teljesen kinyilt virágok átmérője 15-20 centiméter lehet, ami tényleg tányér méretű. A virágok erősen illatosak . Színeződésük különleges: a bimbók sötétlilák, és kinyílvány a szirmok halvány lilás-rózsaszínűek lesznek, de a szirmok töve továbbra is sötétlila marad, ami egy élénk kontrasztot eredményez . A nyár végén kialakuló nagy, 5-7 centiméteres virágrügyek télen is dekoratívak.

Gondozási útmutató

A Magnolia 'Athene' gondozása követi a liliomfák általános igényeit, de számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik.

Fényigény: A napos helyezetet részesíti előnyben. Elviseli a félárnyékot is, de ilyen körülmények között a virágzás intenzitása csökkenhet.

Talajigény: A jól vízelvezető, mélyrétegű, savanyú kémhatású és tápanyagban gazdag talajban érzi a legjobban magát. A meszes talajra érzékeny, amin a levelei elsárgulhatnak és fejlődése elmaradhat.

Vízigény: A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, mivel nem tolerálja a tartós szárazságot.

Metszés: A liliomfák általában nem igényelnek rendszeres metszést. Az elhalt vagy sérült ágak eltávolítása elegendő.

Télállóság: Jó télállóságú, a magyarországi teleket jól viseli.

Egyéb jellemzők: A növény minden része erős felépítésű, robusztus növekedésű, ami hozzájárul egészségéhez és látványos megjelenéséhez.

Ültetési javaslatok

Szoliter növényként a legszebb, ahol egyedülálló szépsége teljes mértékben kiteljesedhet.

Előkertek kiemelkedő díszeként.

Társítás: Más savanyú talajt kedvelő növényekkel, például rododendronokkal és azáleákkal ültethető.

Babe® selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Babe®'	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Babe® Selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Babe®') – A kompakt, halványrózsaszín virágú törpe selyemmirtusz
A selyemmirtusz Babe®, Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta, amely a Mighty Myrtles sorozat tagja. A fajta neve („Babe”) a kompakt, törpe méretre utal. Ez a növény a nyár második felétől kora őszig halványrózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, kompakt mérete miatt pedig kiválóan alkalmas kis kertekbe és konténeres nevelésre.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A selyemmirtusz Babe® a faj egyik legkompaktabb, legsűrűbb növekedésű változata. Kifejlett magassága 40-60 cm, szélessége 30-50 cm között alakul, ami kiválóan alkalmassá teszi kis kertekbe és konténeres nevelésre. Növekedési erélye közepes, habitusa sűrű, bokros. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek közepes méretűek, 3-7 cm hosszúak, oválisak vagy elliptikusak, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fényes, fonáka világosabb. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára vagy vörösre színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, tömött, bugaszerű fürt. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. A 'Babe®' fajta virágának színe halványrózsaszín, a pasztell, áttetsző halványrózsaszíntől a közepes, meleg rózsaszín árnyalatig. A szín a napfény hatására különösen szépen érvényesül. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart (júliustól szeptemberig), a növény bőségesen, hosszan virágzik. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A selyemmirtusz Babe® napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 6,0-6,5) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni a szerkezet javítása és a pH beállítása érdekében.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 2-3 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés és alakítás: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, fagykárosodott, sérült, keresztező, egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Telelés és fagytűrés: A selyemmirtusz Babe® mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -15°C és -18°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval, szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte teljesen szárazon kell tartani; 4-6 hetente egyszer, nagyon kevés vizet adjunk neki, csak annyit, hogy a földje teljesen ne száradjon ki.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A selyemmirtusz Babe® kompakt méretének, halványrózsaszín színének és hosszú virágzási idejének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Kis kertekbe, előkertekbe – a kompakt méret (40-60 cm) miatt ideális választás.

Szoliterként – egy-egy példány a teraszon, a bejáratnál is feltűnő.

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható.

Dézsás növényként teraszokra, erkélyekre, balkonládákba, tetőkertekbe – a tökéletes konténeres növény, mivel nem nő nagyra.

Mediterrán hangulatú kertekbe – a délies hangulatot erősíti.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A selyemmirtusz Babe® halványrózsaszín virágai, sötétzöld lombja és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák – a fehér és a halványrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak.

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia atriplicifolia) – a halványrózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mediterrán hangulatú összképet adnak.

Sárga virágú növények: Aranyvessző (Solidago), napvirág (Helianthemum), kúpvirág (Rudbeckia) – a halványrózsaszín és a sárga vidám, kontrasztos, napsütötte hatást keltenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj (Sedum) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern hatást keltenek, és kiemelik a halványrózsaszín virágokat.

Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), árvalányhaj (Stipa tenuissima), csenkesz fajták – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a selyemmirtusz Babe® mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással, védett helyen áttelelhet, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajthat.)

Bimundorum tölgy	Quercus × bimundorum	14 900 Ft	16 800 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Bimundorum tölgy (Quercus × bimundorum) – A gyors növekedésű, ragyogó őszi színű hibrid tölgy
A Bimundorum tölgy a bükkfélék családjába tartozó, természetes hibrid, amely a fehér tölgy és a kocsányos tölgy kereszteződéséből jött létre. A fajt tudományosan E. J. Palmer írta le 1948-ban. A név („bimundorum” = két világé) a két szülőfaj eltérő származására utal: a fehér tölgy Észak-Amerikából, a kocsányos tölgy pedig Európából és Nyugat-Ázsiából származik. A faj Észak-Amerika keleti részén, ahol a két szülőfaj találkozik, szórványosan fordul elő.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Bimundorum tölgy egy közepes vagy gyors növekedésű, lombhullató díszfa. Kifejlett magassága 10-20 méter között alakul, koronája a fajtától függően oszlopos vagy piramis alakú. A 'Crimschmidt' fajta oszlopos, felfelé törő növekedésű, 10-15 méter magas és 2-3 méter széles lesz. A 'Midwest' fajta piramis alakú koronát nevel. A törzs egyenes, a kéreg sima, fényes szürke, idősebb korban vékony lemezekben repedezik.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei. A levelek a szülőfajokéra emlékeztetnek: kerekded karéjokkal rendelkeznek, a levél széle szabálytalanul karéjos. A levél színe nyáron sötétzöld, ősszel vörös vagy bíborvörös színre vált. A 'Crimschmidt' fajta különösen élénk őszi színt mutat, és kiválóan ellenáll a lisztharmatnak.
A virágzat és a termés a növény másodlagos díszítőelemei. A virágok májusban nyílnak, a porzós barkák aranysárgák, a termős virágok jelentéktelenek. A termések makkok, amelyek 2-2,5 cm hosszúak, lapított kupacsban ülnek. A makktermés bő termést hoz, amely számos madár- és apróvadfaj tápláléka.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A két világ tölgye napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb őszi lombszínt és a legtömöttebb koronát napos helyen hozza.

Talaj: A növény nem igényes a talajra, de a mészre érzékeny, ezért a semleges vagy enyhén savanyú, mészmentes talajokat részesíti előnyben. A legjobban a mély, termékeny, jó vízelvezetésű talajban fejlődik. A pangó vizet nem tolerálja, de a nedvességet jól viseli. A nagyon szárazságtűrő, amint meggyökerezett.

Öntözés: A fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első 2-3 évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik. Az újonnan ültetett fákat 2-3 évig támasztékhoz kell kötni a szélmozgás megelőzése érdekében.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya. Tavasszal komposzttal vagy falevélkomposzttal mulcsozható a nedvesség megőrzése és a talajszerkezet javítása érdekében.

Metszés és ápolás: A két világ tölgye alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A késő télen vagy nyár közepén végezhető metszés során távolítsuk el az elhalt, beteg vagy rossz helyen növő ágakat. A fiatal fákat érdemes erős vázzá nevelni. A késő tavaszi fagyokra érzékeny lehet, ezért a fiatal hajtások védelme javasolt.

Telelés és fagytűrés: A két világ tölgye kifejezetten kiváló télállóságú; az USDA 4-es zónájáig nevelhető, akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, télen nyugalmi állapotban van.

Kártevők és betegségek: A két világ tölgye általában ellenálló, de bizonyos problémák előfordulhatnak: tölgyaknázó moly, levéltetvek, hernyók, lisztharmat és mézgomba. A városi szennyezést jól tűri, a sózást is viseli. A 'Crimschmidt' fajta kifejezetten ellenálló a lisztharmattal szemben.

Fontos tudnivaló: A levelek és a nedv bőrirritációt okozhatnak, ezért a növény kezelésekor érdemes kesztyűt viselni. A makk ehető, de csersavtartalma miatt fogyasztás előtt áztatni kell.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A két világ tölgye a gyors növekedésének, a ragyogó őszi lombszínének, a kiváló télállóságának és a sokoldalúságának köszönhetően az egyik legértékesebb díszfa a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a széles korona és a látványos őszi szín miatt kiváló magányos díszelem nagy kertekben, parkokban.

Fasorként, utcai fának – jól tűri a városi környezetet és a szennyezést, kiváló választás széles utcákba, sugárutakba. Az oszlopos 'Crimschmidt' fajta kifejezetten ajánlott szűkebb helyekre, fasorokba.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Erdősítésre, természetes kertekbe – gyors növekedése és bő makktermése miatt kiváló választás erdősítési programokhoz és természetes hatású kertekbe.

Árnyékadó fának – nagy koronája miatt kiváló árnyékot ad, és mélyen gyökerezik, így könnyű alatta kertészkedni.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A két világ tölgye őszi vörös lombszíne és nagy mérete számos más növénnyel kombinálható:

Cserjékkel: Tűzbokorral, hóbogyóval, gyöngyvirágcserjével – a tölgy alá ültetve szép aljnövényzetet biztosítanak.

Virágos fákkal: Magnóliával – a tavaszi virágzás kiegészíti a tölgy őszi színét.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral – a különböző őszi színek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon a két világ tölgye teljes mértékben télálló; az ország egész területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Bracken's Brown Beauty örökzöld liliomfa	**Magnolia grandiflora 'Brackens Brown Beauty'**	7 450 Ft	7 450 Ft

Szimmetrikus piramis alakú, sűrű lombú örökzöld fa, melynek akár 20 cm-esek is lehetnek a sötétzöld, vastag húsú levelei, melyek fonákja sötétbarna színűek. Kifejlett példányok átlagosan 10-15 m magasak. Az egyik legkedveltebb fajta az USA északi államaiban (Ohio, Pennsylvania, New Jersey).

6a-9b USDA-zóna

Crystal Tulip liliomfa	**Magnolia 'Crystal Tulip'**	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Magnolia 'Crystal Tulip' egy csapott törzsű, lombhullató díszfa, amelyet elsősorban nagy, tiszta fehér virágjáról neveztek el. A virágok szirmai húsosak, és a virág forma kialakulása után sokáig megmaradnak. A növény robusztus növekedésű, nagy, sötétzöld levelekkel . Magyarországon viszonylag új fajtaként számít egy prémium kategóriás növénynek.
A fa végső magassága körülbelül 4 métert érhet el 10 év alatt. Virágzási ideje április-május hónapokra tehető.
Gondozási útmutató
A Magnolia 'Crystal Tulip' gondozása megegyezik a liliomfák általános igényeivel. A legfontosabb szempontok:

Fényigény: A napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. A növényt szélvédett helyre ültessük, mivel a hideg szellők károsíthatják.

Talajigény: A jól vízelvezető, laza, enyhén savanyú kémhatású talaj az ideális számára. A Magnolia 'Crystal Tulip' esetében feljegyzések szerint a fa a mészt is jól tűri.

Vízigény: A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, különösen a száraz, meleg időszakokban. A növény nem tűri a vízzel telített, pangó talajt.

Télállóság: A növény jól télálló, akár -23 °C-ot is kibír. A fa teljes mértékben fagytűrő.

Ültetési javaslat
A fa szoliter növényként a legszebben érvényesül, például egy gyepsziget közepén vagy az előkertben. Lombozata alá árnyékot kedvelő évelőket ültethetünk, például tűzesőt (Heuchera) vagy árnyékliliomott (Hosta).

Csillagvirágú liliomfa	**Magnolia stellata**	6 950 Ft	6 950 Ft

A csillagvirágú liliomfa (Magnolia stellata) Japánból származó lassú növekedésű cserje, vagy kisebb fa. Jellegzetes, a liliomfák általában széles színes sziromleveleihez képest keskeny, hosszú szirmokból álló tavasszal, lombfakadás előtt nyíló virágaival tűnik ki. Mivel 3-4 méternél nem nő magasabbra, kisebb kertekben is jól elfér, szoliterként is telepíthetjük, de hagyjunk helyet a koronájának, hiszen bár alacsony, de terebélyes kis bokorrá vagy 40-50 cm magas törzzsel rendelkező kis fává fejlődik. USDA zóna: 8b-5a

Csüngő gyertyán	**Carpinus betulus 'Pendula'**	8 900 Ft	9 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Csüngő gyertyán (Carpinus betulus 'Pendula') – A különleges, csüngő ágú lombhullató fa
A csüngő gyertyán a nyírfafélék családjába tartozó, Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos közönséges gyertyán nemesített, csüngő ágrendszerű változata. A 'Pendula' fajtajelzés a fa jellegzetes, lecsüngő habitusára utal, amely a fának elegáns, szoborszerű megjelenést kölcsönöz. Ez a fa a tavaszi lombfakadásával, a nyári sűrű lombozatával és az őszi aranysárga színpompájával az egyik legkedveltebb különleges formájú díszfa a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a városi környezethez való alkalmazkodóképessége és a páratlan habitusa miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A csüngő gyertyán egy lassú növekedésű, szétterülő koronájú, lombhullató fa. Kifejlett magassága 4-8 méter, szélessége hasonlóan 4-8 méter között alakul, ami sűrű, zárt koronát eredményez. A fa legjellegzetesebb tulajdonsága a csüngő ágrendszer, amely a fának elegáns, könnyed megjelenést kölcsönöz. A törzs egyenes, a kéreg sima, szürkés, idősebb korban enyhén repedezett. A végleges méret eléréséhez 50 évnél is több idő szükséges, ami a fa rendkívül lassú növekedésére utal.
A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek tojásdadok, fűrészes szélűek, a levélerek kiemelkedően futnak a levélfelületen, ami a gyertyánok egyik jellegzetessége. A levél színe élénkzöld a nyári hónapokban, majd ősszel látványos sárgára és narancssárgára színeződik, ami a fát a késő őszi időszakban is kiemeli a kertből.
A virágzat és a termés a fa másodlagos díszítőelemei. Tavasszal, a levelekkel egy időben a fa zöld porzós és sárga termős barkákat hoz. A virágokat követően a növény jellegzetes, fürtös, szárnyas terméscsoportokat fejleszt, amelyek ősszel érnek be, és a szél segítségével terjednek. A termések a komlótermésekre emlékeztetnek, innen ered a gyertyán angol neve is.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A csüngő gyertyán napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál. A legszebb, legdúsabb koronát napos helyen hozza, de félárnyékban is jól fejlődik.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; mészkőben gazdag, agyagos, vályogos és homokos talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében savanyútól a lúgosig sokoldalúan toleráns. A legjobban a mélyrétegű, jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó, üde, tápanyagban gazdag talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli.

Öntözés: A csüngő gyertyán közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A csüngő gyertyán alapvetően nem igényel rendszeres metszést, mivel természetes formája csüngő és szoborszerű. A formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető, de a természetes forma megőrzése érdekében a metszést érdemes minimalizálni.

Telelés és fagytűrés: A csüngő gyertyán kifejezetten kiváló télállóságú. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A csüngő gyertyán a különleges, csüngő habitusának, a sűrű lombozatának, az őszi aranysárga színének és a városi környezethez való alkalmazkodóképességének köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a szoborszerű habitus és a látványos őszi szín miatt kiváló magányos díszelem.

Építészeti kertekbe, városi és udvari kertekbe – jól tűri a városi környezetet, és a tiszta vonalak, a strukturális megjelenés miatt kiváló választás.

Tájképi kertekbe, parkokba – a fa mérete és strukturális megjelenése miatt kiváló választás.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A csüngő gyertyán csüngő habitusa és őszi aranysárga színe számos más növénnyel kombinálható:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a fa őszi aranysárga színét.

Virágos cserjékkel és évelőkkel: Hortenziával, rododendronnal – a virágzó cserjék színei kiegészítik a fa strukturális megjelenését.

Alacsony növekedésű cserjékkel és évelőkkel – a fa alá ültetve szép háttért vagy aljnövényzetet biztosítanak.

Díszfüvekkel – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a fa strukturális megjelenését.

USDA besorolása: H7 (Magyarországon a csüngő gyertyán teljes mértékben télálló; az ország egész területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok a jó vízelvezetésű talajban akár -20°C és -30°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

D.D. Blanchard örökzöld nagyvirágú liliomfa	**Magnolia grandiflora 'D.D. Blanchard'**	6 950 Ft	6 950 Ft

Végre sikerült hozzájutnunk ehhez a gyönyörű növényhez, az amerikai faiskolák bestselleréhez, mely hazánkban is nagy jövő előtt áll! A D.D. Blanchard fajta sok szempontból is a Magnolia grandiflorák egyik legjobbja! Csodálatos sűrű lombozatú, piramis alakú, 8-9 méter magas örökzöld fa, hófehér, illatos virágai két tenyér nagyságúak, az eddig ismert legnagyobb virág 30 cm átmérőjű volt(!!!). Levelei csillogó haragoszöldek, a fonákjuk vörösbarnán molyhos, és ami a legfontosabb, Európában már számos helyen kiültetett példányai gond nélkül elviselték a mínusz 27 fokos hideget is! Kiemelnénk a hónyomással szembeni ellenállóságát, amely nem minden fajtánál jó, s bizony nagy havazás esetén letördelheti kedves fáink ágait. A D.D. Blanchard fajta ágai is és levélnyelei is rugalmasak, így a hó egyszerűen lecsúszik róluk. Ha meg is áll rajta a hó, olvadáskor az ágak eredeti helyzetükbe állnak vissza, ellentétben számos másik fajtával, ahol sok ág letörik, de jó esetben is a korona tavaszra kinyílik, mint a tubarózsa, s csak komoly visszavágással nevelhetünk ismét sűrű, zárt koronát. A kert első számú, szemet gyönyörködtető dísze!

6b-10a USDA-zóna

David Clulow liliomfa	**Magnolia x 'David Clulow'**	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Magnolia 'David Clulow' egy lombhullató díszfa, amelyet elsősorban lenyűgöző tavaszi virágaiért ültetnek.

Virágok: A fa legfőbb dísze a nagyméretű, hófehér színű virág. A virágok serleg vagy "csésze aljú tányér" formájúak, átmérőjük akár 20-25 centiméter is lehet. A szirmok tövénél gyakran halvány rózsaszínű bemosódás figyelhető meg, ami különösen kecsessé teszi a virágokat.

Megjelenés és méret: A fa erős növekedésű. Végső magassága 4-10 méter között változik, hasonló szélességgel. Koronája idővel széles, lekerekített formát ölt.

Eredet és történet: Egy nemes hibrid, amelyet a Magnolia soulangeana 'Lennei Alba' és a Magnolia veitchii keresztezésével hoztak létre. Nevét egy brit liliomfa-tenyésztőről, David Clulow-ról kapta.

Gondozási útmutató
A sikeres neveléshez az alábbi alapvető szempontokat javaslom figyelembe venni.

Fényigény: A napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. A teljes napsütés a leggazdagabb virágzást biztosítja.

Talaj: A jól vízelvezető, laza szerkezetű, savanyú vagy semleges kémhatású talaj az ideális számára. A meszes talajt nem jól tűri.

Vízigény: Egyenletes talajnedvességet igényel. A nyári szárazság idején különösen fontos a rendszeres öntözés és a tövénél való mulcsozás.

Metszés: Alig igényel metszést. Ha mégis szükséges, azt a virágzást követően azonnal végezzük el.

Télállóság: Jó télállóságú, de a késői tavaszi fagyok károsíthatják a bimbókat és a virágokat. Szélvédett helyre ültetése ezért kiemelten fontos.

Ültetési javaslat
A Magnolia 'David Clulow' látványos szoliter növény, amely gyönyörűen mutat egy gyepsziget közepén vagy az előkertben. Társítható más savanyú talajt kedvelő növényekkel, mint például az azáleák és rododendronok.

Edith Bogue örökzöld nagyvirágú liliomfa	Magnolia grandiflora 'Edith Bogue'	7 950 Ft	7 950 Ft

A világ legtélállóbb örökzöld nagyvirágú magnóliája! Miss Edith A. Bogue-ról kapta a nevét, akinek a kertjében fedezték fel ezt a gyönyörű fává növő példányt. Az ok, hogy a fél világ a csodájára jár, az abból ered, hogy a 1920 körül ültetett növény New Jersey-ben lévő Montclair kisvárosban található, ahol a majd 100 év alatt a hőmérő higanyszála többször is -30 Celsius fok körül járt, amit mindig sérülés nélkül vészelt át. Miss Edith A. Bogue több példányból álló gyűjteményéből a leghidegebb tél (-31) után csak ez az egy példány maradt meg. Az USA északi államaiban a legnépszerűbb az örökzöld liliomfák közül!

6a-10a USDA-zóna

Elegáns törpe dísz-szil	Ulmus elegantissima 'Jacqueline Hillier'	9 950 Ft	9 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Az elegáns törpe dísz-szil (Ulmus elegantissima Jacqueline Hillier')1,5-2 m-es, sűrű ágú, lassú növekedésű cserje, melyet érdekes ágrendszerű törpe faként is nagyon jól lehet tartani ügyes metszéssel. Az érdekesen tekergő görbe törzsön tömött sötétzöld koronát alakotó kétsorba rendezett, elliptikus-lándzsás leveleivel feltűnő megjelenésű dísz-szil. A birminghami Selly Parkban Angliában talált példányról származik a genetika, melyet azóta a faiskolák termesztésbe vontak. A kert tulajdonosa azt mondta Hilliernek, hogy külföldről érkezett, nem helyi mutációról van szó. Zóna:6b			
Escimo Sunset juhar	(Acer pseudoplatanus 'Escimo Sunset'	19 500 Ft	22 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Eskimo Sunset juhar (Acer pseudoplatanus 'Eskimo Sunset') – A tarka, évszakonként változó színű díszfa
Az Eskimo Sunset juhar a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) nemesített, tarka levelű változata. A fajtát Új-Zélandon, az Esk-völgyben fedezték fel véletlen magoncként, innen ered a helyes 'Esk Sunset' elnevezés is, bár a kertészeti forgalomban 'Eskimo Sunset' néven vált ismertté. Ez a fa a tavaszi rózsaszínes lombfakadásával, a nyári tarka, márványos lombozatával és az őszi sárga-narancs színpompájával az egyik leglátványosabb díszfa a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága és a városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
Az Eskimo Sunset hegyi juhar egy lassú növekedésű, oszlopos vagy széles kúp alakú koronájú, lombhullató fa. Kifejlett magassága 4-8 méter, szélessége hasonlóan 4-8 méter között alakul. 20 év alatt jellemzően 4-6 méter magasságot ér el, ami a fajtát kifejezetten kompakt, kisebb kertekbe is alkalmas díszfává teszi. Koronája sűrű, az ágak szorosan a törzshöz simulnak, ami a fának elegáns, szoborszerű megjelenést kölcsönöz.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A levelek nagyok, tenyeresen karéjosak, a hegyi juharra jellemző formájúak. Az 'Eskimo Sunset' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek lenyűgöző színváltozása az év során: tavasszal a levelek narancs-rózsaszín színben hajtanak ki; nyáron a levelek mélyzöld alapon krémszínű, rózsaszín és világosbarna foltokkal, csíkokkal tarkítottakká válnak, a levél fonákja pedig mély vöröseslila vagy bordó színű; ősszel a levelek élénksárga és narancssárga árnyalatokban pompáznak, mielőtt lehullanának. A levelek színmintázata fánként és levélenként is eltérő, ami minden példányt egyedivé tesz. A rózsaszín árnyalatok intenzitása függ a fényviszonyoktól; napos helyen a színek általában élénkebbek.
A virágzat és a termés a fa másodlagos díszítőelemei. A virágok kicsik, zöldessárgák, jelentéktelenek, a tavasz végén jelennek meg, felálló, bugás fürtökben. A termések a juharokra jellemző ikerlependékek (szárnyas termések), amelyek ősszel érnek be.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az Eskimo Sunset hegyi juhar napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál. A legszebb, legintenzívebb lombozatszínt napos helyen hozza, de forró, száraz éghajlaton a délutáni nap elleni védelem ajánlott a levélperzselődés elkerülése érdekében.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savanyú talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja.

Öntözés: Az Eskimo Sunset hegyi juhar közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: Az Eskimo Sunset hegyi juhar alapvetően nem igényel rendszeres metszést, mivel természetes formája szabályos és oszlopos. A formázó és tisztító metszést a nyár folyamán, a levelek teljes kifejlődése után kell elvégezni, mivel a korai tavaszi metszés a fa vérzését (sap bleeding) okozhatja. Fontos: a metszést csak a zöld, hajtásos részekre korlátozzuk; a régi, fásodott részekből a növény nehezen hajt ki.

Telelés és fagytűrés: Az Eskimo Sunset hegyi juhar kifejezetten kiváló télállóságú; akár -23°C és -28,9°C közötti hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
Az Eskimo Sunset hegyi juhar a tarka, évszakonként változó lombozatának, a szabályos, oszlopos koronájának és a városi környezethez való alkalmazkodóképességének köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a szoborszerű habitus és a látványos lombozat miatt kiváló magányos díszelem.

Építészeti kertekbe, városi kertekbe, udvari kertekbe – jól tűri a városi környezetet, és a tiszta vonalak, a strukturális megjelenés miatt kiváló választás.

Konténerekbe, dézsákba, teraszokra – a lassú növekedés és a kompakt méret miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kisebb kertekbe – a kompakt méret (4-8 méter) miatt ideális kisebb kertekbe is. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) Az Eskimo Sunset hegyi juhar tarka lombozata és évszakonként változó színei számos más növénnyel kombinálhatók: Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a fa tarka lombozatát. Sötét levelű növényekkel – a sötét lombozat kiváló kontrasztot alkot a fa világos színű leveleivel. Virágos cserjékkel és évelőkkel: Hortenziával, rododendronnal – a virágzó cserjék színei kiegészítik a fa strukturális megjelenését. Díszfüvekkel – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a fa strukturális megjelenését. USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon az Eskimo Sunset hegyi juhar teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -23°C és -28,9°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Eveline® selyemmirtusz	Lagerstroemia indica 'Eveline®'	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A selyemmirtusz Eveline® Kelet-Ázsiából (Kína, Korea, Japán) származó, oltalommal (eredetiségvédelemmel) védett nemesített fajta. A fajta neve („Eveline”) a halványrózsaszín, finom, elegáns virágokra utal. Ez a növény a nyár második felében, amikor a kertben sok más növény már elvirágzik, halványrózsaszín virágfelhőivel vonzza a tekintetet, emellett simán hámló kérge és élénk őszi lombszíne egész évben érdeklődésre tart számot.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A selyemmirtusz Eveline® közepes növekedésű, bokros vagy kis fává nevelhető, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 2-3 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul. Növekedési erélye közepes, de napos, meleg fekvésben és jó talajon évi 30-50 cm-es növekedést is mutathat. A növény természetes formája váza alakú vagy szétterülő, de metszéssel jól formázható. Hajtásai vékonyak, négyélűek, fiatalon zöldek, később barnák.
A növény egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a kéreg. A kéreg sima, fényes, szürkésbarna vagy bézs színű, amely évente, az idősebb ágakon és a törzsön vékony, papírszerű lemezekben hámlik le. A hámlás után előbukkanó új kéreg világosabb, gyakran zöldes, sárgás vagy rozsdabarna, ami márványos vagy foltos mintázatot eredményez. Ez a tulajdonság télen, a lomb nélkül is kiemelkedően dekoratívvá teszi a növényt.
A levelek közepes méretűek, 4-7 cm hosszúak, 2-4 cm szélesek, elliptikusak vagy tojásdadok, átellenes állásúak, a levél széle ép, a levél csúcsa hegyes. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kissé hamvas. A levélnyél rövid. Az őszi lombszín látványos: a levelek élénksárgára, narancssárgára, barnásvörösre vagy bordóra színeződnek, ami a növényt ősszel is kiemeli a kertből. A levélváltás után a növény a simán hámló kérgével díszít tovább.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-25 cm hosszú, tömött, bugaszerű, füzéres vagy torzsás fürt. Egy virágzaton akár 100-200 virág is lehet. A virágok aprók, 2-4 cm átmérőjűek, hat szirmúak, a szirmok finoman ráncoltak, hullámosak, selymes tapintásúak, a krepp-papírra emlékeztetnek. Az 'Eveline®' fajta virágának színe halványrózsaszín, a pasztell, áttetsző halványrózsaszíntől a közepes, meleg rózsaszín árnyalatig. A virágok közepe sárgás vagy zöldessárga. A szín a napfény hatására különösen szépen érvényesül. A virágzási időszak a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig, néha október elejéig) tart. A virágok a méheket, a pillangókat, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, 5-10 mm átmérőjű, gömbölyded vagy tojásdad, kemény, száraz, barna vagy szürkésbarna, hatrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a következő tavaszig is a növényen maradhatnak. A termések a növényen télen is megmaradnak, ami további térdísz lehet.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A selyemmirtusz Eveline® napos, meleg, szélvédett helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz és az élénk őszi lombszínhez is. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágzata lazább, a hajtásai felnyurgulhatnak, és az őszi lombszín is fakóbb lesz.

Talaj: Nem túl válogatós, de az ideális számára a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen tápdús, humuszos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,0) talaj. A meszes (pH 7,5 feletti), nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri jól, mert a magas mésztartalom klorózist (levélsárgulást) okozhat. A pangó vizet kerülni kell. Ültetéskor érdemes a talajt tőzeggel, komposzttal, savanyú hangafölddel keverni a szerkezet javítása és a pH beállítása érdekében.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de hosszú, forró, csapadékmentes időszakokban érdemes őket hetente egyszer alaposan megöntözni. A túlöntözést kerülni kell. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (akár 2-3 naponta) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás előtt (március-április) adjunk neki lassan oldódó, virágos cserjék számára kifejlesztett műtrágyát. A második tápanyag-utánpótlást a virágzás előtt (júniusban) adhatjuk. Kerüljük a magas nitrogéntartalmú trágyákat, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik). Ősszel ne trágyázzunk, hogy a növény felkészülhessen a télre.

Metszés és alakítás: A selyemmirtusz alapvetően is szép formájú, de metszéssel formázható, alacsony sövénnyé vagy kis fává alakítható, valamint a növény mérete is korlátozható. A metszés legjobb időpontja a késő tél vagy a kora tavasz (február-március), fagymentes időben, mielőtt a növény kihajtana. Mivel a selyemmirtusz az adott évi hajtásokon virágzik, a metszés serkenti az új hajtások képződését és a bőséges virágzást. A metszést a következőképpen végezzük:

Tisztító metszés: Vágjuk ki az elhalt, fagykárosodott, sérült, keresztező, egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vághatjuk vissza az előző évi hajtásokat 2-4 rügyre (kb. a hajtás hosszának 1/3-1/2-ére). Ez serkenti az új hajtások képződését.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növények esetében a legidősebb ágakat tőből is kivághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Kis fa formára nevelés: Válasszunk ki egy erős, egyenes középső vezérhajtást, a többit vágjuk ki. Az alsó, oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el. A fa koronáját a kívánt magasságban alakítsuk ki.

Telelés és fagytűrés: A selyemmirtusz Eveline® mérsékelten télálló. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok rövid ideig elviselhetik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is. Fontos tudni, hogy ha a növény teljesen elfagyna télen, tavasszal tőből újra kihajt és még abban az évben virágzik. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni, és az ország hidegebb részein a fiatal növényeket vastag lombtakaróval, szalmával, fenyőgallyakkal takarni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes vagy hűvös (0-10°C), világos helyen (pl. garázs, pince, lépcsőház, fűtetlen üvegház) kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte teljesen szárazon kell tartani; 4-6 hetente egyszer, nagyon kevés vizet adjunk neki, csak annyit, hogy a földje teljesen ne száradjon ki.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A selyemmirtusz Eveline® méretének, finom halványrózsaszín színének, hosszú virágzási idejének és sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként (magányosan ültetve) – egy-egy példány a gyepen, a teraszon, a bejáratnál, a házfal előtt is feltűnő, különösen a halványrózsaszín virágok miatt.

Alacsony sövénynek, szegélynek – sűrűn ültetve, metszéssel alacsony, nyáron virágzó sövénnyé alakítható.

Előkertekbe, virágos ágyásokba, szegélyágyásokba – a halványrózsaszín virág más színekkel is jól kombinálható.

Mediterrán hangulatú kertekbe, nyaralókertekbe, romantikus kertekbe – a finom szín és a délies hangulat tökéletesen illik.

Nagyobb konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nevelhető konténerben is, de a teleltetésről gondoskodni kell.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet és a szeles körülményeket.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A selyemmirtusz Eveline® halványrózsaszín virágai, sötétzöld lombja, hámló kérge és őszi színei számos növénnyel kombinálhatók:

Fehér virágú növények: Fehér selyemmirtusz (Lagerstroemia indica 'Alba Nivea'), fehér levendula (Lavandula angustifolia 'Alba'), fehér rózsák (Rosa), gyöngyvirágcserje (Deutzia) – a fehér és a halványrózsaszín színek elegáns, romantikus, harmonikus párost alkotnak.

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), rozmaring (Rosmarinus officinalis), orvosi zsálya (Salvia officinalis), perovszkia (Perovskia atriplicifolia) – a halványrózsaszín és a lila-kék szívek hasonló tónusú, harmonikus, mélységet adó összképet eredményeznek.

Sötétrózsaszín vagy piros virágú növények: Sötétebb rózsaszín selyemmirtusz fajták, piros rózsák – a különböző rózsaszín árnyalatok egymás mellett gazdag, réteges hatást keltenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia arborescens, Artemisia ludoviciana), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), szürke varjúháj

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
(Sedum pruinatum), bárányfül (Stachys byzantina) - a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern, mediterrán hatást keltenek, és kiemelik a halványrózsaszín virágokat. Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), csenkesz fajták (Festuca), árvalányhaj (Stipa tenuissima) - a díszfüvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a selyemmirtusz tömöttebb, bokros formáját. Őszi színű díszcserjék: Sárga levelű növények (pl. aranycserje), vörös levelű juharok - a selyemmirtusz őszi sárga-narancs-vörös színei jól összehangolhatók más őszi színű növényekkel. Más selyemmirtusz fajták - különböző színű (fehér, rózsaszín, lila, piros) selyemmirtusz fajták egymás mellé ültetve szivárványszerű hatást keltenek. USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a selyemmirtusz Eveline® mérsékelten télálló; az ország enyhébb, déli, védett fekvésű, szélvédett kertekben (7-es zóna - pl. Budapest, Dél-Dunántúl, Pécs, Villány) takarással, védett helyen áttelelhet a szabadban, de az ország nagy részén (6-os, 6a-6b zóna - pl. Észak-Magyarország, Alföld, Dunántúli-középhegység) konténerben, védett, hűvös, fagymentes helyen teleltetve nevelhető biztonságosan, és a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ki a szabadba. Fontos tudni, hogyha a növény elfagyna, tavasszal tőből újrahajthat.)			
Ezüsthárs	Tilia tomentosa	4 450 Ft	5 490 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az ezüsthárs Délkelet-Európából és Kis-Ázsiából származó lombhullató fa, amely a Kárpát-medencében éri el elterjedési területének északi határát. Magyarországon a Nyírség délkeleti részén és a Dél-Dunántúlon gyakori természetes élőhelyein is, leginkább domb- és hegyvidéki területeken. A faj 2010-ben az „Év fája” címet is elnyerte.
Külső megjelenés
Az ezüsthárs impozáns, tekintélyes termetű fa: kifejlett magassága elérheti a 20-35 métert, szélessége a 12-18 métert is. Fiatal korban a korona kúpos, később széles, tojásdad formát ölt, ágai meredeken felfelé törnek. A kéreg sima, sötétbarna, idővel szürkésbarnára fakul és finoman barázdálttá válik.
A növény legnagyobb dísze a levelek különleges megjelenése. A levelek kerekdedek, szíves vállúak, 6-12 cm hosszúak, szélük finoman fűrészes. A levél színe fakó sötétzöld, fonákát azonban sűrű, csillagszőrök borítják, amely ezüstfehér vagy szürkészöld színt kölcsönöz neki . Forró, napos időben a levelek függőleges helyzetbe állnak, vagy fonákukat fordítják a Nap felé, hogy csökkentsék a párologtatást – ilyenkor a fa koronája szinte ezüstösen ragyog. Ősszel a lombozat aranysárga árnyalatot ölt .
Virágzás és termés
Az ezüsthárs a hazai hársfajok közül a legkésőbb virágzik: virágai június második felében, júliusban nyílnak. A virágok aprók, sárgásfehérek, 6-10 tagú bogernyőkben csüngnek, és rendkívül intenzív, édeskés, bódító illatot árasztanak. A virágokat a méhek és más rovarok tömegesen látogatják, így a fa kiváló méhlegelőnek számít; az ezüsthársméz a legfinomabb, legkarakteresebb hársmézek közé tartozik. A virágzás után gömbölyű, szürkén molyhos, 6-10 mm átmérőjű makkocskák érnek.
Fontos tudnivaló a virágok gyűjtéséhez!
Bár a hársfavirágtea népszerű gyógytea, az ezüsthárs virágait – ellentétben a kis- és nagylevelű hárséval – nem ajánlott gyűjteni. A levelek és virágzatok felületén található apró csillagszőrök ugyanis allergiás reakciót, torok- és nyelőcső-irritációt okozhatnak fogyasztáskor. Maga a virág ugyanolyan gyógyhatású lenne, mint a többi hársé, de a szőrök miatt fogyasztása nem biztonságos .
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy világos félárnyékos helyet kedvel. Napos fekvésben fejleszti a legszebb, legszabályosabb koronát .

Talaj: nem válogatós, de a legjobban mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású vályogtalajban érzi magát. Meszes talajokon is szépen fejlődik . A pangó vizet és a tömörödött, levegőtlen talajt nem kedveli.

Öntözés: fiatal korában rendszeres öntözést igényel a mély gyökérzet kialakulásához. Idősebb korban a hársak között a legszárazságtűrőbb, kifejlett példányok a hosszabb száraz időszakokat is jól elviselik .

Tápanyag-utánpótlás: nem tápanyagigényes; a jó talajadottságok mellett külön trágyázást nem igényel.

Metszés: jól tűri a metszést, ezért formázható, akár magas sövénnyé is alakítható. Főként az elszáradt, sérült, egymást keresztező ágak eltávolítása szükséges .

Telelés: teljesen télálló, a hazai teleket gond nélkül átvészeli.

Várostűrés: kifejezetten jól bírja a városi klímát, a légszennyezettséget, a porosodást és a szűkült gyökérteret is, ezért az egyik legkedveltebb városi díszfa .

Kártevők, betegségek: a hársak között a legellenállóbb. Extrém szárazság esetén levélfoltosság (Mycosphaerella millegrana) vagy hársfa díszbogár (Agrilus aurocollis) támadhatja .

Kertstílus, ahová illik
Az ezüsthárs mérete és igénytelensége miatt elsősorban nagyobb kertekbe, parkokba, fasorokba, városi terekbe, sétányokra és reprezentatív bejáratokhoz ajánlott .

Szoliterként: tekintélyes megjelenése, ezüstös lombozata és illatos virágzása miatt kiváló magányos díszfa nagy gyepfelületeken.

Fasorként: kiválóan bírja a városi körülményeket, ezért utcafásításra is alkalmas, ahol elegendő gyökértér áll rendelkezésére.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Parkfaként: csoportosan ültetve nagyobb díszparkokban is mutatós.

Magas sövényként: metszéssel jól formázható, bár hatalmas termete miatt ez a felhasználás ritka.

Változatos növénytársítások
Az ezüsthárs nagy mérete miatt a társításokat is nagyobb léptékben érdemes gondolkodni:

Nagy termetű lombhullató fák: kocsányos tölgy (Quercus robur), csertölgy (Quercus cerris), virágos kőris (Fraxinus ornus), keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos) .

Lombhullató díszcserjék: som (Cornus), bodza (Sambucus), bangita (Viburnum), madárbirs (Cotoneaster) fajok.

Nagyobb díszfüvek: ezüstpázsit (Miscanthus), nádképű (Calamagrostis), tollborzfű (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) fajok.

A fa koronája alatt idősebb korban sűrű árnyék alakul ki, ezért oda érdemes árnyéktűrő, szárazságot is viselő évelőket (pl. árnyékliliom, tüdőfű, meténg) ültetni.
USDA besorolása: 5-9 (Magyarország egész területén, 5b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).

Fekete dió	Juglans nigra	3 550 Ft	3 550 Ft

Hazájában, Észak-Amerika keleti részén (Massachusetts és Texas között) a magassága elérheti akár az 50 métert is. Spirálisan szórt állású, páratlanul szárnyasan összetett, fűrészes szélű levelei vannak. Csonthéjasra emlékeztető zárt kupacsú, durván bordázott makktermése 5 cm átmérőjű, szabályos gömb alakú és az ősz második felében érik be. Fája keresett a bútoripar számára.
A Fekete dió (Juglans nigra) egy különleges és kedvelt díszfa, amely Észak-Amerika keleti részéről származik. Ez a lombokkal dúsított, lombhullató fa 20-30 méter magasra is megnőhet, és csodálatos, sötét színű kérgéről és jellegzetes levélformájáról ismert. A Fekete dió levelei nagy, párosan álló levélkékkel rendelkeznek, amelyek nyáron sűrű, árnyékos lombkoronát képeznek.
A fa legismertebb vonása azonban a diótermése, amely íze és gazdag tápanyagtartalma miatt különösen keresett. A Fekete dió héja kemény, így a betakarítás során különös odafigyelést igényel. A fa nagyon jól tűri a különböző talajviszonyokat és a városi környezetet, ellenáll a légszennyezésnek is, így tökéletes választás parkokba, kertekbe és utcafrontokra.
A Fekete dió nemcsak gazdasági értékkel bír, hanem az élővilág számára is fontos faj, mivel termései táplálékot nyújtanak számos állatfaj számára.
Ültetési és gondozási útmutató:

Hely kiválasztása: Válasszon napos helyet, ahol a fa elegendő fényt kap.
Talaj előkészítése: A Fekete dió jól fejlődik jól vízelvezető, tápanyagokban gazdag talajban, de képes alkalmazkodni a különböző talajviszonyokhoz is.
Ültetés: Ültesse el tavasszal vagy ősszel, a fák közötti távolság minimum 10 méter.
Öntözés: Az ültetés után bőségesen öntözzük meg, különösen az első évben.

Gondozási tippek:

Öntözés: A fiatal fák esetében fontos a rendszeres öntözés, különösen száraz időszakokban.
Metszés: Az elhalt vagy beteg ágakat tavaszi időszakban távolítsuk el.
Trágyázás: Az új növekedés serkentésére évente alkalmazzon szerves trágyát.

5a-9b USDA-zóna

Green Dwarf törpe mocsári tölgy	Quercus palustris 'Green Dwarf'	30 800 Ft	30 800 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A törpe mocsári tölgy egy gömbölyded, tömör koronájú lombhullató fa, amely 3-4 méter magasra és 2-3 méter szélesre nő. Levelei mélyen karéjosak, élénkzöld színűek, ősszel élénk skarlátvörösre színeződnek. A levelek 8-12 centiméter hosszúak, jellegzetes tölgyformájúak. A fa lassú növekedésű, évente csak 15-20 centimétert nő. Ágai sűrűn elhelyezkednek, képezve a szabályos, gömb alakú koronát.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos helyet kedvel a szép őszi színeződés érdekében

Talajigény: Jól vízelvezető, savanyú vagy semleges kémhatású talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik különböző talajviszonyokhoz

Metszés: Alig igényel metszést, csak az elhalt ágakat kell eltávolítani

Télállóság: Kiváló télállóságú, -30°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Kisebb kertekbe ideális választás

Társítás: Tavaszi hagymás növényekkel, árnyéktűrő évelőkkel

Előkertekbe és gyepszigetekbe

Japán kert stílusú beültetésekbe

Ajánlott kerttípusok

Kis kertek

Előkertek

Japán kertek

Városi kertek

Greenspire sudár kislevelű hárs	Tilia cordata 'Greenspire'	14 900 Ft	16 800 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Greenspire Sudár kislevelű hárs (Tilia cordata 'Greenspire') – A karcsú, szabályos koronájú városi díszfa
A Greenspire sudár kislevelű hárs az Európában őshonos kislevelű hárs (Tilia cordata) nemesített változata. A fajtát az USA-beli Chicagóban nemesítették, és azóta is az egyik legértékesebb és legnépszerűbb városi sorfa a világon. A 'Greenspire' fajtajelzés a fa sűrű, kompakt lombozatára utal. Ez a fa a nyári illatos virágzásával, a sűrű, kompakt lombozatával és a városi környezethez való kiváló alkalmazkodóképességével az egyik legkedveltebb díszfa a közterületeken és a nagyobb kertekben. A könnyű gondozhatósága, a betegség-ellenállósága és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Greenspire sudár kislevelű hárs egy gyors növekedésű, szabályos koronájú, lombhullató fa. Kifejlett magassága 15-20 méter, szélessége 8-12 méter között alakul, ami a fajtához képest viszonylag keskeny, karcsú habitust eredményez. Fiatal korban koronája kúp alakú, az ágak meredeken felfelé törnek; idősebb korban a korona szélesebbé, tojásdad vagy ovális formájúvá válik. A törzs egyenes, a kéreg szürke, idős korban repedezett.
A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek kicsik, szív alakúak, 6-10 cm hosszúak, fényes sötétzöld színűek, a levélfonák kékeszöld vagy világosabb árnyalatú. A 'Greenspire' fajta levelei sűrűn állnak, ami a fának dús, kompakt megjelenést kölcsönöz. Ősszel a levelek látványos aranysárgára színeződnek, ami a fát a késő őszi időszakban is kiemeli a kertből.
A virágzat és a virágok a fa másodlagos díszítőelemei, de jelentőségük a méhlegelőként betöltött szerepük miatt kiemelkedő. A virágok a június-júliusi hónapokban jelennek meg, sárgásfehér vagy krémszínű színűek, 5-9 darabos ernyős fürtökben. A virágok kellemes, édes illatúak, és a méhek, poszméhek, valamint más beporzó rovarok számára gazdag nektárforrást biztosítanak. A 'Greenspire' fajta nem vagy csak ritkán hoz terméseket.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A sudár kislevelű hárs 'Greenspire' napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legdúsabb koronát napos helyen hozza.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. Kifejezetten jól tűri a meszes, kötött talajokat. A legjobban a mélyrétegű, jó vízáteresztő képességű, üde, tápanyagban gazdag talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli.

Öntözés: A sudár kislevelű hárs 'Greenspire' közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A sudár kislevelű hárs 'Greenspire' alapvetően nem igényel rendszeres metszést, mivel természetes formája szabályos és karcsú. A formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető. A fa városi környezetben is jól fejlődik, de a fiatal fákat érdemes a téli szél ellen védeni. A fajta nem levéltetű-érzékeny, így nem termeli a ragadós mézharmatot, ami a városi környezetben különösen előnyös.

Telelés és fagytűrés: A sudár kislevelű hárs 'Greenspire' kifejezetten kiváló télállóságú; akár -34,4°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A sudár kislevelű hárs 'Greenspire' a szabályos, karcsú koronájának, a városi környezethez való kiváló alkalmazkodóképességének, illatos virágainak és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa a kertekben és parkokban:

Fasorként, szűk utcákba – a keskeny habitus és a szabályos korona miatt kiváló választás fasorokba és szűk utcákba.

Szoliter növényként – a szoborszerű habitus és a látványos őszi szín miatt kiváló magányos díszelem nagyobb kertekbe, parkokba.

Városi kertekbe, parkokba, közterületekre – jól tűri a városi környezetet, a szennyezett levegőt és a talaj tömörödését.

Méhlegelőként – a virágok gazdag nektárforrást biztosítanak a méhek és más beporzók számára.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A sudár kislevelű hárs 'Greenspire' őszi aranysárga színe és zöld lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Alacsony növekedésű cserjékkel és évelőkkel – a fa alá ültetve szép háttért vagy aljnövényzetet biztosítanak.

Virágos cserjékkel: Hortenziával, rododendronnal – a virágzó cserjék színei kiegészítik a fa strukturális megjelenését.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral, virágos sommal – a különböző őszi színek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 4-7 (Magyarországon a sudár kislevelű hárs 'Greenspire' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34,4°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Heaven Scent liliomfa	**Magnolia 'Heaven Scent'**	6 950 Ft	6 950 Ft

Heaven Scent nagyvirágú liliomfa (Magnolia x Heaven Scent') keletről származó díszfák közé a liliomfákhoz tartoznak, melyeknek számtalan szebbnél szebb virágot hozó fajtája terjedt el a világon. Igazán nagy kerttel rendelkező gyűjtőnek kell lennie annak, aki a liliomfák fajtáinak begyűjtésére vállalkozik. A Heaven Scent nevű fajta kisebb, de felfelé törő ágú fácska, mely a lombfakadás előtt hatalmas lilás-sötét rózsaszínből fehérbe átmenő szirmú virágokat hoz. Levelei tojásdadok, nagy méretűek. A meszet ha lehet kerüli, inkább semleges, vagy savanyú kémhatású talajokban fejlődik szépen. Ilyen körülmények között a teljes napot is jól viseli, egyébként inkább olyan helyre ültessük, ahol a nyári hősokk kisebb valószínűséggel éri el. egy kis plusz öntözővizet meghálál. Falusi kerteknek elmaradhatatlan növénye a liliomfa, de városi kiskertekbe, előkertekbe is ajánlható. Nagyobb kertekbe szoliterként. vagy más fák, lehetőleg örökzöld növények előterébe ültessük. És hát aki kedveli a keleties, kínaizáló kerteket, annak is "kötelező". Kiválóan párosítható örökzöld cserjékkel, vagy japánjuharok fajtáival.
Magas, egyszálas suhángot küldünk.

Hófehér virágú selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Natchez'**	3 950 Ft	4 450 Ft

A Lagerstroemia indica 'Natchez' varázslatos díszcserje, mely a nyári hónapokban bőséges, hófehér virágzással káprázтatja el a látogatókat. A növény 3-4 méter magasra nő, és széles, terebélyes habitusával kiemelkedik a kertekben. A 'Natchez' fajta különlegessége a tarka, sima kérge, amely tavasszal és ősszel csodálatos textúrát ad a tájnak.
A virágok májustól kezdve egészen késő őszig nyílnak, és gyönyörű kontrasztot alkotnak a sötétzöld levelekkel. A virágok nemcsak gyönyörűek, hanem az őket körülvevő mozgás is szemet gyönyörködtető, ahogyan a méhek és pillangók vonzzák.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A 'Natchez' cserje napfénykedvelő, legalább 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a legjobb virágzás érdekében.
Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj a legelőnyösebb, de a cserje jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz is, optimálisan pH-értéke 6,0-6,8 között van.
Öntözés: A fiatal növényeknek kezdetben rendszeres öntözés szükséges a gyökerek stabilizálása érdekében. A felnőtt növények szárazságtűrőek, de a forró időszakokban hasznos a megfelelő öntözés.
Trágyázás: Tavasszal érdemes kiegyensúlyozott műtrágyát alkalmazni a virágzás serkentésére.
Téliesítés: A Lagerstroemia indica 'Natchez' fagyérzékeny lehet a hidegebb éghajlatokon, így a téli hónapokban ajánlott takarni vagy védettebb helyre ültetni.

Felhasználási lehetőségek:

Szoliter növényként kiválóan mutat a kert közepén vagy más dísznövények között, színt és textúrát biztosítva.
Mivel a 'Natchez' cserje csodálatos virágaival díszít, ideális lehet kerítések és utak mentén is.
Ligetek és parkok díszítésére is ajánlott, hiszen vonzó látványt nyújt, miközben a beporzókat is vonzza.

A Lagerstroemia indica 'Natchez' egy csodálatos választás minden kertész számára, aki tartós, szép és könnyen gondozható növényt keres, amely minden évszakban vonzó látványt nyújt.
7a-10a USDA-zóna

Hopa díszalma	**Malus × adstringens 'Hopa'**	14 500 Ft	16 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Hopa díszalma (Malus × adstringens 'Hopa') – A tömegesen virágzó, télálló díszfa

A Hopa díszalma a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó, hibrid eredetű díszalma fajta. A fajtát Niels Ebbesen Hansen amerikai nemesítő állította elő 1920-ban. A 'Hopa' név a "hope" (remény) szóra utalhat, ami Hansen egyik kedvenc kifejezése volt. Ez a fa a tavaszi virágzásával és őszi terméseivel az egyik legkedveltebb díszalma a kertekben és közterületeken. A könnyű gondozhatósága, kiváló télállósága, valamint a méhek és madarak vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Hopa díszalma egy gyors növekedésű, közepes termetű, lombhullató fa. Kifejlett magassága 4-6 méter, szélessége hasonlóan 4-6 méter között alakul. A növekedés gyors, a fiatal fák 10-20 év alatt érik el végleges méretüket. Koronája széles, gömbölyű, laza és áttetsző szerkezetű, ami a fának légies, elegáns megjelenést kölcsönöz.

A fiatal hajtások lilás színűek, a fa egészének vöröses árnyalatú megjelenést adva. A levelek váltakozó állásúak, tojásdad-elliptikusak, szélük finoman fogazott. A fiatal levelek bronzvörösek vagy vörösesbarnák, majd a nyár folyamán sötétzöldre színeződnek, fonákjukon gyakran vöröses erek futnak végig. Ősszel a levelek sárgára vagy zöldessárgára színeződnek, mielőtt lehullanának.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a rövid hajtásokon, a levelek előtt vagy azokkal egy időben nyílnak, májusban. A bíborlila vagy kárminvörös színű rügyekből 4-4,5 cm átmérőjű, illatos, rózsa-vörös vagy sötét levendula-rózsaszín, egyszerű, ötszirmú virágok nyílnak. A virágzás rendkívül bőséges, a fát teljesen beborítják a virágok, ami a növényt távolról is feltűnővé és mutatóssá teszi, esztétikai értéke rendkívül magas. A virágok kellemes illatukkal vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, 2-3 cm átmérőjű, gömbölyű, élénk narancsvörös vagy piros almácskákat fejleszt. A termések ősszel érnek be, és sokáig, akár október közepéig is a fán maradnak, téli díszként szolgálva. A termések ehetőek, de nyersen fanyar ízűek; befőttnek, zselének vagy lekvárnak feldolgozva kiválóak. Fontos tudni: a magok nyersen mérgező vegyületeket tartalmaznak, ezért a termések feldolgozása során a magokat el kell távolítani. A növényt oltással vagy szemzéssel szaporítják vegetatív úton.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Hopa díszalma napos fekvést igényel a bőséges virágzáshoz és terméshozáshoz. Félárnyékot is tolerálja, de ott virágzása és terméshozama gyengébb lehet.

Talaj: A fa nem igényes a talaj típusára; homokos, vályogos és agyagos talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében savanyútól a lúgosig sokoldalúan toleráns. A legjobban a mély, jó vízáteresztő képességű, termékeny, nedves talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot is kerülni kell.

Öntözés: A fa közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett fákat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb példányok a rövid szárazságot is elviselik, de a tartós szárazság a levelek hervadásához és a termések apróságához vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: A Hopa díszalma közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy adag lassan oldódó, gyümölcsfák vagy díszfák számára kifejlesztett műtrágya. A talajt érdemes komposzttal mulcsozni a nedvességmegőrzés és a tápanyag-utánpótlás érdekében.

Metszés és ápolás: A Hopa díszalma metszése fontos a fa formájának megtartása és az egészsége szempontjából. A metszést kora tavasszal vagy közvetlenül a virágzás után kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült, keresztező vagy egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A fa koronáját a kívánt formára alakíthatjuk; a korona ritkítása javítja a szellőzést és a fényáteresztést.

Termőfa metszés: Mivel a fa a rövid hajtásokon virágzik, a túl hosszú, erős hajtásokat érdemes visszavágni a rövid termőhajtások serkentése érdekében.

Telelés és fagytűrés: A Hopa díszalma kifejezetten kiváló télállóságú; az egyik leginkább fagy- és hidegtűrő díszalma fajta. Akár -34°C-ot is elvisel, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén, takarás nélkül áttelel a szabadban. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kártevők és betegségek: A Hopa díszalma érzékeny lehet bizonyos kártevőkre és betegségekre, különösen a varasodásra és a tűzelhalásra. A gyakori kártevők közé tartoznak a levéltetvek, a takácsatkák és a molyok. A megelőzés érdekében a fa számára szellős, napos helyet biztosítsunk, és a lehullott leveleket ősszel távolítsuk el a betegségek áttelelésének megakadályozása érdekében. Felhasználás a kertben (alkalmazási területek) A Hopa díszalma a látványos virágzásának, dekoratív terméseinek, kiváló télállóságának, gyors növekedésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa a kertekben és közterületeken: Szoliter növényként – a közepes méret és a látványos virágzat miatt kiváló magányos díszelem a gyepen vagy a ház előtt. Fasorként, utcai fának – a városi környezetet is jól tűri, és rendszeres ültetéssel vonzó fasorokat alkot. Közparkokba, kertekbe – a fa mérete és látványos megjelenése miatt kiváló közparki fa. Méhlegelőként, madárbarát kertekbe – a virágok vonzzák a méheket, a termések pedig a madarakat. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A Hopa díszalma virágai és termései számos más növénnyel kombinálhatók: Alacsony növekedésű cserjékkel: Hortenzia (Hydrangea), japán díszjuhar (Acer palmatum) – a fa alá ültetve szép háttért vagy aljnövényzetet biztosítanak. Hagymás évelőkkel: Tulipán (Tulipa), nárcisz (Narcissus) – a fa alá tavasszal ültetve a virágzási időszak meghosszabbítható. Más díszalmákkal: Különböző színű és méretű díszalma fajtákkal – a változatos virág- és terméssszínek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek. USDA besorolása: 4-7 (Magyarországon a Hopa díszalma teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ot is elviselnek. A fa lombhullató, a téli időszakban nem igényel külön védelmet.)			
Ian's Red liliomfa	**Magnolia 'Ian's Red'**	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Ian's Red liliomfa egy közepes termetű, felálló növekedésű lombhullató fa, amely 4-6 méter magasra és 3-4 méter szélesre nő. Fő értéke a nagy, 15-20 cm átmérőjű, serleg alakú virágok, amelyek élénk pirosas rózsaszínűek. A virágok március-április hónapokban nyílnak, a levelek megjelenése előtt. A sötétzöld, ovális alakú levelek nyáron sűrű lombot alkotnak, ősszel pedig sárgászöldre színeződnek. A fa kérge ezüstszürke színű és sima felületű.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félárnyékos, széltől védett helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, savanyú vagy semleges kémhatású, tápanyagban gazdag talaj

Időzítés: Kora tavasszal vagy ősszel

Távolság: 3-4 méteres térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter fa, kerti fő fája, díszfaiskola, gyűjteményes kertek

Gondozási útmutató

Metszés: Ritkán igényel metszést, csak a száraz vagy sérült ágak eltávolítása

Télvédelem: Teljesen télálló, de a késői tavaszi fagyok károsíthatják a virágokat

Öntözés: Átlagos vízigényű, a szárazságot nem kedveli

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Lassú növekedésű, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Modern kertek

Parkok és nagykertek

Gyűjteményes liliomfás kertek

Előkertek és látható helyek

Japán liliomfa	**Magnolia kobus**	13 200 Ft	13 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Japán liliomfa (Magnolia kobus) egy lenyűgöző, közepes méretű, lombhullató fa, amely leginkább látványos, nagy, csésze alakú fehér virágairól ismert. Ezek a virágok a kora tavaszi időszakban borítják be a fa ágait, mielőtt a levelek megjelennek, így a legteljesebb pompájukat mutatják. Az illatos virágok mellett a fa szép, sötétzöld levélzete tavasztól őszig dekoratív, míg őszi lombozata aranysárga színekbe öltözik.
A japán liliomfa ideális választás azok számára, akik kertjükbe egzotikus és elegáns elemet szeretnének beilleszteni. Kedvelt választása klasszikus, ázsiai stílusú, illetve romantikus kerteknek, ugyanakkor modern kompozíciókban is megállja a helyét. Kitűnően mutat szabad térben, akár szoliterként is, ahol teljes szépségében kibontakozhat.
Gondozási útmutató:

Helyválasztás: Napos vagy félárnyékos helyen fejlődik a legjobban.
Talaj: A jó vízelvezetésű, humuszban gazdag, kissé savas talajt kedveli.
Öntözés: Rendszeres öntözést igényel a fiatal növény, de az idősebb fák már szárazságtűrőbbek.
Metszés: Általában nem igényel komoly metszést, de a korona formázása fiatal korban ajánlott.
Tápanyag: Tavasszal érdemes szerves trágyával pótolni a tápanyagokat.

6a-9b USDA-zóna

Kalamondin hibridnarancs	**Citrus x calamondrin**	19 500 Ft	22 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kalamondin hibridnarancs (Citrus × microcarpa) – A kompakt, illatos termésű citrus

A kalamondin hibridnarancs a rutafélék (Rutaceae) családjába tartozó, hibrid eredetű örökzöld cserje vagy kis fa. A növény a mandarin (Citrus reticulata) és a kumkvat (Fortunella japonica) kereszteződéséből jött létre. A faj a Fülöp-szigetekről és Délkelet-Ázsiából származik, ahol évtizedek óta termesztik kereskedelmi mennyiségben. A nemzetség névadója a Citrus, a fajnév (microcarpa) pedig a latin "kis termésű" jelentésű szóból ered, ami a növény apró, de annál intenzívebb ízű termésére utal. Ez a citrusféle a kompakt méretével, az illatos virágaival és a dekoratív, ehető terméseivel az egyik legkedveltebb konténeres citrus a mérsékelt éghajlatú kertekben és lakásokban. A könnyű gondozhatósága és a rendkívüli hasznosíthatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kalamondin hibridnarancs egy sűrű, bokros növekedésű, örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 2,5-4 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul, de konténerben nevelve általában kisebb marad. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtásokon néha rövid, vékony tövisek találhatók. Növekedési erélye közepes, a végleges méret eléréséhez 5-10 év szükséges.

A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek elliptikusak vagy tojásdadok, 3-8 cm hosszúak, fényes, sötétzöld színűek, bőrszerűek, a levélnyélen apró, szárnyas függelék található. A levelek megdörzsölve kellemes, citrusos illatot árasztanak, ami a növény egyik jellegzetessége.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a levélhónaljakban, magányosan vagy kis csoportokban jelennek meg. A virágok 1-2 cm átmérőjűek, csillag alakúak, öt szirommal, fehér színűek, néha halványlila árnyalattal a külső oldalon, illatosak. A virágzási időszak a tavasztól a nyárig tart, de a növény az év során 4-5 alkalommal is virágozhat, így gyakran láthatóak egy időben a virágok és az érett termések is. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, 3-4 cm átmérőjű terméseket fejleszt, amelyek kezdetben zöldek, majd éréskor narancssárgára színeződnek. A termések vékony, édes héjjal rendelkeznek, míg a belső hús rendkívül savanyú és lédús, íze a citromra és a lime-ra emlékeztet. A termések akár egy évig is érhetnek a fán, és hosszú ideig megmaradnak. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kalamondin hibridnarancs napos fekvést igényel a legszebb, legbőségesebb virágzáshoz és terméshozáshoz. Félárnyékban is fejlődik, de a virágzás és a terméskötés gyengébb lehet. A napi minimum 6 óra közvetlen napsütés javasolt.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, savanyú vagy semleges kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a talaj folyamatos, mérsékelt nedvességét igényli. Ültetéskor érdemes a virágföldet homokkal vagy perlittel keverni a jobb vízelvezetés érdekében, és a cserép alján vízelvezető réteget kialakítani.

Öntözés: A kalamondin hibridnarancs közepes vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, de a két öntözés között hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes vagy magas tápanyagigényű. A vegetációs időszakban (tavasztól őszig) 2-4 hetente adjunk neki citrusok számára kifejlesztett folyékony műtrágyát. Télen, a nyugalmi időszakban a tápanyag-utánpótlást csökkentsük vagy szüneteltessük.

Metszés és ápolás: A kalamondin hibridnarancs alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal elvégezhető. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat. Konténerben nevelve a metszés segít a kompakt méret fenntartásában.

Telelés és fagytűrés: A kalamondin hibridnarancs fagyérzékeny. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik az -1°C és -7°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok elpusztítják. Magyarországon a növényt konténerben, védett, hűvös (5-10°C), világos helyen kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte szárazon kell tartani. A következő tavasszal, a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ismét ki a szabadba, fokozatosan szoktatva a napfényhez.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Felhasználás a kertben (alkalmazási területek) A kalamondin hibridnarancs a kompakt méretének, az illatos virágainak, a dekoratív terméseinek és a sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően az egyik legkedveltebb konténeres citrus: Konténerekbe, cserepekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a díszítő érték miatt kiválóan nevelhető konténerben. Szobanövényként lakásokba, irodákba, télikertekbe, üvegházakba – a növény a melegebb hónapokban kivihető a szabadba, télen pedig védett helyen tartható. Dísznövényként ágyásokba, szegélyekbe – a melegebb éghajlatú területeken szabadföldön is nevelhető, akár sövényként is. Gyümölcstermő növényként – a termések sokoldalúan felhasználhatók a konyhában: italok, mártások, lekvárok, chutney-k, valamint hal- és húsételek ízesítésére. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A kalamondin hibridnarancs sötétzöld lombozata és narancssárga termései számos más növénnyel kombinálhatók: Más citrusfélékkel: Citrommal, lime-mal, kumkvattal – a hasonló termesztési igények miatt jól társíthatók, és a különböző terméssznek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek. Mediterrán hangulatú növényekkel: Levendulával, rozmaringgal, olajfával – a hasonló szárazságtűrés és a mediterrán hangulat miatt kiváló társnövények. Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a növény narancssárga terméseit. Virágos növényekkel: Muskátlival, petúniával – a konténeres kompozíciókban a virágok színei kiegészítik a citrus terméseit. USDA besorolása: 8b-11 (Magyarországon a kalamondin hibridnarancs fagyérzékeny; az USDA 8b-11-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) konténerben, védett, hűvös (5-10°C), világos helyen teleltetve nevelhető biztonságosan. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -1°C és -7°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok elpusztítják.)			
Katsura japán juhar	**Acer palmatum 'Katsura'**	4 750 Ft	5 490 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Acer palmatum 'Katsura' egy Japánból származó, nemesített díszfa, melyet levelei kiemelkedő színváltása tett népszerűvé. Tavaszi lombszíne élénk narancssárga, széleken rózsás árnyalattal, melyek nyáron világoszöldre váltanak, majd ősszel aranyvörös tónusokba borulnak. Levelei finoman szeldeltek, 5-7 karéjúak, és a korona sűrű, gömbölyded formát alkot. Apró, lila virágai áprilisban nyílnak, melyeket szárnyas termések (szamarák) követnek. Lassú növekedésű, de kiváló választás kőkertekbe, vízpartok mellé vagy modern teraszok díszeként.

Gondozási útmutató:

Helyzet:

Fényigény: Félárnyékos helyet részesít előnyben, ahol a déli nap elkerülhető. Túlzott napsütés levégsérülést okozhat.

Szélvédelem: Ültessük védett helyre, mert érzékeny az erős szélre.

Talaj:

Savanyú vagy semleges pH-jú (5,5-6,5), laza, jó vízelvezetésű talaj. Tőzegmoha vagy komposzt hozzáadása javasolt.

Öntözés:

Közepes vízigényű: A talajt egyenletesen nedvesen tartsuk, de eláztatást kerüljünk. Nyári szárazságban reggel vagy este öntözzünk.

Metszés:

Ritkán szükséges: Ha szükséges, késő ősszel vagy télen távolítsuk el a száraz vagy sérült ágakat.

Téli védelem:

Fagyállóság: -20°C-ig télálló (USDA 5-8 zóna). Fiatal fákat téli mulccsal (faforgács) védjük.

Betegségek és kártevők:

Levéltetvek: Természetes rovarölő szerek (pl. szappanoldat) használata javasolt.

Lisztharmat: Jó légáramlást biztosítunk és túlöntözést kerülünk.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kislevelű hárs	Tilia cordata	4 450 Ft	4 450 Ft

A kislevelű hárs, egy impozáns és elegáns lombhullató fa, amely Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos. Ez a fa 20-25 méter magasra is megnőhet, széles, kerek koronát alkotva. Szív alakú, fogazott szélű levelei fényes zöldek, ősszel pedig szép sárgásbarna színárnyalatot kapnak. Június-július hónapokban nyílnak mézédes illatú, sárgásfehér virágai, amelyek vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat. Ezeket a virágokat követik a kis, kerekded magtokok. A Tilia cordata nemcsak esztétikai értékével tűnik ki, hanem a helyi ökoszisztémában is fontos szerepet játszik, biztosítva a rovarok és madarak számára szükséges élelmet és élőhelyet.
Gondozási útmutató: A Tilia cordata viszonylag könnyen gondozható, de néhány alapvető igényt érdemes figyelembe venni:

Fényigény: Teljes napfényt vagy félárnyékot igényel a legjobb növekedés érdekében.
Talajigény: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedvel, amely lehet enyhén savas vagy semleges. Jól tolerálja a városi környezetet és a különböző talajtípusokat.
Öntözés: Fiatal fák esetében rendszeres öntözést igényel, de a felnőtt példányok szárazságtűrőek és kevés öntözést igényelnek, különösen jól megeredt gyökérrendszere esetén.
Tápanyag: Tavasszal érdemes szerves trágyával vagy komposzttal dúsítani a talajt, hogy elősegítsük a növekedést és a virágzást.
Metszés: Általában nem szükséges, de a beteg, elhalt vagy megtört ágakat érdemes időben eltávolítani. A formázó metszést késő télen vagy kora tavasszal lehet elvégezni.
Télállóság: Nagyon hidegtűrő, és jól tűri a hideg telet.

Felhasználási javaslat:

Parkok és utcai sorfák: Nagy méretének és széles koronájának köszönhetően ideális választás parkokban és sugárutakon sorfának.
Nagyobb kertek: Központi díszfa lehet nagyobb kertekben, ahol árnyékot és esztétikai értéket biztosít.
Ökoszisztéma támogatása: Virágai és levelei táplálékot és élőhelyet biztosítanak a helyi rovarok és madarak számára.
Mézkészítés: A Kislevelű hársfavirág méze kiváló minőségéről ismert, ezért méhészek számára is értékes növény.

Lassan indul, de utána 1-2 métert is nőhet évente.

5a-9b USDA-zóna

Komlógyertyán	Ostrya carpinifolia	9 900 Ft	12 500 Ft

A komlógyertyán (Ostrya carpinifolia) egy közepes méretű, lombhullató fa, mely a bükkfafélék családjába tartozik. Jellegzetes, tojásdad alakú levelei fényes zöld színűek, őszi időszakra pedig aranysárgára változnak, így különleges díszítőértékkel bírnak. A fa virágai fürtökben jelennek meg, és kellemes látványt nyújtanak tavasszal.
A komlógyertyán kiválóan alkalmazható városi kertekben, parkokban és hőségtűrő fás vegetációs elemeként. Zárttérben csoportosan is ültethető, így látványos lombkoronát alakít ki. Az esztétikai szerepe mellett árnyékot biztosít a növényeknek és az embereknek is.
Gondozási útmutató:

Helyválasztás: Napos vagy félárnyékos helyeken fejlődik a legjobban.
Talaj: Jól tűri a különböző talajtípusokat, de a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt kedveli.
Öntözés: Átlagos vízigényű, rendszeres öntözést igényel a fiatal növény.
Metszés: Nincs szüksége jelentős metszésre, de a korona formázása ajánlott.
Tápanyag: Tavasszal érdemes szerves trágyát adni neki.

Az Appennin-félszigettől a Kaukázusig honos lombhullató fa, melynek természetes élőhelye a Drávánál nagyon megközelíti Magyarországot. Kétszeresen fűrészelt levelei a nyírfáéra hasonlítanak legjobban. Magassága ritkán haladja meg a 15 m-t, jellemzően 8-10 méteres kisebb fa marad. Tavasszal hozza barkáit melyek az igazi díszértékét jelentik. 6b-9b USDA-zóna

Kóreai mézesfa	Evodia hupehensis	3 900 Ft	3 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Koreai Mézesfa egy gyorsan növő, lombhullató díszfa, melyet kései nyári fehér virágzata és méhészeti értéke tett népszerűvé. 6-15 méter magasra nő, ernyőszerűen elterülő koronával 29. Virágai július-augusztusban nyílnak, amikor kevés más fa virágzik, így létfontosságú táplálékforrást biztosít a méheknek
Főbb jellemzők
Virágok: Apró, fehér, illatos virágok tömött sátorvirágzatban (egy fa akár 2500 virágot is hozhat) Levelek: Páratlanul szárnyalt, 7-11 levélkéből álló, sötétzöld lomb Termés: Vörösesbarna toktermések ősszel, madarak kedvelik Télállóság: -20°C-ig ellenálló (USDA 6b zóna), de fiatalon fagyérzékeny
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap (napi 6+ óra) – árnyékban gyengébben virágzik

Talaj: Jó vízelvezetésű, laza talaj (agyonos talajt kerüljük)

Öntözés: Fiatalon rendszeres öntözés szükséges, érett korban szárazságtűrő

Metszés: Tavasszal visszavágás a fagykárosodott ágak eltávolítására

Ültetési tanácsok:

Társítás: Buddleia vagy Perovskia fajtákkal késő nyári mézelő kertekben

Használat: Parkok, utcai ültetések, méhészeti célú ültetvények (legalább 80-100 m-re a kaptároktól)

Ültetés: Tavasszal (március), 5-7 méter tőtávolsággal

Kiemelt előnyök
Kései virágzás – kiegészíti a méhészeti idényt Gyors növekedés – évente akár 1.5-2 métert is nőhet Betegségálló – ritkán támadják kártevők Környezetbarát – jól tűri a városi légszennyezést
Ez a Koreai Mézesfa valódi kincse a méhészeknek és a kerteknek – rendelje meg most!
Kínából származó lombhullató fa, melynek apró, fehér virágai nyár derekán, július második felétől nyílnak és kiváló mézelő, ezért régebben jellemzően ezért ültették. A gazdasági haszna mellett kifejezetten dekoratív fának számít, ezért mint díszfa is közkedvelt a Távol-Keleten és Észak-Amerikában. Virágzása a klasszikus méhészeti idény után van, ezért a méhészek körében nagy népszerűségnek örvend. 6b-9b USDA-zóna

Közönséges júdásfa	**Cercis siliquastrum**	5 200 Ft	5 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Közönséges júdásfa (Cercis siliquastrum) gyönyörű lombhullató fa, amely a mediterrán régióban őshonos, de számos más melegebb éghajlaton is termeszthető. Ez a fa a kertekben és parkokban való ültetés során gyakran választott, mivel számos lenyűgöző tulajdonsággal rendelkezik. Általában 4-8 méter magasra nő, és széles koronát képez. A lassú növekedésű fa hosszú élettartamú. A levelei szív alakúak, világoszöld színűek. Tavasz folyamán válik a legszebbé, amikor a rózsaszín vagy lila virágok előbújnak a lomb alól. Az őszi lombszínváltozás is lenyűgöző, ekkor a levelek sárgáról pirosra vagy narancssárgára váltanak.
A tavaszi júdásfa virágai kicsik, pillangószerűek, és gyakran rózsaszín vagy lila színűek. A virágzás a tavasz elején vagy közepén következik be, és látványos lombozattal párosul. termése hüvelyes, hosszúkás, és magokat tartalmaz. Ezek a termések gyakran díszítő értékkel bírnak, de az emberi fogyasztásra nem alkalmasak.

Fényigény: A Közönséges júdásfa napos vagy félárnyékos helyet igényel. Ültessük olyan területre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri.

Talaj: A fa jó vízelvezetésű, laza talajokat kedvel, de alkalmasabbak a mély, humuszban gazdag talajok. Győződjünk meg róla, hogy a talaj nem áll víz alatt, mivel a fa nem tolerálja a pangó vizet.

Öntözés: Az első években rendszeresen öntözzük a fiatal fákat, hogy segítsünk nekik gyökereket ereszteni és megerősödni. Később kevésbé lesz szükség öntözésre, mivel a fa ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben.

Trágyázás: Tavasszal adjunk szerves trágyát a fa köré, hogy segítsük a növekedését és a lombozat fejlődését.

Metszés: A Közönséges júdásfa ritkán igényel metszést. Ha mégis szükséges, akkor a virágzás után, nyáron végezzünk könnyű metszést.

Betegségek és kártevők: A Cercis siliquastrum általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de időnként ellenőrizzük a levélbetegségek vagy kártevők jelenlétét, és cselekedjünk, ha szükséges.

6b-10b USDA-zóna

Lótusz szilva	**Diospyros lotus**	4 250 Ft	4 250 Ft

10 m-re növő, fénylő sötétzöld lombú, egzotikus megjelenésű fa, cseresznye nagyságú, ehető termésekkel. Nagytermésű rokonának, a Diospyros kakinak alanyaként is szolgál. Kétlaki növény, így porzós és termős egyedet is kell ültetnünk a biztos termés érdekében. Mivel a növényeket magról szaporítjuk, így a nemük nem ismert, ezért többet is célszerű ültetnünk, hogy biztosan mindkét nem meglegyen. Később csak a szükséges két egyedet meghagyva a termés biztosított, a fölösleges növényeket pedig kiáshatjuk és máshova is elültethetjük, vagy ügyesebb kezűek a D. kakival való átoltásukkal is megpróbálkozhatnak!

6b-9b USDA-zóna

Magyaltölgy	**Quercus ilex**	5 900 Ft	5 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Magyaltölgy (Quercus ilex) a bükkfavirágúak (Fagales) rendjébe, a bükkfélék (Fagaceae) családjába tartozó, a Földközi-tenger nyugati medencéjében őshonos örökzöld fa. A magyaltölgy a mediterrán térség egyik legjellegzetesebb fája, amely a déli tájak hangulatát idézi. Magyar nevét onnan kapta, hogy levelei a magyalhoz hasonlóan örökzöldek és tövises szélűek, bár idősebb fákon a levelek széle gyakran ép lesz. Ez az impozáns fa kiváló választás nagyobb kertekbe, parkokba, ahol egész évben dús, sötétzöld lombozatával, impozáns megjelenésével és magas díszítőértékével hódít.
Kifejlett mérete és megjelenése: A magyaltölgy közepes vagy nagy termetű, 10-20 méter magas és 8-15 méter széles fa. Koronája fiatalon kúpos vagy oszlopos, idősebb korban szétterülő, kerekded, sűrű, sötétzöld ernyőszerűvé válik. Törzse egyenes, vastag, idősebb korban a kéreg szürkésfekete, mélyen repedezett, barázdált. Levelei a növény egyik legjellegzetesebb részét képezik: örökzöldek, bőrneműek, kemények, fényes sötétzöldek, fonákjuk szürkészöld vagy aranysárgás, finoman szőrözött. A levelek alakja változó: a fiatal fákon és az alacsonyabb ágakon a levelek kisebbek, 2-5 cm hosszúak, és a szélük jellegzetesen tövises, a magyaléhoz hasonló. Az idősebb fákon, magasabban a levelek nagyobbak, 5-8 cm hosszúak, és szélük ép, fogazatlan. Ez a jelenség a növény védekezési mechanizmusa: a tövises levelek megakadályozzák a legelő állatokat a fiatal hajtások megrágásában. A virágok tavasszal, április-május környékén nyílnak: a fa hosszú, sárgászöld barkavirágzatokat hoz, amelyek a szélbeporzású növény hímvirágai. A termések a magyaltölgy másik jellegzetességét adják: a makkok 1,5-2,5 cm hosszúak, hengeresek vagy tojásdadok, sötétbarna színűek, a makkcsésze szürkés, finoman szőrözött. A makkok szeptember-október környékén érnek be.
Igényei és gondozási útmutató: A magyaltölgy a legszebb formáját teljes napos, széltől védett helyen hozza. Napos helyen a lombozata sűrűbb, a fa formája szabályosabb. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes vagy semleges kémhatású, közepesen tápanyagú talajokat kedveli. A pangó vizet nem tűri, a túlzottan nedves, agyagos talajokat kerüljük. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat, de a hosszan tartó szárazságban érdemes pótolni a vizet. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése jól tűri: alakformáló metszést kora tavasszal vagy késő ősszel végezhetünk. Sövényként nevelve évente egyszer vagy kétszer is nyírható. A magyaltölgy kifejezetten jól tűri a metszést, és a régi fáról is kihajt. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első években téli takarással (lomb, szalma, fólia) védeni a kemény fagyoktól. Hidegebb területeken konténerben nevelve, fagymentes, hűvös helyen teleltethető. Kártevők közül a tölgy-csipkéspoloska, a levéltetvek és a pajzstetvek okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat és a gyökérrothadás (túlöntözés esetén) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A magyaltölgy sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Mediterrán kertekben az olajfa, babérmeggy, levendula és rozmaring társaságában a délies hangulatot erősíti, és a tengerparti szélnek is ellenáll. Tengerparti kertekben kifejezetten jól érzi magát, mivel tűri a sós levegőt. Városi kertekben és előkertekben a légszennyezést is jól tűri, így alapozó növényként, sövényként vagy szoliterként is kiváló. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a sötétzöld, bőrnemű levelei izgalmas textúrát adnak. Formális kertekben nyírt sövényként vagy geometrikus formákra metszve is mutatós. Tájkertekben és angolkertekben szoliter faként impozáns megjelenésével hívja fel magára a figyelmet.
Változatos növénytársítások: Mediterrán fákkal és cserjékkel: A magyaltölgy mellé ültetett olajfa (Olea europaea), babérmeggy (Prunus laurocerasus), gránátalma (Punica granatum) vagy füge (Ficus carica) egy igazi déli kert hangulatát keltheti. Mediterrán évelőkkel: A fa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis) és oregánó (Origanum) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Ezüstlevelű növényekkel: Az ezüstfa (Elaeagnus ebbingei), az ezüstös levelű körte (Pyrus salicifolia), a törpe ezüstakác (Acacia) vagy a tengerparti tátika (Limonium) mellett a magyaltölgy sötétzöld, fényes lombozata gyönyörű kontrasztot alkot. Árnyéktűrő talajtakarókkal: A fa alatti árnyékos részekbe ültethetünk meténget (Vinca minor), árnyékliliomot (Hosta) vagy varjúhájat (Sedum), amelyek szépen díszlenek a fa alatt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus), tőzikék (Scilla) vagy jácintok (Hyacinthus) tavasszal vidám színfoltot jelentenek. Sövénytársítások: Sövényként ültetve társítható babérmeggyel (Prunus laurocerasus), tűztövissel (Pyracantha) vagy örökzöld lonccal (Lonicera nitida) a változatos színű és textúrájú, örökzöld határfal érdekében.
A magyaltölgy kiváló választás azok számára, akik egy impozáns, örökzöld, mediterrán hangulatú fát keresnek, amely egész évben dísze lehet a kertnek, és különösen jól illik mediterrán, tengerparti és városi kertekbe. USDA besorolása: 7-10.

7b-10a USDA-zóna

Magyar tölgy	Quercus frainetto	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A magyar tölgy (más néven balkáni tölgy) a bükkfafélék (Fagaceae) családjába tartozó, Délkelet-Európából (Balkán-félsziget, Olaszország, Magyarország déli részei) származó, impozáns megjelenésű lombhullató fa. Magyarországon természetes élőhelye a Dél-Dunántúl (Mecsek, Villányi-hegység, Őrség, Zala) meleg, szubmediterrán klímájú tölgyeseiben található. Nevét (a frainetto jelentése olaszul „kis kőris”) a levelek alakjáról kapta, amelyek a kőrislevelekre emlékeztetnek.
Külső megjelenés
A magyar tölgy nagy termetű, erőteljes, 25-35 méteres magasságot elérő fa, szélessége akár a 15-20 métert is elérheti. Koronája fiatalon kúpos vagy tojásdad, idősebb korban széles, terebélyes, boltozatos vagy gömbölyded formát ölt, az alsó ágai nem kopaszodnak fel maguktól. Törzse egyenes, vastag, átmérője elérheti a 100-150 cm-t. Kérge szürkésbarna, mélyen barázdált, repedezett, idősen vastag, parásan repedező lemezekre válik szét. A fiatal hajtások sárgásbarnák, szőrözöttek, később kopaszodók.
A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a lombozat. A levelek nagyok, 10-20 cm hosszúak, 5-12 cm szélesek, mélyen karéjosak (7-11 mély, keskeny, visszahajló karéjjal). A levél színi oldala sötétzöld, fényes, a fonáki oldalt sűrű, szürkés vagy vörösesbarna csillagszőrök borítják, ami a levél fonákjának molyhos, nemezes hatást kölcsönöz. A levél válla szíves vagy fül alakú, a levél csúcsa rövid, a karéjok visszahajlanak. A levélnyél rövid (1-2 cm). A levelek ősszel sárgásbarna, sárgászöld, rozsdabarna vagy sárgás-okker színűre színeződnek, de a színek általában kevésbé élénkek, mint más tölgyfajtáknál. A lombozat a tél végéig (november-decemberig) is megmaradhat.
Virágzás és termés
A magyar tölgy kora tavasszal, április-május hónapokban, a levelekkel egy időben vagy azok előtt virágzik. A virágok egylakiak, a porzós barkák sárgászöldek, 5-10 cm hosszúak, a levelek előtt jelennek meg, a termős virágok kevéssé feltűnőek. A beporzás széllel történik.
A termések másfél év alatt érnek be (a vörös tölgyek csoportjába tartozik), vagyis a virágzást követő év őszére (szeptember-október). A makkok 2-3 cm hosszúak, tojásdadok vagy elliptikusak, csúcsuk lekerekített. A makkot a kupacs a hosszának egyharmadáig-feléig borítja. A kupacs pikkelyei hártyásak, a széleiken felállók – ez a faj egyik fontos meghatározó bélyege. A makktermés 25-30 éves korban kezdődik, de néha később (40-50 év) is.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel. A legszebb, legdúsabb lombozatot teljes napfényben hozza, fiatalon a félárnyékot is tolerálja.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén meszes talajban érzi magát. A mély, termékeny vályogtalajokat kedveli, de a homokos és kavicsos talajokat is jól tűri. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már szárazságtűrők, és a legtöbb esetben megelégednek a természetes csapadékkal.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Ültetéskor egy kevés komposzt vagy érett szerves trágya keverhető a talajhoz, ezt követően nem igényel rendszeres tápanyag-utánpótlást.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést. Metszés csak formázás, egészségügyi okokból (száraz, beteg, sérült ágak eltávolítása) vagy a méret csökkentése miatt szükséges. A legjobb időpont a metszésre a késő tél vagy a kora tavasz.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény akár -25°C-ig, -30°C-ig ellenáll a hidegnek, így Magyarország egész területén gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló. A tölgyekre jellemző lisztharmat, antraknózis, levélfoltosság, varasodás, tölgygubacsok előfordulhatnak.

Felhasználás, védelem
A magyar tölgy fáját az építőiparban, bútorgyártásban, parketta- és furnérgyártásban, valamint tűzifa- és faanyagként hasznosítják. Makkjai fontos táplálékai az erdei vadaknak (szarvasok, vaddisznók) és a mókusoknak, valamint a madaraknak (szajkók, harkályok). Lombkoronája védett fészkelőhelyet biztosít a madaraknak.
Kertstílus, ahová illik
A magyar tölgy mérete és impozáns megjelenése miatt elsősorban nagyobb kertekbe, parkokba ajánlott:

Nagyobb kertekbe, parkokba, arborétumokba – szoliterként, magányos faként kiváló választás

Fasorként – nagyobb utak, sétányok mellé ültetve széles, árnyékot adó koronával

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Erdős szegélyekbe, tájkertekbe – természetes hatású ültetésekbe, ahol a fa a táj meghatározó elemévé válhat

Városi kertekbe – jól bírja a városi klímát, a légszennyezettséget

Változatos növénytársítások
A magyar tölgy alá, laza, áttört koronája alá olyan növények ültethetők, amelyek a félárnyékot vagy a szórt fényt kedvelik:

Lombhullató cserjék: Gyertyán, kőris, hárs, berkenye, galagonya, mogyoró

Alacsonyabb díszcserjék: Bangita, som, bodza, madárbirs

Árnyéki évelők: Páfrányok, árnyékliliomok, tüdőfű, bíboros párnácskák

Kora tavaszi hagymások: Krókuszok, törpe nárciszok, gyöngyike, hóvirág

Alacsony, árnyéktűrő talajtakarók: Árnyéki meténg, borostyán

USDA besorolása: 5-8 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban a növény teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is nevelhető).

Metamorphosa japán juhar	**Acer palmatum 'Metamorphosa'**	5 490 Ft	5 490 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Metamorphosa japán juhar egy rendkívül látványos japán juhar-fajta, amelyet a lombjainak drámai színváltása tett népszerűvé. Tavaszi lombszíne élénk sárga, melyen hamarosan rózsaszín szegély jelennek meg. Nyáron a levelek fehérré válnak, vöröses-narancssárga árnyalatokkal, míg ősszel az egész lombkorona narancsvörösre, majd ibolyásvörösre változik. Levelei finoman szeldeltek, a korona sűrű és bokros habitust alkot. Apró virágai tavasszal nyílnak, de fő díszét a színek változatossága adja. Kiválóan alkalmazható japán stílusú kertekben, teraszok díszítésére vagy konténeres ültetésben. A növény lassú növekedésű, így hosszú évekig élvezhető kertjeiben.

Gondozási útmutató:

Helyzet:

Fényigény: Félárnyékos helyet részesít előnyben, ahol a déli nap elkerülhető. Túlzott napsütés levégsérülést okozhat.

Szélvédelem: Ültessük védett helyre, mert érzékeny az erős szélre.

Talaj:

Savanyú vagy semleges pH-jú (5,5-6,5), laza, jó vízelvezetésű talaj. Tőzegmoha vagy komposzt hozzáadása javasolt a talaj minőségének javításához.

Öntözés:

Közepes vízigényű: A talajt egyenletesen nedvesen tartsuk, de eláztatást kerüljünk. Nyári melegben rendszeresen öntözzünk reggel vagy este.

Metszés:

Ritkán szükséges: Ha szükséges, késő ősszel vagy télen távolítsuk el a száraz vagy sérült ágakat. A formázás minimalizálható a természetes növekedési forma megtartása érdekében.

Téli védelem:

Télállóság: -28,9°C-ig (USDA 5a zóna). Fiatal példányokat téli mulccsal (faforgács) vagy burkolószövettel védjük

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Nyári virágzású liliomfa	Magnolia sieboldii	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Óriás virágú liliomfa	Magnolia x 'Felix Jury'	14 900 Ft	16 700 Ft

A Magnolia sieboldii egy lombhullató kisebb fa, amely lassú növekedésével 4-8 méteres magasságot és 3-6 méteres szélességet érhet el. Sötétzöld, elliptikus levelei 10-20 centiméter hosszúak.
Legfeltűnőbb jellemzője a fehér, illatos virág, melynek átmérője 7-15 centiméter között változik. A virágok közepén található sötétbordó vagy vörös porzók rendkívül élénk kontrasztot alkotnak a fehér szirmokkal. A legtöbb liliomfával ellentétben ez a fajta június közepétől júliusig, tehát nyáron virágzik, és a lombja már jelen van a virágzás idején.
Gondozási útmutató

Fényigény: A napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. Szélvédett helyre ültesd, mivel az erős szél megbarnulást okozhat a leveleken.

Talajigény: A jól vízelvezető, laza szerkezetű, savanyú vagy semleges kémhatású, tápanyagban gazdag talaj az ideális számára. A meszes talajt nem jól tűri.

Vízigény: Nagy vízigényű, a szárazságot és a nagy meleget nem szereti

. A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, különösen fiatal korában és száraz időszakban.

Metszés: Alig igényel metszést. Ha szükséges, a virágzást követően végezz el könnyű formálást.

Télállóság: Jó télállóságú, de fiatal növényeit az első pár évben célszerű a tövét téli takarással védeni.

Ültetési javaslat
A növény szoliter növényként a legszebben érvényesül, például egy gyepsziget közepén vagy az előkertben. Nagyobb, védett kertekbe ajánlott. Nagyon fontos, hogy már az ültetéskor örök helyére kerüljön, mivel a húsos gyökérzete miatt az átültetést nem tűri jól.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Felix Jury' legfeltűnőbb tulajdonsága a rendkívül nagy méretű virág. A serleg alakú virágok átmérője akár a 30 centimétert is elérheti, melyek erős és édes illattal rendelkeznek. A virágok színe a bíborvöröstől a mély rózsaszínen át a lágy lila-rózsaszín árnyalataiig terjed. Egy-egy virág akár 9 napig is friss marad, a teljes virágzási időszak pedig közel 3 hétig tarthat. A növény lombja világósárgászöld, ami szép kontrasztot alkot a sötétebb árnyalatú virágokkal. Végső magassága körülbelül 3-5 méter közöttire tehető, hasonló szélességgel, és kúp vagy szélesen piramis formát ölt.
Gondozási útmutató
A 'Felix Jury' igényei megegyeznek a lombhullató liliomfák általános elvárásaival.

Fény és szélvédelem: Napos vagy félárnyékos elhelyezkedést kedvel. Fontos, hogy hideg szélnek ne legyen kitéve, mivel az károsíthatja a virágokat.

Talaj: A jól vízelvezető, laza, savanyú kémhatású talaj az ideális számára. A meszes talajt nem jól tűri.

Öntözés és trágyázás: A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, különösen az elültetés utáni első időszakban. A talaj felszínének mulccsal való betakarása előnyös, mivel a liliomfák sekély gyökérrendszerrel rendelkeznek.

Metszés: A liliomfák alapvetően nem igényelnek metszést. Ha mégis szükséges, azt a virágzást követően azonnal végezzük el.

Télállóság: Meglehetősen jó fagytűrő, -25 °C-ot is kibír, ami USDA 5b zónának felel meg.

Összefoglalás
A Magnolia 'Felix Jury' egy igazi különlegesség, amelyet óriási, feltűnő virágairól neveztek el. Főbb előnyei a káprázatos megjelenés, a kellemes illat és a viszonylag jó télállóság. Legfőbb gondja a késői fagyokra való érzékenység, amit egy jó hely kiválasztásával enyhíthetünk.

Oszlopos díszalma	**Malus tschonoskii**	14 500 Ft	16 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Oszlopos díszalma (Malus tschonoskii) – A lenyűgöző őszi színű díszfa

Az oszlopos díszalma a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó, Japánban őshonos lombhullató díszfa. A fajt 1873-ban írta le először Maximovics orosz botanikus, és 1897-ben került bevezetésre a kertészeti kultúrába. A fajnév a 19. századi japán botanikusra, Tschonoski Sugawára utal. Ez a fa az év nagy részében visszafogott, ám ősszel páratlan színpompával ajándékozza meg a kertet, ami az egyik leglátványosabb őszi lombszínű díszfává emeli a fajtát. A könnyű gondozhatósága és a városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

Az oszlopos díszalma egy erős növekedésű, közepes termetű, lombhullató fa. Kifejlett magassága 8-12 méter, szélessége 4-8 méter között alakul. A fa 10-20 év alatt éri el végleges méretét. Koronája fiatalon oszlopos vagy keskeny kúp alakú, idősebb korban lazábbá, szétterülőbbé válhat. A fiatal hajtások kezdetben gyapjas szőrzetűek, majd később lekopaszodnak.

A levelek váltakozó állásúak, 5-12 cm hosszúak, tojásdad-elliptikusak, szélük fűrészes. A fiatal levelek kezdetben ezüstösen gyapjas szőrzetűek, majd a levél felső oldala lekopaszodik és sötétzölddé válik, míg a fonák szürkésen gyapjas marad. A növény legkiemelkedőbb és legismertebb tulajdonsága a rendkívüli őszi lombszín: a levelek ősszel egyszerre mutatnak bronzos, bíborvörös, narancs, sárga és rózsaszín árnyalatokat, ami a díszalmák között szinte páratlan színkavalkádot eredményez.

A virágzat és a virágok a fa másodlagos díszítőelemei. A virágok a rövid hajtásokon, májusban nyílnak, 4-6 darabos csoportokban, esernyőszerű fürtökben. A virágok 2,5-3 cm átmérőjűek, a rózsaszín bimbókból nyíló fehér szirmokkal. A virágzás nem túl bőséges, de a fa tavaszi megjelenését finoman díszíti.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, 2-3 cm átmérőjű, gömbölyű, zöldessárga színű terméseket fejleszt, amelyek enyhén pirosas árnyalatúak lehetnek. A termések ősszel, szeptember-október táján érnek be, és a csészelevelek a termésen megmaradnak. A termések kevésbé látványosak, de a madarak számára táplálékot jelenthetnek. Fontos tudni: a magok nyersen mérgező vegyületeket tartalmazhatnak, ezért a termések feldolgozása során a magokat el kell távolítani. A növényt magról vagy oltással szaporítják.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az oszlopos díszalma napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb őszi lombszínt napos helyen hozza.

Talaj: A fa nem igényes a talaj típusára; mészkőben gazdag, agyagos, vályogos és homokos talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében savanyútól a lúgosig sokoldalúan toleráns. A legjobban a jó vízelvezetésű, közepesen termékeny talajban érzi magát. A pangó vizet és a hosszan tartó szárazságot egyaránt kerülni kell.

Öntözés: A fa közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett fákat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb példányok a rövid szárazságot is elviselik.

Tápanyag-utánpótlás: Az oszlopos díszalma közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: Az oszlopos díszalma alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal vagy közvetlenül a virágzás után elvégezhető. A metszést fontos június közepéig elvégezni, mivel ezt követően kezdenek kialakulni a következő évi virágbimbók.

Telelés és fagytűrés: Az oszlopos díszalma mérsékelten télálló; a kifejlett példányok az USDA 4-7-es zónákban nevelhetők. Magyarország nagy részén takarással, védett helyen áttelelhet, de a zordabb teleken fagykárosodás előfordulhat. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van.

Kártevők és betegségek: Az oszlopos díszalma érzékeny lehet a levéltetvekre, a takácsatkákra, a varasodásra és a tűzelhalásra. A megelőzés érdekében a fa számára szellős, napos helyet biztosítsunk, és a lehullott leveleket ősszel távolítsuk el.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

Az oszlopos díszalma a látványos őszi lombszínének, oszlopos habitusának és városi környezethez való alkalmazkodóképességének köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa:

Szoliter növényként – a fa őszi színei miatt kiváló magányos díszelem.

Fasorként, utcai fának – a keskeny habitus és a városi környezet tolerálása miatt kiváló választás.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Városi és tájképi kertekbe, parkokba – a fa mérete és látványos őszi megjelenése miatt kiváló közparki fa.

Építészeti kertekbe – a fa tiszta vonalai és strukturális megjelenése miatt.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
Az oszlopos díszalma őszi lombszíne számos más növénnyel kombinálható:

Örökzöld cserjékkel: Tűlevelűekkel és babérmeggyel – a sötétzöld háttér kiemeli az őszi színek intenzitását.

Őszi virágzó évelőkkel: Krizantémokkal és őszi kikericcsel – a virágok és a lombszín együttesen gazdag őszi hatást keltenek.

Alacsony növekedésű cserjékkel: Hortenzia, borbolya – a fa alá ültetve szép háttért vagy aljnövényzetet biztosítanak.

Hagymás évelőkkel: Tulipán, nárcisz – a fa alá tavasszal ültetve a virágzási időszak meghosszabbítható.

USDA besorolása: 4-7 (Magyarországon az oszlopos díszalma mérsékelten télálló; az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban takarással, védett helyen áttelelhet, de a zordabb teleken fagykárosodás előfordulhat.)

Oszlopos olajfa	**Olea europaea 'Pyramidalis'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Az Oszlopos olajfa (Olea europaea Pyramidalis) az olajfák egyik legkülönlegesebb fajtája, amely Olaszországból származik, és oszlopos, ciprusra emlékeztető habitusáról nevezetes. Ez a fajta a kiváló forma, a szűk növekedés és a megbízható szélállóság hármasát kínálja, ami a mediterrán kertek és a szűk helyek egyik legkedveltebb olajfajtájává teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az oszlopos olajfa a hagyományos olajfáknál jóval szűkebb termetű. Kifejlett magassága 5-7 méter, szélessége mindössze 1-1,5 méter. Habitusa oszlopos, karcsú, a ciprushoz hasonlóan szűk, sűrű, függőlegesen megnyúlt koronával. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek. A levelek sűrű állásúak, ami a fa kompakt megjelenését erősíti. A virágok tavasszal nyílnak: aprók, fehérek, illatosak. A termések kicsik, ovális alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek, de a fa fő értéke nem a termés, hanem a látványos forma.
Igényei és gondozási útmutató: Az oszlopos olajfa a legszebb formáját teljes napos, meleg fekvésben hozza. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos vagy kavicsos talajokat kedveli. A pangó vizet nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban szárazságtűrő. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal gondoskodhatunk. Metszése minimális, mivel a fa természetesen is megtartja oszlopos formáját. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, a fiatal fákat érdemes az első években téli takarással védeni. Konténerben nevelve fagymentes, hűvös helyen teleltethető.
Kertstílus és növénytársítások: Az oszlopos olajfa különleges formája miatt rendkívül sokoldalúan használható. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, függőleges karaktert adva. Szűk helyekre, kis kertekbe, előkertekbe, fasorokba és sövénynek kifejezetten ajánlott, mivel keskeny habitusa miatt nem terjeszkedik. Tengerparti kertekben kiváló szélvédő sövényként is funkcionál. Déli fekvésű teraszokon nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a szürkészöld lombozat és a szigorúan függőleges forma izgalmas textúrát ad.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: A fa tövébe ültetett levendula, rozmaring, kakukkfű és zsálya erősíti a mediterrán hangulatot. Ciprussal: A hasonló oszlopos forma miatt egységes, függőleges akcentusú kompozíciót alkot. Magyaltölggyel: A magyaltölgy sötétzöld lombozata mellett a fa ezüstös-zöld színe gyönyörű kontrasztot ad. Alacsony talajtakarókkal: A fa alá ültetett kakukkfű vagy varjúháj takarja a csupasz talajt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok vagy nárciszok tavasszal vidám színfoltot jelentenek.
Az oszlopos olajfa kiváló választás azok számára, akik szűk helyre, fasorba, sövénybe vagy tengerparti kertbe keresnek mediterrán hangulatú, oszlopos növekedésű, szélálló olajfát. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Páfrányfenyő	**Ginkgo biloba**	3 950 Ft	3 950 Ft

A Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) egy rendkívül különleges megjelenésű, ősi fenyőféle, mely legyezőszerű leveleivel egyedülálló a fenyők között. Kínában nagy becsben tartották és főleg templomi kertekbe és paloták közelébe ültették. Nem csak látványban különleges, hanem története is magával ragadó. Gondoljunk csak bele, olyan növény, amelyik túl élte a jégkorszakot és már az i. e. a 3. évezredtől használják gyógyhatása miatt. Először vérkeringés és tüdő problémákra alkalmazták, majd a nyugati orvoslás is elkezdte alkalmazni,manapság a Ginkgo bilobáról mindenki memória megőrzésére gondol. Szép kúp alakú lesz és 20-30 méter magas. Ideális szoliternövény, de éppen olyan kiváló fasorok létrehozására, mert szélessége nem nagy és kitűnően tűri a nagyvárosi szennyezett levegőt. Még a new yorki felhőkarcolók között is jól érzi magát. Legyezőszerű levelei ősszel szép aranysárgára színeződnek. Kétlaki, a hím és nővirágok külön egyedeken fejlődnek. Magjának belseje ehető /pirítva/. A páfrányfenyő kihagyhatatlan kertjeinkből! 5a-9b USDA-zóna

Palmowa fűz	**Salix × erdingerii 'Palmowa'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Palmowa fűz egy különleges, lombhullató cserje vagy kis fa, amely nevét egzotikus, pálmaszerű megjelenéséről kapta. Ez a gyors növekedésű fűzfa ideális választás azok számára, akik egy mediterrán vagy egzotikus hatású, mégis teljesen télálló növényt keresnek a kertbe.
Külső megjelenés
A Palmowa fűz egy feltűnő megjelenésű, laza, elágazó szerkezetű cserje, amely akár 5-6 méteres magasságot is elérhet, széles, terebélyes koronát nevelve. Idősebb korban akár magas törzsre oltott 'sztobri' formában is megvásárolható, ami egy dekoratív, kis fa hatását kelti.
A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a lombozat: levelei hosszúak, vékonyak, keskenyek, lándzsás formájúak, hasonlóan egy bambuszhoz vagy egy kis pálmalevélhez. A levél színe felül szürkészöld vagy kékeszöld, míg a fonákja ezüstösen csillog, ami egész nyáron át egzotikus, friss megjelenést kölcsönöz a növénynek. Ősszel a lombozat gyönyörű aranysárga, narancssárga árnyalatokba borul.
A fiatal hajtások vékonyak, hajlékonyak, színük vörösesbarna vagy cserzőbarna, ami szintén egy trópusi, bambuszra emlékeztető képet fest. Még télen, lomb nélkül is mutatós a színes hajtásainak és formájának köszönhetően.
Virágzás
A Palmowa fűz kora tavaszi virágzása a legnagyobb dekorációs értéke. Már március-áprilisban, még a levelek megjelenése előtt, a hajtások végén megjelennek a nagy, feltűnő barkák. A barkák kezdetben ezüstszürkék, bársonyosak, majd a porzós barkák a virágpor beérésével élénk sárgára színeződnek. A virágok enyhén illatosak, kellemes, édeskés illatot árasztanak és kiváló méhlegelőként szolgálnak, hiszen ez az egyik legkorábbi tavaszi táplálékforrás a méhek és más rovarok számára.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. A napos fekvésben a legszebb a lombozat színe és a legbőségesebb a virágzás.

Talaj: Nem válogatós, de a legjobban a tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű, de nedvességet megtartó talajban érzi magát. A pangó vizet nem szereti, de rövid ideig tartó elárasztást elviseli. Sótűrő képessége miatt városi környezetben is jól érzi magát.

Öntözés: Közepes vízigényű, de a fiatal növényeknél és vízhiányos időszakokban a mélyebb, átvezető öntözést meghálálja. Különösen fontos a gyökérnövekedés első évében.

Tápanyag-utánpótlás: Kifejezetten tápanyagigényes. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával érdemes megtámogatni a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A Palmowa fűz kiválóan tűri a metszést. A legjobb időpont a metszésre a kora tavasz, virágzás után, mielőtt a levelek teljesen kihajtanának. Az idősebb, elöregedett hajtásokat a talaj közelében vissza lehet vágni, ami serkenti az új, fiatal hajtások növekedését. Metszéssel korlátozható a mérete, illetve sűrű, bokros formára is nevelhető.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény akár -25°C, sőt -30°C-ig is ellenáll a hidegnek, így Magyarország egész területén gond nélkül tartható.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de időnként levéltetvek támadhatják meg. Ritkán előfordulhat lisztharmat is, de komolyabb betegségekre nem hajlamos.

Kertstílus, ahová illik
A Palmowa fűz rendkívül sokoldalú növény, számtalan kertstílusba illeszkedik:

Japánkertekbe, keleties hangulatú kertekbe: Egzotikus levelei és a gondozott formája tökéletesen illeszkedik ezekbe a stílusokba.

Természetes kertekbe, vadvirágos rétek szélére: Laza, levegős habitusa és korai virágzása miatt ideális választás.

Modern, mediterrán kertekbe: A pálmaszerű lombozata mediterrán hangulatot varázsol.

Vízparti kertekbe, patakok, tavak mellé: Mivel szereti a nedves talajt, kiválóan ültethető víz közelébe.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Városi és előkertekbe: Ellenálló a szennyeződésekkel szemben, és gyors növekedésével hamar elfedi a nem kívánt kilátásokat. Változatos növénytársítások A Palmowa fűz ezüstös-zöld lombozata és vöröses hajtásai kiválóan kombinálhatók más növényekkel: Lila és bordó levelű növények: A vörös díjszilva, a sötét levelű vérszilva vagy a törpe borbolya gyönyörű kontrasztot alkot a világos lombozattal. Tarka levelű növények: Különböző tarka levelű cserjék és évelők tovább fokozzák a változatosságot. Díszfüvek: A tollbuga, a japán vértfű vagy a kék csenkesz szintén jól passzolnak hozzá, hasonló igényeik miatt. Árnyéki évelők (a fa alá, tövébe): A laza, áttört koronája alá ültethetők árnyékliliomok, tüdőfű, páfrányok. Tavasszal virágzó hagymások: A krókuszok, nárciszok a Palmowa fűz barkái alatt a talajszinten is szépen mutatnak. USDA besorolása: 5-8 (Magyarország egész területén, 5b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).			
Phoenix japán juhar	**Acer palmatum 'Phoenix'**	4 750 Ft	5 490 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Phoenix japán juhar egy különleges japán juhar fajta, gyönyörű, apró, bordó levelekkel büszkélkedhet. Nyáron zöldes árnyalatú, ősszel élénk vörösre változik, ami különleges színt ad a kertnek. Félárnyékos vagy szűrt napsütéses helyet kedvel. A tűző nap megperzselheti érzékeny leveleit, ezért védett helyre ültetendő.

Talaj: Tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű, enyhén savanyú (pH 6-6,5) talajt igényel. Tőzeg vagy komposzt hozzáadása javasolt a talaj minőségének javításához.

Vízigény: Mérsékelt vízigényű, de fiatal példányokat rendszeresen öntözni kell. A talajt nedvesen kell tartani, de vízállás kerülendő.

Télállóság: USDA 5-8 zónákban télálló. Fiatal növényeket télen érdemis mulccsal vagy fenyőkéreggel védeni.

Ápolási Tippek

Metszés: Alakítani csak kora tavasszal vagy késő ősszel szabad, a természetes formáját megőrizve.

Tápanyagozás: Tavasszal és nyáron kiegyensúlyozott, lassan lebomló műtrágyával táplálható az egészséges lombnövekedés és őszi színek érdekében.

Öntözés: Szárazság idején napi öntözés ajánlott, különösen konténerben nevelt példányoknál.

Használat a Kertben

Szoliterként: Kiemelkedő választás japán stílusú kertekben, sziklakertekben vagy kerti tavak mellé.

Konténeres nevelés: Teraszokon, erkélyeken díszítésre alkalmas.

Társnövények: Kontrasztos színei miatt jól kombinálható más japán juharokkal (pl. Acer palmatum 'Atropurpureum'), díszfüvekkel, páfrányokkal vagy tölgylevelű hortenziákkal.

Fontos Megjegyzések

Méretváltozatok: A végső méret függ a telepítési helytől és gondozástól. Konténerben nevelve kisebb marad.

Árnyékolás: Nyári kánikulában árnyékoló háló használata javasolt a levelek perzselődésének megelőzésére.

Bonsai: Népszerű választás bonsaiként történő neveléshez is.

Pink Delight liliomfa	**Magnolia x 'Pink Delight'**	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Pink Delight liliomfa egy közepes termetű, felálló növekedésű lombhullató fa, amely 5-7 méter magasra és 4-5 méter szélesre nő. Fő értéke a nagy, 15-20 cm átmérőjű, serleg alakú virágok, amelyek élénk rózsaszínűek. A virágok március-április hónapokban nyílnak, a levelek megjelenése előtt. A sötétzöld, ovális alakú levelek nyáron sűrű lombot alkotnak, ősszel pedig sárgászöldre színeződnek. A fa kérge ezüstszürke színű és sima felületű.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félárnyékos, széltől védett helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, savanyú vagy semleges kémhatású, tápanyagban gazdag talaj

Időzítés: Kora tavasszal vagy ősszel

Távolság: 4-5 méteres térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter fa, kerti fő fája, gyűjteményes kertek

Gondozási útmutató

Metszés: Ritkán igényel metszést, csak a száraz vagy sérült ágak eltávolítása

Télvédelem: Teljesen télálló, de a késői tavaszi fagyok károsíthatják a virágokat

Öntözés: Átlagos vízigényű, a szárazságot nem kedveli

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Közepes növekedési sebességű, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Modern kertek

Parkok és nagykertek

Gyűjteményes liliomfás kertek

Előkertek és látható helyek

Platánfa	**Platanus acerifolia**	5 750 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A juharlevelű platán egy impozáns méretet elérő fa, mely 30-40 méter magasra is megnőhet, és idővel széles, terebélyes koronát fejleszt. Legismertebb és legkönnyebben felismerhető jellegzetessége a kéreg, amely vékony, lekerekített lapokban hámlik, és világossárga, krémszínű, zöldes vagy olívszínű foltokat hagy maga után.
A levelei váltakozó állásúak, tenyeresen karéjosak, nagyjából 15-25 cm szélesek és erősen hasonlítanak a juhar (Acer) leveleire, ami a tudományos nevének eredete is (acerifolia jelentése 'juharleveű'). A virágai jelentéktelenek, május környékén nyílnak, és ősszel gömb alakú, lecsüngő, barna terméscsoportokká (aszmagokká) érnek be, melyek gyakran a fán maradnak a tél folyamán.
Gondozási útmutató
A platán az egyik legalkalmazkodóképesebb fa városi környezet számára.

Fényigény: A teljes napsütést részesíti előnyben, de elvisel félárnyékos helyet is

.Talajigény: Nagyon igénytelen a talajjal szemben. Legszebben mély, tápanyagdús, jó vízelvezetésű és nedves talajon fejlődik, de elviseli a agyagos, száraz, vagy szegényes talajokat is

.Vízigény: Közepes vízigényű. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, de az idős fák jól tűrik a szárazságot

.Tűrőképesség: Kiválóan ellenáll a városi légszennyezésnek, a talajtömörödésnek, a magas pH-értéknek, és a mértékben fagytűrő is

Metszés: Jól tűri a metszést, akár a radikális tőmetszést (pollarding) is, amit városi környezetben gyakran alkalmaznak

Ültetési javaslatok
Ennek a hatalmas fának nagyon nagy teret kell biztosítani a megfelelő fejlődéshez.

Alkalmazások: Ideális utcafának, sorfának, nagyméretű parkok és terek díszfájának

. A robosztus gyökérzete miatt nem ajánlott épületek, járólapok vagy csatornázások közelébe ültetni

Kerttípusok: Főleg nagykertbe, városi zöldterületre és tájkertbe ajánlott. Jelentős lomb- és kérghullása miatt kisebb kertbe való ültetése nem praktikus

SEO kulcsszavak és meta-leírás

SEO kulcsszavak: Platanus acerifolia, juharlevelű platán, közönséges platán, platánfa, városi fa, utcafa, nagy díszfa, lombhullató fa, platán betegség.

Meta-leírás: "A Platanus acerifolia (juharlevelű platán) egy városi környezetben is jól teljesítő, hatalmas díszfa. Ismerje meg részletes gondozási útmutatónkat, ültetési tanácsainkat és a leggyakoribb betegségeit."

Remélem, hogy ez az átfogó leírás segít a továbbiakban. Tudnom kell, ha más növényre vonatkozóan is készíthetek számára hasonló leírást?

Prima Indián banán, Pawpaw	**Asimina triloba 'Prima'**	18 900 Ft	25 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Észak-Amerikából származó indián banán legtöbb fajtája a hazája (USA) nemesítőinek a munkáját dicséri, de ez a fajta az olasz Montanari cég nemesítőinek köszönhető, mégpedig az összes közül az egyik legjobb fajta. Öntermékeny fajta, tehát porzópár nélkül is hoz termést. Gyümölcsei gömbölyűek, kissé hengeres formát öltenek, tömegük 200 gramm körüli. Éretten puha, íze édes, tápértéke kiváló, vitaminokban gazdag.
A fa összességében 4-5 méteresre fejlődik, jelentősebb díszértéke az érdekes virágain, és termésén kívül nincs.
Fényigény: Meleg napos, esetleg félárnyékos helyre ültessük
Vízigény: Az első években aktívabb öntözést kíván, amit később el lehet hagyni
Talajigény: átlagos kerti talajokat kedvel, nehéz kötött talajokban nem érzi jól magát
USDA Zóna: 6a, teljesen télálló növény
Erős oltványokat küldünk.

7a-9b USDA-zóna

Purple Sensation liliomfa	**Magnolia x 'Purple Sensation'**	14 900 Ft	16 700 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Purple Sensation liliomfa egy közepes termetű, lombhullató díszfa, amely 3-5 méter magasra és 1-3 méter szélesre nő. Koronája felfelé törő, tömött és zárt szerkezetű. Levelei sötétzöldek, elliptikusak. Legszembetűnőbb jellemzője a tavasszal megjelenő, mélylila vagy bíborlila színű virága, amely akár 20 centiméter átmérőjű is lehet. A virágok rózsaszerű alakúak, széles, lekerekített szirmokkal. Virágzási ideje április-május, a lomb fakadása előtt vagy azzal egy időben.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel

Talajigény: Laza szerkezetű, jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, savanyú talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, szárazságot nem tűri jól

Metszés: Alapvetően nem igényel metszést, csak a halott ágakat kell eltávolítani

Télállóság: Jó télállóságú, de fiatal növényeket télen érdemes védeni

Trágyázás: Tavasszal speciális liliomfa trágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Előkertbe vagy gyepszigetbe ideális

Társítás: Árnyéktűrő évelőkkel, tavaszi hagymás növényekkel

Háttérbe örökzöld cserjékkel

Különleges hely: Szélvédett, napos helyen a legszebben fejlődik

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Modern kertek

Parkok és nagyobb kertek

Városi kertek

Gyűjteményes kertek

Royal Star csillagmagnólia	**Magnolia stellata 'Royal Star'**	6 950 Ft	7 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Royal Star csillagmagnólia (Magnolia stellata Royal Star) a magnóliák egyik legkedveltebb törpe fajtája. A Royal Star név – amely királyi csillagot jelent – tökéletesen leírja a virágok megjelenését: a nagy, fehér, csillag alakú, sok szirmú virágok méltóak egy királyi kerthez. Ez a nemesített változat a fajtánál nagyobb virágokkal és tömöttebb habitussal rendelkezik, és az egyik legnépszerűbb csillagmagnólia a kertekben.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Royal Star kis termetű, 1,5-2 méter magas és 1,5-2 méter széles, sűrű, bokros, kerekded habitusú cserje vagy kis fa. Habitusa kompakt, a lassú növekedésnek köszönhetően hosszú ideig megtartja kerekded formáját. Levelei közepes méretűek, tojásdad vagy fordított tojásdad alakúak, 5-10 cm hosszúak, élénkzöldek, fonákjuk világosabb, szélük ép. Ősszel a levelek sárgásbarna árnyalatot öltenek. A virágok a növény igazi ékkövei: március-április környékén, még a lombfakadás előtt nyílnak, ami a magnóliák jellegzetes tulajdonsága. A virágok nagyok, 8-10 cm átmérőjűek, csillag alakúak, 25-30 keskeny, szalagszerű szirommal rendelkeznek. Színük tiszta fehér, néha enyhén rózsaszínes árnyalattal a bimbókban. A virágok a vesszőket teljes hosszukban beborítják, ami lélegzetelállító látványt nyújt. Illatuk kellemes, édeskés, enyhén citromos jegyekkel. A virágok a levelek megjelenése előtt nyílnak, így a fehér virágtömeg a csupasz ágakon különösen mutatós.
Igényei és gondozási útmutató: A Royal Star a legszebb virágdíszét teljes napos vagy félárnyékos, széltől védett helyen hozza. Napos helyen a virágzása bőségesebb, a növekedése sűrűbb. Félárnyékban a virágzás mérsékeltebb lehet. A széltől való védelem fontos, mivel a nagy virágokat a szél könnyen megrongálhatja. Talajban a jó vízelvezetésű, enyhén savanyú (pH 5,5-6,5), humuszos, közepesen tápanyagú talajokat kedveli. A meszes, pangó vizű vagy túlzottan kötött talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban a rendszeres, egyenletes nedvesség segíti a bőséges virágzást. A talajtakarás (mulcs) segít megőrizni a talaj nedvességét és hűvösségét, amit a magnóliák kedvelnek. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, savanyú kedvelő növényekhez való műtrágyával vagy komposzttal gondoskodhatunk. Metszése ritkán szükséges, mivel a növény természetes formája a legszebb. Ha formázni vagy az elhalt ágakat eltávolítani szeretnénk, azt a virágzás után, késő tavasszal végezzük. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -30 °C-ig is ellenáll. A késő tavaszi fagyok azonban károsíthatják a virágokat, ezért érdemes védettebb helyre ültetni. Kártevők közül a levéltetvek és a pajzstetvek okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat és a levélfoltosság fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Royal Star kis mérete és látványos virágzása miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Romantikus kertekben a fehér, csillag alakú virágokkal a lágy, elegáns hangulatot erősíti. Japán kertekben a magnóliák hagyományosan kedvelt növények, a Royal Star kompakt mérete miatt kis japán kertekben is elfér. Angolkertekben a vegyes évelőágyások egyik dísze lehet. Kis kertekben és előkertekben a kis mérete miatt ideális szoliter fa.
Változatos növénytársítások: Alacsony örökzöldekkel: A Royal Star mellé ültetett alacsony boróka (Juniperus) vagy törpefenyő (Pinus mugo) télen is színt visz a kertbe, és kiemeli a fehér virágokat. Rododendronnal: A rododendron (Rhododendron) és az azáleák savanyú talaj iránti igénye megegyezik a magnóliáéval, és a lila, rózsaszín vagy sárga virágok mellett a fehér magnólia gyönyörű kontrasztot alkot. Díszfüvekkel: A tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis) lágy, mozgó hátteret biztosít a magnólia formáihoz. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A magnólia tövébe ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, a magnólia virágzásával egy időben vagy közvetlenül előtte vidám színfoltot jelentenek. Vörös levelű növényekkel: A japán juhar (Acer palmatum) vörös lombozata mellett a fehér virágok különösen jól érvényesülnek. Törpe cserjékkel: A törpe hortenziák (Hydrangea) vagy a törpe gyöngyvirágcserjék (Deutzia) mellett a Royal Star harmonikus kompozíciót alkot.
A Royal Star kiváló választás azok számára, akik egy kis termetű, látványos tavaszi virágzású magnóliát keresnek, amely akár kis kertekben is elfér, és a csillag alakú, fehér virágokkal a kert egyik fő attrakciója lehet kora tavasszal. USDA besorolása: 4-8.

Satisfaction liliomfa	Magnolia x 'Satisfaction'	15 500 Ft	15 900 Ft

A Satisfaction liliomfa (Magnolia x 'Satisfaction') egy kis, vagy inkább közepes növésű magnólia, közepes, ill. nagyméretű virágokkal. A virágok külső színe rózsaszín - püspöklila áranylatokban játszik, míg a belseje tiszta fehér. A virágok csésze formája a Magnolia x soulangeana-éra hasonlít. Bőségesen, és viszonylag korán virágzik.
A lombhullató liliomfák nem fagyérzékeny növények.
Átlagos minőségű talajban, sőt kissé kötöttebb agyagos talajokban is jól fejlődnek. A meszes talajféleségeket kerülik.
A nyári perzselő napot kevéssé szeretik. Ilyenkor jobb számukra a félárnyék, de a tavaszi időszakban szívesen sütkéreznek.
Átlagos vízigényűek, az öntözést azonban meghálálják, és a száraz időszakokat nem kedvelik.
Metszést az elvirágzást követően kell elvégezni. Ilyenkor egy kicsit érdemes ritkítani koronát, egységesen jobb térszerkezetet adva neki.

USDA Zone: 7b-4a

Spirálfűz, csavarfűz	Salix matsudana 'Tortuosa'	3 450 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Csavarfűz (Salix matsudana 'Tortuosa') – A csavart ágú, különleges téli díszfa

A csavarfűz – más néven spirálfűz vagy kígyófűz – a fűzfafélék (Salicaceae) családjába tartozó, Kínából és Koreából származó lombhullató fa. A 'Tortuosa' fajtajelzés a latin tortuosus ('kanyargós, csavart') szóból ered, ami a növény legszembetűnőbb tulajdonságára, a hajtások és ágak rendellenes, csavart-kanyargós növekedésére utal. A fajtát 1923-ban hozták be Észak-Amerikába, és azóta az egyik legkedveltebb különleges formájú díszfa a világ kerteiben.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A csavarfűz egy gyors növekedésű, közepes termetű, lombhullató fa. Kifejlett magassága 10-14 méter, szélessége 4-8 méter között alakul. Koronája fiatalon oszlopos, később kerekdeddé válhat. A kéreg szürkésbarna, idősebb korban sekélyen repedezett. A fa élettartama viszonylag rövid, 30-50 év.

A növény legnagyobb díszét az ágak és hajtások adják. A hajtások és a felső ágak erőteljesen csavartak, kanyargósak, ami a fának a „csavarfűz", „spirálfűz" vagy „kígyófűz" elnevezést adta. Ez a különleges forma a lombhullás után, a téli időszakban a leglátványosabb, amikor a csavart ágrendszer szabadon megmutatkozik.

A levelek keskenyek, lándzsásak, 8-13 cm hosszúak és 1-2,5 cm szélesek, szélük szabályosan fogazott. A levelek is enyhén csavartak, felszínük sötétzöld és fényes, fonákjuk kékeszöld vagy hamvas. Ősszel a levelek sárgára színeződnek, majd lehullanak.

A virágzat a fa másodlagos díszítőeleme. A csavarfűz kétlaki növény, a magyarországi példányok jellemzően nőivarúak. A virágok apró, jelentéktelen, sárgás barkavirágzatok, amelyek a levelekkel egy időben (augusztus-október) jelennek meg. A nőivarú példányok terméketlenek, magot nem érlelnek.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A csavarfűz napos fekvést igényel. A teljes napsütés serkenti az ágak csavarodását, és a fa a leggyorsabban nő.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; agyagos, vályogos és homokos talajokon egyaránt megél. A legjobban a mély, jó vízáteresztő, nedves talajban érzi magát, de a többi fűzfajtához képest szárazságtűrőbb. A talaj pH-ja savanyútól a lúgosig terjedhet.

Öntözés: A csavarfűz közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövid szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya, vagy egy réteg (3-5 cm) érett komposzt a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A csavarfűz metszése fontos a fa egészsége és a forma fenntartása érdekében. A metszést kora tavasszal, a rügyfakadás előtt (február-március) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A fa koronáját a kívánt formára alakíthatjuk; a korona ritkítása javítja a szellőzést.

Fiatalító metszés: Idős fák esetében a fa visszavágható (pollarding), ami serkenti az új, fiatal hajtások képződését. A fiatal hajtások erőteljes csavarodása érdekében a fát érdemes rendszeresen visszametszeni, mivel a kontorzió mértéke a növekedési erélytől függ. Fontos tudni, hogy a csavarfűz hajlamos az ágtörésre, ezért a metszési sebeket érdemes kezelni a fertőzések elkerülése érdekében.

Telelés és fagytűrés: A csavarfűz kifejezetten kiváló télállóságú; akár -34°C-ig is nevelhető. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A csavarfűz a különleges, csavart formájának, gyors növekedésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a csavart ágrendszer és a különleges forma miatt kiváló magányos díszelem.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tájképi kertekbe, parkokba, városi kertekbe – a fa mérete és látványos téli megjelenése miatt kiváló építészeti elem. Vízpartokra, tópartokra – a nedves talajt jól tűri, de nem igényli a pangó vizet. Téli kertekbe – a lombhullás után a csavart ágrendszer különösen mutatós a téli tájban. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A csavarfűz különleges formája számos más növénnyel kombinálható: Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a fa csavart ágrendszerét. Lombhullató cserjékkel: Hortenziával, rododendronnal – a virágzó cserjék színei kiegészítik a fa különleges formáját. Díszfüvekkel: Tollbugával (Pennisetum), árvalányhajjal (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a fa strukturális megjelenését. USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon a csavarfűz teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek.)			
Sunglo (Sun-Glo) indián banán, papau OLTVÁNY	**Asimina triloba 'Sunglo'**	18 500 Ft	18 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Sunglo indián banán (Asimina triloba 'Sunglo' syn. 'Sun-Glo') egy kiváló minőségű, nemesített változata az észak-amerikai őshonos papau fának, amelyet élénk színű, kivételesen édes gyümölcsei miatt tartanak számon. Nevében a "Sun" (nap) és a "Glo" (fény, ragyogás) arra utal, hogy ez a fajta a napfény ízét és ragyogó színét hozza a kertbe. Ez a lombhullató fa lassú növekedésű, kifejlett magassága eléri a 4-6 métert, szélessége 3-5 méter, széles kúp alakú, sűrű, dús koronával.
Külső megjelenése és termése
A fa széles, terebélyes koronát nevel, amely kiváló árnyékadóvá teszi. Levelei nagyon dekoratívak, 15-25 cm hosszúak, lándzsás-elliptikusak, felületük fényes sötétzöld, fonákjuk világosabb, ősszel csodálatos aranysárga színben pompáznak. Április-májusban, a lombfakadás idején vagy azzal egy időben nyílnak a 3-4 cm átmérőjű, bíborvörös vagy csokoládébarna színű, 6 szirmú, harang alakú, lecsüngő virágok. A virágok illata enyhén édeskés, nem tolakodó.
A 'Sunglo' legnagyobb értéke a kiemelkedően nagy, élénk színű és rendkívül édes termése. A gyümölcsök nagyok, átlagosan 200-300 grammosak, alakjuk kerekded-ovális, ami megkülönbözteti a hosszúkásabb fajtáktól. Héjuk éretten élénk sárga, némi narancsos árnyalattal, ami valóban "napfényes" megjelenést kölcsönöz nekik. Húsuk sűrű, vajas-krémes állagú, nagyon kevés magot tartalmaz (az egyik legkevesebb magvú fajták között), íze intenzíven édes, trópusi jegyekkel, amely a mango, vanília, banán és ananász keverékére emlékeztet, de a 'Sunglo' esetében az édesség dominál. Érése szeptember közepétől október elejéig történik, a termések egyenletesen érnek, ami megkönnyíti a betakarítást.
Igényei és gondozása
A Sunglo indián banán félárnyékos vagy napos, széltől védett fekvést kedvel. Fiatal korban jól tűri az árnyékot, de napos helyen a termések édesebbek, nagyobbak és színük is élénkebb lesz. Talajban nem túl válogatós, de a mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, állandóan enyhén nedves, jó vízáteresztő képességű, enyhén savanyú kémhatású (pH 5,5-7,0) közegben érzi magát legjobban. A pangó vizet és a tartós aszályt nem viseli el. Rendszeres, heti szintű, mélyre hatoló öntözést igényel, különösen a terméskötés és a gyümölcsök fejlődése idején. A talajt érdemes mulcsozni a nedvesség megőrzése érdekében.
Tavasszal érett komposzttal, szerves mulccsal (pl. fakéregmulcs) vagy savanyú hatású trágyával takarjuk a tövét a nedvesség megőrzése és a tápanyag-utánpótlás biztosítása érdekében. A mulcs a sekélyen futó gyökereket is védi a kiszáradástól és a szélsőséges hőmérséklettől. Metszést nem igényel, kivéve az elhalt, sérült vagy beteg ágak eltávolítását, ezt kora tavasszal (február végén, március elején) végezzük el.
Fontos: a 'Sunglo' indián banán önmeddő, ezért a bőséges terméshozamhoz feltétlenül szükség van legalább két, egymástól genetikailag különböző fajtára a közelben (10-15 méteren belül). Javasolt beporzó partnerek: 'Sunflower', 'Shenandoah', 'SAB OV', 'Rebecca's Gold', 'Prima' vagy 'Davis'. A természetes beporzást legyek és bogarak végzik, de ha szükséges, kézi beporzással is segíthetünk.
Kártevők és betegségek szempontjából ellenálló, vegyszeres permetezést nem igényel. A zebra fecskefarkú lepke hernyói ugyan táplálkoznak a fiatal levelekkel, de ez nem okoz maradandó kárt a fában. A magvak és az éretlen gyümölcs fogyasztása gyomorpanaszokat okozhat, ezért csak teljesen érett, puha gyümölcsöt fogyasszunk.
Kertstílus és növénytársítások
A 'Sunglo' indián banán kiválóan illik:

Természetes és erdei kertekbe: ahol az erdőszéli, aljnövényzeti hangulatot erősíti.

Gyümölcsösökbe és tanyakertekbe: mint különleges, gourmet gyümölcsfa.

Vadkertekbe és őshonos növényes kertekbe: ahol az észak-amerikai flórát mutatják be.

Nagyobb magánkertekbe, parkokba és arborétumokba: dekoratív lombozatával és élénk színű termésével.

Árnyékadó faként teraszok, ülősarkok mellé.

Javasolt növénytársítások:

Fák és cserjék: somfa (Cornus florida, Cornus mas), közönséges galagonya (Crataegus monogyna), amerikai bangita (Viburnum opulus), mogyoró (Corylus avellana), fekete bodza (Sambucus nigra), berkenye (Sorbus aucuparia)

Évelők és talajtakarók: erdei páfrány (Dryopteris filix-mas), hímzőpáfrány (Athyrium filix-femina), erdei gyöngyvirág (Polygonatum multiflorum), télizöld metény (Vinca minor), erdei szellőrózsa (Anemone nemorosa), békaliliom (Symplocarpus foetidus)

Árnyéktűrő évelők: árnyliliom (Hosta), tarka levelű árnyéki árvacsalán (Lamium maculatum), kaukázusi nefelejcs (Brunnera macrophylla), páfrányfenyő (Podophyllum peltatum)

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Hagymások: hóvirág (Galanthus nivalis), téltemető (Eranthis hyemalis), krókusz (Crocus tommasinianus), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), csillagos májvirág (Scilla siberica)

A fa tövében hagyjuk a lehullott leveleket, amelyek természetes talajtakaróként szolgálnak, védik a gyökereket a kiszáradástól és a fagytól, valamint folyamatosan pótolják a talaj humusztartalmát.
USDA besorolás: 5-8

Sunrise liliomfa	**Magnolia x 'Sunrise'**	14 900 Ft	16 900 Ft

A Sunrise liliomfa (Magnolia x Sunrise) egy Kínából érkezett új liliomfa fajta. A növény itt kertészetben sem túl nagy, de valójában is "törpének" számíthat, hiszen sűrű, kompakt ágrendszerrel mindössze egy 2-3 méteres kisebb fává nő. Virágai kehely alakúak, belül fehérek, kívül inkább krém színűek, csészéje elján pedig piros háromszög lakú minták láthatóak, mint egy-egy vörös lángnyelv. A lángnyelvek csúcsától pedig vékony piros vonal vezet felfelé a szirmok tetejéhez.
A levelei kis kisebbek ovális fomájúak élénk világoszöld színűek.
Fényigény: Napos, nyáron inkább félárnyékos helyet kedvel, tehát jó helye lehet lombhullató fák koronájának védelmében.
Talajigány: átlagos kerti talajok jók lehtnek, de biztosabb a siker, ha kissé savanyúbb kémhatással bír a talajunk. A jó tápanyagellátottságot jobb növekedéssel hálálja meg.
Vízigény: Nem szereti a hosszabb száraz időszakokat, az öntözést ilyenkor meghálálják a liliomfák, emellett jelentősebb vízigényük nincsen.
Nem fagyérzékeny, -25 C fokot is tűr.
USDA zóna: 5b-7b
A magnóliákat nem nagyon kell metszeni. Idősebb korukban, ha túl sűrű a korona, akkor érdemes őket kicsit ritkítani. A metszést azonban rögtön virágzást követően végezzük el, hogy a következő tavaszra minél több új virágrügy kialakulása legyen zavartalan. A metszés tehát legfelejebb a belső, koronát elsűrüsítő ágak, száraz, beteg, vagy rossz irányba fejlődő ágak eltávolítását kell, hogy jelentse.

Sunsation sárga virágú liliomfa	**Magnolia x Sunsation**	14 900 Ft	14 900 Ft

A Sunsation liliomfa (Magnolia x Sunsation) első sorban virágszínével, kissé elnyújtott virágzási intervallumával (április - május), és nagy virághozamával tűnik ki a többi liliomfa közül. Dús, kompakt bokorrá fejlődik, idősebb korára alacsony törzzsel bíró kistermetű fává nevelhető. Virágai később nyílnak, mint a többi liliomfáé, tehát kései fajta, mely tulajdonsága segít elkerülnie a fagyokat.
A lombhullató liliomfák nem fagyérzékeny növények.
Átlagos minőségű talajban, sőt kissé kötöttebb agyagos talajokban is jól fejlődnek. A meszes talajféleségeket kerülik.
A nyári perzselő napot kevéssé szeretik. Ilyenkor jobb számukra a félárnyék, de a tavaszi időszakban szívesen sütkéreznek.
Átlagos vízigényűek, az öntözést azonban meghálálják, és a száraz időszkokat nem kedvelik.
Metszést az elvirágzást követően kell elvégezni. Ilyenkor egy kicsit érdemes ritkítani koronát, egységesen jobb térszerkezetet adva neki.

USDA Zone: 7b-4a

Szelídgesztenye	**Castanea sativa**	14 900 Ft	14 900 Ft

A gesztenye levelei nagyok, hosszúkásak, élénkzöldek, ősszel pedig sárga és barna árnyalatokba váltanak át. A levelek élei fogazottak, ami jellegzetes megjelenést kölcsönöz a fának. A szelíd gesztenye virágai júniusban és júliusban jelennek meg, hosszú, fehéres színű virágfüzérekben. A termések kemény, tüskés tokokban érnek, melyek októberben érlelődnek be és tartalmazzák az ehető gesztenyéket. A gesztenye nemcsak dísznövényként, hanem haszonnövényként is értékes.
Növekedési igények: A szelíd gesztenye mélyrétegű, jól vízelvezető, savanyú talajokat kedveli. Napos helyet igényel optimális növekedéshez és terméshozamhoz. Erős, mély gyökérrendszere van, ezért elegendő helyre van szükség a megfelelő fejlődéshez.
Gondozás: A szelíd gesztenye viszonylag kevés gondozást igényel, egy alkalmas helyen ültetve. Az ifjú fák rendszeres öntözését igényelhetik száraz időszakokban, de érett korukban már jól tűrik a szárazságot. Ritkábban igényel metszést, csak az egészséges növekedés és a korona formálása céljából.
Felhasználás: A szelíd gesztenye ideális választás nyilvános parkokba, nagyobb kertekbe és mezőgazdasági területekre. Gyümölcsének ehetősége miatt kertészeti és mezőgazdasági értéke magas.

6a USDA-zóna

Tatár juhar	**Acer tataricum**	7 900 Ft	7 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Tatár Juhar (Acer tataricum) egy figyelemfelkeltő és sokoldalú díszfa, amely a juharfák családjába tartozik. A növény 5-10 méter magasságra növő cserjéje vagy fája dús, sűrű koronát alkot a széles, zöld majd később sárgás- vörös árnyalatú leveleivel. A vörös ikerlependék termések nyár végén jelennek meg, amelyek szintén díszesek.
Tavasz során a Tatár Juhar gyönyörű sárga és zöld virágokat hoz, amelyek mellett a levelek formájuk miatt különösen vonzóak. Az ősz végén a lombozat gyönyörű színekben úszik, így remek színfoltja lehet a kertnek az év minden szakában.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Tatár Juhar részben árnyékos vagy napos helyet kedvel. A legjobb virágzást teljes napsütés mellett mutatja.
Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj az ideális környezet. Az Acer tataricum jól bírja a különböző talajviszonyokat, beleértve a homokos, agyagos talajokat is.
Öntözés: A fiatal növények rendszeres öntözése javasolt, különösen az első évben, hogy segítsék a gyökér stabilizálását. Az idősebb fák jól bírják a szárazságot, de a rendszeres öntözés serkenti a bőséges növekedést.
Trágyázás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott műtrágya alkalmazása segíthet a növény teljesítményének és virágzásának javításában.
Téliesítés: A Acer tataricum fagyálló, de a fiatal fákat védje a szélsőséges időjárástól.

Felhasználási lehetőségek:

A Tatár Juhar szoliter fának kiválóan illik a kertek közepén vagy más dísznövények között.
Parkokban és utcai fáként is jól használható, hiszen kellemes árnyékot ad.
Különböző dísznövényekkel kombinálva szép, gazdag tájat alakíthat ki.

A Tatár Juhar (Acer tataricum) gyönyörű megjelenésével és tartós használhatóságával ideális választás bármilyen kertész számára, aki szeretné bővíteni kertjét egy gyönyörű, sokoldalú fával.
5b-8b USDA-zóna

Tollgate indián banán, papau	**Asimina triloba 'Tollgate'**	18 500 Ft	18 500 Ft

Tollgate indián banán, papau oltvány (Asimina triloba Tollgate) az észak-amerikai erdők egyik legízletesebb gyümölcstermő növénye, amely a Tollgate nevű nemesített fajtát képviseli. Ez a fajta a papau legjavát nyújtja: nagy méretű, kiváló ízű termésekkel, bőséges hozammal és megbízható növekedéssel. Oltványként garantáltan fajtahű, és lényegesen korábban termőre fordul, mint a magoncok. A Tollgate név a nemesítés helyszínére utal, és a fajta az egyik legkeresettebb a papau kedvelők körében.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Tollgate közepes termetű, lassú vagy közepes növekedésű fa, amely kifejlett állapotban 3-5 méter magas és 2-4 méter széles. Koronája oszlopos vagy kúp alakú, ami keskenyebb formájává teszi a fajtánál, így kisebb kertekben is elfér. Levelei nagyok, fordított tojásdad alakúak, akár 20-30 cm hosszúak is lehetnek, nyáron élénkzöldek, ősszel pedig lenyűgöző, élénk sárga és arany árnyalatokban pompáznak. Tavasszal, még a lombfakadás előtt, furcsa, bíborszínű, harang alakú virágokat hoz, amelyek különleges, enyhén erjedt gyümölcs illatukkal vonzzák a legyeket és bogarakat – ezek a természetes beporzók. A termések a Tollgate igazi büszkeségei: nyár végén, augusztus-szeptember környékén érnek be. A termések nagyok, akár 150-250 grammosak is lehetnek, hosszúkásak vagy enyhén görbültek, zöldes-sárgás héjuk van, amely éréskor meglágyul. Belsejük sárga, krémes, szinte vajas állagú, rendkívül édes, egzotikus ízű, amely a banán, mangó és ananász keverékére emlékeztet, kevés maggal.
Igényei és gondozási útmutató: A Tollgate papau eredeti élőhelyén erdőszéli, aljnövényzeti növény, ezért a tűző napot nem kedveli, különösen fiatalon. Ideális számára a félárnyékos vagy szórt árnyékos hely, ahol a közvetlen déli nap nem éri. Talajban a friss, mély rétegű, jó vízelvezetésű, enyhén savanyú (pH 5,5-7,0) talajokat részesíti előnyben. A meszes, száraz vagy pangó vizű talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, mivel a gyökerei sekélyen futnak és érzékenyek a kiszáradásra. Idősebb korban már szárazságtűrőbb, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy érett szerves trágyával érdemes gondoskodni. Metszésre általában nincs szükség, csak az elhalt vagy sérült ágakat távolítsuk el kora tavasszal. A legfontosabb tudnivaló: a papau nem önbeporzó! Két különböző genetikájú fajtára van szükség a bőséges terméshez. A Tollgate kiváló partner lehet a Rebecca`s Gold, a Prima, a Sunflower vagy a Davis fajták.
Kertstílus és növénytársítások: A Tollgate papau egzotikus megjelenése ellenére remekül illeszkedik bizonyos kertstílusokba. Természetes és erdőszéli kertekben a legotthonosabb, ahol a nagy levelek és az őszi színpompa trópusi hangulatot kelt. Gyűjteményes kertekben ritkasága miatt büszkeség lehet. Prések és vadas kertekben a termések vonzzák a madarakat és más állatokat. Vegyes gyümölcsösökbe is ültethető, de ügyeljünk arra, hogy ne kapjon túl sok napot. Házi kertekben a különleges gyümölcsök kedvelőinek kiváló választás.
Változatos növénytársítások: Beporzó partnerek: A Tollgate mellé mindenképpen ültessünk egy másik papau fajtát, például Rebecca`s Gold, Prima, Sunflower, Davis vagy Overleese. Ezek egymást beporozva hoznak bőséges termést. Árnyékadó fák: Mivel a papau fiatalon árnyékot igényel, ideális aljnövényzetnek magasabb, lombsátorral rendelkező fák alá. Jó választás a közönséges dió (Juglans regia), a hárs (Tilia) vagy a nagylevelű bükk (Fagus sylvatica). Ügyeljünk arra, hogy a dió allelopátiás hatású, de a papau általában jól tűri. Töve takarása: A papau sekély gyökérzete miatt a talajtakaró növényekkel óvatosan bánjunk. A sekély gyökerű, alacsony növények, mint a tőzegrozmaring (Andromeda polifolia), a kúszó hóbogyó (Symphoricarpos) vagy a metény (Vinca minor) jó választás. Évelő kísérők: A fa tövébe ültethetünk páfrányokat, erdei gyöngyvirágot (Convallaria majalis), árnyékliliomokat (Hosta) vagy kárpáti harangvirágot (Campanula carpatica), amelyek szintén a félárnyékos, erdei hangulatot erősítik. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), tőzikék (Scilla) vagy hóvirágok (Galanthus) tavasszal, még a papau lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek.
Fontos tudni, hogy a papau gyökerei érzékenyek a bolygatásra, ezért az ültetés után ne ássunk körülötte. A termések teljes érésben lágyak, onnan kapták az indián banán nevet, ilyenkor hullanak le a fáról, és érdemes napokon belül elfogyasztani vagy feldolgozni, mert nem tárolhatók sokáig. A Tollgate fajta különösen ajánlott azoknak, akik egy nagy terméső, kiváló ízű papaut keresnek, amely megbízhatóan terem. USDA besorolása: 5-8.

Törpe oszlopos gyertyán	**Carpinus betulus 'Monumentalis'**	19 800 Ft	19 800 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Törpe oszlopos gyertyán egy nemesített, keskeny oszlopos koronájú, lassú növekedésű díszfa, amely végül 4-5 méter magasra és csak 1-1,5 méter szélesre nő. Fő jellemzői a szűk, függőleges ágrendszer és a sűrű, tömör korona. A tojásdad alakú, élénkzöld levelek szabályosan helyezkednek el az ágakon, ősszel sárgászöldre majd barnásra színeződve hullanak. A levelek télen is részben a fán maradnak, ami további szerkezetet ad a téli kertnek.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félig árnyas helyen

Talaj: Minden talajtípusban megfelelően nő, a jó vízáteresztő, mély talajt részesíti előnyben

Időzítés: Ősszel (október-november) vagy kora tavasszal (március-április)

Távolság: 1,5-2 méteres térhagyás ajánlott

Használat: Oszlopos sövény, formális kertek, kis kertek fő fája, utcai fásítás, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Alakmetszésre jól alkalmazkodik, nyáron vagy télen végezhető

Télvédelem: Teljesen télálló, kiváló fagytűrő képességgel rendelkezik

Öntözés: Csak az első években és tartós szárazság esetén szükséges

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Kistermetű kertek

Formális kertek

Oszlopos sövények

Városi zöldterületek

Utcai fásítások

Konténeres ültetések

Modern kerti tervek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Van Eseltine oszlopos díszalma	**Malus 'Van Eseltine'**	14 500 Ft	16 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Oszlopos díszalma 'Van Eseltine' (Malus 'Van Eseltine') – Az elegáns, oszlopos növekedésű díszfa

Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó, amerikai nemesítésű díszalma fajta, amelyet 1942-ben hoztak létre. A fajta korábban a 'Geneva' nevet viselte, de később 'Van Eseltine' névre keresztelték át. Ez a fa a tavaszi virágzásával és elegáns, keskeny habitusával az egyik legkedveltebb díszalma a kertekben és közterületeken. A könnyű gondozhatósága, kiváló télállósága, valamint a méhek vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' egy közepes növekedésű, lombhullató fa. Kifejlett magassága 5-8 méter, szélessége 2-4 méter között alakul. A fa 10-20 év alatt éri el végleges méretét. Koronája fiatalon oszlopos vagy keskeny kúp alakú, idősebb korban szélesebbé, váza alakúvá válhat. Hajtásai egyenesen felállók, a fa jellegzetesen sudaras megjelenést kölcsönözve.

A levelek tojásdadok, fényes felületűek, középzöld színűek, ami a fának egész évben dekoratív megjelenést biztosít.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a rövid hajtásokon, májusban nyílnak, a bíborvörös rügyekből nagy, 4-5 cm átmérőjű, rózsaszín virágok fejlődnek, amelyek félig telt vagy telt szirmúak. A virágzás rendkívül bőséges, a fát teljesen beborítják a virágok, ami a növényt távolról is feltűnővé és mutatóssá teszi. A virágok illatukkal vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, kerekded, 1,5-2 cm átmérőjű, sárga vagy barnássárga terméseket fejleszt, amelyek enyhén pirosas árnyalatúak lehetnek. A termések ősszel, szeptember-október táján érnek be. A termések ehetőek, de nyersen fanyar ízűek; felhasználásukkor a magokat el kell távolítani, mivel azok nyersen mérgező vegyületeket tartalmaznak. A növényt oltással vagy szemzéssel szaporítják vegetatív úton.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' napos fekvést igényel a bőséges virágzáshoz. Félárnyékot is tolerálja, de ott virágzása gyengébb lehet.

Talaj: A fa nem igényes a talaj típusára; meszes, agyagos, vályogos és homokos talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében savanyútól a lúgosig sokoldalúan toleráns. A legjobban a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag, közepesen nedves talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja.

Öntözés: A fa közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett fákat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb példányok szárazságtűrőbbek, de a tartós szárazság a levelek hervadásához vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A fa metszése fontos a formájának megtartása és az egészsége szempontjából. A metszést kora tavasszal, a lombfakadás előtt kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült, keresztező vagy egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A fa oszlopos formájának megtartása érdekében a túl hosszú, oldalirányba növő hajtásokat vágjuk vissza.

Telelés és fagytűrés: Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' kifejezetten kiváló télállóságú; akár -34°C-ot is elvisel. Ez azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén, takarás nélkül áttelel a szabadban. A fa lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Kártevők és betegségek: Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' érzékeny lehet bizonyos kártevőkre és betegségekre. A gyakori kártevők közé tartoznak a levéltetvek és a takácsatkák. A megelőzés érdekében a fa számára szellős, napos helyet biztosítsunk, és a lehullott leveleket ősszel távolítsuk el a betegségek áttelelésének megakadályozása érdekében.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' a látványos virágzásának, oszlopos habitusának, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfa a kertekben és közterületeken:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliter növényként – a keskeny, oszlopos forma és a látványos virágzat miatt kiváló magányos díszelem a gyepen vagy a ház előtt.

Fasorként, keskeny utcákba – a keskeny habitus és a városi környezet tolerálása miatt kiváló választás.

Kisebb kertekbe – a kompakt szélesség miatt ideális kisebb kertekbe is.

Méhlegelőként, madárbarát kertekbe – a virágok vonzzák a méheket, a termések pedig a madarakat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
Az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' virágai és termései számos más növénnyel kombinálhatók:

Páfrányfenyővel – a hasonló habitusú, ősszel aranysárgára színeződő páfrányfenyő hangulatos hátteret teremt.

Alacsony növekedésű cserjékkel: Fűszercserje, rózsalonc – a fa alá ültetve szép háttért vagy aljnövényzetet biztosítanak.

Évelőkkel: Nyáriorgona, kasvirág – a sötétlila virágok és a kasvirág színkeveréke kiemeli a díszalma rózsaszín virágait.

USDA besorolása: 4-7 (Magyarországon az oszlopos díszalma 'Van Eseltine' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ot is elviselnek. A fa lombhullató, a téli időszakban nem igényel külön védelmet.)

Virágos kőris	**Fraxinus ornus**	3 250 Ft	3 250 Ft

Hazánkban éri el természetes élőhelyének északi határát, a hazai karsztbokorerdők egyik tipikus faja, mely kisebb termetű (6-10m), gömbölyded koronájú, sötétzöld lombozatú, igen jó szárazságtűrő fa. Meleg- és napfénykedvelő. Krémfehér, illatos virágai dús fürtökben nyílnak májusban.
Gondozás:

Mivel a Fraxinus ornus viszonylag kevés gondoskodást igényel, könnyen karbantartható fafaj.
Időnkénti metszésre lehet szükség az alakja és mérete fenntartása érdekében.
Rendszeres öntözéssel és tápanyag-utánpótlással egészséges és szép maradhat.

A Fraxinus ornus virágzó kőrisfa kiváló választás lehet olyan kertekbe és parkokba, ahol egy különleges és díszes fafajjal szeretnénk gazdagítani a növényzetet. Legyen az árnyékolófa vagy virágzó díszfa, ez a fajta biztosítani fogja a gyönyörű látványt és kellemes atmoszférát.

6a USDA-zóna

Vörös levelű japán juhar	**Acer palmatum 'Atropurpureum'**	4 750 Ft	5 490 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Acer palmatum 'Atropurpureum' egy Japánból és Koreából származó díszfa, melyet már évszázadok óta ültetnek a világ minden táján. Levelei mélyen szeldeltek, eleinte sötét bordóvörösek, nyáron sötétlilás árnyalatot öltenek, ősszel pedig tűzvörössé változnak. Apró, vöröseslila virágai április-májusban nyílnak, melyeket szárnyas termések (szamarák) követnek. Lassú növekedésű, de idővel elegáns, ernyős koronát fejleszt. Kiválóan alkalmazható japán kertekben, vízpartok mellett vagy modern teraszok díszeként.

Gondozási útmutató:

Helyzet:

Fényigény: Félárnyékos helyet részesíti előnyben, ahol a déli nap elkerülhető. Teljes árnyékban a levélszín fakulhat, túlzott napon pedig a levelek pereghetnek.

Szélvédelem: Érzékeny a szélre – ültessük védett helyre!

Talaj:

Savanyú vagy semleges pH-jú (5,5–6,5), laza, jó vízelvezetésű talaj. Tőzegmoha vagy komposzt hozzáadása javasolt.

Öntözés:

Közepes vízigényű. A talajt nedvesen tartsuk, de eláztatást kerüljünk. Nyáron szárazság esetén öntözzünk reggel vagy este.

Metszés:

Ritkán szükséges. Ha szükséges, késő ősszel vagy télen végezzük, a száraz ágakat távolítsuk el.

Téli védelem:

Felnőtt példányok -20°C-ig télállók (USDA 5–8 zóna). Fiatal fákat téli mulccsal (faforgács) vagy burkolószövettel védjük.

Betegségek és kártevők:

Levéltetvek: Természetes rovarölő szerek (pl. szappanoldat).

Lisztharmat: Jó légáramlást biztosítunk és túlöntözést kerülünk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
6a-9a USDA-zóna			
Vörös levelű kocsányos tölgy	**Quercus robur 'Atropurpurea'**	9 900 Ft	11 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Vörös levelű kocsányos tölgy (Quercus robur 'Atropurpurea') – A bordó lombozatú díszfa
A vörös levelű kocsányos tölgy a bükkfélék családjába tartozó, Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos kocsányos tölgy nemesített, vörös levelű változata. A fajtát a 19. század második felében, 1864-ben Muskau-ban szelektálták, és azóta is az egyik legkedveltebb vörös levelű tölgy a kertekben és parkokban.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A vörös levelű kocsányos tölgy egy lassú növekedésű, lombhullató fa vagy nagyobb cserje. Kifejlett magassága 8-10 méter, de egyes példányok akár 11 méter magasra és 8 méter szélesre is megnőhetnek. Fiatal korban gyakran bokros habitusú, később szabályos, széles gömbölyded koronát nevel. Növekedése a fajtára jellemzően lassú, ami a vörös levélszínért felelős antocián festékanyag miatti csökkent fotoszintetikus képességnek köszönhető.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei. A levelek bőrszerűek, a kocsányos tölgyre jellemző módon 3-6 pár lekerekített, szabálytalan karéjjal, a levelek a fajénál valamivel kisebbek. A lombozat tavasszal mély bíborvörös vagy vérvörös színben hajt ki, ami a fajta legfőbb díszítőértéke. A nyár folyamán a levelek fokozatosan barnásvörös, majd zöldes árnyalatot vesznek fel, ősszel pedig a fajra jellemző sárgásbarna színűre váltanak.
A virágzat és a termés a növény másodlagos díszítőelemei. A virágok májusban nyílnak, vöröses vagy sárgászöld színűek, jelentéktelenek. A termések makkok, amelyek 2-3 darabos csoportokban, hosszú kocsányon ülnek, félgömb alakú kupacsban.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A vörös levelű kocsányos tölgy napos fekvést igényel a legszebb lombszín eléréséhez. Félárnyékban a lombozat kevésbé intenzív színű lehet.

Talaj: A növény a mély, friss, tápanyagban gazdag, humuszos talajokat kedveli. A pangó vizet nem tolerálja, de a mérsékelten nedves talajokat jól tűri. A talaj pH-jára nézve toleráns.

Öntözés: A fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy adag lassan oldódó, díszfák számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A vörös levelű kocsányos tölgy jól tűri a metszést. A formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető.

Telelés és fagytűrés: A fajta teljesen télálló, az USDA 5-ös zónájáig nevelhető, akár -26°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül áttelel a szabadban.

Kártevők és betegségek: A fajta hajlamos a lisztharmatra. A megelőzés érdekében a fa számára szellős, napos helyet biztosítsunk.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A vörös levelű kocsányos tölgy a különleges tavaszi lombszínének, a szabályos koronájának és a kiváló télállóságának köszönhetően az egyik legértékesebb díszfa a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a tavaszi bordó lombozat miatt kiváló magányos díszelem.

Parkokba, nagyobb kertekbe – a fa mérete és strukturális megjelenése miatt kiváló választás.

Vegyes faállományokba – a vörös lombozat kiváló kontrasztot alkot a zöld levelű fák között.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A vörös levelű kocsányos tölgy tavaszi bordó lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Zöld levelű fákkal és cserjékkel – a zöld és a bordó szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Sárga virágú tavaszi évelőkkel – a bordó lombozat és a sárga virágok egymás mellett feltűnő színpárost alkotnak.			
Ezüstös levelű növényekkel – a bordó és az ezüstös szívek elegáns, modern hatást keltenek.			
USDA besorolása: 5-8 (Magyarországon a vörös levelű kocsányos tölgy teljes mértékben télálló; az ország egész területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -26°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Watermelon selyemmirtusz	**Lagerstroemia indica 'Watermelon'**	4 950 Ft	5 350 Ft
A Watermelon selyemmirtusz (Lagerstroemia 'Watermelone') gyors növekedésű selyemmirtusz fajta, mely 3-4 méteres magasságot ér el. A liszharmat ellen kiválóan ellenáll. Ha már megfelelően begyökeresedett, akkor jól tűri a szárazságot. Gyenge minőségű talajokban is megél, akár építési törmelékkel szennyezett városi környezetben is. 20-30 cm-es hatalmas virágzatainak színe valóban a görögdinnye húsához hasonlít a legjobban. Természetesen a megvastagodott törzsön jól látszik a fajra jellemző foltos kéreg, és nem marad el az őszi bronzos levélszíneződés is.			
Yellow Bird liliomfa	**Magnolia x brooklinensis 'Yellow Bird'**	16 700 Ft	18 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A növény jellemzői

Megjelenés és méret: Ez a lombhullató fa erős, egyenes törzses, fiatalon szabályos, piramis formát nő, majd idősebb korában a koronája lekerekített és kiterjedt lesz

. Magassága 5-10 méter, szélessége 3-5 méter között alakul.

Virágok: Fő díszeként késő tavasszal, április végén vagy májusban nyílik. A 3-10 centiméter széles, élénksárga virágok felállók, felülnézetből tulipán formájúak. A virágzás akár 3 hétig is eltarthat.

Levelek és egyéb: Levelei nagyok, elliptikusak, fényes sötétzöldek. Ősszel sárgásbarnára vagy bronzosra színeződnek, majd lehullanak.

Ültetés és gondozás

Előnyös hely: A napos vagy félárnyékos, szélvédett helyet kedveli. A déli tájolású falak mellől érdemes elkerülni, mert a meleg téves időzítésű rügyfakadást idézhet elő.

Ideális talaj: A nedves, jó vízelvezetésű, savanyú vagy semleges kémhatású, tápanyagban gazdag talaj a legjobb számára. A gyökereink felszínközeliek és törékenyek, ezért a talajt mulccsal lefedni javasolt.

Vízigény és télállóság: Állandóan nedves talajt igényel, de az átázást nem tűri. Megfelelő telepítés után szárazságot is jól visel. Jó télállóságú, a -23 °C-ot is elviseli.

Metszés: Alig igényel metszést. Az egyetlen szükséges beavatkozás a sérült vagy egymást keresztező ágak eltávolítása.

Alkalmazási ötletek

Szoliter fának kiváló. Kis kertjekbe is befér kompakt méreteivel

Társnövények: A savanyú talajt kedvelő rododendronokkal, azáleákkal, vagy alá ültetett árnyéktűrő évelőkkel.

fenyők

Arany terülő tiszafa	Taxus baccata 'Repandens Aurea'	6 950 Ft	6 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Arany terülő tiszafa (Taxus baccata 'Repandens Aurea') – Az aranyszegélyű, elfekvő növekedésű örökzöld

Az arany terülő tiszafa a tiszafafélék családjába tartozó, ismeretlen eredetű, örökzöld tűlevelű cserje. A fajtát a kertészeti forgalomban gyakran 'Repens Aurea' néven is említik, de a 'Repandens Aurea' az elfogadott név. A 'Repandens Aurea' fajtajelzés az elfekvő habitusra és az arany színű lombszegélyre utal. Ez a növény sűrű, párnaszerű növekedésével, egész évben dekoratív lombozatával és igénytelenségével az egyik legkedveltebb talajtakaró tűlevelű a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, kiváló télállósága, árnyéktűrése és városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

Az arany terülő tiszafa egy lassú növekedésű, elfekvő ágrendszerű, örökzöld cserje. Kifejlett magassága 0,5-1 méter, szélessége azonban elérheti az 1-1,5 métert is, ami sűrű, párnaszerű vagy szőnyegszerű gyepet eredményez. Növekedési erélye lassú, évi 7,5-12 cm-es gyarapodással. A hajtások a talajon elfekvők, a csúcságak vízszintesen, hullámosan nőnek, az oldalágak egyenletesen lehajlók. A kéreg vörösesbarna, a hajtások zöldek.

A tűlevelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A tűlevelek 1-3 cm hosszúak, laposak, fényesek, puha tapintásúak, nem szúrósak, ami a tiszafák egyik jellegzetessége. A 'Repandens Aurea' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a tűlevelek kétszínűsége: a levél középső része sötétzöld, míg a levél széle feltűnő aranysárga, amely a fiatal hajtásokon a legintenzívebb, és egész évben dekoratív. A lombozat színintenzitása függ a fényviszonyoktól: napos vagy világos félárnyékos helyen a legélénkebb az arany szegély; mély árnyékban a tűlevelek zöldesebb árnyalatúvá válhatnak.

A virágzat és a termés a fajta jellegzetességeitől függően változhat. Az arany terülő tiszafa nőivarú fajta, amely ősszel piros, húsos magköpenyt fejleszt, amely dekoratív, és a madarak számára táplálékul szolgál. A virágzás tavasszal történik, a porzós virágok sárga színűek.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az arany terülő tiszafa napos vagy félárnyékos, de árnyékos fekvést is jól tűri. A legszebb, legélénkebb lombozatszínt világos félárnyékban vagy napos helyen hozza; mély árnyékban a tűlevelek kevésbé intenzív színűek, zöldesebb árnyalatúak lehetnek.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén lúgos talajban érzi magát, de szinte bármilyen kerti talajban megél, ha az nem túl száraz vagy nem áll benne a víz. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli.

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények mérsékelten szárazságtűrőek, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy adag lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágyát, vagy egy réteg (2-3 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: Az arany terülő tiszafa kiválóan tűri a metszést, és alacsony sövényként vagy formára vágva is nevelhető. A metszést kora tavasszal (február-március) vagy nyár végén (augusztus-szeptember) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása és a kívánt szélesség korlátozása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat.

Telelés és fagytűrés: Az arany terülő tiszafa kiválóan télálló; az USDA 6-9-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad, és nem igényel külön védelmet.

Fontos tudnivaló a mérgezőségről: Az arany terülő tiszafa minden része (kivéve a piros magköpenyt) mérgező, különösen a magvak. A növényben található taxán-alkaloidok súlyos mérgezést okozhatnak emberben és állatban egyaránt. A gondozás során mindig viseljünk védőkesztyűt, és a növényt gyermekek és háziállatok közelében fokozott körültekintéssel ültessük.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

Az arany terülő tiszafa az aranyszegélyű, örökzöld lombozatának, elfekvő habitusának, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb talajtakaró tűlevelű a kertekben és parkokban:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Talajtakaróként napos vagy félárnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Szegélynövényként – a kompakt, alacsony növekedés és az aranyszegélyű lombozat miatt kiváló szegélynövény.

Alacsony sövényként – a jó metszéstűrés miatt alacsony, díszítő sövény kialakítására is alkalmas.

Sziklakertekbe, kőkertekbe, rézsűkbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Városi kertekbe, közterületekre – jól tűri a városi környezetet és a szennyezett levegőt.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
Az arany terülő tiszafa aranyszegélyű lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Sötét levelű tűlevelűekkel – a sötétzöld tűlevelek kiemelik az aranyszegélyű lombozat intenzív színét.

Virágos évelőkkel – a tiszafa aranyszegélyű lombozata kiváló háttér a virágos évelők számára.

Lila virágú növényekkel: Levendulával – a lila és az arany szívek kontrasztos, vibráló hatást keltenek.

Vörös levelű növényekkel – a vörös és az arany szívek harmonikus, meleg hatást keltenek.

USDA besorolása: 6-9 (Magyarországon az arany terülő tiszafa teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Aranylombú terülő boróka	**Juniperus x media 'Old Gold'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Középerős növekedési erélyű, kissé lazább gallyrendszerű amerikai fajta. Idősebb hajtásai sárgászöldek (a fonákuk kékeszöld), a fiatal hajtásrészek azonban az első évben rikító, világos kénsárgák. Idősebb korára 2,5-3 méteres szélességet és derékig érő magasságot is elérhet. Napos helyre való, jó tűrőképességű, ellenálló változat, talajtakarásra, rézsűkre, sziklakertekbe is ültethető. Zóna:5a

Atlasz cédrus	**Cedrus atlantica**	5 250 Ft	5 750 Ft

Észak-Afrikában, Algériában és Marokkóban honos nagy termetű, akár 1000 éves kort is megérő fenyő. Tűi szürkészöldek, örvszerű csomókban állnak. Jellegzetes, sajátos habitusú, igen szép fa. Ellenálló, aromás illatú, tartós faanyagának köszönhetően nem csak az ókorban használták előszeretettel, hanem ma is igen nagy becsben áll, a többi cédrusfajhoz hasonlóan. Teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem telepítik erdészetileg, hiszen gyengébb termőhelyeken, például szárazabb, déli domb-, illetve hegyoldalakon a kezdeti kis odafigyelést később évente méteres növekedésekkel hálálja meg (!), nem beszélve arról, micsoda fenséges látvány egy cédruserdő, akár már 10 éves korában is!
6b-10a USDA-zóna

Blue Chip henyeboróka	**Juniperus horizontalis 'Blue Chip'**	3 290 Ft	3 290 Ft

A Blue Chip henyeboróka (Juniperus horizontalis 'Blue Chip') egy gyönyörű kékes lombozattal fejlődő talajtakaró fenyőféle. Első sorban napos, meleg helyeken igazán versenyképes, ilyen körülmények között tud sűrű, tömör lombozatot fejleszteni. Igaz, ilyen helyeken lassabban is halad, de a jó munkához idő kell!
Ha nem talajtakaróként használjuk, akkor sziklakerti növényként is ültethetjük. Gyönyörűen mutat a kék lombszín a legtöbb kőzet színével.
Kisebb városi kertekben is jól használható, akár lépőkövek közé, vagy kavicsos felületeken telepítve.
Talajminőségre nem kényes, fényigényes, szárazságot tűrő növény, mely hazánkban egyáltelén nem fagyérzékeny. Jól társítható más kúszó, vagy törpe növésű fenyőfélékkel, esetleg törpe cserjékkel, vagy alacsony növekedésű évelőkkel.
Zóna:4a

Cukorsüvegfenyő	**Picea glauca 'Conica'**	14 900 Ft	15 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Picea glauca 'Conica', vagy más néven Cukorsüvegfenyő gyönyörű és különleges kerti növény, cserje jellegű, kis termetű, kompakt növekedésű fenyő, ami lehetővé teszi a kisebb kertekben, teraszokon és erkélyeken való elhelyezést is.
A Cukorsüvegfenyő egy sűrű, gömb alakú cserje, amely évről évre kompaktabbá válik, természetes módon formálódik, így csak minimális metszést igényel. Alakja hasonlít egy cukorsüvegre, ahonnan ered a neve.
Az ágakon található apró, tűlevelek az év során kellemesen ezüstös-fehéres árnyalatot kapnak, ami a növény díszítő értékét emeli. A Picea glauca 'Conica' lassú növekedésű, ami azt jelenti, hogy nem igényel gyakori metszést és karbantartást. Körülbelül évente 5-10 cm-t nő, így a növény könnyen kontrollálható méretű maradhat.
Gondozása: A Cukorsüvegfenyő kedveli a napos vagy enyhén félárnyékos helyzetet. A közvetlen, erős napfény elősegíti az aranyos ezüstös tűk kialakulását. Jó vízáteresztésű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajban érzi magát a legjobban. A savas talaj különösen előnyös számára. A növény számára a kiegyensúlyozott öntözés lényeges, mivel nem viseli jól sem a túl száraz, sem a túl vizes talajt. Hidegtűrő növény, de a hidegebb téli hónapokban érdemes takarással védeni.

4a-9b USDA-zóna

Európai ciprus	**Cupressus sempervirens**	4 950 Ft	4 950 Ft

A Európai ciprus, egy díszes és elegáns megjelenésű örökzöld fa, amely a Ciprusfélék (Cupressaceae) családjába tartozik. Eredetileg a Kelet-Mediterrán térségben őshonos, ahol hosszú élettartamot és robosztus növekedést mutatott a különböző környezeti kihívások mellett.
Általában 20-30 méteres magasságot ér el, néha akár 40 métert is, de léteznek kertészeti változatok, amelyek jóval kisebb méretben tarthatóak. A fa oszlopos, szabályos kúp alakja kiválóan alkalmassá teszi arról, hogy viszonylag szűk helyeken is termeszthető legyen. A pikkelylevelei sötétzöld színűek, aprók és szorosan tapadnak az ágakhoz, amelyek egész évben állandó zöld látványt nyújtanak.
Virágai nem feltűnőek, a fa inkább a levelei és formája miatt értékelhető. Kis, kerek tobozok, amelyek 1-3 cm átmérőjűek és a többi ciprussal összehasonlítva viszonylag kevés magot tartalmaznak.
A Cupressus sempervirens kiválóan alkalmazkodik a száraz, meleg éghajlatokhoz, és jól tűri a szegényes talajokat is, bár a termesztés sikeresebb a jó vízáteresztő mérsékelten termékeny talajokon. Gyakran használják dísznövényként sövények vagy magas körvonalak kialakítására, különösen a mediterrán stílusú kertekben, ahol a hangsúly a formán és az egyszerűségen van.
Gondozása egyszerűnek mondható, mivel alacsony karbantartást igényel. Rendszeres metszést igényelhet a ház körüli használathoz, de a természetes formájának fenntartása érdekében ezt minimalizálni kell. Összességében a Cupressus sempervirens népszerű választás lakói környezetbe és parkokba egyaránt a világ számos részén.

Gold Star aranylombú terülő boróka	**Juniperus x media 'Gold Star'**	3 750 Ft	3 750 Ft

Laposan a föld felett szétterülő, viszonylag lassú növekedésű, aranysárga lombozatú talajtakaró boróka. Lombszínében némi kékeszöld árnyalat érzékelhető. Nagyon edzett növény, jól bírja a száraz, meszes talajokat is! Napos helyet szeret, mint a borókák túlnyomó többsége!

5a USDA-zóna

Hamvaskék kúszó virginiai boróka	**Juniperus virginiana 'Grey Owl'**	4 250 Ft	4 250 Ft

A Juniperus virginiana 'Grey Owl', közismert nevén Hamvaskék kúszó virginiai boróka, egy rendkívül dekoratív és sokoldalúan felhasználható örökzöld cserje. Ez a boróka alacsony, kúszó növekedésű, és jellegzetes hamvaskék tűleveleiről ismert, amelyek egész évben színt és textúrát biztosítanak a kertnek.
Egyik legnagyobb előnye, hogy széles körben elterjed a talajon, így kiválóan alkalmas talajtakaróként vagy lejtők, rézsűk stabilizálására. Ez a fajta jó szárazságtűrő képességgel rendelkezik, és alkalmazkodik a különféle talajtípusokhoz, beleértve a szegényes talajokat is, bár a jó vízelvezetésű helyeket preferálja.
A 'Grey Owl' boróka különösen alkalmas napos és félárnyékos helyeken való telepítésre. Alacsony karbantartási igénye miatt remek választás kezdő kertészeknek vagy olyan területekre, ahol a gondozás minimalista megközelítést igényel. Az idő múlásával eléri teljes terjedelmét, és közben enyhe formázó metszéssel tartható formában.
Továbbá, a Juniperus virginiana 'Grey Owl' nemcsak esztétikai értékkel bír, hanem a kert ökoszisztémáját is gazdagítja, mivel menedéket nyújt a kisebb állatoknak.

Zóna:4a

Havasi törpefenyő	**Pinus mugo**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Havasi törpefenyő (Pinus mugo) egy varázslatos kis örökzöld növény, amely méltán vált az egyik legkedveltebb dísznövénnyé a kertészetekben és kertekben világszerte. Ez a törpefenyő fajta különleges tulajdonságai és lenyűgöző megjelenése miatt vált népszerűvé. A Havasi törpefenyő egy apró növény, amely a magasabb hegycsúcsokon és havas területeken található meg, így neve is innen származik. Az általában alacsonyabbra növő törpefenyőkkel ellentétben, ez a fajta egyedülállóan tömör és kompakt formájú, amely igazán szemet gyönyörködtető látványt nyújt. A lassú növekedésű növény általában körülbelül 1-2 méter magasra növekszik, de egyes példányok akár 3 méteres magasságot is elérhetik, ami azért rendkívül ritka. Az Havasi törpefenyő tűi rövidek és vastagok, sötétzöld színűek, amelyek szépen elrendeződnek a tömör ágakon. Ez a tulajdonság hozzájárul a növény gömb alakú, kompakt megjelenéséhez. Télen sem veszíti el tűlevelét, így egész évben szép és zöld marad, ami nagyszerű kiegészítője lehet kerti tájképnek vagy más növények között. A Havasi törpefenyő rendkívül ellenálló és könnyen gondozható növény. Jól érzi magát napos vagy félárnyékos helyeken, és jól bírja a hideg teleket és a szélsőséges időjárási körülményeket is. A talajjal szemben nem túl igényes, de a jó vízelvezetésű talajokat részesíti előnyben. Rendszeres öntözésre van szüksége az első években, amíg gyökérzete meg nem erősödik. A Havasi törpefenyő egy sokoldalú növény, amely többféle módon felhasználható. Az alacsony növekedésű példányok szépen mutatnak kőkertekben, sziklakertekben vagy kerti konténerekben. Nagyszerűen alkalmazható a kerti határok kialakításában, vagy sziklakertekben. Emellett a Havasi törpefenyő gyakran felhasználják bonsai kerti vagy belső tér díszítésére is, mivel kompakt mérete és lassú növekedése ideálisak a formálásához. A növény hosszú élettartammal rendelkezik, így hosszú távon is élvezhetjük a szépségét és egyediségét. A törpefenyők könnyen fenntarthatók és kevés gondozást igényelnek, így ideális választás azoknak, akik kevésbé tapasztalt kertészek vagy időhiányban szenvedő emberek. A Havasi törpefenyő kis teret foglal el, így kisebb kertekben vagy balkonokon is könnyen elhelyezhető. Végül, de nem utolsósorban, a Havasi törpefenyő egy olyan növény, amely élettel tölti meg a környezetét. Az élénk zöld színe és a kis mérete miatt vonzza a tekintetet, és kisugározza a természet szépségét. A növény által nyújtott frissesség és harmónia a kert vagy a terasz hangulatát fokozza, és egy kellemes, pihentető atmoszférát teremt. Összességében a Havasi törpefenyő egy varázslatos és különleges növény, amely szépsége és sokoldalúsága révén vonzóvá teszi a kerteket és a kerti területeket. Legyen szó kis tájképről, bonsai kertekről vagy kerti határokról, ez a törpefenyő minden környezetben megállja a helyét. Ha egy tartós, könnyen gondozható és impozáns dísznövényre vágyik, a Havasi törpefenyő kiváló választás lehet.

Kaliforniai gyantásciprus	**Calocedrus decurrens**	4 750 Ft	4 750 Ft

A Calocedrus decurrens (Kaliforniai gyantásciprus) az USA csendes-óceáni partvidékének hegyvidéki övezetében, Kaliforniában és Oregonban, nagy területeken honos fenséges növény. Hazai arborétumokban is sok idős, robusztus méretű példánya található. Karcsú oszlopos alakját hosszú évtizedeken át tartja, koronája csak később szélesedik ki. Kérge eleinte bordóvörös, később szürkésbarnára vált át. Fényes, üdezöld színű hajtásai pikkelylevelűek, tujára emlékeztetők. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek - télen több-kevesebb faggyal - kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-10b USDA-zóna

Karcsú oszlopos közönséges boróka	**Juniperus communis 'Sentinel'**	4 450 Ft	4 750 Ft

A hazai flórából ismert közönséges boróka egy igen jól sikerült oszlopos kertészeti változata. Színe, levélformája ugyan olyan, de egy keskeny oszlopos habitusú cserjévé fejlődik. Látványos eleme lehet napos sziklakerteknek, kőkerteknek, ajánlható szűkebb városi kertekbe, vagy keskeny előkertekbe. Jól mutat más napimádó növényekkel is. 5a-8b USDA-zóna

Kék arizóna-ciprus	**Cupressus arizonica 'Glauca'**	10 450 Ft	10 450 Ft

A kék arizóna-ciprus egy igénytelen, erőteljes szárazságtűrő növény. Sivatagi, félsivatagi zord környezetből származik, ezért a mi kertjeink klímája maga a kánaán számára. Ennek megfelelően gyors növekedésű fenyőféleként kezelhetjük, amit inkább visszafogni kell, mint noszogatni. A 8-10 méter magas növénnyé fejlődhet. Szélessége eléri a 3-4 métert is. Jól tűri a nyírást, alakítást is. Az alapfajnál a Glauca változat egy hamvasabb, kékebb lombszínű növény, melyből kialakíthatóak sövények, de csoportba, vagy szoliterként is igen szépek. Idősebb korában érdekes pikkelyekből álló kérge is szépen mutat, ezért javasolható az alsó ágkörök időben való eltávolítása, hogy ezt is meg lehessen mutatni a kertben.
Fényigény: kifejezetten napos termőhelyet kedvel
Vízigény: szárazságtűrő, telepítést követően el lehet engedni az öntözést
Talajigény: nadves kötött talajoktól eltekintve mindenhol jól érzi magát
Fagytűrés: jó hidegtűrő
USDA zóna: 5a

Kék atlasz cédrus	**Cedrus atlantica 'Glauca'**	4 850 Ft	5 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A kék atlasz cédrus egy monumentális díszfa, amelyet szenvedélyes kertészek és tájépítészek egyaránt imádnak. Eredetileg az Észak-Afrikai Atlasz-hegységből származik, de dísznövényként világszerte népszerű. Jellegzetes ezüstkék tűlevelei és idővel szélesre, szabálytalanul ívelődő koronája teszik egyedivé. Fiatalon szűk, oszlopos formájú, majd évek múltán széles, lebegő ágrendszert fejleszt. Télen is zöld marad, és érett korában hosszú, felálló tobozokat hoz.
Mérete és jellege:

Magasság: 15-25 méter (lassú növekedésű, évtizedek alatt éri el maximális méretét).

Szélesség: 8-15 méter (idővel terjedelmes koronával).

Talajigény: Jó vízáteresztésű, köves vagy homokos talajt kedvel, de alkalmazkodik agyagos talajhoz is.

Gondozási útmutató
Fényigény: Kizárólag napos helyen ültessük – árnyékban színe fakul, és gyengén fejlődik. Öntözés: Fiatalon mérsékelt öntözést igényel, idősebb korában szárazságtűrő. Metszés: Nem szükséges, de halott ágakat tavasszal el lehet távolítani. Formavágásra csak szakértői kezelés ajánlott. Télvédelem: -25°C-ig télálló, extrém hidegben fiatal példányok törzsét érdemes takarni. Figyelem: Ne ültessük nedves, vízzel telített talajba – gyökérrothadásra hajlamos!

6b-10a USDA-zóna

Leyland-ciprus	**Cupressocyparis leylandii**	2 750 Ft	2 950 Ft

A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést az ültetést követő pár évben meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robosztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. Bátran kijelenthető, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény!
A leyland ciprus (x Cupressocyparis leylandii) egy gyorsan növekvő pikkelylevelű örökzöld, amely könnyen elérheti a 20 méters magasságot és 5 méteres szélességet. Piramis alakú, elegáns, sötétzöld lombozata van. Ha túl nagyra nő, vagy kinövi a helyét, szükségessé válik a metszése, nyírása.
Leyland ciprus metszése
A leyland Cypress-t a világ egyik legnépszerűbb sövénynövénye, mert nagyon strapabíró, gyorsan növő örökzöld, évi akár 1 méteres növekedéssel. Kiváló szélfogónak, vagy nagyobb kertekben a különböző kertrészek elhatárolására, illetve legjellemzőbben kertek határán sövénynek. A megfelelő elhelyezés, tőtávolság (1-1,5 m) mellett is szükséges a leyland ciprus metszése, formájának alakítása a gyors növekedése miatt – különösen akkor ha kinőtte a számára kijelölt helyet.
A leyland ciprus formális sövényként történő metszése bevett gyakorlat, ilyen esetben ajánlatos évente legalább egyszer megnyírni. Érdemes a nyírást koratavaszra időzíteni. Az első évben vágja le a tetejét és az oldalát, hogy elkezdje kialakítani a kívánt formát. A második és harmadik évben csak azokat az oldalágakat vágja le, amelyek túl messzire nyúltak, hogy fenntartsák és elősegítsék a lombsűrűséget. A metszés onnantól megváltozik, ha a fa eléri a kívánt magasságot. Ekkor évente vágja le a tetejét 20-30 cm-el a kívánt magasság alá és ezt minden év tavaszán megismételni.
6b-9b USDA-zóna

Leyland-ciprus (legnagyobb)	**Cupressocyparis leylandii**	9 900 Ft	10 500 Ft

A Cupressus macrocarpa és a Chamaecyparis nootkatensis hibridje. Igen gyors növekedésű, 1 m-t is nőhet évente. Bár jó szárazságtűrő, az öntözést meghálálja. Talajban nem válogatós, jól bírja a nyírást, sövénynek is kiváló. Nyírás nélkül robosztus, gyönyörű mélyzöld színű, szabályos kúp alakú koronát nevel. A leyland ciprusok, más fenyőfélékhez hasonlóan idősebb korban ellenállóbbak a fagyokkal szemben. Ha leyland ciprusunk elérte a 4-5 éves kort, minden esélye megvan rá, hogy akár évszázados hidegrekordokat is különösebb károsodás nélkül viseljen el. Talán mondható, hogy a mi klímánkra találták ki ezt a növényt. Szélsőséges körülmények között is (átlagosnál keményebb tél, aszályos, forró nyár, gyenge talaj) az egyik legerőteljesebb növekedésű növényünk. Kiváló sövénynövény! 6b-9b USDA-zóna

Libanoni cédrus	**Cedrus libani**	6 550 Ft	6 550 Ft

A Cedrus libani (Libanoni cédrus) idősebb korában óriási méretű, fenséges szépségű fenyő. Lombozata fényeszöld, ágrendszere vízszintes emeletekben helyezkedik el. Fiatalon gyorsan növő, kúpos koronájú fa. Csontváry képekről jól ismerjük ezt a csodálatos növényt. Alphonse de Lamartine XIX. századi francia költő írta a Libanoni cédrusról: 'A legcsodálatosabb természeti emlék a világon'. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek hegyvidéki területei – télen több-kevesebb faggyal – kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. 6a-9b USDA-zóna

Lucfenyő	**Picea abies**	7 950 Ft	7 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Közönséges lucfenyő, más néven Norvég lucfenyő vagy Európai lucfenyő, Észak- és Közép-Európa hegyvidékeiről származó, az Alpokban és a Kárpátokban erdőalkotó örökzöld tűlevelű fa . A fenyőfélék családjába tartozó faj a legismertebb és legelterjedtebb lucfenyő a kontinensen, amelyet gazdasági jelentősége mellett dísznövényként is széles körben ültetnek .
Örökzöld, kúpos koronájú, egyenes törzsű fa, amely természetes élőhelyén 30-50 méter magasra nő, törzsének átmérője elérheti az 1-1,5 métert. A szabadon álló példányok alsó ágai a földig leérhetnek, míg sűrű erdőben az alsó ágak elszáradnak, a törzs felkopaszodik . Ágai örvökben állnak, a fiatal hajtások vörösesbarnák, a későbbiek lecsüngenek . Kérge fiatalon vörösesbarna, sima, idősebb korban szürkésbarna, pikkelyesen repedezett.
Tűlevelei szúrósak, négyélűek, 1-2,5 cm hosszúak, sötétzöld színűek, mind a négy oldalukon alig látható légzőnyílásokkal. A tűk a hajtásokon spirálisan helyezkednek el, és 4-7 évig maradnak a fán; lehullásuk után az ágak durva tapintásúak maradnak.
A virágzást követően a nőivarú tobozok kezdetben felfelé állnak, majd őszre, amikor megérnek, lecsüngenek. A termések hengeresek, 10-15 cm hosszúak, barnák, pikkelyeik szélén finom fogazással. Érés után egészben hullanak le a fáról.
Igényei és gondozása
A Közönséges lucfenyő hűvös, csapadékos, párás klímát kedvel, természetes élőhelyén a hegyvidékek hűvösebb öveiben érzi jól magát . Napos vagy félárnyékos fekvést igényel; fiatal korában árnyéktűrő, később több fényre van szüksége . Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, savanyú kémhatású (pH 6,0 alatti), üde, laza szerkezetű vályogtalajokat kedveli, alacsony tápanyagtartalommal is beéri. A pangó vizet és a meszes talajt nem tűri, száraz, forró nyári klímában gyengén fejlődik, és érzékennyé válik a lucgubacstetű támadására.
Gondozása viszonylag egyszerű. A fának sekély gyökérzete van, ezért a viharok könnyen kidönthetik, különösen laza talajon . Metszést fiatal korban a koronaformálás érdekében végezhetünk, idősebb korban már nem igényli. A metszést késő tavasszal vagy nyár elején végezzük, amikor a nedvkeringés élénk. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal savanyú hatású tűlevelű-trágyával gondoskodjunk. Télállósága kiváló, akár -30 °C-ot is elviseli.
Felhasználás a kertben
A Közönséges lucfenyő impozáns megjelenésű, hűvösebb fekvésű kertekben méltóságteljes dísze lehet a tájnak. Magányosan, szoliterként ültetve a legszebb, ahol teljes koronáját kibonthatja . Csoportosan ültetve szélfogó sövényként, védőerdősávként is funkcionálhat. Nagyobb kertekbe, parkokba, tágas előkertekbe ideális. A fajnak számos kertészeti változata (fajtája) létezik, amelyek között törpe, gömb alakú, csüngő ágú vagy aranylevelű formák is megtalálhatók – ezek kisebb kertekbe, sziklakertekbe, konténerbe is alkalmasak . A leggyakoribb karácsonyfa, bár vágott állapotban száraz levegőn hamar hullatja tűleveleit.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, savanyú talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek más tűlevelűek, mint a fenyők (Pinus), a jegenyefenyők (Abies) vagy a borókák (Juniperus). Savanyú talajt kedvelő lombhullató cserjékkel, például hangával (Calluna), tőzegrozmaringgal (Andromeda) vagy havasszépe (Rhododendron) fajokkal ültetve színpompás, örökzöld kompozíciót hozhatunk létre. Árnyéktűrő évelőkkel, mint a páfrányok, a tüdőfű (Pulmonaria) vagy a hunyor (Helleborus) a fa tövében is alakíthatunk ki dekoratív, gyommentes felületet.
3a-9b USDA-zóna

Mas nehézszagú boróka	**Juniperus sabina 'Mas'**	4 450 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Mas' nehézszagú boróka egy széles, elterülő habitusú örökzöld cserje, amely 100-150 cm magasra és 200-300 cm szélesre nő. Fő értéke a sűrűn álló, pikkelyszerű levelek, amelyek élénkzöld színűek és jellegzetes, erős illatot árasztanak. A levelek télen bronzos árnyalatot öltenek. A növény termése kisméretű, kékes-fekete tobozbogyó. Gyors növekedésű és rendkívül ellenálló, sűrű talajtakarót képez.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Napos vagy félárnyékos helyen

Talaj: Bármilyen jó vízáteresztő talaj, száraz, köves talajt is jól tűri

Távolság: 150-200 cm-es távolsággal

Használat: Talajtakaró meredek lejtőkön, nagy területek betelepítése, ipari területek, sziklakertek

Gondozási útmutató

Metszés: Jól tűrő, de ritkán szükséges metszés

Télvédelem: Teljesen télálló, -30°C-ig is ellenáll

Öntözés: Nagyon alacsony vízigényű, kiváló szárazságtűrő

Tápanyagutánpótlás: Nem igényel különösebb tápanyagutánpótlást

Általános: Rendkívül ellenálló, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Meredek lejtők

Ipari területek

Szárazságtűrő kertek

Parkok és nagy területek

Sziklakertek

Tengerparti kertek

5a-9b USDA-zóna

Mint Julep boróka	**Juniperus x media 'Mint Julep'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fényes sötétzöld lombszínű, kezdetben alacsonyan szétterülő, később, ahogy ágemeletei egymásra épülnek, 2 méteres magasságot is elérő, majdnem gömbölyded bokor lesz. Gyors növekedésű, edzett, ellenálló, amerikai eredetű fajta. Zóna:5a			
Nehézszagú kúszó boróka	**Juniperus sabina 'Tamariscifolia'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel a Juniperus sabina 'Tamariscifolia' (Nehézszagú kúszó boróka) egyedülálló szépségét! Ez az alacsony növekedésű örökzöld tökéletes választás talajtakaróként, lejtők beültetésére vagy sziklakertek kialakításához. Erős gyökerű, egész évben ültethető növényeinket gondosan szállítjuk!
Külső jellemzők

Méret: 1-1,5 m magas, 1,5-2 m széles.

Levelek: Sötétzöld pikkelylevelek, megdörzsölve jellegzetes "nehéz" illatúak.

Növekedés: Szélesen elterülő, párnaszerű habitus.

Termés: Nőivarú egyedek kékesfekete tobozbogyókat hoznak.

Előnyös tulajdonságok

Kiváló talajtakaró: Gyorsan és sűrűn borítja a talajt.

Szárazságtűrő: Teljesen kifejlődve minimális öntözést igényel.

Fagytűrő: Akár -30°C-ig is ellenáll.

Alacsony karbantartású: Szinte metszésmentes.

Ültetési javaslatok

Talaj: Minden talajtípusban megél, a jó vízelvezetésű talajt preferálja.

Fényigény: Napos vagy részleges árnyékos helyeket kedvel.

Ültetési sűrűség: 1 db/m² ajánlott.

Gondozás

Öntözés: Csak fiatalon és szélsőséges szárazság esetén.

Metszés: Alig igényel metszést, de tavasszal formálható.

Trágyázás: Nem szükséges, de tavasszal lassú oldódású trágya használható.

Tervezési javaslatok

Társítás: Harmonizál Cotoneaster dammeri-vel, Sedum-fajokkal vagy Festuca glauca-val.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Ajánlott helyek:

Talajtakaróként

Lejtők beültetése

Sziklakertek

Temetők és köztéri zöldterületek

Oszlopos arizóniai ciprus	**Cupressus arizonica 'Fastigiata'**	8 500 Ft	8 500 Ft

Az arizóna-ciprus oszlopos, karcsú változatáról van szó, ami keskenyebb formájának köszönhetően sövénynek ültetve kevesebb helyet vesz el a kertből, mint az alapfaj. Sűrű lombja, ezüstös-kék színével, elegáns formájával szoliter növénynek is kiválóan alkalmas. Talajokban nem válogat és szárazságtűrő így kevésbé intenzíven gondozott kertekbe is nyugodtan ültethetjük. Gyors növekedésének köszönhetően kiváló megoldás sövénynövénynek! 7a-9b USDA-zóna

Oszlopos tiszafa	**Taxus baccata 'Fastigiata'**	5 950 Ft	6 350 Ft

Középerősen növekedő, zárt oszlop alakú, sötétzöld lombú fajta. A növény valamennyi része a gyomorba jutva mérgező. Kivételt képez a termést borító húsos-piros magburok, amely ehető. Kétlaki növény: termést csak a nőpéldányok hoznak. A talaj iránt igénytelen, a tűző napon, de egész mélyárnyékban is jól fejlődik. Nyíratlan sövénynek is elsőrangú! 6a-9b USDA-zóna

Pfitzeriana Glauca kék terülőboróka	**Juniperus × pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca'**	3 950 Ft	4 250 Ft

A Kék terülőboróka 'Pfitzeriana Glauca', más néven Pfitzer-boróka vagy Kék pfitzer-boróka, az egyik legkedveltebb és legszélesebb körben ültetett örökzöld tűlevelű. Közepes termetű, terülő habitusú hibrid növény, amely a kínai boróka és a nehézszagú boróka keresztezéséből jött létre. Kifejlett korára 1-1,5 méter magas és akár 3-4 méter széles is lehet, jellegzetes, ívelten szétterülő formát alkotva.
A növény vázágai 45 fokos szögben emelkednek ki a töből, míg a fiatal hajtások végei enyhén lehajlanak, ami kecses, mégis rendezett megjelenést kölcsönöz neki. Lombozata sűrű, pikkelyszerű levelekből áll, melyek színe ezüstös-kékeszöld. Különlegesen dekoratívvá teszi, hogy a hideg hónapokban, télen a lombozat gyakran lilás árnyalatot ölt. A növény porzós klónból származik, ezért termést nem hoz.
Igényei és gondozása
A Kék terülőboróka 'Pfitzeriana Glauca' rendkívül alkalmazkodóképes és hálás növény, ami a kezdő kertészek egyik kedvence lehet. Napos vagy félárnyékos helyet kedvel, de minél több fényt kap, annál szebb és tömöttebb lesz a lombja. Talaj tekintetében nem válogatós: a jó vízelvezetésű, akár száraz, homokos, köves vagy meszes talajokon is kiválóan fejlődik. A pangó vizet azonban nem tűri, ezért ültetéskor gondoskodjunk a megfelelő vízelvezetésről. Szárazságtűrése kiváló, a kiültetett példányok a hosszabb aszályos időszakok kivételével nem igényelnek öntözést. Gondozása minimális, metszésre általában nincs szükség, de ha mégis formálni szeretnénk, kora tavasszal óvatosan visszavágható. Fontos azonban, hogy a nehéz metszést nem viseli jól, mert onnan nehezen újul. Városтűrő, a kedvezőtlen körülményeket és a légszennyezést is jól tolerálja.
Felhasználás a kertben
Sokoldalú megjelenésének köszönhetően a Kék terülőboróka a kert számos pontján megállja a helyét. Kiválóan alkalmas talajtakarónak nagyobb felületek, rézsűk vagy lejtők beültetésére, ahol sűrű lombjával hatékonyan elnyomja a gyomokat. Sziklakertekben és kavicságyásokban struktúrát és egész éves színt ad. Több példányt egymás mellé ültetve nyíratlan sövényként vagy alacsony térelválasztóként is funkcionálhat. Alacsonyabb termete miatt vegyes évelő- és cserjeágyások hátterébe, vagy nagyobb fák elé ültetve is mutatós. Jól tűri a szélsőséges körülményeket, ezért városi kertekbe, forgalmas utak mellé is ideális választás.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes kihasználni az ezüstös-kékes lombozat kontraszteremtő képességét. Kiváló partnerei lehetnek a meleg színű lombhullató cserjék, mint a sárga levelű borbolyák vagy a tarka levelű somok. Díszfüvekkel, például tollborzfűvel vagy kínai ezüstfűvel ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk. Alacsony termetű, lila vagy kék virágú évelőkkel, mint a levendula vagy a zsálya, mediterrán hangulatú kompozíciót hozhatunk létre. Több borókafajtát kombinálva is mutatós: az arany lombú 'Old Gold' vagy a zöld 'Pfitzeriana' társaságában színpompás, egész éves együttest alkothatunk.

Robosztus oszlopos tiszafa	**Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Robosztus oszlopos tiszafa svájci eredetű, sötétzöld lombú, gyorsan fejlődő, keskeny oszlopos fajtája, melynek fagytűrése is figyelemre méltó. Rendkívül szép sövény telepíthető belőle!

Külső tulajdonságok

Magasság és forma: Oszlopos habitus, felfelé keskenyedő ágakkal. Kifejlett állapotban 5-7 méter magas és 1-1,5 méter széles lehet.

Levelek: Világoszöld, tűszerű, lapos levelek, amelyek évközben nem változtatják jelentősen színüket. A kéreg vörösesbarna színű.

Termés: Nőivarú példányokon szeptember körül élénkpiros bogyók jelennek meg, amelyek madarak számára vonzóak, de az emberek és háziállatok számára mérgezőek.

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos, világos vagy félárnyékos helyeket kedvel. Teljes árnyékban is túléli, de növekedése lassabb lehet.

Talaj: Jó vízelvezető, tápanyagban gazdag, nedves (de nem pangó) talajt preferál. Tolerálja a savas, semleges és lúgos talajt is.

Öntözés: Közepes vízigényű. Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, míg a kifejlett példányok szárazságot is jól tűrik.

Metszés: Jól viseli a metszést. Az alakmegőrző nyírást május végén és szeptemberben ajánljuk.

Télállóság: Teljesen télálló, fiatal növényeket érdemes szélvédett helyre ültetni.

Ültetési javaslatok

Időzítés: Tavasz vagy ősz ideális, amikor a talaj hőmérséklete kedvező a gyökérfejlődéshez.

Távolság: Sövényként ültetve 1-1,5 méteres távolságot ajánlunk a zárt hatás érdekében.

Hely: Napos vagy félárnyékos hely, jó vízelvezetésű talajjal.

Alkalmazási lehetőségek

Sövényként: Sűrű növekedése miatt kiváló élőkerítés vagy zaj- és szélfogó.

Szoliterként: Egyedi megjelenése miatt hangsúlyos elem a kertben vagy parkban.

Dísznövény: Oszlopos formája kontrasztot teremt más növényekkel kombinálva.

Mérgező hatás: A növény minden része (kivéve a bogyó húsát) erősen mérgező az emberek és háziállatok számára.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Betegségek: Ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de a pangó víz gyökérrothadást okozhat.

Extra tipp: A tiszafa bogyói madárvilág vonzására alkalmasak, és sűrű ágazata menedéket nyújt a kisebb állatok számára.

Zóna:6a

Sárgalombú leyland ciprus	**Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'**	4 950 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Sárgalombú leylandciprus 'Gold Rider' (× Cuprocyparis leylandii 'Gold Rider') – A gyors növekedésű, aranyszínű örökzöld
A sárgalombú leylandciprus – más néven aranylombú leylandciprus – a ciprusfélék családjába tartozó, hibrid eredetű örökzöld tűlevelű fa. A fajta a 'Leighton Green' fajta ágmutációjaként jött létre Hollandiában, és 1986 óta került forgalomba. A 'Gold Rider' fajtajelzés a növény feltűnő aranysárga lombozatára utal, amely a klasszikus zöld leylandciprushoz képest jóval dekoratívabb megjelenést biztosít. Ez a növény a rendkívül gyors növekedésével és egész éves aranyszínű lombozatával az egyik legkedveltebb örökzöld sövénynövény a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a városi környezethez való alkalmazkodóképessége és a páratlan színvilága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A sárgalombú leylandciprus egy gyors növekedésű, szabályos, keskeny kúp alakú koronájú, örökzöld fa. Kifejlett magassága 12-25 méter, szélessége 4-8 méter között alakul, de sövényként nyírva kisebb méretben tartható. A növény évi 1 méteres növekedést is elérhet, ami az egyik leggyorsabban fejlődő örökzölddé teszi. Koronája sűrű, oszlopos, az ágak felfelé törekvők, ami a fának impozáns, elegáns megjelenést kölcsönöz. A kéreg vörösesbarna, idősebb korban repedezett.
A lombozat a növény legfőbb díszítő eleme, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A tűlevelek pikkelyszerűek, aprók, a hajtásokon sűrűn, átfedően helyezkednek el. A 'Gold Rider' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a lombozat élénk aranysárga színe, amely egész évben megőrzi dekoratív hatását. A fiatal hajtások a legvilágosabbak, idősebb korban a levelek enyhén zöldesebb árnyalatot kaphatnak. Télen a lombozat enyhén bronzos árnyalatot ölthet, ami további díszítőértéket ad a növénynek.
A virágzat és a termés a növény másodlagos díszítőelemei. A virágok aprók, jelentéktelenek, tavasszal jelennek meg, a hímivarú virágok sárgás-barnás tobozkák, a nőivarú virágok kevésbé feltűnőek. A termések apró, gömbölyded tobozok, amelyek eleinte zöldek, majd éréskor barnák, de nem különösebben dekoratívak.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A sárgalombú leylandciprus napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legintenzívebb aranysárga lombozatszínt napos helyen hozza. Félárnyékban a lombozat színe kevésbé intenzív lehet.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli.

Öntözés: A sárgalombú leylandciprus közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett fák a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, tűlevelűek számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A sárgalombú leylandciprus metszése fontos a növény méretének kordában tartása és a sűrű habitus fenntartása érdekében, különösen sövényként történő nevelés esetén. A metszést kora tavasszal (március) és nyár közepén (július) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Sövénymetszés: Sövényként ültetve a növényt évente 2-3 alkalommal nyírjuk vissza a kívánt magasságra és formára.

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Fontos: A metszést csak a zöld, hajtásos részekre korlátozzuk; a régi, fásodott részekből a növény nem hajt ki. Ősszel már ne nyírjuk, mert az új hajtások visszafagyhatnak.

Telelés és fagytűrés: A sárgalombú leylandciprus kifejezetten kiváló télállóságú. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, télen is dekoratív.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A sárgalombú leylandciprus az aranysárga lombozatának, a gyors növekedésének, a városi környezethez való alkalmazkodóképességének és az egész éves dekorativitásának köszönhetően az egyik legkedveltebb örökzöld sövénynövény:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Magas sövényként, adatvédelmi falként – a gyors növekedés és a sűrű lombozat miatt kiváló választás élő falak kialakítására.

Szélfogóként – a sűrű, tömött lombozat hatékonyan véd a szél ellen.

Szoliter növényként – a szabályos, kúp alakú habitus és a látványos szín miatt kiváló magányos díszelem.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet.

Zajcsökkentő sövényként – forgalmas utak mentén hangfogóként is használható.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A sárgalombú leylandciprus aranysárga lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Sötétzöld tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli az aranysárga lombozat intenzív színét.

Lila levelű cserjékkel – a lila és az arany szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Virágos cserjékkel és évelőkkel – a virágzó növények színei kiegészítik a sövény strukturális megjelenését.

Díszfüvekkel – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a sövény merevebb, strukturális formáját.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a sárgalombú leylandciprus teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Széles oszlopos tiszafa	Taxus baccata 'Overeynderi'	5 950 Ft	5 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A széles oszlopos tiszafa 'Overeynderi' a tiszafafélék (Taxaceae) családjába tartozó, Európában, Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában őshonos közönséges tiszafa nemesített változata. A fajtát 1860 körül találták Hollandiában, Boskoopban, a 'Fastigiata' fajta magoncaként, és azóta is az egyik legkedveltebb oszlopos tiszafa a kertekben és parkokban. A 'Overeynderi' fajtajelzés a felfedezőjére, C. G. Overeynderre utal. Ez a növény egész évben mutatós, sötétzöld lombozatával és elegáns, széles oszlopos habitusával az egyik legkedveltebb strukturális örökzöld a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, kiváló télállósága, árnyéktűrése és városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A széles oszlopos tiszafa 'Overeynderi' egy sűrű, zárt koronájú, örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 3-6 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul. A növény habitusa széles oszlopos vagy széles kúp alakú, felfelé törekvő, tömött, idős korban sem esik szét. Növekedési erélye lassú vagy közepes, évi 15-30 cm-es gyarapodással, és rendkívül hosszú életű; akár 1000 évig is élhet. A kéreg vékony, vörösesbarna, idős korban szürkésbarna, pikkelyesen hámlik.
A tűlevelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A tűlevelek 2-3 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, puha tapintásúak, nem szúrósak, ami a tiszafák egyik jellegzetessége. A tűlevelek sűrűn állnak a hajtásokon, és a növény egész évben dekoratív lombozatot biztosítanak. Ősszel a lombozat enyhén bronzos vagy rézbarnás árnyalatot ölthet, ami a téli időszakban is megmarad.
A virágzat és a termés a fajta jellegzetességeitől függően változhat. A 'Overeynderi' általában hímivarú (porzós) fajta, amely bőségesen virágzik, de nem terem. A virágzás áprilisban történik, a porzós virágok sárga színűek. A nőivarú példányokon (ha vannak) ősszel piros, húsos magköpeny (arillus) fejlődik, amely dekoratív, és a madarak számára táplálékul szolgál.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A széles oszlopos tiszafa rendkívül árnyéktűrő, de napos vagy félárnyékos helyen fejlődik a legszebben. Teljes árnyékban is megél, de ott lassabban nő. A forró, száraz, déli fekvésű helyeket kerülni kell, mert a téli napégés károsíthatja a lombozatot.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén lúgos talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja.

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények mérsékelten szárazságtűrőek, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy adag lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágyát, vagy egy réteg (3-5 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A széles oszlopos tiszafa kiválóan tűri a metszést, és sövényként vagy formára vágva is nevelhető. A metszést kora tavasszal (február-március) vagy ősszel (szeptember) kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat.

Sövénymetszés: Sövényként ültetve a növényt évente 1-2 alkalommal nyírjuk vissza a kívánt magasságra és formára.

Telelés és fagytűrés: A széles oszlopos tiszafa kiválóan télálló; az USDA 5-7-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. Fontos, hogy a növény védett, szélvédett helyen álljon, mert a téli, száraz, hideg szelek károsíthatják a lombozatot.

Fontos tudnivaló a mérgezőségről: A széles oszlopos tiszafa minden része (kivéve a piros magköpenyt) mérgező, különösen a magvak. A növényben található taxán-alkaloidok súlyos mérgezést okozhatnak emberben és állatban egyaránt. A gondozás során mindig viseljünk védőkesztyűt, és a növényt gyermekek és háziállatok közelében fokozott körültekintéssel ültessük.
Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A széles oszlopos tiszafa a sötétzöld, örökzöld lombozatának, széles oszlopos habitusának, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az

egyik legkedveltebb tűlevelű a kertekben és parkokban:

Szoliter növényként – a szoborszerű habitus és a látványos szín miatt kiváló magányos díszelem.

Sövényként – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt kiváló választás örökzöld, térelválasztó sövények kialakítására.

Formára vágva, nyírott növényként – bonsai, gömb, kúp vagy más geometriai formák kialakítására is alkalmas.

Temetőkbe, városi parkokba, előkertekbe – jól tűri a városi környezetet és a kipufogógázokat.

Térhatároló elemként, építészeti kertekbe – a tiszta vonalak és a strukturális megjelenés miatt.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A széles oszlopos tiszafa sötétzöld lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Virágos cserjékkel és évelőkkel: Rhododendronnal, hortenziával és páfrányokkal – a sötétzöld háttér kiemeli a virágok élénk színét.

Más tűlevelűekkel: Arany levelű tujákkal, sötétzöld ciprusokkal és borókákkal – a különböző színű és habitusú tűlevelűek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

Lila virágú évelőkkel: Levendulával (Lavandula) és macskamentával (Nepeta) – a lila és a sötétzöld szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral (Acer palmatum) és virágos sommal (Cornus kousa) – a tiszafa sötétzöldje kiemeli az őszi lombszín élénk árnyalatait.

USDA besorolása: 5-7 (Magyarországon a széles oszlopos tiszafa teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Totem karcsú európai ciprus	**Cupressus sempervirens 'Totem'**	4 950 Ft	4 950 Ft

Rendkívül keskeny, szabályos formájú fajtája az Európai ciprusnak. Származási helyének éghajlata a télen esős, nyáron száraz mediterrán területek – télen több-kevesebb faggyal – kemény lombú, örökzöld növényzettel. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Elsősorban a tavaszi ültetése javasolt a fagyérzékenysége miatt, mert a friss (őszi) ültetés mindig érzékenyebb a téli hidegre. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul. A Cupressus sempervirens 'Totem' (Karcsú oszlopos európai ciprus) mivel főleg fiatal korában érzékeny az erősebb fagyokra, érdemes a kert legvédettebb részére ültetni. 7b-10a USDA-zóna

REZISZTENS GYÜMÖLCSTERMŐK

Matador nagyterméső húsos som	**Cornus mas 'Matador'**	9 900 Ft	11 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Matador nagytermésű húsos som (Cornus mas 'Matador') – A bőtermő, kora tavaszi virágú gyümölcscserje

A Matador nagytermésű húsos som a somfélék családjába tartozó, Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos, lombhullató cserje vagy kis fa nemesített változata. A fajtát a francia Pepinieres Minier nemesítő cég hozta létre 2007-ben, és azóta az egyik legértékesebb termő somfajtának számít. A 'Matador' fajtajelzés a bőséges, rendszeres terméshozamra utal. Ez a növény a kora tavaszi sárga virágzásával, a nyár végi ehető, piros terméseivel és az igénytelenségével az egyik legkedveltebb gyümölcscserje a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a kiváló télállósága és a betegség-ellenállósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Matador nagytermésű húsos som egy közepes vagy erőteljes növekedésű, szétterülő, bokros habitusú, lombhullató cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 3-5 méter, szélessége 2-4 méter között alakul. Többtörzsű formában vagy egy vezérhajtásos faként is nevelhető. Növekedési erélye közepes vagy erőteljes, a korona szétterülő, a végleges méret eléréséhez 10-15 év szükséges. A kéreg szürkésbarna, idősebb korban pikkelyesen hámlik, ami télen is dekoratív.

A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek egyszerűek, átellenesek, elliptikusak vagy tojásdadok, 4-10 cm hosszúak, fényes sötétzöld színűek, a levél széle ép. A lombozat a nyár folyamán dekoratív, ősszel pedig a levelek sárgás, vöröses vagy bronzos árnyalatokat öltenek, ami a fát a késő őszi időszakban is kiemeli a kertből.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 1-2 cm átmérőjű, sűrű, ernyős fürt, amelyen a apró, 4-6 mm átmérőjű virágok helyezkednek el. A virágok sárga színűek, jelentéktelenek egyenként, de a sűrű fürtökben feltűnőek. A virágzási időszak a késő téltől a kora tavaszig tart: Magyarországon jellemzően február végétől márciusig, a levelek előtt. A virágok illatosak, és a méheket, poszméheket és más kora tavaszi beporzó rovarokat vonzzák; a növény kiváló méhlegelő.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény nagy, 1,5-2,5 cm hosszú, gömbölyded vagy hosszúkás, élénkpiros, csonthéjas terméseket fejleszt. A termések augusztus-szeptemberben érnek be, és a teljes éréskor édeskés-savanykás ízűvé válnak, miközben a kezdeti fanyarság csökken. A termések gazdag C-vitaminban, pektinben, antocianinokban és antioxidánsokban. Felhasználhatók frissen, lekvároknak, szirupoknak, kompótnak, gyümölcsboroknak és pálinkának. A növény magról és vegetatív úton (szemzéssel, oltással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Matador nagytermésű húsos som napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legbőségesebb virágzást és terméshozamot napos, szellős fekvésben hozza. Félárnyékban is jól fejlődik, de a virágzás és a terméskötés gyengébb lehet.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, meszes, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után elviseli.

Öntözés: A Matador nagytermésű húsos som közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, gyümölcscserjék számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A Matador nagytermésű húsos som alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat. Faként nevelve a törzs alsó részéről távolítsuk el az oldalhajtásokat.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növényeket erőteljesen is visszavághatjuk tavasszal, hogy serkentsük az új, fiatal hajtások képződését.

Telelés és fagytűrés: A Matador nagytermésű húsos som kifejezetten kiváló télállóságú; akár -26°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, télen nyugalmi állapotban van, és nem igényel külön védelmet.

Beporzás: A Matador nagyterméső húsos som önmeddő, vagyis a bőséges terméshez egy másik somfajta jelenléte szükséges a közelben. Ajánlott beporzó fajták: 'Elegant', 'Flava', 'Pioneer', 'Red Star' vagy 'Yellow'.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Matador nagyterméső húsos som a kora tavaszi virágzásának, az ehető terméseinek, a kiváló télállóságának és a sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb gyümölcscserje a kertekben és parkokban:

Gyümölcsöskertbe – a bőséges terméshozam és a C-vitaminban gazdag gyümölcsök miatt kiváló választás.

Szoliter növényként – a szétterülő habitus és a látványos tavaszi virágzás miatt kiváló magányos díszelem.

Vegyes cserjeágyásokba, természetes kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok és termések vonzzák a madarakat és a beporzó rovarokat.

Sövényként, védősövényként – a sűrű növekedés és a jó metszéstűrés miatt kiváló választás.

Városi kertekbe, közterületekre – jól tűri a városi környezetet és a szennyezett levegőt.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Matador nagyterméső húsos som sárga tavaszi virágai és piros termései számos más növénnyel kombinálhatók:

Kora tavaszi virágzó cserjékkel: Mogyoróval, télie hangával – a hasonló virágzási időszak miatt kiváló társnövények.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral – a különböző őszi színek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

Virágos cserjékkel és évelőkkel – a virágzó növények színei kiegészítik a fa strukturális megjelenését.

Díszfüvekkel – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a fa strukturális megjelenését.

USDA besorolása: 5-7 (Magyarországon a Matador nagyterméső húsos som teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -26°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

SAB OV indián banán, papau	**Asimina triloba 'SAB OV'**	18 500 Ft	18 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A SAB OV indián banán (Asimina triloba 'SAB OV') egy kifejezetten ellenálló, bőtermő és viszonylag kompaktabb növekedésű nemesített változata az észak-amerikai őshonos papau fának, amelyet közismert nevén indián banánként tartanak számon. Ez a lombhullató fa lassú-közepes növekedésű, kifejlett magassága eléri az 5-7 métert, szélessége 3-5 méter, ami a fajtához képest oszloposabb, szűkebb koronát jelent, így kisebb kertekbe is beilleszthető.
Külső megjelenése és termése
A fa természetes élőhelyén oszlopos, majd idővel szélesebb, kúp alakú koronát nevel, ami karcsúbb megjelenést kölcsönöz neki a szélesebb fajtákhoz képest. Levelei nagyok, 15-30 cm hosszúak, lándzsás-elliptikusak, sötétzöld színűek, ősszel sárgásbarna, kevésbé feltűnő árnyalatot öltenek. Április-májusban, még a lombfakadás előtt vagy azzal egy időben nyílnak a 3-5 cm átmérőjű, bíborvörös, kellemesen illatos, harang alakú, lecsüngő virágok. A 'SAB OV' értéke a rendkívül bőséges és megbízható terméshozam. Termése közepes-nagy méretű (150-250 gramm), hosszúkás-ovális alakú, héja éretten zöldes-sárga. Húsa sűrű, krémes állagú, kevés magot tartalmaz, íze édes, erőteljes, trópusi jegyekkel (mango, vanília, ananász). Érése szeptembertől október elejéig tart, jól szállítható és tárolható.
Igényei és gondozása
Az indián banán félárnyékos vagy napos, széltől védett fekvést kedvel. Fiatal korban az árnyékolást is tolerálja, de napos helyen több és édesebb termést hoz. Talajban nem igényes, de a mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, állandóan enyhén nedves, jó vízáteresztő képességű, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,5) közegben érzi magát legjobban. A pangó vizet és a hosszan tartó aszályt nem viseli el. Rendszeres, különösen a nyári száraz időszakban történő, heti szintű, mély öntözést igényel. Tavasszal érett komposzttal vagy savanyú tőzegmulccsal takarjuk a tövét a nedvesség megőrzése érdekében. Metszést nem igényel, kivéve az elhalt, beteg vagy egymást keresztező ágak eltávolítását, ezt kora tavasszal (február-március) végezzük el. Fontos a termékenyüléshez: az indián banán önmeddő, ezért legalább két, egymástól genetikailag különböző fajtát (pl. 'Rebecca's Gold', 'Sunflower', 'Prima', 'Davis') kell egymás közelébe (10-15 méteren belül) ültetni. Kártevők és betegségek szempontjából ellenálló, permetezést nem igényel.
Kertstílus és növénytársítások
A 'SAB OV' indián banán kiválóan illik:

Természetes és erdei kertekbe: ahol az aljnövényzet részeként vagy erdőszéli faként funkcionál.

Gyümölcsösökbe és tanyakertekbe: mint különleges, de megbízható gyümölcsfa.

Koloniális és vadkertekbe: ahol az őshonos növényeket részesítik előnyben.

Nagyobb városi kertekbe és parkokba: oszloposabb növekedése miatt szűkebb helyre is ültethető.

Javasolt növénytársítások:

Fák és cserjék: somfa (Cornus mas, Cornus florida), közönséges galagonya (Crataegus monogyna), amerikai bangita (Viburnum opulus), fekete ribiszke (Ribes nigrum), mogyoró (Corylus avellana), csermelyciprus (Chamaecyparis)

Évelők és talajtakarók: erdei páfrány (Dryopteris filix-mas), szálkás pajzsika (Polystichum), erdei gyöngyvirág (Polygonatum multiflorum), tarka árnyéki árvacsalán (Lamium maculatum), télizöld metény (Vinca minor), erdei szellőrózsa (Anemone nemorosa)

Hagymások és tavaszi virágok: téltemető (Eranthis hyemalis), hóvirág (Galanthus), krókusz (Crocus), tavaszi tőzike (Leucojum vernum)

A fa tövében hagyjuk a lehullott leveleket, amelyek természetes talajtakaróként védik a gyökereket és pótolják a humuszt.
USDA besorolás: 5-8

Ascolana olajfa	Olea europaea Ascolana	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Ascolana olajfa (Olea europaea Ascolana) az olajfák egyik legkedveltebb és legkiválóbb asztali fajtája, amely Olaszország középső részéből, Ascoli Piceno városából származik. Ez a fajta a kiváló íz, a nagy termésméret és a megbízható hozam hármasát kínálja, ami a házi kertek és a kisüzemi termelés egyik kedvencévé teszi. Az Ascolana különlegessége, hogy terméseit nem olajpréselésre, hanem kifejezetten asztali fogyasztásra, tartósításra és a híres Ascoli Picenó-i töltött olajbogyó (Olive all'Ascolana) elkészítésére nemesítették.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az Ascolana közepes vagy nagyobb termetű, 5-8 méter magas és 4-6 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik, ami a mediterrán tájak jellegzetes hangulatát idézi. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-8 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések az Ascolana igazi büszkeségei: a bogyók nagyok, akár 5-8 grammosak is lehetnek, ovális vagy enyhén tojásdad alakúak. Húsuk vastag, lédús, roppanós, enyhén édeskés, nem keserű, kellemes olajbogyóízzel. Az Ascolana termései kifejezetten asztali célra alkalmasak: sós lében vagy olajban tartósítva, fűszerezve, illetve a hagyományos olasz recept szerint hússal töltve, panírozva és kisütve fogyasztják. A fajta olajhozama alacsony, ezért olajpréselésre nem ajánlott.
Igényei és gondozási útmutató: Az Ascolana a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és az íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása és a termőrészek serkentése. Az Ascolana jól tűri a metszést, de a túlzott visszametszés csökkentheti a terméshozamot. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek és a levéltetvek okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a lisztharmat és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: Az Ascolana a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és olajfaligetekben a hagyományos mediterrán táj hangulatát kelti. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis) és oregánó (Origanum vulgare) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
Az Ascolana kiváló választás azok számára, akik egy ízletes, nagy méretű asztali olajbogyót termő olajfát keresnek, amely a mediterrán kertek egyik alapvető eleme lehet, és a termések a hagyományos olasz receptek szerint is feldolgozhatók. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Avdat termős pisztácia	**Pistacia vera 'Avdat'**	31 500 Ft	31 500 Ft

Az Avdat pisztácia korai virágzású (nálunk április közepe) izraeli fajta, melynek magas százalékban nyitottak a gyümölcsei. Gyümölcseinek íze, élvezeti értéke kifejezetten magas. Sok tulajdonságában nagyon hasonlít a Larnaka ciprusi fajtához, pl hogy korán szüretelhető (szeptember eleje), ami nagy előny nálunk, mert a hűvösebb, nedvesebb szeptemberekben a legtöbb fajta termése érzékeny a gombásodásra.
7a-9b USDA-zóna

Általános tudnivalók:
A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztenek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím- (porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamain tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindeznek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatású és erősíti az immunrendszerünket!

Balkon füge	**Ficus carica 'Little Miss Figgy'**	4 750 Ft	5 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Balkon füge (Ficus carica 'Little Miss Figgy') egy kifejezetten törpe növekedésű, kompakt fügefajta, amelyet a balkonra és teraszra, valamint kis kertekbe való termesztésre nemesítettek. Kiválóan alkalmas dézsában való nevelésre, miközben ízletes, sötétlila gyümölcsöket hoz. Kompakt, bokros növekedés. Magassága 1-1.8 méter, szélessége 1-1.2 méte. Gyümölcse sötétlila/bordó héjú, epervörös húsú. Körte alakú, kb. 35-40 gramm. Íze igen édes.
Little Miss Figgy (MAJOAM) törpe füge (Ficus carica Little Miss Figgy MAJOAM) a fügefajták legújabb generációjának egyik legizgalmasabb képviselője. Ez a nemesített, védett fajta (MAJOAM) minden előnyét hordozza a hagyományos fügéknek, de egy törpe, kompakt méretben, ami lehetővé teszi, hogy szinte bárki élvezhesse a saját termésű, édes fügét, még a legkisebb erkélyen vagy teraszon is.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Little Miss Figgy valóban törpe méretű: kifejlett állapotban mindössze 1-1,5 méter magas és ugyanilyen széles. Habitusa sűrű, bokros, ágai rövidek, ami miatt természetesen is kompakt marad, alig igényel metszést. Levelei a hagyományos fügéhez hasonlóan nagyok, karéjosak, 3-5 lebenyűek, élénkzöld színűek, de a rövidebb ízközök miatt sűrűbben állnak. A termések a fajta egyik nagy büszkesége: a viszonylag kis fa méretéhez képest nagy, közepes vagy nagy méretű fügék érnek rajta, amelyek héja sötétlila vagy barnáslila, belsejük élénk pirosas-rózsaszín, tele apró, roppanós magokkal. Ízük rendkívül édes, mézes, kellemes fügearomával. A fajta bőtermő, gyakran már az első évben terem, és a termések nyár közepétől őszig, két hullámban érnek.
Igényei és gondozási útmutató: A Little Miss Figgy a legszebb terméseit teljes napos, széltől védett helyen hozza. A meleg, napfényes fekvés elengedhetetlen a termések beéréséhez és az édes íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű, közepesen tápanyagú virágföldet vagy kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, ezért a cserepek aljára feltétlenül tegyünk vízelvezető réteget (kavics, agyagkavics). Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, különösen nyáron, a virágzás és terméskötődés idején. A konténerben nevelt növényt gyakrabban kell öntözni, mint a szabadföldit. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal és nyár elején, fügeműtrágyával vagy lassú felszívódású, káliumban gazdag műtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése minimális: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat. Formázó metszésre alig van szükség, mivel a növény természetesen is kompakt marad. Teleltetése egyszerű: konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen, például lépcsőházban, garázsban vagy hideg üvegházban teleltethető. Szabadföldbe ültetve téli takarást (lomb, szalma, fólia) igényel a fiatal növény.
Kertstílus és növénytársítások: A Little Miss Figgy a kis helyű kertek és teraszok sztárja. Teraszokon és erkélyeken dekoratív cserépben a mediterrán hangulatot idézi, miközben hasznos, ehető hozamot biztosít. Városi kertekben és kisebb udvarokban a helyhiány miatt ideális választás. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, modern cserepekhez a nagy, formás levelei izgalmas textúrát adnak. Mediterrán kertekben a hagyományos füge kicsinyített másaként is megállja a helyét. Akár nagyobb ablakpárkányra vagy fűtött téli kertbe is ültethető.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: A Little Miss Figgy mellé ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris) és oregánó (Origanum) egy igazi mediterrán hangulatú teraszt varázsolnak, és mind hasonló gondozást igényelnek. Törpe citrusfélékkel: Egy kaliforniai paprikafával (törpe narancs, citrom vagy kumquat) párosítva a déli, egzotikus hatás tökéletes. Évelő virágokkal: A cserép aljába vagy köré ültetett macskamenta (Nepeta), árvácska (Viola) vagy büdöske (Tagetes) színesíti a kompozíciót és vonzza a beporzó rovarokat. Díszfüvekkel: A törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis Adagio) vagy a tollborzfű (Pennisetum) lágy, mozgó kontrasztot ad a füge nagy, keményebb leveleihez. Hagymásokkal: A cserépbe tavasszal virágzó krókuszok (Crocus) vagy apró nárciszok (Narcissus) ültethetők a füge tövébe, amelyek a tavaszi hónapokban, még a füge lombfakadása előtt nyílnak.
A Little Miss Figgy tökéletes választás azok számára, akik szeretnének saját termésű fügét, de nincs helyük egy hagyományos, nagy fügefának. Konténerben nevelve akár egy balkonon is tartható, és a kompakt mérete miatt könnyen mozgatható, így a teleltetés is egyszerű. USDA besorolása: 7-10 (konténerben teleltetve 5-6-os zónában is tartható).
A 'Little Miss Figgy' egy törpe fügefajta, amelyet a 'Violette de Bordeaux' ősi francia fajta ágmutációjaként fedeztek fel . Legfőbb előnye a kompakt, tömör növekedési formája, ami ideálisvá teszi nemcsak kisebb kertek, hanem balkonok és teraszok számára is, ahol konténerben nevelhető.
A növény levelei nagyok, jellegzetesen karéjosak és sötétzöldek, magas dekoratív értékkel. Gyümölcse közepes méretű, körte alakú, sötétlila héjjal és élénk epervörös, lédús hússal . Íze kiváló, intenzíven édes . A füge partenokarp, azaz beporzás nélkül is képes termést hozni, így egyetlen fa is elegendő a bő terméshez.
Gondozási útmutató
A 'Little Miss Figgy' viszonylag könnyen nevelhető, de a szükséges alapfeltételeket be kell tartani a sikeres termesztéshez.

Fényigény: A teljes napsütés elengedhetetlen a jó fejlődés és a gyümölcsképződés érdekében. Naponta legalább 6-8 óra közvetlen napfényre van szüksége.

Talaj: A jól vízelvezető, laza szerkezetű talaj a legfontosabb. A konténerbe ültetéskor ügyeljünk a megfelelő lyukak és esetleg egy kavicsréteg elhelyezésére az alján. A növény nem igényes, de a tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben.

Öntözés: Közepes vízigényű. A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, különösen a száraz, forró időszakokban. Kerüljük a túlöntözést, mivel a pangó víz gyökérrothadáshoz vezethet.

Télvédelem: Bár a fajta -10°C - -15°C-ig fagytűrő, a dézsa és a növény töve téli védelemre szorul. A konténert szalmával, jutaszövetekkel be lehet burkolni, a növény tövét pedig levelekkel vagy kéregmulccsal lehet letakarni. Nagyon hideg teleken a növényt érdemes lehet egy fagymentes, világos helyiségbe (pl. garázs, üvegház) átteleltetni.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Metszés: Alapvetően nem igényel radikális metszést. A legfontosabb a száraz vagy gyenge ágak tavaszi eltávolítása. A növény alakja könnyen tartható és szabályozható.

Trágyázás: A növekedési szezon kezdetén, tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassan oldódó műtrágyával történő trágyázás elősegítheti az egészséges fejlődést és a bő termést.

Ültetési javaslatok
Ez a fajta rendkívül sokoldalúan használható fel.

Konténeres nevelés: Kifejezetten dézsa- és cserépben való ültetésre nemesítették, így ez az elsődleges javaslat balkonra és teraszra.

Kis kertek: Korlátozott helyű kertje számára is kiváló választás, akár szoliter növényként, akár gyümölcstermő díszcserjeként.

Díszérték: Nemcsak gyümölcséért, de látványos, exotikus megjelenése miatt is érdemes ültetni, ami mediterrán hangulatot visz a teraszra!

Barna török füge	**Ficus carica 'Brown Turkey'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Nyugat-Európa legnépszerűbb fügéje, mely kiváló fagytűrésével, és hihetetlen termésbőségével hazai kertjeinknek is ígéretes újdonsága! Rendkívül bőtermő, aszalásra az egyik legalkalmasabb fajta. Gyümölcseit késő nyáron, kora ősszel hozza.
A Barna török füge könnyen nevelhető és viszonylag igénytelen.

Öntözés: Közepes vízigényű. A növekedési időszakban rendszeres öntözést igényel, de jól tűri a szárazságot. A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, de el kell kerülni a víz állását.

Metszés: A téli metszés ideális a forma kialakításához és a halott ágak eltávolításához. A metszés serkenti az új hajtások növekedését, amelyeken a termések képződnek.

Télvédelem: A USDA 6-os zónában és hidegebb éghajlatokon téli védelem nélkülözhetetlen. A gyökérzóna vastag mulccsal való takarása és a növény burkolása segíthet a fagykárosodás elkerülésében. Konténerben nevelt növényeket téli fagyok előtt hűvös, fényes helyiségbe kell helyezni.

Trágyázás: A talaj komposzttal való gazdagítása és a növekedési szezonban egy kiegyensúlyozott műtrágya alkalmazása előnyös.

Ültetési javaslat
A Barna török füge rendkívül sokoldalúan használható fel.

Kültéri ültetés: Díszfa vagy gyümölcstermő növényként egyaránt kiváló. Ültessük napos, védett helyre, például egy déli tájolású fal mellé, amely hőt ad és véd a fagyoktól.

Konténeres nevelés: Edénybe ültetve is nagyon jól megél, így teraszra és kisebb kertekbe is ideális. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy hidegebb teleken a növényt beltérbe helyezzük.

Tőtávolság: A talajba ültetéskor 2-3 méteres távolságot kell betartani a megfelelő fejlődés érdekében.

Ajánlott kerttípusok
A Ficus carica 'Brown Turkey' jól illeszkedik az alábbi kerttípusokba:

Gyümölcskert

Mediterrán kert

Díszkert

Konténeres kert

7a-10a USDA-zóna

Füge, az édenkert gyümölcse. A fügefák komoly titkokat rejtenek, hiszen virágaik soha nem látnak napvilágot. A füge még zöld, termésnek nevezett része igazából virág, pontosabban egy serlegvirágzat. A füge az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye. A Jordán-folyó völgyében több mint tízezer éves fügemaradványokra bukkantak, melyeket emberi beavatkozással szaporítottak. Maga a gyümölcs a történelem folyamán mindig is kultikus erejű tápláléknak számított. Egyiptomi sírok falfestményei is ábrázolnak fügeszedőket, Buddha megvilágosodása egy fügefa alatt történt, a hinduk szerint ez maga a 'szent fa', mellyel az istenek átadták az embereknek a tudást. Platón véleménye szerint a füge az atléták tökéletes tápláléka, így az ókori Athénban

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

talán nem véletlenül volt állami monopólium a kereskedelme, tiltották az exportját, nehogy túl sok jusson belőle az olimpiai ellenfeleiknek. A Szentírásban igaz, a szőlő a leggyakrabban előforduló gyümölcs, de közvetlenül a füge (Ficus carica) követi, melyet több mint hatvan helyen említ a Biblia. De ha a füge maga a virágzat, akkor hol a füge termése? Tehát azt már az elején leszögeztük, hogy a füge egy összetett virágzat, belsejében sok száz apró virágot bújtat, ezáltal mikor megérik, nem is egyetlen termésről beszélhetünk, hanem sok száz aprócska termés csoportosulásáról, egy befelé fordított fürtről. Olyan ez, mintha egy szőlőfürtöt becsomagoltunk volna egy selymes tapintású, könnycsepp alakú bőrbatyuba. Az édes ízű füge nem véletlenül a romantikus esték egyik elengedhetetlen gyümölcse! Fokozza a „boldogsághormon”, az endorfin-kiválasztását, hírhedten vágyfokozó, miközben nem hizlal, és tisztítja, megszépíti a bőrt, lelkileg nyitottabbá tesz, mivel oldja a gátlásokat. A növény minden porcikája (leszámítva a teljesen érett gyümölcsöket) hófehér, latex tartalmú tejnedvet tartalmaz, amely gyengén maró hatású az emberi szövetekre is. A füge szorosan kötődik a szimbolikához. Szinte minden vallásban másként, de jellemzően a füge az egyetemes igazságot, tudást és bőséget szimbolizálja. Míg a keresztény hagyomány az almát a tudás, a jó és a rossz fájának gyümölcseként ismeri el, addig a zsidó hagyomány ezt a szerepet a fügének tulajdonítja. A Biblia alapján egyes tudósok úgy értelmezik, hogy Ádám és Éva fügét evett, nem almát – végül is később meztelenségüket nem véletlenül fügelevél mögé rejtették.

Bolwilleri Csoda mogyoró	**Corylus avellana 'Bolwilleri Csoda'**	7 900 Ft	7 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Bolwilleri Csoda mogyoró (Corylus avellana 'Bolwilleri Csoda') lombhullató cserje vagy kis termetű fa, amely 3–5 méter magasra és 2–4 méter szélesre nő. Koronája kezdetben felálló, majd szélesedő, laza szerkezetű. Levelei kerekdedek, szélük fűrészes, tavasszal világoszöldek, ősszel aranysárgára színeződnek. Kora tavasszal (február–március) hosszú, sárga barkákban nyílnak a porzós virágok, amelyek a tél végi kert egyik első színfoltjai. A termős virágok aprók, pirosasak, és a rügyekből később fejlődnek ki a nagy, ízletes mogyorótermések. A fajta nevét a kiváló termésminőségéről és bőséges hozamáról kapta. A termések augusztus végén – szeptemberben érnek, és éréskor a barkákból kihullva szedhetők.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; a bőséges terméshez legalább napi 6 óra közvetlen napfény szükséges.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű talajt kedvel. A meszes, agyagos és homokos talajokat is elviseli, de a pangó vizet nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; az első években rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot is jól tűri. Aszályos időszakban a termés mennyisége és minősége csökkenhet.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, a legtöbb magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültethető, napos, védett helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy érett trágyát a jobb talajszerkezet és tápanyagellátás érdekében.

Öntözés: Az első 2–3 évben rendszeresen öntözze, különösen száraz nyarakon. Később a természetes csapadék általában elegendő, de a termésfejlődés idején (június–augusztus) a rendszeres vízellátás javítja a hozamot.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya vagy érett komposzt támogatja a növekedést és a terméshozamot. Túlzott nitrogéntrágyázás a lomb növekedését serkenti a termés rovására.

Metszés: A mogyoró termése a fiatal hajtásokon képződik, ezért a metszést a téli nyugalmi időszakban (február–március) végezze. Távolítsa el az elhalt, beteg vagy keresztező hajtásokat, és ritkítsa a koronát a jobb fény- és levegőáramlás érdekében. A töven képződő sarjhajtásokat rendszeresen vágja vissza, hogy a növény fa alakban nevelhető legyen. Ha cserjeként tartja, a sarjhajtásokat hagyhatja, de 5–7 évente fiatalítsa meg a bokrot.

Betegségek és kártevők: A mogyoró általában egészséges, de a mogyoróbarkó és a mókusok, madarak károsíthatják a termést. A lisztharmat és a levélfoltosodás ritkán jelentkezik. A pangó víz gyökérrothadást okozhat.

Betakarítás: A termések akkor érettek, amikor a barka megsárgul, és a mogyoró könnyen kihullik. Szedje fel a lehullott terméseket naponta, hogy elkerülje a penészedést és a kártevőket. A terméseket szellős, száraz helyen szárítsa meg, majd hűvös, száraz helyen tárolja.

Kerti stílus
Ez a mogyorófajta kiváló választás gyümölcsösökbe, konyhakertekbe, madárbarát kertekbe és természetközeli kertekbe. Cserjeként sövényként is nevelhető, így egyszerre nyújt takarást és termést. Kis fává nevelve szoliterként is megállja a helyét a kertben. Jól mutat cottage- és vidéki kertekben, valamint erdőszéli, természetes hatású kompozíciókban. Mivel korán virágzik, a téli-tavaszi kert egyik első színfoltja.
Növénytársítások

Gyümölcsfák és bogyósok: alma, körte, szilva, ribizli, egres – hasonló igényűek, és együtt változatos termést kínálnak.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Nitrogénkötő növények: borsó, bab, here, lucerna – javítják a talajt a mogyoró körül.

Hagymás és évelő növények: tavaszi hagymások (nárcisz, tulipán, krókusz) és árnyéktűrő évelők (kankalin, ibolyák) színesítik a mogyoró alatti talajfelszínt.

Fűszernövények: rozmaring, kakukkfű, zsálya – szárazságtűrők, és jól mutatnak a mogyoró tövében.

Madárbarát cserjék: galagonya, kökény, bodza – menedéket és táplálékot nyújtanak a madaraknak, és növelik a kert biológiai sokféleségét.

USDA télállósági zóna: 4-8.

Bouche de Betizac eurázsiai hibrid szelídgesztenye	**Castanea sativa x mollissima 'Bouche de Betizac'**	16 500 Ft	16 500 Ft

Bouche de Betizac Eurázsiai hibrid szelídgesztenye (Castanea sativa x crenata Bouche de Betizac) a gesztenyefajták egyik legkiválóbb és legkeresettebb képviselője, amelyet Franciaországban nemesítettek a nemes gesztenye (Castanea sativa) és a japán gesztenye (Castanea crenata) keresztezésével. Ez a hibrid a két faj legjobb tulajdonságait ötvözi: a nemes gesztenye kiváló ízét és a japán gesztenye betegség-ellenállóságát, valamint a hibrid erélyt. A Bouche de Betizac – amely francia elnevezés – különösen a termések óriási méretéről és rendkívül édes, könnyen hámozható gesztenyéiről ismert.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Bouche de Betizac közepes vagy nagyobb termetű, 8-10 méter magas és 6-8 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik, ami bőséges árnyékot biztosít. Levelei közepes méretűek vagy nagyok, 10-18 cm hosszúak, elliptikus vagy lándzsás alakúak, szélük finoman fogazott, felületük fényes, sötétzöld, a hibrid erélynek köszönhetően dús lombozatot képez. Ősszel a levelek sárgásbarna árnyalatot öltenek. A virágok nyár elején, június környékén nyílnak: a fa hosszú, sárgásfehér barkavirágzatokat hoz. A termések a növény igazi büszkeségei: ősszel, szeptember-októberben érnek be, a tipikus sündisznószerű, tüskés kupacsokban. A kupacsok nagyok, a tüskék sűrűk, de a japán gesztenye örökségeként kevésbé szúrósak, mint a nemes gesztenyéé. A kupacsok általában 2-3 termést tartalmaznak. A gesztenyék a fajta legnagyobb erényei: óriási méretűek, akár 20-30 grammosak is lehetnek, lapított gömb alakúak, héjuk világos- vagy sötétbarna, fényes, jellegzetesen csíkozott. A Bouche de Betizac legnagyobb előnye, hogy a belső hártya (episperm) rendkívül vékony és könnyen eltávolítható, ami a hámozást rendkívül kényelmessé teszi. Belsejük világossárga vagy krémszínű, szilárd, rendkívül édes, kellemes gesztenyeízzel, a nemes gesztenyénél is édesebb. Kiválóan alkalmas sütésre, főzésre, gesztenyepüré készítésére, de nyersen is fogyasztható.
Igényei és gondozási útmutató: A Bouche de Betizac a legszebb terméseit teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza, de a bőséges terméshez a napos fekvés az ideális. Talajban a jó vízelvezetésű, enyhén savanyú vagy semleges (pH 5,5-7,0), közepesen tápanyagú, mély rétegű talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött és a nagyon meszes talajokat nem tűri jól. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a gesztenyék növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású gyümölcsfa műtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: fiatal korban a koronaformázó metszés, idősebb korban a ritkító és egészségügyi metszés (elhalt, sérült, egymást keresztező ágak eltávolítása) javasolt. A legfontosabb tudnivaló: a Bouche de Betizac részben önbeporzó, de a bőséges terméshez két különböző genetikájú fa szükséges egymás közelében. Kiváló beporzó partner lehet a Marsol, a Marigoule vagy más hibrid fajták. Jó télállósággal rendelkezik, akár -20 °C-ig is ellenáll, de a fiatal fákat érdemes az első években takarni.
Kertstílus és növénytársítások: A Bouche de Betizac méretéből adódóan nagyobb kertekbe, parkokba és tájkertekbe illik. Házi kertekben és nagyobb gyümölcsösökben a gyümölcsfák között is megfér, különösen ha van elegendő hely. Tájkertekben és angolkertekben a szétterülő, impozáns koronája miatt kiváló szoliter fa. Természetes kertekben és erdőszéli kertekben a termések vonzzák a madarakat és más állatokat. Mint haszonfa, a gesztenyetermesztés kedvelőinek nélkülözhetetlen eleme.
Változatos növénytársítások: Beporzó partnerek: A Bouche de Betizac mellé mindenképpen ültessünk egy másik gesztenyefajtát a bőséges termés biztosításához. Jó választás a Marsol, a Marigoule, a Bournette vagy más hibrid fajták. Alacsony cserjékkel: A fa alá vagy köré ültetett alacsony díszcserjék, mint a levendula (Lavandula), borbolya (Berberis) vagy a csodabogyó (Gaultheria) takarják a csupasz talajt, miközben vonzzák a beporzó rovarokat. Árnyéktűrő évelőkkel: A fa alatti árnyékos részekbe ültethetünk páfrányokat, árnyékliliomokat (Hosta), erdei gyöngyvirágot (Convallaria majalis) vagy kárpáti harangvirágot (Campanula carpatica), amelyek szépen díszlenek a fa alatt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a gesztenye lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszalmával vagy más virágzó fákkal: A gesztenye mellé ültetett díszalma (Malus) vagy díszcseresznye (Prunus) tavasszal látványos virágzásával, ősszel pedig termésével egészíti ki a gesztenye impozáns megjelenését.
A Bouche de Betizac kiváló választás azok számára, akik egy ízletes, óriási méretű, könnyen hámozható gesztenyét keresnek, és szeretnének egy betegségekkel szemben ellenálló, megbízhatóan termő hibrid fát ültetni.
6b USDA-zóna

C-Especial porzós pisztácia	**Pistacia vera 'C-Especial'**	31 500 Ft	31 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A C-Especial porzós pisztácia (Pistacia vera) egy különleges beporzófajta, amely kulcsszerepet játszik a termős pisztáciák gyümölcshozamának növelésében. Mivel a porzós növények nem eredményeznek gyümölcsöt, a C-Especial feladata a pollen biztosítása a termős egyedek számára, így hozzájárulva a termésmegkötéshez és a növények sikeres beporzásához.
Ez a fajta kifejezetten a hatékony pollentermelésre lett nemesítve, és kiválóan alkalmazkodik a különböző klimatikus viszonyokhoz, különösen a mediterrán éghajlatú térségekhez, ahol a legjobban fejlődik. A C-Especial porzós pisztácia fája jól tűri a szárazságot és a szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat, ezért ideális választás fenntartható gazdálkodásra.
Bár a C-Especial nem termel gyümölcsöt, dísznövényként is népszerű, hiszen vonzó, egészséges megjelenése kedvező hatással van a kertészeti tájra. A növény gondozása viszonylag egyszerű, és alacsony vízigényének köszönhetően nem igényel nagy figyelmet.
Összegzésül, a C-Especial porzós pisztácia elengedhetetlen a pisztáciás ültetvények sikeréhez, mivel biztosítja a megfelelő beporzást a termős egyedek számára, aminek következtében bőséges és ízletes pisztáciatermés érhető el.
Ciprusról származik ez a kiváló porzós pisztácia fajta. A mezőgazdasági kutatók hosszas munkáját dicséri, mert sikerült egy nagyon életerős fajtát létrehozni, mely a magas minőségű pollenjeit hosszasan juttatja a levegőbe. Érdekességként a Ciprusi kutatók görög (az ország nagyobbik felén, déli felén ez a hivatalos nyelv) nyelven publikálták le az új fajtájukat, emiatt sok hivatkozásban görög fajtáról írnak. Korai virágzású és az Aegina, Larnaka termő fajták elsőszámú porzója. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztenek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamain tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatású és erősíti az immunrendszerünket!

Conadria füge	Ficus carica Conadria	4 750 Ft	4 750 Ft

Conadria füge (Ficus carica Conadria) a fügefajták egyik legkedveltebb és legmegbízhatóbb képviselője, amelyet az Amerikai Egyesült Államokban, Kaliforniában nemesítettek a híres Conadria nemesítési program keretében. Ez a fajta a kiváló íz, a nagy terméméret és a megbízható, bőséges hozam hármasát kínálja, miközben viszonylag igénytelen és könnyen kezelhető. A Conadria különösen népszerű a házi kertekben, mivel mind az első (breba), mind a második (fő) terméshulláma bőséges és ízletes.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Conadria közepes termetű, 3-5 méter magas és 3-4 méter széles fa vagy nagy cserje. Koronája szétterülő, ágai kissé szétnyílók, ami megkönnyíti a termések szüretelését. Levelei nagyok, jellegzetesen karéjosak, 3-5 lebenyűek, élénkzöldek, érdes tapintásúak, dús lombozatot képeznek. A fa különleges megjelenéséhez hozzájárul a sima, ezüstszürke kéreg is. A termések a növény igazi büszkeségei: a Conadria bőtermő fajta, amely két hullámban terem. Az első (breba) termések június-júliusban érnek, ezek általában nagyobbak. A második (fő) termések augusztus-szeptemberben, néha október elejéig. A fügék közepesen nagyok vagy nagyok, 50-80 grammosak, körte alakúak. Héjuk zöldes-sárga, néha enyhén lilás árnyalattal, vékony, de szívós. Húsuk élénk eperrózsaszín, sűrű, lédús, tele apró, roppanós magokkal. Ízük rendkívül édes, mézes, kellemes fügearomával, enyhén eperre emlékeztető jegyekkel. A Conadria egyik nagy előnye, hogy a termések nem repednek meg könnyen, és jól szállíthatók.
Igényei és gondozási útmutató: A Conadria a legszebb terméseit teljes napos, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és az édes íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes vagy semleges kémhatású, közepesen tápanyagú talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött és a nagyon savanyú talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hőségben, mivel a nagy levelek sok vizet párologtatnak. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályt, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a gyümölcsök növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy fügeműtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat, valamint ritkítsuk meg a túl sűrű koronát. A Conadria jól tűri a metszést, és a visszametszett hajtásokon bőségesen terem.
Teleltetése fontos kérdés: bár a fa maga fagytűrő akár -15 °C-ig, a fiatal növényeket érdemes az első 2-3 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni, különösen a törzsnél. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető.
Kertstílus és növénytársítások: A Conadria a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme, de más stílusokban is megállja a helyét. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű és olajfa társaságában a délies hangulatot idézi. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Házi kertekben és gyümölcsösökben a gyümölcsfák között is megfér, különösen déli kitettségben. Természetes kertekben a nagy levelei és a termések madarakat vonzanak. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a nagy, formás levelei izgalmas textúrát adnak.
Változatos növénytársítások: Más fügefajtákkal: A Conadria mellé ültetett más fügefajták (például Dalmatie, Little Miss Figgy, Brown Turkey) nem szükségesek a beporzáshoz, mivel a füge önbeporzó, de a változatos termések miatt érdemes több fajtát is tartani. Mediterrán évelőkkel: A füge tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris) és zsálya (Salvia officinalis) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Déli gyümölcsfákkal: Olajfa (Olea europaea), gránátalma (Punica granatum) vagy datolyaszilva (Diospyros kaki) mellett ültetve egy igazi déli gyümölcsös hangulatát kelthetjük. Szőlővel: Déli fekvésű pergolán vagy kerítésen futó szőlő (Vitis vinifera) tökéletes társa lehet a fügének, hasonló igényeik miatt. Alacsony talajtakarókkal: A füge alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a füge lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek.
A Conadria kiváló választás azok számára, akik egy megbízható, bőtermő, ízletes fügét keresnek, amely mind az első, mind a második terméshullámban bőséges hozamot ad, és a termések nem repednek meg könnyen. USDA besorolása: 7-10 (téli takarással 6-os zónában is tartható).

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Dauphine füge	**Ficus carica 'Dauphine'**	4 750 Ft	4 750 Ft

A Dauphine füge (Ficus carica Dauphine) a fügefajták egyik legkiválóbb képviselője, amely Franciaországból származik, és nevét a történelmi Dauphiné régióról kapta. Ez a fajta a kiváló íz, a nagy termésméret és a megbízható, bőséges hozam hármasát kínálja, miközben viszonylag igénytelen és könnyen kezelhető. A Dauphine különösen népszerű a házi kertekben és a kisüzemi termelésben egyaránt, mivel mind az első (breba), mind a második (fő) terméshulláma bőséges, és a termések kivételesen édesek, mézízűek.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Dauphine közepes vagy nagyobb termetű, 3-5 méter magas és 3-4 méter széles fa vagy nagy cserje. Koronája szétterülő, ágai erőteljesek, ami a bőséges termés elviseléséhez szükséges. Levelei nagyok, jellegzetesen karéjosak, 3-5 lebenyűek, sötétzöldek, dús lombozatot képeznek. A fa különleges megjelenéséhez hozzájárul a sima, ezüstszürke kéreg. A termések a növény igazi büszkeségei: a Dauphine bőtermő fajta, amely két hullámban terem. Az első (breba) termések június-júliusban érnek, ezek általában nagyobbak, akár 80-100 grammosak is lehetnek. A második (fő) termések augusztus-szeptemberben, néha október elejéig érnek. A fügék nagyok, körte alakúak, kissé megnyúltak. Héjuk lilás-barna vagy sötétlila, néha enyhén zöldes árnyalattal, vékony, de szívós. Húsuk élénk eperrózsaszín vagy mézszínű, sűrű, lédús, tele apró, roppanós magokkal. Ízük rendkívül édes, mézes, kellemes fügearomával, a Dauphine-t gyakran a legédesebb fügefajták között tartják számon. A termések nem repednek meg könnyen, és jól szállíthatók.
Igényei és gondozási útmutató: A Dauphine a legszebb terméseit teljes napos, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és az édes íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes vagy semleges kémhatású, közepesen tápanyagú talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött és a nagyon savanyú talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hőségben, mivel a nagy levelek sok vizet párologtatnak. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályt, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a gyümölcsök növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy fügeműtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat, valamint ritkítsuk meg a túl sűrű koronát. A Dauphine jól tűri a metszést, és a visszametszett hajtásokon bőségesen terem.
Teleltetése fontos kérdés: bár a fa maga fagytűrő akár -15 °C-ig, a fiatal növényeket érdemes az első 2-3 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni, különösen a törzsnél. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető.
Kertstílus és növénytársítások: A Dauphine a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme, de más stílusokban is megállja a helyét. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű és olajfa társaságában a délies hangulatot idézi. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Házi kertekben és gyümölcsösökben a gyümölcsfák között is megfér, különösen déli kitettségben. Természetes kertekben a nagy levelei és a termések madarakat vonzanak. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a nagy, formás levelei izgalmas textúrát adnak. Falusi kertekben a hagyományos, paraszti hangulatot erősíti.
Változatos növénytársítások: Más fügefajtákkal: A Dauphine mellé ültetett más fügefajták (például Conadria, Dalmatie, Brown Turkey, Little Miss Figgy) nem szükségesek a beporzáshoz, mivel a füge önbeporzó, de a változatos termések és a hosszabb szüreti időszak miatt érdemes több fajtát is tartani. Mediterrán évelőkkel: A füge tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris) és zsálya (Salvia officinalis) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Déli gyümölcsfákkal: Olajfa (Olea europaea), gránátalma (Punica granatum) vagy datolyaszilva (Diospyros kaki) mellett ültetve egy igazi déli gyümölcsös hangulatát kelthetjük. Szőlővel: Déli fekvésű pergolán vagy kerítésen futó szőlő (Vitis vinifera) tökéletes társa lehet a fügének, hasonló igényeik miatt. Alacsony talajtakarókkal: A füge alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a füge lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszcserjékkel: A sötét lombozatú vöröslevelű díszszilva (Prunus cerasifera Nigra) vagy az aranyborbolya (Berberis thunbergii Aurea) izgalmas színkontrasztot ad a füge zöld lombozatához.
A Dauphine kiváló választás azok számára, akik egy igazán édes, mézízű, nagy terméső fügét keresnek, amely megbízhatóan és bőségesen terem, és mind az első, mind a második terméshullámban kiváló minőséget nyújt. USDA besorolása: 7-10 (téli takarással 6-os zónában is tartható).

Frantoio olasz olajfa	**Olea europaea 'Frantoio'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Frantoio olajfa (Olea europaea Frantoio) az olajfák egyik legkiválóbb és legismertebb olajpréselési fajtája, amely Olaszország középső részéből, Toszkánából származik. A Frantoio név az olasz frantoio (olajprés) szóból ered, utalva a fajta elsődleges felhasználási módjára. Ez a fajta a kiváló minőségű, intenzív aromájú olaj és a megbízható, bőséges hozam hármasát kínálja, ami a világ egyik legkeresettebb olajbogyó-fajtájává teszi. A Frantoio olívaolaját friss, fűszeres, gyümölcsös, enyhén csípős és kesernyés jegyek jellemzik, amely a magas minőségű extra szűz olívaolajok egyik alapvető fajtája.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Frantoio közepes vagy nagyobb termetű, 5-8 méter magas és 4-6 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik, ami a mediterrán tájak jellegzetes hangulatát idézi. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-8 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Frantoio igazi büszkeségei: a bogyók közepes méretűek, 2-4 grammosak, ovális vagy enyhén tojásdad alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek. Húsuk közepesen vastag, a mag aránya közepes. A Frantoio olajhozama magas, akár 18-22% is lehet, és az olaj minősége kiváló. A termések olajpréselésre készülnek, asztali fogyasztásra kevésbé alkalmasak, mivel ízük túl intenzív és kesernyés lehet.
Igényei és gondozási útmutató: A Frantoio a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és a kiváló minőségű olaj kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Frantoio jól tűri a metszést, de a szakértői metszés fontos a magas olajminőség eléréséhez.
Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a lisztharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Frantoio a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi. Olajfaligetekben a hagyományos mediterrán táj hangulatát kelti, és kisebb ültetvényekben is megállja a helyét. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis) és oregánó (Origanum vulgare) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Frantoio mellé ültetett más olajfafajták (például Leccino, Pendolino, Coratina, Ascolana) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Frantoio részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Frantoio kiváló választás azok számára, akik saját, kiváló minőségű olívaolajat szeretnének préselni, és egy megbízható, bőtermő, intenzív aromájú olajbogyó-fajtát keresnek, amely a mediterrán kertek egyik alapvető eleme lehet. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

7b-10a USDA-zóna

Füge	Ficus carica	2 900 Ft	2 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Nagyméretű kerek bokor, karéjos levelekkel, finom, édes gyümölcsökkel, jobb években kétszer is teremhet. Levelei kb. 18 cm átmérőjűek, melyek dúsan borítják az egész növényt. Gyümölcse körte alakú, 3-10 cm hosszú, sárgás-zöld, bronz, vagy sötét bíborvörös színű. A füge hazája Nyugat Ázsia és a Földközi Tenger vidéke. Újkőkorszakbeli ásatások- feltárások alkalmával kiderült, hogy Kr.e. 5000-ben már termesztették. 7b-10a USDA-zóna

Füge, az édenkert gyümölcse. A fügefák komoly titkokat rejtenek, hiszen virágaik soha nem látnak napvilágot. A füge még zöld, termésnek nevezett része igazából virág, pontosabban egy serlegvirágzat. A füge az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye. A Jordán-folyó völgyében több mint tízezer éves fügemaradványokra bukkantak, melyeket emberi beavatkozással szaporítottak. Maga a gyümölcs a történelem folyamán mindig is kultikus erejű tápláléknak számított. Egyiptomi sírok falfestményei is ábrázolnak fügeszedőket, Buddha megvilágosodása egy fügefa alatt történt, a hinduk szerint ez maga a 'szent fa', mellyel az istenek átadták az embereknek a tudást. Platón véleménye szerint a füge az atléták tökéletes tápláléka, így az ókori Athénban talán nem véletlenül volt állami monopólium a kereskedelme, tiltották az exportját, nehogy túl sok jusson belőle az olimpiai ellenfeleiknek. A Szentírásban igaz, a szőlő a leggyakrabban előforduló gyümölcs, de közvetlenül a füge (Ficus carica) követi, melyet több mint hatvan helyen említ a Biblia. De ha a füge maga a virágzat, akkor hol a füge termése? Tehát azt már az elején leszögeztük, hogy a füge egy összetett virágzat, belsejében sok száz apró virágot bújtat, ezáltal mikor megérik, nem is egyetlen termésről beszélhetünk, hanem sok száz aprócska termés csoportosulásáról, egy befelé fordított fürtről. Olyan ez, mintha egy szőlőfürtöt becsomagoltunk volna egy selymes tapintású, könnycsepp alakú bőrbatyuba. Az édes ízű füge nem véletlenül a romantikus esték egyik elengedhetetlen gyümölcse! Fokozza a „boldogsághormon", az endorfin-kiválasztását, hírhedten vágyfokozó, miközben nem hizlal, és tisztítja, megszépíti a bőrt, lelkileg nyitottabbá tesz, mivel oldja a gátlásokat. A növény minden porcikája (leszámítva a teljesen érett gyümölcsöket) hófehér, latex tartalmú tejnedvet tartalmaz, amely gyengén maró hatású az emberi szövetekre is. A füge szorosan kötődik a szimbolikához. Szinte minden vallásban másként, de jellemzően a füge az egyetemes igazságot, tudást és bőséget szimbolizálja. Míg a keresztény hagyomány az almát a tudás, a jó és a rossz fájának gyümölcseként ismeri el, addig a zsidó hagyomány ezt a szerepet a fügének tulajdonítja. A Biblia alapján egyes tudósok úgy értelmezik, hogy Ádám és Éva fügét evett, nem almát - végül is később meztelenségüket nem véletlenül fügelevél mögé rejtették.

Goji bogyó	**Lycium chinense**	4 050 Ft	5 250 Ft

A Goji bogyó, egy rendkívül értékes évelő növény, melyet főként gyógyászati és táplálkozási előnyei miatt termesztenek. Ázsiai származású, leginkább Kínában, Mongóliában és a Himalája régióiban ismert. A növény közepes méretű, bokros habitusú, és nyár végén hozza jellegzetes, narancsvörös bogyóit. A goji bogyók rendkívül népszerűek a szuperélelmiszerek között, hiszen magas antioxidáns-tartalmuk, vitaminjaik (különösen C-vitamin és A-vitamin), ásványi anyagaik és aminosavaik révén kiemelkednek a többi bogyós gyümölcs közül. Gyakran fogyasztják szárítva, teákban, levesekben, gabonapehely keverékekben vagy egyszerűen frissen.
Ez a növény napfénykedvelő és jól tolerálja a szárazságot, de a jó vízelvezetésű talajt kedveli. A goji bogyóéinak termesztése könnyű, mivel a növény ellenálló a kártevőkkel és a betegségekkel szemben, bár a korai gyümölcshozás érdekében rendszeres metszés ajánlott.
A Lycium chinense nemcsak táplálkozási, hanem ökológiai értékével is hozzájárul a kert biodiverzitásához, mivel vonzza a beporzó rovarokat, madarakat.

Grossane olajfa, olíva	**Olea europaea 'Grossane'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Grossane olajfa, olíva (Olea europaea Grossane) az olajfák egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb francia fajtája, amely Provence régiójából, Franciaország délkeleti részéből származik. A Grossane név a provanszál nyelvjárásból ered, és a fajta nagy, húsos termésére utal. Ez a fajta a kiváló íz, a nagy terméséret és a sokoldalú felhasználhatóság hármasát kínálja, ami a házi kertek és a kisüzemi termelés egyik kedvencévé teszi. A Grossane különlegessége, hogy termései egyaránt kiválóan alkalmasak asztali olajbogyónak (tartósításra) és olajpréselésre is, ami ritka tulajdonság az olajfák között.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Grossane közepes termetű, 4-6 méter magas és 3-5 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-7 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Grossane igazi büszkeségei: a bogyók nagyok vagy nagyon nagyok, akár 5-8 grammosak is lehetnek, ovális vagy enyhén tojásdad alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek. Húsuk vastag, lédús, roppanós, enyhén édeskés, alma- és diós jegyekkel, kellemes, nem túl keserű olajbogyóízzel. A Grossane olajhozama közepes, 15-18% körüli, és az olaj minősége jó, lágy, gyümölcsös, enyhén fűszeres. A termések asztali célra is kiválóak: sós lében vagy olajban tartósítva, fűszerezve fogyaszthatók.
Igényei és gondozási útmutató: A Grossane a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és az íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Grossane jól tűri a metszést. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a liszttharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Grossane a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, különösen Provence hangulatát. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad. Provanszi kertekben a levendulával és rozmaringgal alkotott társítása a dél-francia vidék hangulatát idézi.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis), oregánó (Origanum vulgare) és szantolina (Santolina chamaecyparissus) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Grossane mellé ültetett más olajfafajták (például Frantoio, Leccino, Pendolino, Cailletier, Ascolana) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Grossane részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Grossane kiváló választás azok számára, akik egy sokoldalúan felhasználható, nagy, húsos termésű olajfafajtát keresnek, amelyből egyszerre készíthetnek asztali olajbogyót és kiváló minőségű olívaolajat is, miközben a provanszi kertek hangulatát idézi. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Hayward termős kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 900 Ft	6 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Az Actinidia deliciosa (chinensis) ’Hayward’ (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a Actinidia deliciosa (chinensis) ’Tomuri’. A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakurtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes termeszthetősége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna			
Herault Zöld olajfa	Olea europaea 'Verdale de l'Hérault'	5 450 Ft	5 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fajta neve származásának helyéről árulkodik, méghozzá a dél-francia Herault megyére. Rendkívül jó minőségű olajbogyót adó fajta, melynek olaja a legdrágábbak közé tartozik Franciaországban. Terméshozama stabilan magas, ezért ültetvényesek is előszeretettel választják. Öntermékenynek tekinthető, így akár nem szükséges a közelben egyéb fajta legyen, vagy fajták legyenek, de sok éves viszonylatban 10-15%-ot mégis ront a termés mennyiségén ha egyedüli fajta a környéken. Termése átlagos méretű és elég kerekded a formája. Hamar termőrefordul, ültetést követő 4.-5. évben. Ha biztosra akarunk menni, a Picholine-t szokták porzópárjának használni. Április-májusban virágzik és novemberben szüretelikDél-Franciaországban. Az olajfák között az egyik legjobb a hidegtűrése (-15-ig)!
Az olajfák virágai kicsik, fehérek és illatosak. Ezek a virágok a tavaszi hónapokban virágoznak, majd átalakulnak olajbogyókká, amelyek kezdetben zöld színűek. A Heraulti Zöld olajbogyók éretten sötétednek meg és szép, mélyzöld színt öltenek. A Heraulti Zöld olajbogyók rendkívül magas olajtartalommal rendelkeznek, és kiváló minőségű extra szűz olívaolajat állítanak elő. Az olaj különleges gazdag, gyümölcsös ízzel rendelkezik, amely kellemesen keserű és fűszeres jegyekkel párosul. Az extra szűz Heraulti Zöld olívaolajat gyakran salátákhoz, hideg előételekhez és grillezett ételekhez használják. A magas minőségű olaj nagyszerű ízvilággal bír, és kiválóan alkalmas főzéshez is.
Gondozási útmutató:

Fény és hőmérséklet: Az olajfa szereti a napfényt, így ügyeljünk arra, hogy a növény számára biztosítsunk elegendő napsütést. Ideális esetben a növénynek naponta legalább 6-8 órányi napfényre van szüksége. Az olajfa hőigényes, és az ideális hőmérséklet a növekedéshez és terméshez 15-25°C között van.

Öntözés: Az olajfa szárazságtűrő, de az elhúzódó száraz időszakokban rendszeres öntözést igényel. Ügyeljünk arra, hogy a talaj ne száradjon ki túlságosan, de ne is legyen túlzottan nedves. Fontos, hogy a növény ne legyen hosszú időn keresztül vízben álló talajban.

Trágyázás: Az olajfákat évente kétszer trágyázzuk meg, tavasszal és nyáron. Használjunk lassan oldódó ásványi trágyát, amely gazdagítja a talajt az esszenciális tápanyagokkal.

Metszés: Az olajfát évente egyszer metszük meg, általában a téli hónapokban. A metszés segít a növény formájának és méretének ellenőrzésében, valamint a termést is javíthatja.

Betegségek és kártevők: Az olajfa hajlamos lehet néhány betegségre és kártevőre, például liszharmatra vagy olajfavészre. Rendszeresen ellenőrizze a növényt, és szükség esetén alkalmazzon megfelelő kezeléseket.

A Heraulti Zöld olajfa gondozása és termesztése az extra szűz olívaolaj kiemelkedő minőségét biztosítja, és gyönyörű növényként is szolgál a kertben vagy a teraszon. Legyen türelmes a növény gondozásában, és élvezze az ízletes olajbogyók és olívaolaj előnyeit.
8a-10a USDA-zóna

Húsos som	**Cornus mas**	2 950 Ft	2 950 Ft

A Cornus mas (Húsos som) terebélyes, 3-5 méteres bokor, kora tavasszal, lombfakadás előtt nyíló sárga virágzatai igen mutatósak. Korai virágzása miatt az első mézelő növény egyike. Skarlátpiros színű, fényes termései édes-savanykásak, túléretten nyersen is fogyasztható, de finom lekvárt, szörpöt, bort és pálinkát is készíthetünk belőle. Régóta része az emberi táplálkozásnak, sok C-vitamint tartalmaz, ezért aszalva télen felér egy C-vitamin bombával. Edzett, tűrőképes növény, meleg fekvést, meszes talajt kedvel. Fája igen tömör, jól esztergálható, keresett cikk. Sövénynek is alkalmas. Érdekessége, hogy nálunk honos faj, amiről egyes földrajzi neveink is árulkodnak, gondoljunk csak Somogy megyére vagy Som községre. Származási helyének éghajlata a hűvös mérsékelt öv (szűkebb értelemben vett mérsékelt öv), egész éven át kielégítő csapadékkal, télen erősebb fagyokkal. Ez az öv a lombhullató mérsékelt övi erdők területe. Kifejezetten igénytelen növény, ezért a telepítést követően gondozásra nem szorul.

5a-9b USDA-zóna

Josta	**Ribes × nidigrolaria (Josta)**	3 450 Ft	3 450 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Josta bokor akár 1-2 méter magasra is megnőhet, széles és bokros szerkezettel. A levelek formája hasonlít a fekete ribizliére, de méretük nagyobb, textúrájuk pedig valamivel durvább. Apró, fehér színű virágok jelennek meg tavasszal, melyek vonzóak a beporzó rovarok számára. A gyümölcsök nagyobbak, mint a fekete ribizli, általában 1-3 cm átmérőjűek. Színük sötétkék vagy majdnem fekete, kívül fényes, belül lédús hússal. Az íze egyedi keveréke a fekete ribizli édes-savanykás és az egres pikáns ízvilágának.

Nagyon termékeny, könnyen terem, évente nagy mennyiségű gyümölcsöt hoz.
Ellenállóbb a betegségekkel és a kártevőkkel szemben, mint a szülőfajták.
Alacsony karbantartást igényel, nem szükséges speciális metszés vagy bonyolult gondozás.
Magas a C-vitamin, antioxidánsok, és egyéb fontos mikroelemek tartalma.

Friss fogyasztásra, lekvárok, szörpök, piték készítésére kiváló. Dekoratív megjelenése miatt dísznövényként is funkcionálhat a kertben.
Ültetés és Gondozás

Fényigény: Napos vagy félárnyékos hely idealis.
Talajigény: Jól lecsapolt, tápanyagban gazdag talajt igényel, pH-érték tekintetében nem különösebben válogatós.
Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen száraz időszakokban.

A Josta ötvözi a gyümölcstermesztés praktikumát a kertészeti esztétikummal, így tökéletes választás lehet minden kertbe, ahol egyszerre keresnek szemet gyönyörködtető és ízletes gyümölcsöket.

Kalamondin hibridnarancs	**Citrus x calamondrin**	19 500 Ft	22 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kalamondin hibridnarancs (Citrus × microcarpa) – A kompakt, illatos termésű citrus

A kalamondin hibridnarancs a rutafélék (Rutaceae) családjába tartozó, hibrid eredetű örökzöld cserje vagy kis fa. A növény a mandarin (Citrus reticulata) és a kumkvat (Fortunella japonica) kereszteződéséből jött létre. A faj a Fülöp-szigetekről és Délkelet-Ázsiából származik, ahol évtizedek óta termesztik kereskedelmi mennyiségben. A nemzetség névadója a Citrus, a fajnév (microcarpa) pedig a latin "kis termésű" jelentésű szóból ered, ami a növény apró, de annál intenzívebb ízű termésére utal. Ez a citrusféle a kompakt méretével, az illatos virágaival és a dekoratív, ehető terméseivel az egyik legkedveltebb konténeres citrus a mérsékelt éghajlatú kertekben és lakásokban. A könnyű gondozhatósága és a rendkívüli hasznosíthatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kalamondin hibridnarancs egy sűrű, bokros növekedésű, örökzöld cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 2,5-4 méter, szélessége 1,5-2,5 méter között alakul, de konténerben nevelve általában kisebb marad. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtásokon néha rövid, vékony tövisek találhatók. Növekedési erélye közepes, a végleges méret eléréséhez 5-10 év szükséges.

A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek elliptikusak vagy tojásdadok, 3-8 cm hosszúak, fényes, sötétzöld színűek, bőrszerűek, a levélnyélen apró, szárnyas függelék található. A levelek megdörzsölve kellemes, citrusos illatot árasztanak, ami a növény egyik jellegzetessége.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a levélhónaljakban, magányosan vagy kis csoportokban jelennek meg. A virágok 1-2 cm átmérőjűek, csillag alakúak, öt szirommal, fehér színűek, néha halványlila árnyalattal a külső oldalon, illatosak. A virágzási időszak a tavasztól a nyárig tart, de a növény az év során 4-5 alkalommal is virágozhat, így gyakran láthatóak egy időben a virágok és az érett termések is. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, 3-4 cm átmérőjű terméseket fejleszt, amelyek kezdetben zöldek, majd éréskor narancssárgára színeződnek. A termések vékony, édes héjjal rendelkeznek, míg a belső hús rendkívül savanyú és lédús, íze a citromra és a lime-ra emlékeztet. A termések akár egy évig is érhetnek a fán, és hosszú ideig megmaradnak. A növény magról és vegetatív úton (félfás dugványozással) egyaránt szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kalamondin hibridnarancs napos fekvést igényel a legszebb, legbőségesebb virágzáshoz és terméshozáshoz. Félárnyékban is fejlődik, de a virágzás és a terméskötés gyengébb lehet. A napi minimum 6 óra közvetlen napsütés javasolt.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, savanyú vagy semleges kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a talaj folyamatos, mérsékelt nedvességét igényli. Ültetéskor érdemes a virágföldet homokkal vagy perlittel keverni a jobb vízelvezetés érdekében, és a cserép alján vízelvezető réteget kialakítani.

Öntözés: A kalamondin hibridnarancs közepes vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, de a két öntözés között hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes vagy magas tápanyagigényű. A vegetációs időszakban (tavasztól őszig) 2-4 hetente adjunk neki citrusok számára kifejlesztett folyékony műtrágyát. Télen, a nyugalmi időszakban a tápanyag-utánpótlást csökkentsük vagy szüneteltessük.

Metszés és ápolás: A kalamondin hibridnarancs alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal elvégezhető. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat. Konténerben nevelve a metszés segít a kompakt méret fenntartásában.

Telelés és fagytűrés: A kalamondin hibridnarancs fagyérzékeny. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik az -1°C és -7°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok elpusztítják. Magyarországon a növényt konténerben, védett, hűvös (5-10°C), világos helyen kell teleltetni. A teleltetés idején a növényt szinte szárazon kell tartani. A következő tavasszal, a fagyok elmúltával (április vége-május) tehető ismét ki a szabadba, fokozatosan szoktatva a napfényhez.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Felhasználás a kertben (alkalmazási területek) A kalamondin hibridnarancs a kompakt méretének, az illatos virágainak, a dekoratív terméseinek és a sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően az egyik legkedveltebb konténeres citrus: Konténerekbe, cserepekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a díszítő érték miatt kiválóan nevelhető konténerben. Szobanövényként lakásokba, irodákba, télikertekbe, üvegházakba – a növény a melegebb hónapokban kivihető a szabadba, télen pedig védett helyen tartható. Dísznövényként ágyásokba, szegélyekbe – a melegebb éghajlatú területeken szabadföldön is nevelhető, akár sövényként is. Gyümölcstermő növényként – a termések sokoldalúan felhasználhatók a konyhában: italok, mártások, lekvárok, chutney-k, valamint hal- és húsételek ízesítésére. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A kalamondin hibridnarancs sötétzöld lombozata és narancssárga termései számos más növénnyel kombinálhatók: Más citrusfélékkel: Citrommal, lime-mal, kumkvattal – a hasonló termesztési igények miatt jól társíthatók, és a különböző terméssznek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek. Mediterrán hangulatú növényekkel: Levendulával, rozmaringgal, olajfával – a hasonló szárazságtűrés és a mediterrán hangulat miatt kiváló társnövények. Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a növény narancssárga terméseit. Virágos növényekkel: Muskátlival, petúniával – a konténeres kompozíciókban a virágok színei kiegészítik a citrus terméseit. USDA besorolása: 8b-11 (Magyarországon a kalamondin hibridnarancs fagyérzékeny; az USDA 8b-11-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) konténerben, védett, hűvös (5-10°C), világos helyen teleltetve nevelhető biztonságosan. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -1°C és -7°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok elpusztítják.)			
Kínai szelídgesztenye	**Castanea mollissima**	4 950 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Kínai szelídgesztenye (Castanea mollissima) Kelet-Ázsia erdeinek őshonos fája, amely az elmúlt évtizedekben világszerte népszerűvé vált a nemes gesztenye (Castanea sativa) helyettesítésére, mivel kiváló ellenálló képességgel rendelkezik a gesztenyefák egyik legveszélyesebb betegségével, a kéregrákkal szemben. Ez a faj a kiváló ízű termések, a megbízható növekedés és a kivételes télállóság hármasát kínálja, miközben viszonylag igénytelen és könnyen kezelhető.
Kifejlett mérete és megjelenése: A kínai szelídgesztenye közepes vagy nagyobb termetű, 8-12 méter magas és 6-10 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik, ami bőséges árnyékot biztosít. Levelei közepes méretűek, 8-15 cm hosszúak, elliptikus vagy lándzsás alakúak, szélük finoman fogazott, felületük fényes, sötétzöld, fonákjukon puha, ezüstös szőrzet található (innen a mollissima név, ami latinul nagyon puha jelentésű). Ősszel a levelek sárgásbarna árnyalatot öltenek. A virágok nyár elején, június környékén nyílnak: a fa hosszú, sárgásfehér barkavirágzatokat hoz, amelyek a szélbeporzású növény hímvirágai. A termések a növény igazi büszkeségei: ősszel, szeptember-októberben érnek be, a tipikus sündisznószerű, tüskés kupacsokban. A kupacsok közepes méretűek, a tüskék sűrűk, de rövidebbek és puhábbak, mint a nemes gesztenyéé, ami miatt könnyebb őket kezelni. A kupacsok általában 2-3 termést tartalmaznak. A gesztenyék közepesen nagyok vagy nagyok, 10-20 grammosak, gömbölyded vagy enyhén lapított alakúak, héjuk sötétbarna, fényes. Belsejük világossárga, szilárd, édes, kellemes gesztenyeízzel, a nemes gesztenyéhez hasonló, de gyakran még édesebb. A kínai szelídgesztenye különösen alkalmas sütésre, főzésre és gesztenyepüré készítésére.
Igényei és gondozási útmutató: A kínai szelídgesztenye a legszebb terméseit teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza, de a bőséges terméshez a napos fekvés az ideális. Talajban a jó vízelvezetésű, enyhén savanyú vagy semleges (pH 5,5-7,0), közepesen tápanyagú, mély rétegű talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött és a nagyon meszes talajokat nem tűri jól. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a gesztenyék növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású gyümölcsfa műtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: fiatal korban a koronaformázó metszés, idősebb korban a ritkító és egészségügyi metszés (elhalt, sérült, egymást keresztező ágak eltávolítása) javasolt. A legfontosabb tudnivaló: a kínai szelídgesztenye részben önbeporzó, de a bőséges terméshez két különböző genetikájú fa szükséges egymás közelében. Kiváló télállósággal rendelkezik, akár -25 °C-ig is ellenáll, így Magyarország legtöbb régiójában takarás nélkül teleltethető.
Kertstílus és növénytársítások: A kínai szelídgesztenye méretéből adódóan nagyobb kertekbe, parkokba és tájkertekbe illik. Házi kertekben és nagyobb gyümölcsösökben a gyümölcsfák között is megfér, különösen ha van elegendő hely. Tájkertekben és angolkertekben a szétterülő, impozáns koronája miatt kiváló szoliter fa. Természetes kertekben és erdőszéli kertekben a termések vonzzák a madarakat és más állatokat. Mint haszonfa, a gesztenyetermesztés kedvelőinek nélkülözhetetlen eleme.
Változatos növénytársítások: Beporzó partnerek: A kínai szelídgesztenye mellé mindenképpen ültessünk egy másik gesztenyefajtát vagy magoncot a bőséges termés biztosításához. A nemes gesztenye (Castanea sativa) is megfelelő beporzó lehet, ha virágzási idejük egybeesik. Alacsony cserjékkel: A fa alá vagy köré ültetett alacsony díszcserjék, mint a levendula (Lavandula), borbolya (Berberis) vagy a csodabogyó (Gaultheria) takarják a csupasz talajt, miközben vonzzák a beporzó rovarokat. Árnyéktűrő évelőkkel: A fa alatti árnyékos részekbe ültethetünk páfrányokat, árnyékliliomokat (Hosta), erdei gyöngyvirágot (Convallaria majalis) vagy kárpáti harangvirágot (Campanula carpatica), amelyek szépen díszlenek a fa alatt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a gesztenye lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszalmával vagy más virágzó fákkal: A gesztenye mellé ültetett díszalma (Malus) vagy díszcseresznye (Prunus) tavasszal látványos virágzásával, ősszel pedig termésével egészíti ki a gesztenye impozáns megjelenését. Gyümölcsfákkal: Alma, körte vagy szilva mellé ültetve egy vegyes gyümölcsös részeként is megállja a helyét, de ügyeljünk a megfelelő távolságokra.
A kínai szelídgesztenye kiváló választás azok számára, akik egy ízletes, édes gesztenyét keresnek, és szeretnének ellenálló, betegségekkel szemben védett fát ültetni, amely ráadásul a nemes gesztenyénél jobban tűri a hideg teleket.
Észak-Kínában és a Koreai-félszigeten honos szelídgesztenye az európai fajt sújtó fertőzésekkel szemben, teljesen ellenálló és a termésének a mérete is lényegesen nagyobb. A télállósága hasonló az európai rokona hidegtűréséhez.

6b USDA-zóna

Kökény	Prunus spinosa	3 950 Ft	3 950 Ft

Rendkívül igénytelen, jó szárazságtűrő, tövises ágú cserje. Termése ehető. A Prunus spinosa, más néven Kökény, sokoldalú kerti növény, amely a rózsafélék családjába tartozik. Ez a kis fa vagy bokor rendkívül népszerű a kertészek és természetkedvelők körében, mivel számos előnnyel rendelkezik. A kökény cserje mérete általában 2-4 méter magas, így kiválóan alkalmas kertekbe és parkokba, de még kisebb területeken is elfér. A növény levelei elliptikusak és sötétzöldek, amelyek kellemes látványt nyújtanak az év többi részében. Azonban igazi csodát jelent a tavaszi virágzása. A kökény virágai apró, fehér vagy rózsaszín szirmokkal rendelkeznek, és tömegesen borítják a növényt. A virágzás ideje alatt a kökény gyönyörű látványt nyújt, és vonzza a méheket és más beporzó rovarokat. Ezáltal hozzájárul a biodiverzitás támogatásához a kertben. Az igazi érték azonban a Kökény termésében rejlik. A kökény termései, apró, kerek, sötétlila színűek, és az ősszel érik el teljes érettséget, ilyenkor édesek lesznek. Ezek az ízletes gyümölcsök gazdagok C-vitaminban és antioxidánsokban, és számos egészségügyi előnnyel járnak. A kökénygyümölcsök felhasználhatók lekvárok, szirupok, likőrök és más finom ételek és italok készítéséhez. A Prunus spinosa könnyen gondozható és ellenálló növény. Általában szereti a napos vagy félárnyékos helyeket és a jó vízelvezetéssel rendelkező talajt. Az elültetést követően a megfelelő öntözés és a rendszeres metszés segíti a növény egészséges növekedését és a termés bőségét. Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy a kökény egy hasznos növény a kertben, mivel védőtövises ágai kiválóan alkalmasak sövények kialakítására, amelyek hatékonyan határolják a területeket és biztosítják a magánéletet. Állatok kívűl tartására is rendkívűl alkalmas természetes telekhatárt alakíthatunk ki belőle.

Lars SC 215 dán mogyoró	Corylus Lars SC 215	8 950 Ft	8 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Lars SC 215 dán mogyoró (Corylus Lars SC 215) a mogyorófajták egyik legkiválóbb képviselője, amelyet Dániában nemesítettek kifejezetten a házi kertek és kisüzemi gyümölcsösök számára. Ez a fajta a kiváló íz, a nagy termésméret és a megbízható, bőséges hozam hármasát kínálja, miközben viszonylag igénytelen és könnyen kezelhető.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Lars SC 215 közepes termetű, 3-5 méter magas és 2-4 méter széles bokorrá vagy kis fává fejlődik. Koronája közepesen sűrű, ágai enyhén szétterülők, ami megkönnyíti a termések szüretelését. Levelei kerekdedek, szélük kétszeresen fűrészes, élénkzöld színűek, ősszel sárgás árnyalatot öltenek. Tavasszal, február-március környékén, még a lombfakadás előtt hosszú, csüngő barkavirágzatokat hoz, amelyek a szélbeporzású növény hímvirágai. A termések szeptember-októberben érnek be: nagy méretűek, kerekded vagy tojásdad alakúak, héjuk vékony, törékeny, könnyen törhető. A bele valódi csemege: nagy, krémszínű, rendkívül ízletes, édeskés, kellemes mogyoróaromával.
Igényei és gondozási útmutató: A dán mogyoró a legjobb terméshozamot teljes napos helyen hozza, de félárnyékban is fejlődik, ilyenkor azonban a termés mennyisége kisebb lehet. Talajban a mély rétegű, jó vízelvezetésű, közepesen tápanyagú, enyhén meszes vagy semleges kémhatású talajokat kedveli. A pangó vizet, a nagyon savanyú és a túlzottan kötött talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete megfelelően ki nem fejlődik. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése fontos: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat, valamint ritkítsuk meg a túl sűrű koronát a jobb szellőzés és termésérés érdekében. A legfontosabb tudnivaló: a mogyoró nem önbeporzó! Két különböző genetikájú fajtára van szükség a bőséges terméshez. A Lars SC 215 kiváló partner lehet a Halle`s Riesen, a Webbs Prize, a Cosford vagy a Barcelona fajták.
Kertstílus és növénytársítások: A Lars SC 215 sokoldalúságának köszönhetően több kertstílusba is remekül illeszkedik. Házi kertekben és falusi kertekben a hagyományos gyümölcsös hangulatát erősíti, miközben hasznos, ehető hozamot biztosít. Természetes és vadas kertekben a bokor formája és a termések vonzzák a madarakat és más állatokat. Gyűjteményes kertekben a ritka, nemesített fajták között is megállja a helyét. Permakultúrás kertekben a réteges növénytársítások kiváló eleme lehet.
Változatos növénytársítások: Beporzó partnerek: A Lars SC 215 mellé mindenképpen ültessünk egy másik mogyorófajtát, például Halle`s Riesen, Webbs Prize, Cosford, Barcelona vagy más, eltérő virágzási idejű fajtát. Ezek egymást beporozva hoznak bőséges termést. Alacsony évelő kísérők: A bokor tövébe ültethetünk levendulát (Lavandula angustifolia), macskamentát (Nepeta), kakukkfüvet (Thymus) vagy szamócát (Fragaria), amelyek takarják a csupasz talajt, miközben vonzzák a beporzó rovarokat. Magasabb háttérnövények: A mogyoró mögé ültethetünk magasabb gyümölcsfákat, például almát, körtét vagy szilvát, amelyek árnyékot adnak a mogyoró gyökereinek, miközben a mogyoró a szélfogó szerepét is betöltheti. Őszi hangulatú társítások: A sárgára színeződő őszi levelek mellé ültetett díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a pampuszfű (Cortaderia) gyönyörű őszi kompozíciót alkotnak. Tavasszal virágzó hagymások: A mogyoró tövébe ültetett krókuszok (Crocus), hóvirágok (Galanthus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a lombok kinyílása előtt vidám színfoltot jelentenek.
A Lars SC 215 kiváló választás azok számára, akik szeretnék saját, egészséges és ízletes mogyorójukat szüretelni, miközben egy szép, közepes méretű bokrot nevelnek a kertben. USDA besorolása: 4-8.

Li kínai datolya	Ziziphus jujuba 'Li'	9 950 Ft	9 950 Ft

Egy újabb „rejtély-növény”, ugyanis teljesen érthetetlen, hogy hazánkban miért nem terjedt el, hiszen teljesen télálló és klímánk egyéb adottságai is tökéletesen megfelelnek számára. A kínai datolya, mint neve is mutatja, Kínából származik, ahol már 4000 (!) évvel ezelőtt termesztették és ahol jelenleg már 400 fölött van fajtáinak száma. Napjainkban Oroszországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Dél-Európában és az USA délnyugati részén is számottevő mennyiségben termesztik. Az alapfaj termése kicsi, nem lédús, teljes érésben inkább cukrozott fűrészpornak tűnik, ez lehet az oka, hogy nem sokan kívánták meg eddig nálunk. Nemesített fajtái viszont finomak, lében gazdagabbak, édesek, termesztésre tényleg érdemesek lennének, nem utolsósorban gazdag C-vitamin tartalmuk miatt is. Az ázsiai kultúrákban teáját évezredek óta gyógyításra is használják, pl. torokfájás esetén. A növény kezdetben kis kerekded cserje, majd kisebb fává is cseperedhet. Lombozata igen mutatós, viszonylag kis levelei csillogóan fénylő élénkzöldek. Virágai kicsik, zöldessárgák, enyhén illatosak, késő tavasztól kora nyárig nyílnak. A késő tavaszi fagyok nem ártanak neki, mert lombfakadása is elég késői. Termesztésére bármilyen átlagos adottságú terület megfelelő, sőt a szárazságot kifejezetten jól tűri! A ’Li’ az egyik legkorábban érő fajta, már augusztus közepén szedhető. Gömbölyű termései zöldessárgák, nagy méretűek, elsősorban friss fogyasztásra ajánlhatók. Fája keskeny, felfelé törekvő, sűrűn ágas, kissé tövises. 6a-9b USDA-zóna

Lila termésű gránátalma	Punica granatum 'Fruits Violets'	9 900 Ft	13 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A lila termésű gránátalma a gránátalmafélék családjába tartozó, Délnyugat-Ázsiából származó, lombhullató cserje vagy kis fa nemesített, díszváltozata. A 'Fruits Violets' fajtát a francia Pépinières Baud nemesítő cég hozta forgalomba, és az egyik legkülönlegesebb termésszínű gránátalma a kertekben. A fajta a 'Fruits Noirs' (fekete termésű) változathoz hasonló, de annál világosabb, lilás színű termésekkel rendelkezik. Ez a növény a nyári élénk virágzásával és az őszi, feltűnő lila terméseivel az egyik legkedveltebb díszcserje a mediterrán hangulatú kertekben és konténerekben. A könnyű gondozhatósága, a kiváló szárazságtűrése és a különleges termésszíne miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A lila termésű gránátalma egy kompakt, sűrűn elágazó, bokros habitusú, lombhullató cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 1,5-2,5 méter, szélessége 1-2 méter között alakul, ami a fajtát kifejezetten kompakt, kisebb kertekbe és konténerekbe is alkalmassá teszi. Növekedési erélye közepes, a korona sűrű, zárt. A kéreg szürkésbarna, idősebb korban repedezett. A hajtások végein néha vékony, rövid tövisek találhatók.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek egyszerűek, átellenesek, lándzsásak vagy hosszúkás-elliptikusak, 3-8 cm hosszúak, fényes sötétzöld színűek, a levél széle ép. A lombozat a nyár folyamán dekoratív, ősszel a levelek sárgás árnyalatokat öltenek, mielőtt lehullanának.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a levélhónaljakban magányosan vagy kettesével-hármasával jelennek meg. A virágok nagyok, 2-4 cm átmérőjűek, csésze alakúak, öt-nyolc szirommal, élénk narancsvörös vagy pirosas színűek, feltűnő porzókkal. A virágzási időszak a nyár közepétől a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően június-szeptember között, de a virágzás akár az első fagyokig is elhúzódhat.
A növény legnagyobb díszét a termések adják. A virágzást követően a növény gömbölyded, 5-8 cm átmérőjű, kemény héjú terméseket fejleszt, amelyek a 'Fruits Violets' fajtánál feltűnő lilás vagy sötétlila színűek, ami a gránátalmák között ritkaságnak számít. A termések ősszel (szeptember-október) érnek be, és a fán hosszú ideig (akár télig) megmaradnak, ami a növényt a késő őszi és téli időszakban is dekoratívvá teszi. A termések ehetőek, de a 'Fruits Violets' fajta elsősorban díszértékű: a termések íze savanyú, ezért friss fogyasztásra kevésbé alkalmasak, inkább díszítő jellegük miatt értékesek.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

· Fényigény: A lila termésű gránátalma napos, meleg, szélvédett fekvést igényel; a legszebb, legbőségesebb virágzást és terméshozamot teljes napsütésben hozza. Félárnyékban a virágzás és a terméskötés gyengébb lehet.
· Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, meszes, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után jól tűri.
· Öntözés: A lila termésű gránátalma közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja. A túlöntözés kerülendő.
· Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, gyümölcscserjék vagy díszcserjék számára kifejlesztett műtrágya.
· Metszés és ápolás: A lila termésű gránátalma alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a formázó és tisztító metszés kora tavasszal (február-március) elvégezhető. A következő metszési műveleteket végezzük:
  · Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy keresztező ágakat.
  · Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat.
  · Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növényeket erőteljesen is visszavághatjuk tavasszal, hogy serkentsük az új, fiatal hajtások képződését.
· Telelés és fagytűrés: A lila termésű gránátalma mérsékelten télálló; az USDA 7-10-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok károsíthatják. Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a fiatal példányok tövét télen vastag mulccsal takarni. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A lila termésű gránátalma a különleges termésszínének, a nyári élénk virágzásának, a kompakt méretének és a mediterrán hangulatának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserje a kertekben és parkokban:

· Szoliter növényként – a kompakt habitus és a látványos termések miatt kiváló magányos díszelem.
· Konténerekbe, dézsákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a díszítő érték miatt kiválóan nevelhető konténerben is.
· Mediterrán hangulatú kertekbe, sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – a szárazságtűrés és a délies hangulat miatt kiváló választás.
· Vegyes cserjeágyásokba, előkertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok és termések vonzzák a madarakat és a beporzó rovarokat.
· Téli kertekbe, üvegházakba – a konténerben nevelt növények a hidegebb hónapokban védett helyen tarthatók.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)

A lila termésű gránátalma narancsvörös virágai és lila termései számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

· Levendulával, rozmaringgal, kakukkfűvel – a mediterrán hangulatú növényekkel együtt harmonikus, illatos együttest alkotnak.
· Ezüstös levelű növényekkel: Ürröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a termések lila színét.
· Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis) – a narancsvörös és a sárga virágok meleg, napsütötte hatást keltenek.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

· Örökzöld cserjékkel és tűlevelűekkel – a sötétzöld háttér kiemeli a termések lila színét.

USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a lila termésű gránátalma mérsékelten télálló; az USDA 7-es, 8-as, 9-es és 10-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) védett, szélvédett helyen, takarással nevelhető. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok károsíthatják.)

Lótusz szilva	**Diospyros lotus**	4 250 Ft	4 250 Ft

10 m-re növő, fénylő sötétzöld lombú, egzotikus megjelenésű fa, cseresznye nagyságú, ehető termésekkel. Nagytermésű rokonának, a Diospyros kakinak alanyaként is szolgál. Kétlaki növény, így porzós és termős egyedet is kell ültetnünk a biztos termés érdekében. Mivel a növényeket magról szaporítjuk, így a nemük nem ismert, ezért többet is célszerű ültetnünk, hogy biztosan mindkét nem meglegyen. Később csak a szükséges két egyedet meghagyva a termés biztosított, a fölösleges növényeket pedig kiáshatjuk és máshova is elültethetjük, vagy ügyesebb kezűek a D. kakival való átoltásukkal is megpróbálkozhatnak!

6b-9b USDA-zóna

Lucques (Lucca) olíva, olajfa	**Olea europaea 'Lucques'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Lucques (Lucca) olíva, olajfa (Olea europaea Lucques) az olajfák egyik legkiválóbb és legkeresettebb asztali fajtája, amely Franciaország déli részéről, Languedoc régióból származik. A Lucques név a Hérault megyében található Luc-sur-Orbieu településre utal, ahol ezt a fajtát hagyományosan termesztik. Ez a fajta a kiváló íz, a különleges formájú termés és a megbízható hozam hármasát kínálja, ami a gasztronómiai célú olajbogyó-termesztés egyik kedvencévé teszi. A Lucques olajbogyóit gyakran a világ legjobb asztali olajbogyójaként emlegetik.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Lucques közepes termetű, 4-6 méter magas és 3-5 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, 4-7 cm hosszúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek, a szárazsághoz és a napsütéshez alkalmazkodtak. A virágok tavasszal, május-június környékén nyílnak: aprók, fehérek, illatosak, kis fürtökbe rendeződnek. A termések a Lucques igazi büszkeségei: a bogyók közepesen nagyok, 4-6 grammosak, jellegzetesen félhold alakúak vagy enyhén görbültek, oválisak, éréskor zöldek, majd sötétlilára vagy feketére színeződnek. A Lucques egyik legnagyobb különlegessége, hogy hagyományosan zöld állapotban szüretelik, amikor a legjobb az ízük. Húsuk vastag, roppanós, lédús, enyhén édeskés, mandulás, diós jegyekkel, kellemes, nem keserű olajbogyóízzel. A Lucques olajhozama alacsony, ezért olajpréselésre nem ajánlott, kizárólag asztali célra termesztik.
Igényei és gondozási útmutató: A Lucques a legszebb formáját és a legbőségesebb termését teljes napos, meleg, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és a kiváló íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos, kavicsos vagy akár sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a bogyók növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású műtrágyával gondoskodhatunk. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: a cél a korona ritkítása, a levegős szerkezet biztosítása, a termőrészek serkentése és a fa megfiatalítása. A Lucques jól tűri a metszést. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első 3-5 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni a kemény fagyoktól. A fa akár -10 °C-ig is ellenáll, de a tartós -12 °C alatti hideg károsíthatja. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül az olajbogyó-légy, a pajzstetvek, a levéltetvek és az olajbogyó-moly okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás, a lisztharmat, a peacock foltosság és a baktériumos daganat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Lucques a mediterrán kertek nélkülözhetetlen eleme. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű, füge és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, különösen a dél-francia vidék hangulatát. Déli fekvésű teraszokon és belső udvarokban nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Tájkertekben és kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a szürkészöld, ezüstös lombozat izgalmas textúrát és színt ad. Gasztronómiai kertekben a kiváló minőségű asztali olajbogyó termesztésére kifejezetten ajánlott.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: Az olajfa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis), oregánó (Origanum vulgare) és szantolina (Santolina chamaecyparissus) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Más olajfafajtákkal: A Lucques mellé ültetett más olajfafajták (például Frantoio, Leccino, Pendolino, Cailletier, Grossane) elősegíthetik a keresztbeporzást és növelhetik a terméshozamot, bár a Lucques részben önbeporzó. Más mediterrán fákkal és cserjékkel: Füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum), ciprus (Cupressus sempervirens) vagy magyaltölgy (Quercus ilex) mellett ültetve egy igazi déli kert hangulatát kelthetjük. Alacsony talajtakarókkal: Az olajfa alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még az olajfa lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszfüvekkel: Az olajfa ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa).
A Lucques kiváló választás azok számára, akik a világ egyik legjobb asztali olajbogyóját szeretnék saját kertjükben termeszteni, és egy különleges, félhold alakú, roppanós, mandulás ízű olajbogyófajtát keresnek, amely a dél-francia kertek hangulatát idézi. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Marsol eurázsiai hibrid szelídgesztenye	**Castanea sativa x mollissima 'Marsol'**	16 500 Ft	16 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Marsol Eurázsiai hibrid szelídgesztenye (Castanea sativa x crenata Marsol) a gesztenyefajták egyik legmegbízhatóbb és legkedveltebb képviselője, amelyet Franciaországban nemesítettek a nemes gesztenye (Castanea sativa) és a japán gesztenye (Castanea crenata) keresztezésével. Ez a hibrid a két faj legjobb tulajdonságait ötvözi: a nemes gesztenye kiváló ízét és a japán gesztenye betegség-ellenállóságát, valamint a hibrid erélyt. A Marsol különösen a bőséges, megbízható hozamáról és a termések kiváló ízéről ismert, ami a kereskedelmi termelésben és a házi kertekben egyaránt népszerűvé teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Marsol közepes vagy nagyobb termetű, 8-10 méter magas és 6-8 méter széles fa. Koronája szétterülő, kerekded, idősebb korban széles, ernyőszerűvé válik, ami bőséges árnyékot biztosít. Levelei közepes méretűek vagy nagyok, 10-18 cm hosszúak, elliptikus vagy lándzsás alakúak, szélük finoman fogazott, felületük fényes, sötétzöld, a hibrid erélynek köszönhetően dús lombozatot képez. Ősszel a levelek sárgásbarna árnyalatot öltenek. A virágok nyár elején, június környékén nyílnak: a fa hosszú, sárgásfehér barkavirágzatokat hoz. A termések a növény igazi büszkeségei: ősszel, szeptember-októberben érnek be, a tipikus sündisznószerű, tüskés kupacsokban. A kupacsok közepes vagy nagy méretűek, a tüskék sűrűk, de a japán gesztenye örökségeként kevésbé szúrósak, mint a nemes gesztenyéé. A kupacsok általában 2-3 termést tartalmaznak. A gesztenyék nagy méretűek, 15-25 grammosak, lapított gömb vagy szív alakúak, héjuk világos- vagy sötétbarna, fényes, jellegzetesen csíkozott. A Marsol egyik nagy előnye, hogy a belső hártya (episperm) vékony és viszonylag könnyen eltávolítható. Belsejük világossárga vagy krémszínű, szilárd, rendkívül édes, kellemes, aromás gesztenyeízzel, a nemes gesztenyéhez hasonlóan kiváló minőségű. Kiválóan alkalmas sütésre, főzésre, gesztenyepüré készítésére, de nyersen is fogyasztható.
Igényei és gondozási útmutató: A Marsol a legszebb terméseit teljes napos vagy félárnyékos helyen hozza, de a bőséges terméshez a napos fekvés az ideális. Talajban a jó vízelvezetésű, enyhén savanyú vagy semleges (pH 5,5-7,0), közepesen tápanyagú, mély rétegű talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött és a nagyon meszes talajokat nem tűri jól. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a gesztenyék növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy lassú felszívódású gyümölcsfa műtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: fiatal korban a koronaformázó metszés, idősebb korban a ritkító és egészségügyi metszés (elhalt, sérült, egymást keresztező ágak eltávolítása) javasolt. A legfontosabb tudnivaló: a Marsol részben önbeporzó, de a bőséges terméshez két különböző genetikájú fa szükséges egymás közelében. Kiváló beporzó partner lehet a Bouche de Betizac, a Marigoule, a Bournette vagy más hibrid fajták. Jó télállósággal rendelkezik, akár -20 °C-ig is ellenáll, de a fiatal fákat érdemes az első években takarni.
Kertstílus és növénytársítások: A Marsol méretéből adódóan nagyobb kertekbe, parkokba és tájkertekbe illik. Házi kertekben és nagyobb gyümölcsösökben a gyümölcsfák között is megfér, különösen ha van elegendő hely. Tájkertekben és angolkertekben a szétterülő, impozáns koronája miatt kiváló szoliter fa. Természetes kertekben és erdőszéli kertekben a termések vonzzák a madarakat és más állatokat. Mint haszonfa, a gesztenyetermesztés kedvelőinek nélkülözhetetlen eleme. A Marsol megbízható hozama miatt kisüzemi termelésre is alkalmas.
Változatos növénytársítások: Beporzó partnerek: A Marsol mellé mindenképpen ültessünk egy másik gesztenyefajtát a bőséges termés biztosításához. Jó választás a Bouche de Betizac, a Marigoule, a Bournette vagy más hibrid fajták. Alacsony cserjékkel: A fa alá vagy köré ültetett alacsony díszcserjék takarják a csupasz talajt, miközben vonzzák a beporzó rovarokat. Árnyéktűrő évelőkkel: A fa alatti árnyékos részekbe ültethetünk páfrányokat, árnyékliliomokat (Hosta), erdei gyöngyvirágot (Convallaria majalis) vagy kárpáti harangvirágot (Campanula carpatica), amelyek szépen díszlenek a fa alatt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a gesztenye lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek. Díszalmával vagy más virágzó fákkal: A gesztenye mellé ültetett díszalma (Malus) vagy díszcseresznye (Prunus) tavasszal látványos virágzásával, ősszel pedig termésével egészíti ki a gesztenye impozáns megjelenését. Gyümölcsfákkal: Alma, körte vagy szilva mellé ültetve egy vegyes gyümölcsös részeként is megállja a helyét, de ügyeljünk a megfelelő távolságokra.
A Marsol kiváló választás azok számára, akik egy megbízható, bőségesen termő, kiváló ízű hibrid gesztenyét keresnek, amely betegségekkel szemben ellenálló, és a Bouche de Betizac-hoz hasonlóan kiváló minőséget képvisel. USDA besorolása: 6-9.

6b USDA-zóna

Mirtuszfüge, Fidzsoa	**Acca sellowiana**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Fidzsoa, más néven Mirtuszfüge vagy Brazil guáva, Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi vidékeiről – Brazília, Uruguay, Paraguay, Argentína – származó örökzöld gyümölcscserje. A mirtuszfélék családjába tartozó növény egzotikus megjelenésével és különleges, ananász-eper ízű termésével egyre népszerűbb a hazai kertekben.
Örökzöld, bokros növekedésű cserje vagy kis fa, amely kifejlett állapotban 2-5 méter magas és 2-3 méter széles lehet. Növekedési üteme lassú, ami miatt dézsás tartásra is kiválóan alkalmas. Levelei átellenesek, tojásdadok vagy elliptikusak, 3-7 cm hosszúak, bőrszerűek, felszínük fényes sötétzöld, fonákjuk ezüstösen molyhos, ami jellegzetes, kékeszöld fényt kölcsönöz a növénynek.
A növény virágzása káprázatos látvány. Május-június folyamán a levelek hónaljában nyíló, 3-4 cm átmérőjű, húsos, fehér szirmú virágok jelennek meg. A négy húsos szirom színe krémszínű, középen pedig a feltűnő, hosszú, bíborvörös porzók díszlenek, amelyek a virágot egzotikus megjelenésűvé teszik. A virágok ehetőek, édeskés, kellemes ízűek, salátákba, desszertekbe is felhasználhatók.
A virágokat követően ősszel, október-novemberben érnek meg a termések. A fidzsoa termése tojás vagy körte alakú, 3-6 cm hosszú, felülete zöld, néha lilás beütéssel, gyakran viaszos bevonattal. A termés belseje krémes, áttetsző, lédús, apró magokkal tarkított. Illata intenzív, frissítő, íze az ananász, eper, guáva és menta keverékére emlékeztet. A termést félbevágva kanalazzuk ki, vagy a héjával együtt fogyaszthatjuk.
Igényei és gondozása
A Fidzsoa napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legjobb terméshozamot teljes napsütésben hozza, de félárnyékot is elfogad. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, enyhén savanyú (pH 5,5-6,5) kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.
Fiatal korában fagyérzékeny, ezért az első 2-3 évben téli takarást igényel: a tövét takarjuk be lombbal vagy komposzttal, a hajtásokat pedig fenyőágakkal vagy jutával védjük. Idősebb korában mérsékelten fagyálló, akár -12 °C-ig is ellenállhat, de keményebb teleken a fiatal hajtások visszafagyhatnak.
Délnyugati, déli fekvésű, védett helyre ültessük.
Gondozása egyszerű. Metszést kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhetünk: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat. A termőágakat ne vágjuk vissza, mert a virágok és termések az egyéves hajtásokon képződnek. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk.
Felhasználás a kertben
A Fidzsoa rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Magányosan, szoliterként ültetve egzotikus hangulatot teremt. Dézsában tartva a teraszok, erkélyek dísze lehet, és télen védett helyre vihető. Meleg fekvésű, déli vagy nyugati fekvésű kertekbe, házfalak elé ültetve a fal visszasugárzó melege segíti a teleltetést és a termésérést. Sövényként is nevelhető, mert sűrű lombozata jó takarást nyújt. Örökzöld lombozata egész évben díszít.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, meleg fekvést kedvelő, mediterrán hangulatú növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula, a rozmaring, a kakukkfű és más fűszernövények. Örökzöld cserjékkel, például babérmeggyel, tűztövissel vagy borókákkal kombinálva egész évben díszítő, struktúrált kompozíciót hozhatunk létre. Dézsás társításban jól mutat olajfa, citromfa vagy gránátalma társaságában.
8a-10b USDA-zóna

Missionario Chiandetti mini kivi	**Actinidia arguta 'Missionario Chiandetti'**	4 450 Ft	4 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Missionario Chiandetti' mini kivi egy olasz nemesítésű, rendkívül bőséges termésű fajta, amely a közönséges kivi (Actinidia deliciosa) közeli rokona, de annál jóval igénytelenebb és fagyállóbb. Nevét nemesítőjéről, Chiandetti missionáriusról kapta, aki évtizedeken át dolgozott a mini kivi fajták tökéletesítésén. A fajta kiváló terméshozamáról és rendkívül édes, aromás gyümölcseiről ismert.
Erőteljes növekedésű, lombhullató kúszónövény, amely kifejlett állapotban 5-8 méter magasra is felkapaszkodhat. Hajtásai vékonyak, rugalmasak, zöldesbarna színűek, a fiatal hajtások enyhén szőrözöttek. Levelei szív alakúak, 8-15 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, a levélnyél gyakran vöröses árnyalatú. A lombozat sűrű, kellemes árnyékot nyújt a nyári hónapokban.
Június folyamán a levelek hónaljában apró, illatos, krémszínű vagy fehér virágok nyílnak. A virágok 1-2 cm átmérőjűek, csillag alakúak, kellemes, édeskés illatot árasztanak. A fajta porzós klón, ezért termékenyüléshez hímnemű porzópartnerre van szükség.
A gyümölcsök szeptembertől, a nyári meleg elmúltával érnek be. A mini kivi termése sima héjú, 2-3 cm hosszú, tojás vagy henger alakú. A héj zöldesbarna, fényes, teljesen kopasz – ami a legnagyobb előnye a közönséges kivihez képest, mert nem kell hámozni, a gyümölcs héjastul fogyasztható. Belseje élénkzöld, apró, ehető magokkal tarkított. Íze rendkívül édes, aromás, a közönséges kivihez hasonló, de annál intenzívebb, gyakran ananászra, eperre vagy passiógyümölcsre emlékeztető jegyekkel. A 'Missionario Chiandetti' az egyik legédesebb mini kivi fajtának számít.
Igényei és gondozása
A 'Missionario Chiandetti' mini kivi napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legjobb terméshozamot teljes napsütésben hozza, de félárnyékot is elfogad. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, enyhén savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5) kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.
A fajta termő klón, ezért termékenyüléshez hímnemű porzópartnerre van szükség. Javasolt egy hímnemű mini kivi fajta (pl. 'Weiki' vagy 'Japsai' hím) ültetése 5-10 nőivarú növényre. Porzópartner hiányában a terméshozam jelentősen csökkenhet.
Gondozása egyszerű, de rendszeres metszést igényel. Metszését téli nyugalmi időszakban (február-március) végezzük: távolítsuk el az elhalt, sérült, egymást keresztező hajtásokat, a termőhajtásokat pedig rövidítsük vissza 5-6 rügyre. Nyáron a túl hosszúra nőtt hajtásokat is visszavághatjuk, hogy a növény ne fojtsa el a termést.
Támrendszert igényel: pergola, lugas, erős drótokkal ellátott kerítés vagy rács szükséges számára. A hajtásokat rendszeresen vezessük a támasztékra. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága kiváló, akár -25 °C-ig is ellenáll, így hazánkban gond nélkül teleltethető.
Felhasználás a kertben
A 'Missionario Chiandetti' mini kivi kiválóan alkalmas pergolák, lugasok, kerítések, rácsok, házfalak befuttatására. Sűrű lombozatával kellemes árnyékot ad nyáron, ősszel pedig bőséges termésével örvendeztet. Friss fogyasztásra a legideálisabb, de lekvárnak, befőttnek, gyümölcsleveknek, sütemények díszítésére is alkalmas. A gyümölcsök szobahőmérsékleten utóérnek, hűtőben hosszabb ideig eltarthatók.
Növénytársítási ötletek
Társításakor más futónövényekkel, például iszalaggal (Clematis) vagy lonccal (Lonicera) kombinálva izgalmas, rétegzett felületeket alakíthatunk ki. Tövébe ültethetünk alacsony termetű, félárnyéktűrő évelőket, mint a hunyor (Helleborus), a tüdőfű (Pulmonaria) vagy a páfrányok, amelyek a kúszónövény alsó részét takarják. Napos helyen alacsony talajtakaró évelők, mint a levendula (Lavandula) vagy a macskamenta (Nepeta) szintén jól illeszkedhetnek a tövébe.
USDA 5b

Nagyterméső étkezési mogyoró	Corylus avellana 'Bőtermő Nagy'	4 950 Ft	4 950 Ft

Ahogy a neve is utal rá, kifejezetten nagy, gömbölyded termései vannak, ráadásul nagy számban.

5a USDA-zóna

Nagyterméső som	Cornus mas 'Macrocarpa'	9 900 Ft	9 900 Ft

A közismert húsos som (Cornus mas) gyönyörű, nagyterméső változata, a termés tömege az alapfajéhoz képest legalább kétszeres! A som korán tavasszal virágzik még lombfakadás előtt így adva hazai meleg, napos domboldalakon elhelyezkedő ereinknek gyönyörű színpompát. A termések egész nyáron érnek, és akkor a legfinomabbak, amikor bordóra színeződnek, és elég csak megrázni egy-egy ágat, hogy lehulljanak.
A húsos somból idős korára kis fácskát is ki lehet alakítani, melnyek nagyon hangulaos girbe-gurba törzse a kis darabokban leváló kéreggel látványos.
A termés savanykás, igazi vad gyümölcs, melyet nyersen fogyasztva, vagy akár mártásnak elkészítve is lehet fogyasztanai.
Fényigény: napos helyre ültessük
Vízigény: szárazságtűrő
Talajigény: jó vízáteresztő, átlagos tápértékű talajokat kedvel
USDA Zóna:4b

Nyugati szamócafa	Arbutus unedo	3 900 Ft	4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Arbutus unedo, más néven Nyugati szamócafa, különlegesen díszítő örökzöld cserje vagy kis fa, amely a Mediterrán térségben és az Atlanti-óceán partvidékén őshonos. A növény jellegzetes megjelenésének köszönhetően ideális választás lehet a kertekben és parkokban.
Kifejlett állapotában akár 5-10 méter magasságig is megnőhet. Lombozata sötétzöld, fényes és bőrnemű, ami egész évben vonzó megjelenést kölcsönöz a növénynek. Tavasztól nyár végéig apró, krémszínű vagy rózsaszín virágokkal díszített. Ezek a virágok gyakran vonzzák a méheket és más beporzókat.
Gyümölcsei körülbelül diónyi méretűek és pirosak, majd sárgára érnek. A gyümölcs érettségi ideje ősszel van, és ízletes, édeskés, enyhén fanyar íze miatt sokan szívesen fogyasztják frissen vagy például lekvár és kompót készítéséhez.
Gondozási útmutató:

Talaj és ültetés: Ültessük a Nyugati szamócafát jó vízáteresztésű talajba. A tavasz vagy ősz a legjobb időpont az ültetésre.

Napfény: A növény szereti a napfényt, de jól tűri az enyhe árnyékot is, különösen a forró nyári hónapokban.

Öntözés: A Nyugati szamócafa mérsékelt öntözést igényel. Nyáron tartsuk a talajt enyhén nedvesen, de kerüljük a túlzott öntözést, ami károsíthatja a gyökereket.

Trágyázás: Az év elején, tavasszal vagy kora nyáron trágyázzuk meg a növényt általános célú lassú felszabadulású műtrágyával.

Metszés: Az Arbutus unedo kevésbé igényel metszést, de az elhalt vagy beteg ágakat távolítsuk el rendszeresen. Az alakító metszést a tél végén vagy tavasszal végezzük.

Gyümölcsszedés: Az érett gyümölcsöket óvatosan szedjük le ősszel. A friss gyümölcsöt akár nyersen is fogyaszthatjuk, vagy felhasználhatjuk különböző ételek és italok készítéséhez.

A Nyugati szamócafa egy gyönyörű dísznövény, amely emellett finom gyümölcsöt is kínál. Ha megfelelő gondozás mellett, sokáig élvezhetjük a növény látványát és ízletes gyümölcseit is.
8a-10b USDA-zóna

Opylovac porzós homoktövis	**Hippophae rhamnoides 'Opylovac'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Opylovac porzós homoktövis (Hippophae rhamnoides Opylovac) a homoktövis fajták egyik legmegbízhatóbb porzós változata, amely Csehországból származik. Az Opylovac kifejezetten beporzó fajtaként lett nemesítve, célja az, hogy bőséges és hosszan tartó virágportermelésével biztosítsa a termős homoktövis fajták megfelelő megtermékenyülését és ezáltal bőséges terméshozamát. A homoktövis kétlaki növény, ami azt jelenti, hogy külön porzós (hímivarú) és külön termős (nőivarú) egyedek léteznek. Terméshozamhoz legalább egy porzós fajtára van szükség 5-10 termős fa mellé.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az Opylovac közepes termetű, 2-3 méter magas és 1,5-2,5 méter széles bokor. Habitusa bokros, sűrű, ágai erőteljesek, tövisesek, ami a homoktövis jellegzetes tulajdonsága. Levelei keskenyek, lándzsás alakúak, 3-6 cm hosszúak, felülük ezüstszürkészöld, fonákjuk ezüstösen csillogó, sűrűn pikkelyes szőrzettel borított. A levelek a szél által megmozgatva jellegzetes, ezüstösen csillogó hatást keltenek. A virágok az Opylovac legfontosabb jellemzői: kora tavasszal, március-április környékén, még a lombfakadás előtt nyílnak. A porzós virágok kicsik, barnás színűek, rövid barkákba rendeződnek, és bőséges mennyiségű, sárgás virágport termelnek. A virágportermelés hosszan tartó, ami biztosítja a termős virágok megfelelő idejű beporzását. Az Opylovac nem terem termést, mivel porzós fajta. A termős egyedeken megjelenő termések (amelyeket a porzós virágpor termékenyít meg) narancssárga vagy vörösesnarancs bogyók, ovális vagy gömbölyded alakúak, savanykás-édeskés ízűek, rendkívül magas C-vitamin-tartalommal.
Igényei és gondozási útmutató: Az Opylovac a legjobb virágportermelését teljes napos helyen hozza. Napos fekvésben a virágzás bőségesebb, a növény növekedése erőteljesebb. Talajban a jó vízelvezetésű, homokos, kavicsos, meszes talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, a nyári aszályokat is gond nélkül átvészeli. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szüksége, sőt, a túlzott tápanyagellátás károsíthatja. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: távolítsuk el az elhalt, sérült, egymást keresztező vagy túl öreg ágakat. Az Opylovac jól tűri a metszést, a visszametszés serkenti az új hajtások növekedését. Teleltetésre nincs szükség, mivel kiváló télállósággal rendelkezik, akár -35 °C-ig is ellenáll. Kártevők közül a homoktövisléggy, a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a verticilliumos hervadás és a lisztharmat fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: Az Opylovac sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Házi kertekben és gyümölcsösökben a termős homoktövis fajták nélkülözhetetlen beporzó partnere. Gyógykertekben a homoktövis magas C-vitamin-tartalma miatt kedvelt. Természetes kertekben a madarakat vonzó termései (a termős egyedeken) és a jellegzetes, ezüstös lombozata miatt kiváló választás. Homokos talajú kertekben és tengerparti kertekben a szárazságtűrése és a homokos talajok iránti igénye miatt kifejezetten ajánlott. Városi kertekben a légszennyezést is jól tűri.
Változatos növénytársítások: Termős homoktövis fajtákkal: Az Opylovac mellé mindenképpen ültessünk termős homoktövis fajtákat a termés biztosításához. Jó választás a Leikora, Frugana, Askola, Botanicheskaya, Hergo vagy a Pollmix. Egy porzós fa 5-10 termős fa megporzásához elegendő, ha a széljárás biztosított. Alacsony szárazságtűrő évelőkkel: A homoktövis tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), kakukkfű (Thymus vulgaris), oregánó (Origanum vulgare) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben vonzzák a beporzó rovarokat. Díszfüvekkel: A homoktövis ezüstös lombozatához jól illenek a díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum alopecuroides) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa tenuissima). Alacsony talajtakarókkal: A cserje alá ültetett meténg (Vinca minor) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A homoktövis alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a homoktövis lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek.
A homoktövis termése rendkívül értékes, magas C-vitamin-, E-vitamin- és karotinoid-tartalommal rendelkezik. Frissen fogyasztva savanykás, de lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok és étrend-kiegészítők formájában is feldolgozható. Az Opylovac porzós fajtaként nem hoz termést, de nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a termős egyedek bőségesen teremjenek. USDA besorolása: 3-8.

Oszlopos olajfa	Olea europaea 'Pyramidalis'	5 450 Ft	5 450 Ft

Az Oszlopos olajfa (Olea europaea Pyramidalis) az olajfák egyik legkülönlegesebb fajtája, amely Olaszországból származik, és oszlopos, ciprusra emlékeztető habitusáról nevezetes. Ez a fajta a kiváló forma, a szűk növekedés és a megbízható szélállóság hármasát kínálja, ami a mediterrán kertek és a szűk helyek egyik legkedveltebb olajfajtájává teszi.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az oszlopos olajfa a hagyományos olajfáknál jóval szűkebb termetű. Kifejlett magassága 5-7 méter, szélessége mindössze 1-1,5 méter. Habitusa oszlopos, karcsú, a ciprushoz hasonlóan szűk, sűrű, függőlegesen megnyúlt koronával. Levelei örökzöldek, keskenyek, lándzsás alakúak, felülük sötétzöld, fonákjuk ezüstszürke, bőrszerűek. A levelek sűrű állásúak, ami a fa kompakt megjelenését erősíti. A virágok tavasszal nyílnak: aprók, fehérek, illatosak. A termések kicsik, ovális alakúak, éréskor sötétlilára vagy feketére színeződnek, de a fa fő értéke nem a termés, hanem a látványos forma.
Igényei és gondozási útmutató: Az oszlopos olajfa a legszebb formáját teljes napos, meleg fekvésben hozza. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes, homokos vagy kavicsos talajokat kedveli. A pangó vizet nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, idősebb korban szárazságtűrő. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal gondoskodhatunk. Metszése minimális, mivel a fa természetesen is megtartja oszlopos formáját. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, a fiatal fákat érdemes az első években téli takarással védeni. Konténerben nevelve fagymentes, hűvös helyen teleltethető.
Kertstílus és növénytársítások: Az oszlopos olajfa különleges formája miatt rendkívül sokoldalúan használható. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring és ciprus társaságában a délies hangulatot idézi, függőleges karaktert adva. Szűk helyekre, kis kertekbe, előkertekbe, fasorokba és sövénynek kifejezetten ajánlott, mivel keskeny habitusa miatt nem terjeszkedik. Tengerparti kertekben kiváló szélvédő sövényként is funkcionál. Déli fekvésű teraszokon nagy konténerben nevelve egzotikus dísze lehet a lakás közelének. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz a szürkészöld lombozat és a szigorúan függőleges forma izgalmas textúrát ad.
Változatos növénytársítások: Mediterrán évelőkkel: A fa tövébe ültetett levendula, rozmaring, kakukkfű és zsálya erősíti a mediterrán hangulatot. Ciprussal: A hasonló oszlopos forma miatt egységes, függőleges akcentusú kompozíciót alkot. Magyaltölggyel: A magyaltölgy sötétzöld lombozata mellett a fa ezüstös-zöld színe gyönyörű kontrasztot ad. Alacsony talajtakarókkal: A fa alá ültetett kakukkfű vagy varjúháj takarja a csupasz talajt. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok vagy nárciszok tavasszal vidám színfoltot jelentenek.
Az oszlopos olajfa kiváló választás azok számára, akik szűk helyre, fasorba, sövénybe vagy tengerparti kertbe keresnek mediterrán hangulatú, oszlopos növekedésű, szélálló olajfát. USDA besorolása: 8-10 (téli takarással 7-es zónában is tartható).

Potomac indián banán	Asimina triloba 'Potomac'	18 500 Ft	18 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Potomac' indián banán oltvány, más néven papau vagy pawpaw, Észak-Amerika keleti részéről, a Potomac folyó vidékéről származó, rendkívül különleges gyümölcsű lombhullató fa. Az Annonaceae család tagja, a trópusi gyümölcsök (pl. cukor alma, cherimoya) hidegtűrő rokona. A 'Potomac' fajta Maryland államból származik, kiváló ízéről és bő terméséről ismert.
Közepes termetű, lassú növekedésű, lombhullató gyümölcsfa vagy nagy cserje, amely kifejlett állapotban 4-8 méter magas és 3-5 méter széles. A fa fiatalon kúpos, idősebb korban széles, terebélyes koronát nevel. Kérge sima, szürkésbarna, idősebb korban érdesebbé válik. A fa gyökérzete húsos, törékeny, mélyre hatol.
Levelei nagyok, szélesen lándzsásak vagy tojásdadok, 15-30 cm hosszúak, 10-15 cm szélesek, ép szélűek, élénkzöldek, fényesek, a levél csúcsa kihegyezett. A levelek a hajtásvégeken csoportosan, örvösen helyezkednek el, ami trópusi megjelenést kölcsönöz a fának. Ősszel a lombozat látványos aranysárgára színeződik.
Májusban, a lombfakadás előtt vagy azzal egy időben hozza a fákon még a lomb előtt nyíló, bíborvörös, bársonyos szirmú, harang alakú virágait. A virágok 3-5 cm átmérőjűek, jellegzetes, enyhén édeskés-élesztős illatúak, ami a rovarokat, elsősorban a döglégyeket vonzza. A virágok a fa alsóbb részein, az előző évi hajtásokon nyílnak.
Októberben, késő ősszel érnek meg a termések. A 'Potomac' termése 8-15 cm hosszú, tojás vagy henger alakú, 200-400 gramm tömegű, zöldessárga színű, a teljes érésben sárgásbarnára változik. A termés belseje krémes, sárga, édes, vanília, banán és ananász keverékére emlékeztető ízű. A gyümölcsben 8-16 nagy, barna mag található, melyek nem ehetőek. A termések puhán, éretten szedhetők, friss fogyasztásra, desszertekhez, fagylalthoz, turmixokhoz ideálisak.
Igényei és gondozása
A 'Potomac' indiánbanán napos vagy félárnyékos, meleg, szélvédett fekvést igényel. Fiatal korában árnyékot is tűr, de a legjobb terméshozamot teljes napsütésben hozza. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, humuszos, laza szerkezetű, enyhén savanyú (pH 5,5-6,5) kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.
Az indiánbanán oltványként termésbiztosabb, de a jobb termékenyülés érdekében legalább két, különböző fajta együttes ültetése javasolt. A virágok megporzását a természetben főként döglégyek és bogarak végzik, ezért a gyümölcshozam növelése érdekében kézi beporzás is alkalmazható.
Gondozása egyszerű. Metszést a fa fiatal korában, a koronaformálás érdekében végezhetünk kora tavasszal. A fának mélyre hatoló gyökérzete van, ezért átültetést nem kedvel. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága kiváló, akár -25 °C-ig is ellenáll, így hazánkban gond nélkül teleltethető. Betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló.
Felhasználás a kertben
A 'Potomac' indiánbanán oltvány rendkívül értékes, különleges gyümölcsű fa, amely a kert egzotikus hangulatát is fokozza. Magányosan, szoliterként ültetve a nagy levelek és a különleges termések miatt is feltűnő. Csoportosan, több fajtát egymás mellé ültetve a jobb termékenyülés érdekében is ajánlott. Termőcserjeként, gyümölcsösként kifejezetten értékes. Nagyobb kertekbe, házikertekbe, természetes hatású kertekbe ideális.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, tápanyagban gazdag talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a som (Cornus) és a bodza (Sambucus) fajok, amelyek szintén értékes terméső cserjék. Díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a kínai ezüstfű (Miscanthus), ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk. Árnyéktűrő évelőkkel, például páfrányokkal, hunyorral (Helleborus) vagy tüdőfűvel (Pulmonaria) a fa tövében is alakíthatunk ki dekoratív, gyommentes felületet.

Prémium Advat és C-Especial pisztácia csemete csomag	**1 db Advat termős pisztácia + 1 db C-Especial porzós pisztácia**	59 500 Ft	65 000 Ft

Az Avdat termős pisztácia (Pistacia vera 'Avdat') egy korai virágzású izraeli fajta, amely április közepén nyílik. Gyümölcsei nyitott héjúak és ízletesek, szeptember elején szüretelhetőek. Kiválóan termeszthető a magyarországi klímán, különösen előnyös, mert ellenáll a hűvösebb, nedvesebb időjárás miatti gombásodásnak.
A C-Especial porzós pisztácia kiemelkedő beporzófajta, amely nélkülözhetetlen a termős pisztáciák gyümölcshozamának biztosításához. Kifejezetten arra lett nemesítve, hogy magas pollenhozammal rendelkezzen, ezzel segítve a termésmegkötést. E fajta ellenálló a környezeti stresszel szemben, és dísznövényként is megállja a helyét a kertekben, mivel vonzó megjelenésével hozzájárul a táj szépségéhez.

7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa,melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztenek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamain tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatású és erősíti az immunrendszerünket!

Prima Indián banán, Pawpaw	**Asimina triloba 'Prima'**	18 900 Ft	25 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Észak-Amerikából származó indián banán legtöbb fajtája a hazája (USA) nemesítőinek a munkáját dicséri, de ez a fajta az olasz Montanari cég nemesítőinek köszönhető, mégpedig az összes közül az egyik legjobb fajta. Öntermékeny fajta, tehát porzópár nélkül is hoz termést. Gyümölcsei gömbölyűek, kissé hengeres formát öltenek, tömegük 200 gramm körüli. Éretten puha, íze édes, tápértéke kiváló, vitaminokban gazdag.
A fa összességében 4-5 méteresre fejlődik, jelentősebb díszértéke az érdekes virágain, és termésén kívül nincs.
Fényigény: Meleg napos, esetleg félárnyékos helyre ültessük
Vízigény: Az első években aktívabb öntözést kíván, amit később el lehet hagyni
Talajigény: átlagos kerti talajokat kedvel, nehéz kötött talajokban nem érzi jól magát
USDA Zóna: 6a, teljesen télálló növény
Erős oltványokat küldünk.

7a-9b USDA-zóna

Randy porzós pisztácia	**Pistacia vera 'Randy'**	32 500 Ft	32 500 Ft

A Randy egy porzós (hímivarú) pisztácia fajta, amelyet Kalifornia állam egyik mezőgazdasági kísérleti állomásán nemesítettek. A korai virágzású porzós fajták közé tartozik. Nagyobb ültetvényeknél használják a Kerman-hoz is, mint a virágzási időszak korábbi szakaszának lefedésére. A Randy 8-12 nappal korábban virágzik, mint a Peters és 2-6 nappal előbb C-Especial-nél. Jól és egyenletesen virágzik a hidegebb években is! A pollene tartós, és a kihullást követően 28 napig megőrzi életképességét. A pollen kezdeti életképessége is magasabb a legtöbb porzófajtához képest. A Larnaka termő fajta porzója. A frissen átültetett növények szabadföldi kiültetését szeptembertől javasoljuk! 7a-9b USDA-zóna Általános tudnivalók: A száraz éghajlatú Nyugat- és Közép-Ázsiából származó lombhullató fa, melyet mára az egész világ szubtrópusi és a mérsékelt öv sivatagi és félsivatagos területein termesztenek. Látva az éghajltaváltozás folyamatait, tendenciáit, a mezőgazdaság számára egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz biztosítása, így a szárazságtűrő fajok jelentősége, térnyerése várhatóan növekedni fog. Ennek abszolút megfelel a pisztácia, mert a terméshozamát nem befolyásolja jelentősen a nyári aszály. Hosszú életű fajról van szó, mely terméshozamának csúcspontját körülbelül 15 éves korától éri el és ez megfelelő kezelés mellett akár egy évszázadig fenntartható. Kétlaki, így a terméshez hím-(porzó) és nőivarú (termő) egyedekre van szükség és ültetvényekben 10-15 termőhöz 1 porzót ültetnek. A virágoknak nincs szirmuk, egyivarúak és szőlőszerű fürtökben nyílnak. A magokat ehetetlen, kemény, krémszínű héj borítja, amelyet húsos, vékony halványzöld, éréskor pirosas héj borít be. A világ egyik legnépszerűbb csemegéje nemcsak ízletes, hanem legalább annyira egészséges is! Nyomelemekben, ásványi anyagokban és nem utolsó sorban vitaminokban kifejezetten gazdag. Magas A-, B-, E-vitamain tartalmának köszönhetően igazi antioxidáns bomba! Mindezeknek köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, rákmegelőző hatású és erősíti az immunrendszerünket!

Római mogyoró, Nagytermésű étkezési mogyoró	**Corylus avellana 'Római'**	4 950 Ft	4 950 Ft

Egy nagyon régi, jól bevált fajta Olaszországból. Termései augusztus végén-szeptember elején érnek. Kettesével hozza egyébként is nagy terméseit. Terméseinek minősége az egyik legjobb a piacon. Idegen megporzásra szorul.

5a USDA-zóna

Sunglo (Sun-Glo) indián banán, papau OLTVÁNY	**Asimina triloba 'Sunglo'**	18 500 Ft	18 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Sunglo indián banán (Asimina triloba 'Sunglo' syn. 'Sun-Glo') egy kiváló minőségű, nemesített változata az észak-amerikai őshonos papau fának, amelyet élénk színű, kivételesen édes gyümölcsei miatt tartanak számon. Nevében a "Sun" (nap) és a "Glo" (fény, ragyogás) arra utal, hogy ez a fajta a napfény ízét és ragyogó színét hozza a kertbe. Ez a lombhullató fa lassú növekedésű, kifejlett magassága eléri a 4-6 métert, szélessége 3-5 méter, széles kúp alakú, sűrű, dús koronával.
Külső megjelenése és termése
A fa széles, terebélyes koronát nevel, amely kiváló árnyékadóvá teszi. Levelei nagyon dekoratívak, 15-25 cm hosszúak, lándzsás-elliptikusak, felületük fényes sötétzöld, fonákjuk világosabb, ősszel csodálatos aranysárga színben pompáznak. Április-májusban, a lombfakadás idején vagy azzal egy időben nyílnak a 3-4 cm átmérőjű, bíborvörös vagy csokoládébarna színű, 6 szirmú, harang alakú, lecsüngő virágok. A virágok illata enyhén édeskés, nem tolakodó.
A 'Sunglo' legnagyobb értéke a kiemelkedően nagy, élénk színű és rendkívül édes termése. A gyümölcsök nagyok, átlagosan 200-300 grammosak, alakjuk kerekded-ovális, ami megkülönbözteti a hosszúkásabb fajtáktól. Héjuk éretten élénk sárga, némi narancsos árnyalattal, ami valóban "napfényes" megjelenést kölcsönöz nekik. Húsuk sűrű, vajas-krémes állagú, nagyon kevés magot tartalmaz (az egyik legkevesebb magvú fajták között), íze intenzíven édes, trópusi jegyekkel, amely a mango, vanília, banán és ananász keverékére emlékeztet, de a 'Sunglo' esetében az édesség dominál. Érése szeptember közepétől október elejéig történik, a termések egyenletesen érnek, ami megkönnyíti a betakarítást.
Igényei és gondozása
A Sunglo indián banán félárnyékos vagy napos, széltől védett fekvést kedvel. Fiatal korban jól tűri az árnyékot, de napos helyen a termések édesebbek, nagyobbak és színük is élénkebb lesz. Talajban nem túl válogatós, de a mély termőrétegű, tápanyagban gazdag, állandóan enyhén nedves, jó vízáteresztő képességű, enyhén savanyú kémhatású (pH 5,5-7,0) közegben érzi magát legjobban. A pangó vizet és a tartós aszályt nem viseli el. Rendszeres, heti szintű, mélyre hatoló öntözést igényel, különösen a terméskötés és a gyümölcsök fejlődése idején. A talajt érdemes mulcsozni a nedvesség megőrzése érdekében.
Tavasszal érett komposzttal, szerves mulccsal (pl. fakéregmulcs) vagy savanyú hatású trágyával takarjuk a tövét a nedvesség megőrzése és a tápanyag-utánpótlás biztosítása érdekében. A mulcs a sekélyen futó gyökereket is védi a kiszáradástól és a szélsőséges hőmérséklettől. Metszést nem igényel, kivéve az elhalt, sérült vagy beteg ágak eltávolítását, ezt kora tavasszal (február végén, március elején) végezzük el.
Fontos: a 'Sunglo' indián banán önmeddő, ezért a bőséges terméshozamhoz feltétlenül szükség van legalább két, egymástól genetikailag különböző fajtára a közelben (10-15 méteren belül). Javasolt beporzó partnerek: 'Sunflower', 'Shenandoah', 'SAB OV', 'Rebecca's Gold', 'Prima' vagy 'Davis'. A természetes beporzást legyek és bogarak végzik, de ha szükséges, kézi beporzással is segíthetünk.
Kártevők és betegségek szempontjából ellenálló, vegyszeres permetezést nem igényel. A zebra fecskefarkú lepke hernyói ugyan táplálkoznak a fiatal levelekkel, de ez nem okoz maradandó kárt a fában. A magvak és az éretlen gyümölcs fogyasztása gyomorpanaszokat okozhat, ezért csak teljesen érett, puha gyümölcsöt fogyasszunk.
Kertstílus és növénytársítások
A 'Sunglo' indián banán kiválóan illik:

Természetes és erdei kertekbe: ahol az erdőszéli, aljnövényzeti hangulatot erősíti.

Gyümölcsösökbe és tanyakertekbe: mint különleges, gourmet gyümölcsfa.

Vadkertekbe és őshonos növényes kertekbe: ahol az észak-amerikai flórát mutatják be.

Nagyobb magánkertekbe, parkokba és arborétumokba: dekoratív lombozatával és élénk színű termésével.

Árnyékadó faként teraszok, ülősarkok mellé.

Javasolt növénytársítások:

Fák és cserjék: somfa (Cornus florida, Cornus mas), közönséges galagonya (Crataegus monogyna), amerikai bangita (Viburnum opulus), mogyoró (Corylus avellana), fekete bodza (Sambucus nigra), berkenye (Sorbus aucuparia)

Évelők és talajtakarók: erdei páfrány (Dryopteris filix-mas), hímzőpáfrány (Athyrium filix-femina), erdei gyöngyvirág (Polygonatum multiflorum), télizöld metény (Vinca minor), erdei szellőrózsa (Anemone nemorosa), békaliliom (Symplocarpus foetidus)

Árnyéktűrő évelők: árnyliliom (Hosta), tarka levelű árnyéki árvacsalán (Lamium maculatum), kaukázusi nefelejcs (Brunnera macrophylla), páfrányfenyő (Podophyllum peltatum)

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Hagymások: hóvirág (Galanthus nivalis), téltemető (Eranthis hyemalis), krókusz (Crocus tommasinianus), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), csillagos májvirág (Scilla siberica)

A fa tövében hagyjuk a lehullott leveleket, amelyek természetes talajtakaróként szolgálnak, védik a gyökereket a kiszáradástól és a fagytól, valamint folyamatosan pótolják a talaj humusztartalmát.
USDA besorolás: 5-8

Svetlyachok húsos som	**Cornus mas 'Svetlyachok'**	17 900 Ft	18 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A húsos som (Cornus mas) egyik legértékesebb, nagy termésű nemesített változata a Svetlyachok. A fajtát Dr. Svitlana Klymenko nemesítette a Kijevi Nemzeti Botanikus Kertben, és 1999-ben hozták forgalomba. Nevének jelentése „Szentjánosbogár”, ami a termések ragyogó színére és kiváló minőségére utal. Méretét tekintve közepes növekedésű, 10 éves korára körülbelül 2,5 méter magas és széles, idősebb korban 3-4 méter magasra is megnőhet. Koronája eleinte feltörő, később szélesedő, bokros habitusú.
A növény legkorábbi dísze a kora tavaszi, bőséges virágzás. Már március-áprilisban, a levelek megjelenése előtt az ágakon apró, csillag alakú, élénksárga virágok ezrei nyílnak, amelyek nemcsak a kertbe hoznak meleget, hanem értékes, kora tavaszi méhlegelőként is szolgálnak. A virágokat követően nyáron érnek be a fajta igazi különlegességét adó termések.
Termés: A Svetlyachok termése az egyik legnagyobb a húsos som fajták között. A gyümölcsök hosszúkás, palack alakúak (hosszuk elérheti a 3,8 cm-t, szélességük a 2 cm-t), tömege általában 6,5-7,5 gramm, de optimális körülmények között egyes szemek elérhetik a 9-11 grammot is. A termés színe teljes éréskor sötétvörös, ragyogó rubinvörös, ami a napfényben csillog. Húsa sötétvörös, lédús, kellemesen édes-savanykás aromás ízű, magja a gyümölcs tömegének mindössze 8-10%-át teszi ki. Cukortartalma kiemelkedően magas (9,6-11,5%), ami friss fogyasztásra is alkalmassá teszi. A termések augusztus végétől szeptember elejéig érnek, és ami kertészeti szempontból jelentős előny, éretten sem hullanak le a bokorról, csak a túlérett szemek potyognak. Ez lehetővé teszi a szüret időzítését és a termés hosszabb ideig történő a fán hagyását. A Svetlyachok termései a betakarítás után hűtőtárolásban 3-4 hétig is eltarthatók.
Igényei és gondozása:

Fény: Napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Bár félárnyékban is megél, a bőséges terméshozamhoz napos fekvés ajánlott.

Talaj: Nem válogatós, de a jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag, humuszos, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású kerti talajban fejlődik a legszebben. A pangó vizű, agyagos talajt kerülni kell.

Öntözés: Fiatal korban és hosszantartó szárazság idején rendszeres öntözést igényel a mély gyökérnövekedés érdekében. Idősebb korban szárazságtűrő, bár tartós aszályban a termés mérete és minősége csökkenhet.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, szerves-trágya tartalmú műtrágyával érdemes megtámogatni a terméshozam és a növekedés érdekében.

Metszés: Különösebb metszést nem igényel, de a termés mennyiségének és minőségének növelése érdekében késő télen vagy kora tavasszal (a virágzás előtt) a régi, elöregedett vagy sűrűn növő ágak ritkítása javasolt. Ez elősegíti a szellőzést és a fény bejutását a belső részekbe. A túlzott metszés a termés rovására mehet.

Beporzás: A fajta részben öntermékeny, azonban a terméshozam és a gyümölcs mérete jelentősen növelhető, ha legalább két különböző húsos som fajtát (például a 'Lukjanovszkij' vagy egy másik korai virágzású fajtát) ültetünk egymás közelében a keresztbeporzás elősegítése érdekében.

Telelés: Kiválóan télálló, a fa -30 °C-ig, a virágrügyek is hasonlóan ellenállóak, így hazánk egész területén gond nélkül tartható.

Betegségek: A fajta magas ellenálló képességgel bír a gombás betegségekkel és a kártevőkkel szemben.

Termés felhasználása: A Svetlyachok termése kivételesen magas C-vitamin tartalommal (120-165 mg/100g) rendelkezik, ami a citromének közel háromszorosa. Emellett gazdag antocianinokban, pektinekben, káliumban, kalciumban, magnéziumban és vasban. Felhasználása sokoldalú: fogyasztható frissen, de kiváló lekvárok, dzsemek, szörpök, gyümölcsborok és pálinkák készítésére is alkalmas. A vadételekhez készült mártások kedvelt alapanyaga. Ásványianyag-tartalmának és magas C-vitamin szintjének köszönhetően a népi gyógyászat is előszeretettel használja erősítő, vérképző hatása miatt.
Kertstílusok, ahová illik: Természetes és vadvirágos kertek, gyümölcsösök, erdős szegélyek, házikertek, tájkertek. Kiválóan használható sövénynek vagy válaszfalnak (méterenként 2-3 tövet ültetve), valamint értékes szoliter növényként a gyep közepén.
Változatos növénytársítások:

Őshonos gyümölcsfák és cserjék: vadalma, vadkörte, galagonya, berkenye, kökény, csipkebogyó.

Illatos cserjék: orgona, illatos bangita, levendula, rozmaring.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Alacsony növekedésű évelők (a som alá): erdei gyöngyvirág, keltike, kárpáti harangláb, tavaszi hérics.			
Tavasszal nyíló hagymások: krókusz, törpe nárcisz, gyöngyike, csillagos májvirág.			
Késő nyári/őszi évelők (a som termésével egy időben): őszirózsa, lángvirág, őszi kikerics.			
Díszfüvek (a termésérés időszakában): tollbuga, japán vértfű, kék csenkesz.			
USDA besorolása: 4-7 (Magyarország egész területén, 5-7-es zónákban biztonságosan nevelhető).			
Szafer húsos som	**Cornus mas 'Szafer'**	8 900 Ft	8 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Szafer Húsos som (Cornus mas 'Szafer') – A kiváló antioxidáns-tartalmú, édes gyümölcsű fajta
A Szafer húsos som a somfélék családjába tartozó, Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos, lombhullató cserje vagy kis fa nemesített változata. A fajtát a lengyelországi Bolestraszyce Arborétumban nemesítették, ahol hosszú távon gyűjtik és értékelik a nagyméretű szelekciókat. A 'Szafer' a lengyel somfajták egyik legértékesebb képviselője, amelyet kiemelkedő gyümölcsminősége és magas antioxidáns-tartalma miatt tartanak számon.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A húsos som 'Szafer' egy közepesen erős növekedésű, kúpos koronájú, lombhullató cserje vagy kis fa. Kifejlett magassága 3-5 méter, szélessége 2-4 méter között alakul. Többtörzsű cserjét vagy kisebb fát alkot, széles kúp alakú koronával. A törzs és az ágak simák, a kéreg szürkésbarna, idősebb korban pikkelyesen hámlik, ami télen is dekoratív.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek egyszerűek, átellenesek, széles tojásdadok, nyáron sötétzöldek, ősszel pedig sárga vagy bíbor árnyalatokra váltanak. A lombozat a nyár folyamán dekoratív, ősszel pedig a levelek sárgás, vöröses vagy bronzos árnyalatokat öltenek.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzás kora tavasszal kezdődik, a levelek kibontakozása előtt, leggyakrabban februártól márciusig. A virágok kicsik, sárgák és kellemes illatúak, ami vonzóvá teszi a növényt a korai tavaszi kertekben. A virágok a beporzó rovarokat vonzzák, és a növény kiváló méhlegelő.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény körte alakú, sötétvörös terméseket fejleszt. A termések súlya elérheti a 7,2 grammot is. A termések augusztus közepétől szeptember végéig érnek, a betakarítási idő hosszú, akár 6 hétig is eltarthat. A 'Szafer' fajta kiemelkedő tulajdonsága a magas cukortartalom (kb. 16%), az alacsony savtartalom (2,4%) és a magas C-vitamin-tartalom (75 mg/100 g). A termések antioxidáns-tartalma kiemelkedő: a 'Szafer' fajta bizonyult a legmagasabb antioxidáns aktivitásúnak a vizsgált lengyel somfajták közül. A termések közvetlen fogyasztásra is alkalmasak, igazi desszert fajtának számítanak. Felhasználhatók frissen, lekvároknak, befőtteknek, gyümölcsleveknek és likőröknek. A fajta öntermékeny, de a jó terméskötés érdekében két különböző fajta ültetése javasolt.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A húsos som 'Szafer' a legjobban teljes napsütésben fejlődik, de jól tűri a részleges árnyékot is. A napos, nyitott fekvéseket, déli, délkeleti és délnyugati lejtőket kedveli.

Talaj: A növény a mészben gazdag talajú, melegkedvelő gyümölcsfák közé tartozik. A leginkább a semleges vagy enyhén lúgos talajokat kedveli, a pH-érték 6,5-8 között optimális. A pangó vizet, az erősen savanyú vagy sós talajokat nem tolerálja.

Öntözés: A húsos som 'Szafer' szárazabb körülményeket is elvisel, mivel mélyen gyökerezik, és egyenletlenül eloszló csapadékviszonyok mellett is képes nedvességet biztosítani magának. Csak a terméséré idején igényel több nedvességet, ami szezonálisan augusztustól szeptemberig tart.

Tápanyag-utánpótlás: Ültetéskor és évente legalább egyszer szerves trágya kijuttatása szükséges a megfelelő növekedéshez és terméshez.

Metszés és ápolás: Évente egyszer alakító metszés szükséges. A metszést a talajszinttől számított 50-70 cm-es magasságban érdemes végezni, a szemzési pont felett hagyva a hajtásokat.

Telelés és fagytűrés: A húsos som 'Szafer' kifejezetten kiváló télállóságú; fában és virágban is teljesen fagyálló. Az érett növények fagyállósága körülbelül -30°C. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban.

Beporzás: A 'Szafer' fajta öntermékeny, de a jó terméskötés érdekében két különböző fajta ültetése javasolt.

Kártevők és betegségek: A húsos som általában ellenálló, betegségek és kártevők ritkán támadják meg.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A húsos som 'Szafer' a kora tavaszi virágzásának, a kiváló minőségű terméseinek, a kiváló télállóságának és a sokoldalúságának köszönhetően az egyik legértékesebb gyümölcscserje a kertekben:

Gyümölcsöskertbe – a bőséges terméshozam és a kiváló gyümölcsminőség miatt kiváló választás.

Szoliter növényként – a kúpos habitus és a látványos tavaszi virágzás miatt kiváló magányos díszelem.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Méhlegelőként – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a kora tavaszi beporzók számára.

Vegyes cserjeágyásokba, természetes kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok és termések vonzzák a madarakat és a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A húsos som 'Szafer' sárga tavaszi virágai és piros termései számos más növénnyel kombinálhatók:

Kora tavaszi virágzó cserjékkel: Mogyoróval, télie hangával – a hasonló virágzási időszak miatt kiváló társnövények.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral – a különböző őszi színek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

Virágos cserjékkel és évelőkkel – a virágzó növények színei kiegészítik a növény strukturális megjelenését.

Díszfüvekkel – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a növény strukturális megjelenését.

USDA besorolása: 5-8 (Magyarországon a húsos som 'Szafer' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Szelídgesztenye	**Castanea sativa**	14 900 Ft	14 900 Ft

A gesztenye levelei nagyok, hosszúkásak, élénkzöldek, ősszel pedig sárga és barna árnyalatokba váltanak át. A levelek élei fogazottak, ami jellegzetes megjelenést kölcsönöz a fának. A szelíd gesztenye virágai júniusban és júliusban jelennek meg, hosszú, fehéres színű virágfüzérekben. A termések kemény, tüskés tokokban érnek, melyek októberben érlelődnek be és tartalmazzák az ehető gesztenyéket. A gesztenye nemcsak dísznövényként, hanem haszonnövényként is értékes.
Növekedési igények: A szelíd gesztenye mélyrétegű, jól vízelvezető, savanyú talajokat kedveli. Napos helyet igényel optimális növekedéshez és terméshozamhoz. Erős, mély gyökérrendszere van, ezért elegendő helyre van szükség a megfelelő fejlődéshez.
Gondozás: A szelíd gesztenye viszonylag kevés gondozást igényel, egy alkalmas helyen ültetve. Az ifjú fák rendszeres öntözését igényelhetik száraz időszakokban, de érett korukban már jól tűrik a szárazságot. Ritkábban igényel metszést, csak az egészséges növekedés és a korona formálása céljából.
Felhasználás: A szelíd gesztenye ideális választás nyilvános parkokba, nagyobb kertekbe és mezőgazdasági területekre. Gyümölcsének ehetősége miatt kertészeti és mezőgazdasági értéke magas.

6a USDA-zóna

Tollgate indián banán, papau	**Asimina triloba 'Tollgate'**	18 500 Ft	18 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Tollgate indián banán, papau oltvány (Asimina triloba Tollgate) az észak-amerikai erdők egyik legízletesebb gyümölcstermő növénye, amely a Tollgate nevű nemesített fajtát képviseli. Ez a fajta a papau legjavát nyújtja: nagy méretű, kiváló ízű termésekkel, bőséges hozammal és megbízható növekedéssel. Oltványként garantáltan fajtahű, és lényegesen korábban termőre fordul, mint a magoncok. A Tollgate név a nemesítés helyszínére utal, és a fajta az egyik legkeresettebb a papau kedvelők körében.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Tollgate közepes termetű, lassú vagy közepes növekedésű fa, amely kifejlett állapotban 3-5 méter magas és 2-4 méter széles. Koronája oszlopos vagy kúp alakú, ami keskenyebb formájává teszi a fajtánál, így kisebb kertekben is elfér. Levelei nagyok, fordított tojásdad alakúak, akár 20-30 cm hosszúak is lehetnek, nyáron élénkzöldek, ősszel pedig lenyűgöző, élénk sárga és arany árnyalatokban pompáznak. Tavasszal, még a lombfakadás előtt, furcsa, bíborszínű, harang alakú virágokat hoz, amelyek különleges, enyhén erjedt gyümölcs illatukkal vonzzák a legyeket és bogarakat - ezek a természetes beporzók. A termések a Tollgate igazi büszkeségei: nyár végén, augusztus-szeptember környékén érnek be. A termések nagyok, akár 150-250 grammosak is lehetnek, hosszúkásak vagy enyhén görbültek, zöldes-sárgás héjuk van, amely éréskor meglágyul. Belsejük sárga, krémes, szinte vajas állagú, rendkívül édes, egzotikus ízű, amely a banán, mangó és ananász keverékére emlékeztet, kevés maggal.
Igényei és gondozási útmutató: A Tollgate papau eredeti élőhelyén erdőszéli, aljnövényzeti növény, ezért a tűző napot nem kedveli, különösen fiatalon. Ideális számára a félárnyékos vagy szórt árnyékos hely, ahol a közvetlen déli nap nem éri. Talajban a friss, mély rétegű, jó vízelvezetésű, enyhén savanyú (pH 5,5-7,0) talajokat részesíti előnyben. A meszes, száraz vagy pangó vizű talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, mivel a gyökerei sekélyen futnak és érzékenyek a kiszáradásra. Idősebb korban már szárazságtűrőbb, de a bőséges teméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy érett szerves trágyával érdemes gondoskodni. Metszésre általában nincs szükség, csak az elhalt vagy sérült ágakat távolítsuk el kora tavasszal. A legfontosabb tudnivaló: a papau nem önbeporzó! Két különböző genetikájú fajtára van szükség a bőséges teméshez. A Tollgate kiváló partner lehet a Rebecca`s Gold, a Prima, a Sunflower vagy a Davis fajták.
Kertstílus és növénytársítások: A Tollgate papau egzotikus megjelenése ellenére remekül illeszkedik bizonyos kertstílusokba. Természetes és erdőszéli kertekben a legotthonosabb, ahol a nagy levelek és az őszi színpompa trópusi hangulatot kelt. Gyűjteményes kertekben ritkasága miatt büszkeség lehet. Prések és vadas kertekben a termések vonzzák a madarakat és más állatokat. Vegyes gyümölcsösökbe is ültethető, de ügyeljünk arra, hogy ne kapjon túl sok napot. Házi kertekben a különleges gyümölcsök kedvelőinek kiváló választás.
Változatos növénytársítások: Beporzó partnerek: A Tollgate mellé mindenképpen ültessünk egy másik papau fajtát, például Rebecca`s Gold, Prima, Sunflower, Davis vagy Overleese. Ezek egymást beporozva hoznak bőséges termést. Árnyékadó fák: Mivel a papau fiatalon árnyékot igényel, ideális aljnövényzetnek magasabb, lombsátorral rendelkező fák alá. Jó választás a közönséges dió (Juglans regia), a hárs (Tilia) vagy a nagylevelű bükk (Fagus sylvatica). Ügyeljünk arra, hogy a dió allelopátiás hatású, de a papau általában jól tűri. Töve takarása: A papau sekély gyökérzete miatt a talajtakaró növényekkel óvatosan bánjunk. A sekély gyökerű, alacsony növények, mint a tőzegrozmaring (Andromeda polifolia), a kúszó hóbogyó (Symphoricarpos) vagy a meténg (Vinca minor) jó választás. Évelő kísérők: A fa tövébe ültethetünk páfrányokat, erdei gyöngyvirágot (Convallaria majalis), árnyékliliomokat (Hosta) vagy kárpáti harangvirágot (Campanula carpatica), amelyek szintén a félárnyékos, erdei hangulatot erősítik. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), tőzikék (Scilla) vagy hóvirágok (Galanthus) tavasszal, még a papau lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek.
Fontos tudni, hogy a papau gyökerei érzékenyek a bolygatásra, ezért az ültetés után ne ássunk körülötte. A termések teljes érésben lágyak, onnan kapták az indián banán nevet, ilyenkor hullanak le a fáról, és érdemes napokon belül elfogyasztani vagy feldolgozni, mert nem tárolhatók sokáig. A Tollgate fajta különösen ajánlott azoknak, akik egy nagy terméső, kiváló ízű papaut keresnek, amely megbízhatóan terem. USDA besorolása: 5-8.

Tomuri porzós kivi	Actinidia chinensis 'Tomuri'	4 900 Ft	6 950 Ft

Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna

Viking fekete berkenye	Aronia melanocarpa 'Viking'	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Viking' fekete berkenye, más néven arónia vagy fekete arónia, Észak-Amerikából származó, rendkívül értékes gyümölcsű lombhullató cserje. A fajta a Michigani Állami Egyetemen nemesítették, és az egyik legkedveltebb, legbővebben termő arónia fajta a világon. Termése magas antioxidáns-tartalmáról, vitamin- és ásványianyag-gazdagságáról ismert.
Közepes termetű, bokros, felálló növekedésű lombhullató cserje, amely kifejlett állapotban 1,5-2,5 méter magas és 1,5-2 méter széles. Hajtásai sötétbarnák, idősebb korban a kéreg érdekesen hámlik. Levelei tojásdadok vagy elliptikusak, 3-8 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, finoman fűrészes szélűek. Ősszel a lombozat látványos vörös-bordó színűre vált, ami különösen dekoratívvá teszi a növényt.
Május-június folyamán a hajtások csúcsán 10-15 virágból álló, ernyős virágzatok nyílnak. A virágok aprók, fehérek vagy halványrózsaszínűek, 1-1,5 cm átmérőjűek, kellemes illatúak. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Augusztus végétől szeptemberben érnek meg a termések. A 'Viking' termése nagyobb a fajtajellegű aróniánál: a bogyók 1-1,5 cm átmérőjűek, gömbölydedek, fekete színűek, felületük fényes, viaszos bevonattal. Húsuk sötétlila, lédús, ízük kellemesen édes-savanykás, kevésbé csípős, mint más arónia fajtáké. A termések a fagyok beálltáig a bokron maradhatnak, és a madarak is kedvelik.
Igényei és gondozása
A 'Viking' fekete berkenye rendkívül alkalmazkodóképes és hálás növény. Napos vagy félárnyékos fekvésben egyaránt jól fejlődik, de a legbőségesebb terméshozamot teljes napsütésben hozza. Talaj tekintetében nem igényes: a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag kerti talajokat kedveli, de a kötöttebb, nedvesebb talajokat is jól tűri. A pangó vizet nem szereti, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli.
Gondozása egyszerű, metszéssel jól formálható. Metszését kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezzük: távolítsuk el az elhalt, sérült, egymást keresztező vagy túl öreg (5-6 évesnél idősebb) hajtásokat. A termés az előző évi hajtásokon képződik, ezért a fiatal hajtásokat óvjuk. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága kiváló, akár -30 °C-ig is ellenáll, így hazánkban gond nélkül teleltethető. Betegségekkel és kártevőkkel szemben is ellenálló.
Felhasználás a kertben
A 'Viking' fekete berkenye rendkívül sokoldalúan felhasználható. Kiválóan alkalmas sövénynek, akár nyírt, akár szabadon növekvő formában. Cserjecsoportokba, vegyes cserjefalakba ültetve a sötétzöld lombozat és az őszi vörös szín remek kontrasztot ad. Magányosan, szoliterként is mutatós, különösen terméséréskor. Termőcserjeként kifejezetten értékes: a bogyók friss fogyasztásra, lekvárnak, szörpnek, gyümölcslének, befőttnek, borászati felhasználásra, sőt aszalásra is alkalmasak.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes kihasználni a sötétzöld lombozat és az őszi vörös szín kontraszttteremtő képességét. Kiváló partnerei lehetnek a sárga levelű cserjék, mint az aranylevelű fagyal (Ligustrum ovalifolium 'Aureum') vagy a sárga levelű borbolya (Berberis thunbergii 'Aurea'). Díszfüvekkel, például tollborzfűvel (Pennisetum) vagy kínai ezüstfűvel (Miscanthus) ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk. Gyöngyvesszővel (Spiraea) vagy jezsámennel (Philadelphus) társítva természetes hangulatú, könnyen fenntartható cserjecsoportot alakíthatunk ki. Alacsony termetű talajtakarók, mint a kis meténg (Vinca minor), takarják a cserje tövét.
3b-8b USDA-zóna

Violette de Sollies füge	**Ficus carica 'Violette de Sollies'**	4 750 Ft	4 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Violette de Sollies füge (Ficus carica Violette de Sollies) a fügefajták egyik legkedveltebb és legmegbízhatóbb képviselője, amely a francia Riviéráról, a Var megyében található Sollies-Ville településről származik. Ez a fajta a kiváló íz, a bőséges hozam és a viszonylag jó télállóság hármasát kínálja, ami a házi kertek egyik kedvencévé teszi. A Violette de Sollies – amely franciául solly-i ibolyát jelent – nevét terméseinek szép, sötétlila vagy ibolyaszínű árnyalatáról kapta.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Violette de Sollies közepes vagy nagyobb termetű, 3-4 méter magas és 2,5-3,5 méter széles fa vagy nagy cserje. Habitusa szétterülő, bokros, ágai erőteljesek, dús lombozatot képeznek. Levelei közepes vagy nagy méretűek, jellegzetesen karéjosak, 3-5 lebenyűek, sötétzöldek, érdes tapintásúak. A termések a növény igazi büszkeségei: a Violette de Sollies bőtermő fajta, amely két hullámban terem. Az első (breba) termések június-júliusban érnek, ezek általában nagyobbak, akár 80-100 grammosak is lehetnek. A második (fő) termések augusztus-szeptemberben, néha október elejéig érnek, ezek közepes méretűek, 50-70 grammosak. A fügék körte alakúak, a nyakuk rövid vagy közepesen hosszú. Héjuk sötétlila vagy ibolyaszínű, néha majdnem fekete, vékony, de szívós, gyakran kékes hamvas bevonattal. Húsuk élénk eperrózsaszín vagy mélyvörös, sűrű, lédús, tele apró, roppanós magokkal. Ízük rendkívül édes, mézes, eperlekvárra emlékeztető, intenzív fügearomával. A Violette de Sollies az egyik legízletesebb fügefajták között szerepel, és a termések aszalásra is kiválóan alkalmasak.
Igényei és gondozási útmutató: A Violette de Sollies a legszebb terméseit teljes napos, széltől védett, lehetőleg déli vagy délnyugati fekvésben hozza. A meleg, napfényes hely elengedhetetlen a termések beéréséhez és az édes íz kialakulásához. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes vagy semleges kémhatású, közepesen tápanyagú talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan kötött és a nagyon savanyú talajokat nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hőségben. Idősebb korban már jól tűri a rövid aszályt, de a bőséges terméshez érdemes aszályos időszakban pótolni a vizet, különösen a terméskötődés és a gyümölcsök növekedésének idején. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, komposzttal vagy fügeműtrágyával érdemes gondoskodni. Metszése kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezhető: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy egymást keresztező ágakat, valamint ritkítsuk meg a túl sűrű koronát. A Violette de Sollies jól tűri a metszést, és a visszametszett hajtásokon bőségesen terem. Teleltetése fontos kérdés: bár a fa maga fagytűrő akár -15 °C-ig, a fiatal növényeket érdemes az első 2-3 évben téli takarással (lomb, szalma, fólia, gyapjú) védeni, különösen a törzsnél. Konténerben nevelve a fagymentes, hűvös (de nem fűtött) helyen teleltethető. Kártevők közül a fügebogár, a levéltetvek és a takácsatkák okozhatnak problémát. Betegségek közül a lisztharmat, a rozsda és a szürkepenész fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A Violette de Sollies sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Mediterrán kertekben a levendula, rozmaring, kakukkfű és olajfa társaságában a délies hangulatot idézi. Házi kertekben és gyümölcsösökben a gyümölcsfák között is megfér, különösen déli kitettségben. Természetes kertekben a nagy levelei és a termések madarakat vonzanak. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a sötétlila termések és a nagy, formás levelei izgalmas textúrát és színt adnak. Falusi kertekben a hagyományos hangulatot erősíti.
Változatos növénytársítások: Más fügefajtákkal: A Violette de Sollies mellé ültetett más fügefajták (például Ronde de Bordeaux, Rouge de Bordeaux, Sucrette, Verdino, Conadria, Dauphine, Brown Turkey, Little Miss Figgy) nem szükségesek a beporzáshoz, mivel a füge önbeporzó, de a változatos termések és a hosszabb szüreti időszak miatt érdemes több fajtát is tartani. Mediterrán évelőkkel: A füge tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris) és zsálya (Salvia officinalis) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Déli gyümölcsfákkal: Olajfa (Olea europaea), gránátalma (Punica granatum) vagy datolyaszilva (Diospyros kaki) mellett ültetve egy igazi déli gyümölcsös hangulatát kelthetjük. Szőlővel: Déli fekvésű pergolán vagy kerítésen futó szőlő (Vitis vinifera) tökéletes társa lehet a fügének, hasonló igényeik miatt. Alacsony talajtakarókkal: A füge alá ültetett kakukkfű (Thymus) vagy varjúháj (Sedum) fajták takarják a csupasz talajt, miközben szárazságtűrők és nem versengenek a vízért. Tavasszal virágzó hagymásokkal: A fa alá ültetett krókuszok (Crocus), nárciszok (Narcissus) vagy tőzikék (Scilla) tavasszal, még a füge lombfakadása előtt vidám színfoltot jelentenek.
A Violette de Sollies kiváló választás azok számára, akik egy megbízható, bőtermő, rendkívül ízletes, sötétlila termésű fügét keresnek, amely a mediterrán kertek egyik alapvető eleme lehet, és a termések aszalásra is alkalmasak. USDA besorolása: 7-10 (téli takarással 6-os zónában is tartható).

KÚSZÓ- ÉS FUTÓNÖVÉNYEK

Arany kúszó kecskerágó	**Euonymus fortunei 'Sunspot'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Aranyló színfolt a kertben: Euonymus fortunei 'Sunspot'
Az Euonymus fortunei 'Sunspot' a kúszó kecskerágó egyik leglátványosabb, tarka levelű változata. Ez az örökzöld talajtakaró nem csupán funkcionális növény, hanem igazi dísze a kertnek: leveleinek közepén ragyogó aranysárga folt hívja fel magára a figyelmet, amely napfényben szinte világít. Sötétzöld levélszélekkel keretezett, ovális-elliptikus levelei egész évben üde színt adnak az ágyásoknak, sőt, a téli hideg hatására gyakran enyhén rózsaszínes vagy bordó árnyalatot is ölthetnek.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Sunspot' habitusa a körülményektől függően változó: fiatalon inkább kúszó, később terebélyesedő, kissé felálló formájú lehet. Talajtakaróként a földön kúszva sűrű, szőnyegszerű borítást ad. Idősebb korában, vagy ha támasztékot talál, akár alacsony falakra, kerítésekre is felkúszhat.

Magasság: A növény végső magassága általában 40-100 cm között alakul.

Szélesség: Terjedése jelentős lehet, elérheti a 100-240 cm-t is, ami kiváló talajtakaróvá teszi. Nyáron megjelenő virágai jelentéktelenek, zöldes színűek, de ősszel néha narancsvörös álterméseket hozhat, amelyek madárcsalogatóként is szolgálnak.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: A tarka levelű növények általában több fényt igényelnek a színük megtartásához. A 'Sunspot' napos vagy félárnyékos helyen fejlődik a legszebben. Naposabb helyen a levél közepén lévő arany folt sokkal élénkebb és intenzívebb lesz. Árnyékban a levél kizöldülhet, és visszaüt a zöld változatra.

Talaj: Nem igényes, az átlagos kerti talajokat jól tolerálja. A jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, humuszos talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a begyökeresedésig. Idősebb korában közepes vízigényű, a hosszan tartó szárazságot megszenvedheti, de általában jól tűri a rövidebb aszályos időszakokat is.

Télállóság (USDA-zóna): A növény besorolása szerint USDA 5-9 zónákban teleltethető, ami azt jelentené, hogy Magyarország nagy részén télálló. Azonban megjegyzendő, hogy nem olyan télálló, mint más fajták, és a fiatal növények védelmet igényelhetnek a téli szelek ellen. Ezért a leghidegebb tájakon vagy szélsőségesen kontinentális éghajlaton érdemes számára szélvédett, napos helyet választani, és a fiatal töveket az első években takarással védeni.

Metszés: Metszése tavasszal vagy nyár elején, a kívánt formára igazítva végezhető. Visszavágással sűrűbb növekedésre ösztönözhetjük. Időnként előfordulhat, hogy egy-egy hajtás "visszazöldül" (reverzió), azaz elveszíti a sárga színt. Ezeket a teljesen zöld hajtásokat érdemes minél előbb eltávolítani, hogy ne terjedjenek el, és ne nyomják el a tarka változatot.

Ellenállóság: A kecskerágó fajtákhoz hasonlóan fogékony lehet a takácsatkákra és a kecskerágó-pajzstetűre. A jó, szellős elhelyezés sokat segíthet a megelőzésben.

Kertstílus és növénytársítások:
Rendkívül sokoldalúan felhasználható növény a ragyogó lombozata miatt:

Talajtakaró: Nagy felületek gyommentes borítására ideális. Fák, bokrok alatt, lejtőkön, nehezen megművelhető helyeken.

Szegélynövény: Ágyások, utak szegélyezésére alacsony, örökzöld sövényként.

Sírkert: Örökzöld mivolta és dekoratív megjelenése miatt gyakori választás temetőkbe.

Konténeres növény: Erkélyen, teraszon cserépben is tartható, ahol lelógó hajtásaival díszít.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Sziklakert, évelőágyás: Színes foltot biztosít más évelők között.

Ajánlott növénytársítások:

Sötétlombú növények: Az aranysárga levélfoltok fantasztikusan kiemelkednek a sötétzöld vagy bordó levelű növények közül. Társítsuk bordó levelű borbolyával (Berberis) vagy sötétzöld örökzöldekkel (pl. tuja, hamisciprus).

Kék és lila virágú évelők: A sárga és lila klasszikus kontraszt. Ültessünk mellé levendulát (Lavandula), macskamentát (Nepeta) vagy kék árnyékliliomot (Hosta).

Fehér virágú növények: Elegáns, világító kombinációt alkot a fehérrel, például fehér kecskerágóval vagy fehér évelőkkel.

Tavaszi hagymások: A sárga lombozatú növények között gyönyörűen mutatnak a kék és lila hagymások, mint a jácint vagy tulipánok.

Zóna:5a

Aranyszív borostyán	**Hedera helix 'Gold Heart'**	3 450 Ft	3 950 Ft

A Hedera helix 'Gold Heart' (Aranyszív borostyán) egy örökzöld kúszócserje, fényes-zöld leveleinek közepe terjedelmes világossárga folttal díszített, nagyon dekoratív! Kezdetben ugyan kissé lassan fejlődik, később azonban falra, vagy fatörzsre futtatva lenyűgözően szép látvány! 6a-9b USDA-zóna

Aranytarka kúszó kecskerágó	**Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Az Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' (Arany kúszó kecskerágó) kezdetben felfelé törő, majd később oldalirányban terjedő 1 m magas örökzöld cserje. Smaragdzöld levelei széles aranysárga szegélyűek, télen pirosasra színeződnek. Talajtakarónak és alacsony sövénynek kitűnően alkalmas.
A levelek kicsik, tojásdad alakúak, és élénk arany-sárga színnel rendelkeznek, amelyeket élénk zöld vonalak szegélyeznek. A lombozat frissességét egész évben megőrzi, így télen is színpompás látványt nyújt. Az Aranytarka kúszó kecskerágó terjedő, kúszó növekedést mutat, és könnyen formázható a kívánt méretre és alakra. Ideális választás lehet talajtakaróként, vagy akár sövényként is, különféle kerti környezetekben. Az Aranytarka kúszó kecskerágó jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékos területeken fejlődik a legjobban. A napfényre való kitettség fokozza az arany-sárga szín intenzitását. Ez a kúszónövény nem igényel különleges talajtípust, de a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben.
Az Aranytarka kúszó kecskerágó kiválóan alkalmazható talajtakaróként dombos kertekben, sziklakertekben vagy éppen sírkertekben. Sövényként való használata is hatásos lehet, különféle kerttípusokban. A növény ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi szépségét és zöld színét.
6a-9b USDA-zóna

Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó	**Euonymus fortunei 'Canadale Gold'**	2 950 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Viszonylag nagy levelei díszes sárgatarkák. A megszokott alacsony termetű kúszó kecskerágók mellett, ez a fajta valamivel magasabb, elérheti a 80-100cm-t, kiváló talajtakaró örökzöld díszcserje, de egy-egy egész évben színes folt kialakítására is alkalmas a kertben. Gyakrabban nyírva tömör gömböt alkot, ritkább nyírás mellett koronája kissé fellazul.
A levelek nagyok, tojásdad alakúak és élénk arany-sárga színnel rendelkeznek. A lombozat dús és tömött, hozzájárulva a cserje vonzó megjelenéséhez. Ez a kúszó kecskerágó terjedő növekedést mutat, amely lehetővé teszi, hogy szőnyegszerűen borítsa a talajt. Könnyen formázható és ellenálló, így ideális választás talajtakaróként vagy sövényként. A cserje tavasszal apró, észrevétlen zöldes-vöröses virágokat hoz, amelyek után kis, díszes magvak alakulnak ki. Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékosabb területeken fejlődik a legjobban. A napfényre való kitettség segíti a színes levelek intenzitását. A cserje nem igényel különleges talajt, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben.
Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó ideális választás lehet talajtakaróként dombos kertekben, sziklakertekben vagy éppen sírkertekben. Sövényként is hatékonyan használható, díszítve ezzel kertek és parkok területeit. A növény ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi szépségét és zöld színét.

Gondozási útmutató

Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágót olyan helyre ültessük, ahol a talaj jó vízelvezetésű és laza.
Az ültetési időpont leginkább őszi vagy tavaszi időszakra ajánlott.
Az újonnan telepített növényeket rendszeresen öntözzük, hogy segítsük a gyökérzet kialakulását.
Idővel a kúszó kecskerágó ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben, de a kiszáradás elkerülése érdekében száraz időszakokban rendszeresen gondoskodjunk a megfelelő öntözésről.
Tavasszal és nyáron trágyázzuk a növényt, hogy segítsük a fejlődését és a színes levelek intenzitását.
Az elszáradt vagy beteg részeket rendszeresen távolítsuk el, hogy a cserje egészséges és rendezett maradjon.
Igény esetén formázzuk meg a kúszó kecskerágót, hogy kívánt alakja és mérete legyen.
Ha az adott térségben hideg telek szoktak lenni, a növényeket takarjuk le mulccsal vagy száraz levelekkel a hideg hónapokban, hogy megvédjük őket a fagyoktól.

Az Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó gondozása viszonylag egyszerű, és a megfelelő gondoskodással hosszú éveken át szép és egészséges kertdíszítő lehet.

Zóna:5a

BARENBURG Dichondra, Kúszó pázsitszulák	Dichondra repens	7 500 Ft	7 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Dichondra – Zöld talajtakaró
Dichondra repens /kúszó pázsitszulák/ – egy évelő, apró levelű, élénk zöld színű, gyorsan növő talajtakaró növény. A kertekben a gyep helyettesítését szolgálhatja, oldalhajtásaival terjed, így a talajt sűrűn beborítja. 3-5 cm-es magasságú szőnyegszerű talajtakaró. Naposabb, szárazabb helyeken alacsonyabbra nő és levelei is kisebbek, árnyékos, nedves helyen nagyobbak lesznek a levelei és magasabbra növekszik.
Különösen alkalmas fák, kerti növények közötti talajborításra, kerti tipegők közeinek kitöltésére vagy olyan helyeken, ahol a fű ápolása nehézkes. Jól tolerálja a különböző talajtípusokat, valamint a napos és árnyékos területeket egyaránt.
A taposást, igénybevételt mérsékelten tűri, különleges zöld színét egész évben megőrzi. -5°C alatt levelei barnulhatnak, azonban az áttelelést követően tavasszal regenerálódik.
Talaj előkészítése a vetéshez:
Lazítsuk a talajt kb. 15 cm mélyen és egy aprómorzsás, egyenletes, jól elmunkált magágyat készítsünk a vetéshez. Fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy a telepítendő terület vízelvezetése megfelelő legyen, hiszen ez jelentősen hozzájárul majd az egészséges, sűrű növényzet kialakulásához. Célszerű a gyep telepítéséhez ajánlott műtrágya használata a vetést megelőzően.
Vetés ideje, módja:
A Dichondra telepítéséhez legalkalmasabb időpont, amikor a nappali hőmérséklet 20 °C felett van, az éjszakai hőmérséklet pedig nem süllyed 10 °C alá. Ez egyaránt lehet tavaszi vagy őszi időszak. A csírázási idő 7-14 nap, a körülmények függvényében.
A vetéshez ajánlott vetőmag mennyisége 10 g/m2, a vetés mélysége kb. 0,5 cm legyen. A telepítést követően gondoskodjunk a gyakori, kisadagú öntözésről az eredményes kelés érdekében.
Öntözés
A vetést követően szükség van gyakoribb öntözésre a gyors csírázás és kezdeti fejlődés elérése érdekében. A kellően megerősödött, kifejlett növényeket viszont ritkábban, ám nagyobb vízmennyiséggel ajánlott öntöznünk. Mindezzel elősegíthetjük a mélyre hatoló gyökérzet kialakulását. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a Dichondra inkább szenved a túl sok öntözéstől, mint a ritkább öntözés következményeitől.
Nyírás
Az első nyírásra akkor kerüljön sor, amikor a növényzet eléri az 5 cm-es magasságot. A későbbiekben az ajánlott nyírási magasság 3-5 cm, azonban arra ügyeljünk, hogy a nyírási magasságot lassan, fokozatosan és kis léptékben csökkentsük. Kéthetente ajánlott nyírnunk, de tetszés szerint nyírás nélkül is hagyhatjuk.
Tápanyagellátás
A tavasszal elvégzett vetés utáni kelést, kezdeti fejlődést követően 4-6 g/m2 N hatóanyagot juttassunk ki, amit a későbbiekben 4-6 hetenként megismétlünk a nyár folyamán. Arra ügyeljünk, hogy a műtrágya kijuttatásakor a levélzet száraz legyen és a tápanyagellátást követően a levélzetről mossuk le a talajra a granulátumokat.

Bordólevelű japán lonc	**Lonicera japonica 'Purpurea'**	5 350 Ft	5 350 Ft

A Bordólevelű japán lonc látványos örökzöld cserje, melynek a leginkább szembetűnő jellemzője az élénk bordó levelek. A levelek színe a növény különleges vonzerejét fokozza, és a kert díszítésében egyedi kontrasztot nyújt más növények hátttereként. A fajta jellegzetességei közé tartoznak az apró krémszínű virágok és az elbűvölő illatuk, melyek vonzzák a méheket és a pillangókat.
Gondozás: A Lonicera japonica 'Purpurea' gondozása viszonylag könnyű, és a megfelelő körülmények között hosszú éveken át élvezheti szépségét.
1. Fény és hely: Az egész napos vagy félárnyékos helyszín a legjobb választás a növény számára. A megfelelő fényviszonyok elősegítik a lombozat intenzív színét és az egészséges növekedést.
2. Talaj: A jó vízáteresztő képességű, tápanyagokban gazdag talaj segíti a növény megfelelő fejlődését. Kerti földet keverjen össze komposzttal vagy falevélhumusszal a talaj szerkezetének javítása érdekében.
3. Öntözés: Az első években rendszeres öntözésre van szüksége a növénynek, hogy kifejlessze gyökérzetét. Miután megerősödött, ellenállóbb lesz a szárazsággal szemben. Ellenőrizze a talaj nedvességtartalmát, és öntözze meg mérsékelten.
4. Metszés: A metszést tavasszal vagy kora nyáron végezze el a formázás és a méret visszafogása érdekében. Elhervadt vagy beteg hajtásokat bármikor eltávolíthatja.

Zóna:5a

Cserjés törpeborostyán	**Hedera helix 'Erecta'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hedera helix 'Erecta' - Csodásan formált, felkapaszkodó örökzöld növény, amely kerteket és otthonokat varázsol díszesebbé!
Jellegzetes, szív alakú levelei ragyogó, sötétzöld színűek. Szárai Felfelé törő szárai 1 méter magasságot érnek el. A lombozat sűrűsége és tömörsége miatt tökéletesen alkalmas, alacsony hogy falakat, kerítéseket, burkoljon be, így szépen kiemelkedik a környezetéből. Egyedi és látványos vertikális elemeket hozhatunk létre a kertben vagy akár az otthonok homlokzatán, támfalakon.
Az Cserjés törpeborostyán a részleges árnyékot és a napos helyeket is jól tűri, ami lehetővé teszi a széles körű telepítést. A jó vízáteresztő képességű talaj és az időnkénti öntözés hozzájárul a növény optimális egészségének és növekedésének fenntartásához.
A Cserjés törpeborostyán egyszerűen gondozható növény. Az időnkénti metszéssel a méretét és alakját könnyen ellenőrizhetjük. A támrendszerrel vagy hálóval ellátott felületeken az növény könnyen felkapaszkodik, de szükség lehet időnkénti irányításra, hogy megfelelően formálható legyen.

5b USDA-zóna

Csillagjázmin	Trachelospermum jasminoides	3 750 Ft	3 750 Ft

A Trachelospermum jasminoides (Csillag jázmin) tavasszal nyíló fehér virágai csodálatos illatúak, ami tág környezetében érezhető. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. Ültetést követő első télen takarást igényel, mert a természetes élőhelyén a mi teleinknél enyhébb telekhez szokott és fiatal korában már a - 10 oC is jelentős károkat okozhat. Az ország kevésbé enyhe telű részein edényesként kell tartanunk, de fantasztikus édes jázminillatával kárpótolja fáradozásunkat! Támasz mellett neveljük! 7b-9b USDA-zóna

Csüngő rozmaring	Rosmarinus officinalis 'Prostratus'	2 450 Ft	2 950 Ft

A rozmaring fajták egyik legnépszerűbb csüngő változata. Dézsákba, rézsűkbe kiváló dísz-, illetve fűszernövény! 7b-10a USDA-zóna

Eichholz madárbirs	Cotoneaster dammeri 'Eicholz'	2 450 Ft	2 450 Ft

Apró fényes örökzöld leveleivel, tavasszal, és nyárelőn nyíló kicsi fehér virágaival díszítő növény, mely nagy jól alkalmazható félárnyékos, árnyékos kopasz felületek növényesítésére, vagy éppen meredek rézsűk szőnyeg szerű eltakarására. Jól tűri a rideg bánásmódot, de fontos, hogy egységes szőnyeget alkothasson. Helyenként felálló vesszőit nyugodtan csípjük vissza, ez a gyorsabb sűrűsödését vonja majd maga után.
 A cserje tavasszal apró, fehér vagy rózsaszín virágokkal díszül. A virágzást követően piros vagy narancssárga bogyókat hoz, amelyek különleges kontrasztot képeznek a sötétzöld levelekkel. Az Eichholz madárbirs terjedő, szőnyegszerű növekedést mutat, amely különféle talajtakaró felhasználásokhoz kiválóan alkalmazkodik. Könnyen formázható, így szép szélességet és teret foglal el a kertben.Ez a madárbirsfajta jól alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékosabb területeken mutatja meg legjobban szépségét. Az Eichholz madárbirs számos talajtípust tolerál, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben. A pH-érték szempontjából nem igényes, ami tovább növeli a kerti alkalmazhatóságát.
A talajtakaró jellege miatt az Eichholz madárbirs kiváló választás lehet dombos kertekben, sziklakertekben vagy olyan területeken, ahol a talajt kell borítani. Emellett ideális dísznövényként is funkcionálhat, kiegészítve más cserjék vagy évelők társaságát.Az Eichholz madárbirs ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi vonzó megjelenését.

Elegant örökzöld mirtuszlonc	Lonicera nitida 'Elegant'	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

1-1,5 m magas, sötétzöld lombú, örökzöld cserje. Alakja kezdetben mereven felálló, sűrű ágú, csúcsa és az oldalhajtások elegánsan ívesen bókolók. Mattzöld levelei 5 cm nagyságúak, alakjuk hosszúkás. Illatos, szép fehér virágai május-júniusban nyílnak. Talajtakarásra, vagy alacsony nyírott sövénynek kiváló!

Az Elegant mirtuszlonc általában mérsékelt növekedésű, kerekded alakú cserje, amely eléri az átlagosan 1-1,5 méteres magasságot és terjedést. Kompakt formájának köszönhetően ideális választás kisebb kertek és terek számára is. A növény sűrű lombkoronáját apró, sötétzöld levelek alkotják, melyek egész évben megmaradnak. A levelek kis mérete és rendezett elrendezése a növénynek elegáns és ápolt megjelenést kölcsönöz. Jól alkalmazkodik különböző fényviszonyokhoz, de általában napos vagy félárnyékos elhelyezést kedveli. Jól tűri az árnyékosabb környezetet is, de a legjobban a naposabb területeken fejlődik. Az Elegant mirtuszlonc viszonylag szegény talajon is jól nő, de jobban teljesít tápanyagdús, jó vízáteresztő képességű talajban. Mérsékelt vízigényű növény, de fontos, hogy ne hagyjuk kiszáradni a talajt.
A növény könnyen formázható és fenntartható. Érdemes rendszeresen metszeni, hogy megőrizzük a kívánt alakot és sűrűséget. Télen is megtartja díszítő értékét, így térburkolatként vagy sövényként is kiválóan használható.
Az Elegant örökzöld mirtuszlonc tehát egy elegáns, díszes és könnyen kezelhető növény, amely széles körben alkalmazható kertépítészetben, és hozzájárul egy szép és ápolt kert kialakításához.

6b USDA-zóna

Eva borostyán	Hedera helix 'Eva'	3 950 Ft	4 250 Ft

Az Adam nevű fajtához igen hasonló, kicsi, fehértarka, de mélyebben karéjos levelekkel rendelkező, borostyánfajta, mely igen látványos falakra,vagy kerítésekre felfuttatva. Az árnyékos termőhelyről kibújva napos felületeken is szépen teljesít. Fehértarka levelei nem égnek meg, és mivel növekedése visszafogottabb, kevesebb gondozást is igényel. Emellett sövénynyíróval jól formázható, kaspókba, cserepekbe is ültethető.Növénykazettákban igen jó talajtakaró. Romantikus falusi kertek fontos növénye a borostyán. A tarka levelűek valójában szoliter növényekként is alkalmazhatóak, hiszen amire felfutnak, arratarka színükkel fel is hívják egyúttal a figyelmet. Gondos metszésével pedig így a figyelem központjába kerülő értékes részlet mindig kellemes részlete lehet a kertnek. Régi épületekre, kerti tárolókra, vagy akár nagy sziklákra futtatva romantikus, vadregényes hatást érhetünk el.
Az Eva borostyán gyorsan növekszik és könnyen formázható, így a kerttervezők számára is nagyszerű választás. Ez a fajta borostyán jól alkalmazkodik a különböző növekedési körülményekhez, beleértve a napfényes vagy félárnyékos területeket, valamint a különböző talajtípusokat. A növény ellenálló a szennyeződésekkel és a városi környezet negatív hatásaival szemben, így ideális választás lehet városi kertek vagy parkok számára.

USDA zóna: 6b

Fehér banks rózsa	Rosa banksiae 'Alba'	3 390 Ft	3 390 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Fehér Banks rózsa (Rosa banksiae 'Alba') változat egy gyönyörű, kevés tüskés kúszórózsa, mely 4-6 méter magasra és 3-5 méter szélesre nőhet . Jellegzetes apró, telt fehér virágfürtjeit április-májusban hozza, melyek enyhe ibolyillatot árasztanak . Kiváló választás pergolák, ívek, kerítések befuttatására, vagy falra vezetve.
Főbb jellemzők
Virágok: Apró (2 cm), telt fehér virágok nagy fürtökben Levelek: Kis méretű, fényes zöld, örökzöld (enyhe éghajlaton) Tüskék: Minimális számú - könnyű kezelés Télállóság: -12°C-ig ellenálló (7-10. zóna) - fiatalon érdemes védeni
Közép- és Nyugat-Kínában honos, ahonnan Sir Joseph Banks botanikus hozta be az 1800-as évek elején Európába és feleségéről, Dorothea Lady Banksről nevezte el. Egy erőteljes növekedésű futórózsa, amely jellemzően legfeljebb 5-6 m-es ágakat nevel. A legtöbb rózsával ellentétben gyakorlatilag tövis nélküli, ami sokat tett népszerűségéért. Enyhébb teleken örökzöldként működik nálunk is! Kicsi, 2 cm átmérőjű virágai fehérek és enyhén illatosak. Rózsák között a korán (májustól) nyílók közé tartozik. Tökéletes kúszónövényünk lehet! Az arizonai Tombstone-ban 1885-ben telepített Rosa banksiae birtokolja a világ legnagyobb rózsabokra címet. Egy 840 m2-es felületet borít be és 3,7 m törzsének a kerülete.

Az 'Alba' fajtajelzője a hatalmas, fehér virágok, amelyek különösen látványosak a tavaszi hónapokban. A virágok csoportokban jelennek meg, és bőségesen fedik a növényt, így lenyűgöző látványt nyújtanak.Ezen kívül, a Fehér Banks rózsa 'Alba' erőteljes és kellemes illatot áraszt, amely még tovább fokozza a kert vagy terasz hangulatát. A levelek aprók és sötétzöldek, az év nagy részében megőrzik frissességüket, így a rózsa télen is vonzó marad. Ez a fajta gyorsan növő, kúszó rózsa, amely pergolák, kerítések vagy más támaszok mentén könnyedén felkúszik. A hajlékony ágak lehetővé teszik, hogy a rózsa könnyedén alkalmazkodjon a környezetéhez és a kert tervezési elgondolásokhoz. A Fehér Banks rózsa 'Alba' napos vagy félárnyékos helyeken fejlődik a legjobban. A napfény segíti a bőséges virágzatot és az intenzív illat kialakulását. Nem válogatós a talaj típusát illetően, de a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj előnyös számára. A Fehér Banks rózsa 'Alba' ideális választás lehet pergolák, kerítések vagy falak díszítésére. Kiválóan alkalmas kertek romantikus, vidéki vagy mediterrán stílusú kialakításához. Rendkívül ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi látványos megjelenését.
A Fehér Banks rózsa 'Alba' egy varázslatos választás lehet azoknak, akik kertjüket szeretnék romantikusabbá és illatosabbá tenni. A fehér virágok bősége és az erőteljes illat egyaránt garantáltan lenyűgözővé teszi ezt a rózsa fajtát.

7b-9bUSDA-zóna

Fehér kis télizöld	**Vinca minor 'Gertrude Jekyll"**	1 950 Ft	1 950 Ft

Vinca minor ‘Gertude Jekyll’ - Fehér kis télizöld, kis meténg- alacsony örökzöld talajtakaró félcserje, sötétzöld levelei között szépen mutatnak apró fehér virágai. Szőnyegként borítja be a talajt. Ötszirmú apró fehér virága április-májusban nyílnak A virágzó hajtások felállók, a meddők elfekvők, legyökeresedők. Félárnyékos, párás helyet kedveli. Talaj: Mérsékelten száraz, jó vízáteresztő, laza szerkezetű, közepes tápanyagtartalmú földben érzi jól magát. Lúgos, vagy semleges kémhatású talajt szereti. Nagy felületek árnyéki talajtakarására használjuk.

Fehértarka kúszó kecskerágó	**Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' (Fehértarka kúszó kecskerágó) jellemzően fél méteres örökzöld törpecserje, levelei fehér szegélyűek, ősszel kissé rózsaszínesek lesznek. Kiváló talajtakaró.

A növény levelei érdekes színkombinációval rendelkeznek. A levéllemezeken élénk zöld szín találkozik fehérrel, létrehozva egy különleges, élénk kontrasztot. A levelek ovális alakúak és egymáshoz közel helyezkednek el, létrehozva egy sűrű, kompakt lombkoronát. Az 'Emerald Gaiety' fajtaváltozat általában mérsékelt növekedésű, de terjedelmes növény. Kúszó habitusának köszönhetően alkalmas talajtakaróként vagy sövényként történő alkalmazásra. A növény eléri az átlagosan 60-90 centiméteres magasságot és akár 120 centiméteres terjedést.
Az 'Emerald Gaiety' napos vagy félárnyékos helyen is jól fejlődik. Jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a gazdagabb színek és sűrűbb növényzet érdekében a naposabb elhelyezést részesíti előnyben. A növény szárazságtűrő és könnyen gondozható. Jól adaptálódik különböző talajtípusokhoz, de a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajokat részesíti előnyben. Az 'Emerald Gaiety' könnyen karbantartható, és rendszeres metszéssel formálható. A túlzott növekedés vagy a formai egyenetlenségek kijavítása érdekében érdemes évente legalább egyszer metszeni.
Az 'Emerald Gaiety' Fehértarka kúszó kecskerágó tehát kiváló választás lehet azoknak, akik egy színesebb és dekoratívabb kertet szeretnének létrehozni, különleges levelezettel és könnyű karbantartással.

5a-9a USDA-zóna

Fehértarka levelű kis meténg	**Vinca minor 'Variegata'**	3 450 Ft	3 450 Ft

A fehértarka levelű kis meténg (Vinca minor 'Variegata') egy örökzöld, virágzó évelő, mely igen hatékony gyeppótlóként használatos olyan helyeken, ahol egységes gyepfelületeket szinte reménytelen az árnyék miatt kialakítani. 5-10 cm-nél nem nő nagyobbra. Indáival sűrűn behálózza a talajfelszínt, ügyesen terjeszkedik, ezért nem is nagyon érdemes más évelőkkel társítani, hiszen gyorsan elfoglalja azok teritóriumát is. Viszont egységes nagy szőnyegeket könnyű vele kialakítani, esetleg mulcsot helyettesíthetünk vele nagyobb cserjecsoportok alatt.
Lépőkövek köz, támfelelemekbe, szórt kavicsos felületekre is egyerán kiültethető.
Teljesen télálló, sokoldalú növény, melyet érdemes sok kertbe telepíteni.

Flamenco narancsvörös trombitafolyondár	**Campsis radicans 'Flamenco'**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Flamenco' trombitafolyondár, más néven trombitaflaszter vagy csavarpuszpáng, Észak-Amerika keleti részéről származó, rendkívül erőteljes növekedésű lombhullató kúszónövény. A Campsis radicans egyik legkedveltebb, élénkpiros virágú fajtája, amely a spanyol flamenco táncosok ruhájának színét idézi. Erőteljes növekedésű, önmagán is kapaszkodó, lombhullató kúszónövény, amely kifejlett állapotban 5-10 méter magasra is felkapaszkodhat. A növény léggyökerekkel és tapadókorongokkal rögzíti magát a támasztékhoz, így külön támrendszer nélkül is feljut a falakra, kerítésekre. Hajtásai hosszúak, rugalmasak, idősebb korban a kéreg hosszanti irányban repedezik.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 20-40 cm hosszúak, 7-11 darab fogazott szélű, tojásdad vagy lándzsás levélkéből állnak. A levélkék felszíne sötétzöld, fényes, fonákjuk világosabb. A lombozat sűrű, dús, kellemes árnyékot nyújt a nyári hónapokban.
A növény igazi dísze a nyári virágzat. Júliustól egészen szeptemberig, sőt kedvező időjárás esetén akár októberig bőségesen hozza a hajtások végén, fürtökben nyíló, 5-7 cm hosszú, tölcsér vagy trombita alakú virágait. A virágok színe élénkpiros, torkukban sárgás folttal, ami még feltűnőbbé teszi a virágokat. A virágok cső alakúak, hosszúkásak, a méhek és a kolibrik (ahol előfordulnak) kedvelt nektárforrásai. A virágzás időszaka hosszan tartó, a növény a késő nyári kert egyik legszínpompásabb dísze.
Igényei és gondozása
A 'Flamenco' trombitafolyondár napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza; félárnyékban virágzása mérsékeltebb lehet. Talaj tekintetében nem igényes, a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású kerti talajokban fejlődik a legszebben. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot a kiültetett példányok már jól elviselik.
Gondozása egyszerű. Metszését kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezzük: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy túl sűrűvé vált hajtásokat. Mivel a virágok az új hajtásokon képződnek, a visszavágás serkenti a virágzást. A növény erőteljes növekedésű, ezért időnként erőteljes visszavágásra is szükség lehet, hogy a kívánt formában tarthassuk. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága jó, a keményebb teleken a fiatal hajtások visszafagyhatnak, de tavasszal megbízhatóan újrahajt. Hazánkban a legtöbb területen gond nélkül teleltethető.
Felhasználás a kertben
A 'Flamenco' trombitafolyondár kiválóan alkalmas pergolák, lugasok, kerítések, rácsok, házfalak befuttatására. Sűrű lombozatával kellemes árnyékot ad nyáron, élénkpiros virágaival pedig a késő nyári kert egyik leglátványosabb dísze. Gyors növekedésű, így nagyobb felületek gyors zöldítésére is ideális. Dézsában, konténerben is nevelhető, ahol teraszok, erkélyek dísze lehet – ilyenkor a téli védelem is könnyebben megoldható.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos fekvést kedvelő kúszónövényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a sárga virágú iszalagfajták (Clematis), amelyek színben is gyönyörűen kiegészítik a piros trombitafolyondárt. Lila vagy kék virágú loncfajtákkal (Lonicera) ültetve izgalmas színkontrasztot hozhatunk létre. Tövébe ültethetünk alacsony termetű, napos fekvést kedvelő évelőket, mint a levendula (Lavandula) vagy a macskamenta (Nepeta), amelyek a kúszónövény alsó részét takarják. Mediterrán hangulatú kertekben jól mutat olajfa, gránátalma vagy füge társaságában.
6a USDA-zóna

Francis borostyán	**Hedera helix 'Francis'**	3 950 Ft	4 250 Ft

A többi borostyánfajtához képest gyorsabb ütemben fejlődik. Egészséges zöld levelei kevésbé mélyen karéjosak, inkább fodrosak, de ennél a növénynél is több formájú levéllel találkozhatunk egy-egy egyeden. Árnyas, üde talajú termőhelyek növénye, de sokan tartják kaspóban, cserépben érdekes levelei miatt. Ilyen helyzetekben kis állványt érdemes elhelyezni a cserében, amire fel tud kapaszkodni, hogy nagyobb felületen láthassuk a leveleit. A többi borostyánhoz hasonlóan fel tud kapaszkodni drótfonatokra, de falfelületekre is. Fontos tudni, hogy a borostyánok a felszínen látható gyökereikkel csak rátámaszkodnak az őket tartó falra, vagy másik növényre, táplálék felvételére ezek nem alkalmasak. Így ilyen értelemben nem élősködnek más növényeken, ellenben lombjukkal elveszik tőlük a teret, a fényt, ezért térparazitáknak nevezzük őket.
A Francis borostyán gyorsan növekszik és könnyen gondozható. Jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz és növekedési körülményekhez, beleértve a napfényes vagy félárnyékos helyeket. Rendszeres metszéssel könnyen karbantartható és formázható, így a kerttervezők és kertgondozók számára is ideális választás.
USDA zóna: 6b

Graham Thomas kúszólonc	**Lonicera periclymenum 'Graham Thomas'**	4 950 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Graham Thomas Kúszólonc (Lonicera periclymenum 'Graham Thomas') – Az illatos, későn virágzó kúszócserje

A Graham Thomas Kúszólonc (Caprifoliaceae) családjába tartozó, európai erdőkben őshonos erdei lonc nemesített fajtája. A fajta a híres angol kertész, Graham Thomas tiszteletére kapta nevét. Ez a növény a nyár második felében nyíló, illatos virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb futónövény a kertekben. A könnyű gondozhatósága, gyors növekedése és a méhek, pillangók, majd ősszel a madarak vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Graham Thomas Kúszólonc egy erőteljes növekedésű, csavarodó szárú, lombhullató kúszócserje. Kifejlett magassága 4-8 méter, szélessége 1-1,5 méter között alakul. A növény évente jelentős méretet gyarapszik, és 5-10 év alatt éri el végleges méreteit. Hajtásai vékonyak, rugalmasak, a támaszték köré csavarodnak.

A levelek oválisak vagy tojásdadok, 3-6 cm hosszúak, a levél széle ép. A levél felszíne sötétzöld, fonáka világosabb, kékes-zöldes árnyalatú. A lombozat a növényen csak a vegetációs időszakban található, ősszel a levelek lehullanak.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a felső levélhónaljakban kialakuló, végálló fürtökben helyezkednek el. A virágok nagyok, trombita alakúak, kétajkúak. A 'Graham Thomas' fajta legjellegzetesebb tulajdonsága a virágok színváltozása: a virágok bimbóként fehérek, majd kinyílva tiszta fehér színűek, később halvány vajsárgára vagy krémszínűre színeződnek. A virágok illata erős, édeskés, különösen az esti órákban intenzív. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően júliustól szeptemberig, ami későbbi virágzást jelent, mint a legtöbb más loncfajta. A virágok a lepkéket, a méheket és más éjszakai beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, fényes piros bogyókat fejleszt. A bogyók ősszel jelennek meg, és a madarak számára fontos táplálékforrást jelentenek. Fontos tudni: a bogyók emberi fogyasztásra nem alkalmasak, mérgezőek lehetnek. A növény magról és vegetatív úton (dugványozással, rétegezéssel) egyaránt szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kúszólonc 'Graham Thomas' napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál. A napos helyen a virágzás bőségesebb, de a talaj nedvességtartalmára fokozottan figyelni kell. Félárnyékban is jól fejlődik.

Talaj: A kúszólonc 'Graham Thomas' nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, de nedvességet megtartó, termékeny, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. A talajt érdemes komposzttal vagy érett szerves trágyával dúsítani. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot is kerülni kell.

Öntözés: A kúszólonc 'Graham Thomas' közepes vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, különösen a virágzási időszakban és a fiatal növényeknél. A szárazság a levelek hervadását és a virágzás gyengülését okozhatja. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni.

Tápanyag-utánpótlás: A kúszólonc 'Graham Thomas' közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adjunk neki egy réteg (3-5 cm) érett komposztot vagy szerves trágyát a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A kúszólonc 'Graham Thomas' metszése fontos a bőséges virágzás és a növény formájának megtartása érdekében. A metszést a virágzás után, késő nyáron vagy kora ősszel kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült, gyenge vagy keresztező hajtásokat.

Formázó metszés: A túl hosszú, lombtalan hajtásokat vágjuk vissza egészséges rügyre.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növényeket néhány évente erőteljesen, akár 60 cm-es magasságúra is visszavághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Telelés és fagytűrés: A kúszólonc 'Graham Thomas' kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elveszítik leveleiket, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A kúszólonc 'Graham Thomas' az illatos virágzásának, gyors növekedésének, késői virágzási időszakának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb futónövény:

Kerítések, falak, pergolák, lugasok befuttatására – a gyors növekedés és a látványos virágzat miatt kiváló választás.

Cottage kertekbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat, a bogyók a madarakat.

Városi kertekbe, udvarokba – jól tűri a városi környezetet.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet és a szeles körülményeket.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kúszólonc 'Graham Thomas' fehér-sárga virágai és sötétzöld lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Más futónövényekkel: Iszalag (Clematis) fajtákkal – a különböző virágzási időszakok és színek egymás mellett változatos, hosszan virágzó hatást keltenek.

Rózsákkal (Rosa) – a rózsák és a lonc együttes ültetése romantikus, cottage kerti hangulatot teremt.

Évelő árnyékliliomokkal (Hosta) – a hosták nagy, dekoratív levelei a lonc tövében kiváló talajtakarót alkotnak.

Lila virágú évelőkkel: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta) – a lila és a fehér-sárga szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a kúszólonc 'Graham Thomas' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. A növény lombhullató, a téli időszakban nem igényel külön védelmet.)

Guilfoylei nagyvirágú trombitafolyondár	**Campsis x tagliabuana 'Guilfoylei'**	5 450 Ft	5 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Guilfoylei nagyvirágú trombitafolyondár (Campsis x tagliabuana Guilfoylei) a trombitafolyondárok nemesített hibridje, amely a fajta ellenálló képességét ötvözi a virágok páratlan méretével és intenzív színével. Ez a növény tökéletes választás azok számára, akik szeretnék élvezni a trombitafolyondár egzotikus megjelenését, de egy kevésbé agresszív növekedésű, könnyen kordában tartható változatot keresnek.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Guilfoylei hibrid visszafogottabb növekedésű, mint a Campsis radicans fajták. Kifejlett magassága jellemzően 4-6 méter, szélessége pedig 2-3 méter körül alakul. Lombozata sötétzöld, fényes, páratlanul szárnyalt levelekből áll, amelyek dús, egészséges megjelenést kölcsönöznek a növénynek. A virágok a fő attrakció: hatalmas, akár 8-10 cm hosszú, tölcsér alakú, külső oldalukon narancsvörös, belül sárgás torokkal. A virágok fürtökben nyílnak júniustól szeptemberig, folyamatosan vonzva a rovarokat és a pillangókat.
Igényei és gondozási útmutató: Ez a hibrid a legszebb virágdíszét teljes napos helyen hozza, ahol napi legalább 6-8 óra közvetlen napfényt kap. Félárnyékban is fejlődik, de ilyenkor a virágzás mérsékeltebb lehet. Talajban nem igényes, de a pangó vizet nem tűri; a közepesen termékeny, jó vízelvezetésű talajokban érzi magát a legjobban. Fiatal korban rendszeres öntözést igényel, de idősebb korban már elég szárazságtűrő. Metszése egyszerű: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt érdemes a tavalyi hajtásokat 2-3 rügyre visszavágni, ami serkenti az új, virágzó hajtások képződését. Teleltetésre nincs szükség, mivel teljesen fagytűrő.
Kertstílus és növénytársítások: Sokoldalúsága miatt a kerttervezés kedvelt eleme.

Mediterrán kertekben: A délies hangulatot erősíti, különösen ha terrakotta cserepekben vagy fehérre meszelt falakon fut.

Romantikus kertekben: A nagy, tölcséres virágok vidéki bájjal ruházzák fel a kerítéseket és a lugasokat.

Városi kertekben és udvarokban: Mivel kevésbé terjedékony, kisebb helyeken is biztonsággal nevelhető, akár nagyobb konténerben is.

Kortárs kertekben: Letisztult, modern építészeti elemekkel – például acélkerítéssel vagy betonfallal – kombinálva a virágok élénk színe izgalmas kontrasztot alkot.

Változatos növénytársítások:

Színkontrasztos párosítás: A fehéren virágzó havasi iszalaggal (Clematis montana) vagy ezüstlevelű olajfűzzel (Elaeagnus angustifolia) ültetve a narancsvörös virágok még látványosabbá válnak.

Magassági játék: Alacsonyabb, előtérbe ültetett levendulával (Lavandula) vagy díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) kiemelhető a futónövény függőleges hatása.

Tövek takarása: Magasra növő rózsatövek mellett futva a csupasz szárakat takarja, miközben a virágok hasonló időszakban nyílnak.

Falas kompozíció: Ha egy falat vagy kerítést több növénnyel díszítenénk, társíthatjuk a sötétebb lombozatú borostyánnal (Hedera helix) vagy a tavasszal virágzó lonc (Lonicera) fajtákkal, így évszakonként változó összképet kapunk.

A Guilfoylei hibrid előnye, hogy kapaszkodógyökereivel önállóan is felkúszik a falakra és kerítésekre, így nem igényel külön drótozást vagy futtatást. USDA besorolása: 6-9.

Hayward termős kivi	Actinidia chinensis 'Hayward'	4 900 Ft	6 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Hayward' (Hayward kivi) gyönyörű, nagy termésű változat, a világ egyik legnépszerűbb kivi fajtája! Csak porzófajtával együtt ültetve terem! Egy porzós növény 2-3 termős példány porzásához elegendő. Származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri'. A http://www.terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/kivi.html oldalon az alábbiakat találtuk róla: 'Napjaink sztár gyümölcse. Nem véletlenül, hiszen tízszer több C-vitamin van benne, mint egy almában. A szőlőhöz hasonló kúszó cserje, mindenütt termelhető, ahol a szőlő is megél. Fagyérzékenysége a csemegeszőlőkével egyezik meg. A fiatal példányokat erős fagyok esetén célszerű a földre ledöntve takarni, idősebb példányok teljesen fagyállóak. Robusztus, erőteljes növekedésű, ujjnyi vastag hajtásokkal, tengernyi, kerek szőrös levelekkel, nagy, 3 cm átmérőjű hófehér virágokkal. Metszeni, permetezni nem kell, kapálni tilos. Nálunk is tökéletesen beérik, mivel utóérő gyümölcs. Terméseit az erősebb fagyok előtt szedjük le és utóérés után - amikor megpuhul (december elejétől, április végéig)- fogyaszthatjuk. Egy tő 800-1000 db-ot is képes teremni. A saját termésű kivink sokkal édesebb és kellemesebb ízű, mint a boltban vásárolt, mivel érettebben szedjük le. Az ültetést követő harmadik évben fordul termőre.' Ezeket annyival egészíteném ki, hogy metszeni nem árt, de csak szakszerűen érdemes, mert hozzáértés nélkül a metszéssel könnyen odavész az az évi termés is. A metszés lényege, hogy a hosszú, indaszerű vesszőket nem szabad visszakurtítani, csak a számukat megritkítani, ha túlságosan buján növekednének. A gyümölcsök tárolásával kapcsolatos hazai tapasztalatok nagyon biztatóak!: ha a teljes érés előtt szedjük le a termést, tehát már majdnem éretten, csak kissé éretlenül, még keményen, akkor hűvös pincében, vagy akár egy fűtetlen, de fagymentes garázsban is hónapokig tárolhatjuk! A betárolt gyümölcsöt rendszeresen ellenőrizzük, óvatosan megérintjük, és az utóérésben előrehaladott terméseket együk meg, amelyek már kissé puhábbak. Egyes gazdáknak sikerült közel 6 hónapig tárolniuk a kivit! Az biztos, hogy az egyik legkézenfekvőbb téli vitaminforrás! Egyszerű, vegyszermentes termeszthetősége és könnyű tárolhatósága miatt komoly vétek nem foglalkozni vele! Megdöbbentő a következő adat: 2009. októberében egy letenyei (nem Olaszország, nem Új-Zéland, stb!) magánkert egyetlen leánykivijéről közel 240 kilogramm, vagyis majdnem negyed tonna termést szüreteltek!!! 6b-9b USDA-zóna

Illumination kis meténg	Vinca minor 'Illumination'	3 950 Ft	5 110 Ft

Editerrán származású alapfaj, a Vinca minor sárgatarka levelű változata. Elheverő hajtású örökzöld félcserje, lombozata aranysárga színnel tarkázott (a levelek közepén nagy aranysárga folt található), szép hátteret adva májusban nyíló kék virágainak. Kiválló talajtakaró, mely mérsékelt növekedésével kisebb kertekben, vagy vékonyabb burkolatok közötti sávokban is jól használható. Kavicsos felületkbe is elepíthető, de ilyenkor vigyázzunk, hogy a hátteret alkotó kőzet egyszínű, lehetőleg sötétbb érnyalatú legyen, ilyen helyzetben szinte világítanak a sárgatarka levelek.
USDA zóna: 5a-9b

Ír borostyán	Hedera hibernica	2 950 Ft	2 950 Ft

10-15 m magasra kúszó, gyors kezdeti növekedésű, léggyökerekkel kapaszkodó lomblevelű örökzöld cserje.
A levelek jellegzetesen nagyok, szív alakúak és csillogó zöldek. A sűrű lombozat egész évben megőrzi frissességét, és télen is színt visz a kertbe. Az Ír borostyán gyorsan növő, kúszó növény, amely könnyen felkapaszkodik a falakra, kerítésekre vagy más támaszokra. Hajlékony szárai lehetővé teszik, hogy könnyen alkalmazkodjon a környezetéhez és kialakított területekhez. A borostyánfajok nem feltétlenül hoznak látványos virágokat, de az Ír borostyán apró sárgászöld virágokat és később fekete bogyókat hozhat létre. Jól alkalmazkodik az árnyékos vagy félárnyékos környezethez, de a teljes napfényt is elviseli. A napfényre való kitettség segíti a sűrű lombozat kialakulását. Ez a borostyánfaj nem válogatós a talaj típusát illetően, de jól teljesít a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajokban.Kiváló választás lehet függőleges kertek, pergolák, vagy más kerti támaszok díszítésére. A talajtakaró képessége miatt alkalmas talajtakaróként is, különféle kerttervezési koncepciókhoz. Az Ír borostyán viszonylag ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi díszítő szerepét a kertben.
Az Ír borostyán (Hedera hibernica) könnyen gondozható és gyorsan fejlődő növény, amely sokoldalúan alkalmazható kertek és más zöld területek díszítésére. A lombozat szépsége és a hajlékony növekedési forma kiválóan kiegészíti a különböző kerti tervezéseket.
6a-8b USDA-zóna

Japán lonc	Lonicera japonica	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Japán lonc (Lonicera japonica) – illatos kúszónövény kertekbe
A japán lonc (más néven japán futólonc) Kelet-Ázsiából származó, rendkívül népszerű kúszónövény, amelyet elsősorban illatos virágai és gyors növekedése miatt ültetnek. Támasz mellett 4–8 méter magasra is felkapaszkodhat, míg támasz nélkül talajtakaróként, a földön kúszva is szépen terjed. A növény azonban hajlamos a túlzott terjedésre, érdemes a növekedésére odafigyelni.
Külső megjelenés A japán lonc levelei egyszerűek, átellenes állásúak, tojásdadok, 3–8 cm hosszúak. Felszínük fényes sötétzöld, fonákjukon világosabbak, fiatalon mindkét oldalukon szőrösek. A növény enyhe teleken örökzöld, hideg teleken azonban leveleit hullathatja. Virágai május–augusztus között nyílnak, eleinte fehérek, később sárgássá válnak, így a hajtásokon egyszerre megfigyelhető mindkét szín. A virágok csövesek, kétajkúak, jellegzetes, igen erős, édes illatot árasztanak, különösen az esti órákban. Termése ősszel beérő, fényes, kékesfekete bogyó, amely azonban erősen mérgező.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Félárnyékban a legszebb a lombszíne és a legbőségesebb a virágzás.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású (pH 6,0–7,5). Átlagos kerti talajban is megél, de laza, humuszos közegben fejlődik a legszebben.

Öntözés: közepes vízigényű; a fiatal növényeket és a tartósan száraz időszakokat kivéve nem igényel rendszeres öntözést. A jól meggyökeresedett példányok a rövid aszályt is elviselik.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával érdemes megtámogatni a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: kora tavasszal (február–március) ajánlott. A túl hosszú, sűrű vagy elöregedett hajtásokat vissza lehet vágni, hogy a növény formáját megtartsuk és a virágzását serkentsük. Metszés nélkül idővel alulról felkopaszodhat.

Telelés: kimondottan téléálló, Magyarország egész területén megbízhatóan áttelel. Enyhe teleken leveleit is megtartja.

Kártevők, betegségek: időnként lisztharmat vagy levéltetvek támadhatják meg.

Kertstílus, ahová illik Romantikus, természetes hatású kertek, falusi kertek (cottage garden), erdős szegélyek. Kiválóan alkalmas pergolák, lugasok, kerítések, falak befuttatására, de akár talajtakaróként is használható.
Változatos növénytársítások

Más kúszónövények: futórózsák, iszalag (Clematis fajták) – eltérő virágzási idővel egész szezonban díszíthetnek.

Lila virágú évelők: levendula, macskamenta, perovszkia – a japán lonc fehér virágaival szép kontrasztot alkotnak.

Rózsák: a japán lonc és a rózsák egymást erősítve is szépen mutatnak egy pergolán.

Alacsony, árnyéktűrő évelők (a növény tövéhez): páfrányok, tüdőfű, árnyékliliom.

Tavaszi hagymások: krókusz, nárcisz – a lonc lombfakadása előtt még érvényesülhetnek.

Figyelmeztetés: A japán lonc bogyós termése mérgező! Fogyasztása emberben és állatokban hányingert, hányást, hasmenést okozhat. Kisebb kertekben érdemes a terjedését rendszeres metszéssel korlátozni.
USDA besorolása: 4-9 (egyes források szerint 5-9; Magyarország egész területén, a 4b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).

Judy trombitafolyondár	Campsis 'Judy'	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Judy trombitafolyondár (Campsis Judy) a trombitafolyondárok egyik legkedveltebb modern hibridje, amelyet különleges virágszíne és visszafogottabb növekedési erélye tesz igazán különlegessé. Ez a növény tökéletes választás azok számára, akik egy kevésbé domináns, mégis látványos futónövényt keresnek, amely nem növi túl a kertet.
Kifejlett mérete és megjelenése: A Judy hibrid a trombitafolyondárok között kifejezetten kompaktnak számít. Kifejlett magassága általában 3-5 méter, szélessége pedig 2-3 méter körül alakul, ami lehetővé teszi, hogy akár nagyobb cserépben vagy korlátozott helyű kertekben is megállja a helyét. Lombozata élénkzöld, fényes, páratlanul szárnyalt levelekből áll, amelyek dús, egészséges megjelenést biztosítanak. A virágok a növény igazi ékkövei: hosszúkás, trombitaszerű formájúak, 6-8 cm hosszúak, és finom, pasztelles őszibarack-narancs színben pompáznak, gyakran sárgás torokkal. A virágfürtök júniustól szeptember végéig folyamatosan nyílnak, vonzva a poszméheket, lepkéket és más beporzó rovarokat.
Igényei és gondozási útmutató: A Campsis Judy a legszebb virágdíszét teljes napos helyen hozza, ahol napi legalább 6-8 óra közvetlen napfényt kap. Félárnyékban is fejlődik, de ilyenkor a virágok száma kevesebb lehet, és a színük is fakóbb árnyalatot vehet fel. Talajban nem válogatós, de a jó vízelvezetés elengedhetetlen; a pangó vizet egyáltalán nem tűri. A közepesen termékeny, tápanyagban mérsékelten gazdag talajokban érzi magát a legjobban. Fiatal növényként rendszeres öntözést igényel, de idősebb korban már jól tűri a rövid szárazságot. A tápanyag-utánpótlásról tavasszal, lassú felszívódású műtrágyával vagy komposzttal érdemes gondoskodni.
Metszés és teleltetés: A metszés kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából. Kora tavasszal, a rügyfakadás előtt érdemes a tavalyi hajtásokat 2-3 rügyre visszavágni, ami serkenti az új, virágzó hajtások képződését. A formázó metszés nyáron, virágzás után is elvégezhető, ha túlterjeszkedett. Teljesen fagytűrő, takarást nem igényel Magyarország legtöbb régiójában.
Kertstílus és növénytársítások: A Judy trombitafolyondár sokoldalúsága miatt számos kertstílusban megállja a helyét. Kortárs és modern kertekben lágy, pasztelles színeivel tökéletesen illeszkedik a letisztult vonalakhoz és a természetes anyagokhoz, mint a beton, fa vagy acél. Romantikus kertekben a finom szín és a dús lombozat vidéki bájjal ruházza fel a lugasokat, kerítéseket és a régi falakat. Kisvárosi és előkertekben kompakt mérete miatt ideális választás kisebb udvarokba, ahol a nagyobb trombitafolyondárok már nem férnének el. Teraszokon és erkélyeken nagyobb konténerben nevelve a terasz díszévé válhat, különösen ha pergolára vagy fali rácsra futtatjuk.
Változatos növénytársítások: Lila virágú Clematis viticella fajtákkal (például Polish Spirit, Étoile Violette) ültetve az őszibarack-narancs és a lila egymást erősítve, egzotikus hangulatot teremt. A sötét, bordó levelű vöröslevelű díszszilva (Prunus cerasifera Nigra) vagy a sötét levelű csodamogyoró (Corylus maxima Purpurea) mellett a Judy trombitafolyondár világos virágai és zöld lombozata ragyogóan érvényesül. A növény tövébe ültetett levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta) vagy törpe pampuszfű (Miscanthus sinensis Adagio) tökéletesen kiegészíti a futónövény függőleges hatását.
Tavasszal virágzó lonccal (Lonicera periclymenum Belgica) együtt ültetve folyamatos virágzást biztosíthatunk a tavaszi hónapoktól egészen az őszi fagyokig.
A Judy trombitafolyondár kiváló választás kezdő kertészek számára is, mivel gondozása egyszerű. USDA besorolása: 6-9.

Kis meténg	Vinca minor	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kis télizöld (Vinca minor) – Az igénytelen, örökzöld talajtakaró

A kis télizöld a meténgfélék (Apocynaceae) családjába tartozó, Európából és Kis-Ázsiából származó, örökzöld, elfekvő hajtású félcserje. A faj névadója a „minor” (kisebb) jelző, amely a rokon nagylevelű meténgtől (Vinca major) való kisebb méretbeli különbségre utal. Ez a növény a talajtakaró növények egyik legismertebb és legkedveltebb képviselője, amely a sűrű, szőnyegszerű növekedésével, örökzöld lombozatával és hosszú virágzási időszakával az egyik legmegbízhatóbb talajtakaró a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, kiváló árnyéktűrése és a talajerózió megakadályozásában játszott szerepe miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kis télizöld egy alacsony termetű, elfekvő hajtású, örökzöld félcserje. Kifejlett magassága 15-20 cm, szélessége 1-1,5 méter között alakul, ami sűrű, szőnyegszerű gyepet eredményez. A hajtások elfekvők, a talajon kúsznak, és a nóduszoknál legyökereznek, ami elősegíti a növény gyors, szőnyegszerű terjedését, és egybefüggő, gyomelnyomó talajtakarót képez.

A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek átellenesek, 2-4,5 cm hosszúak, 1-2,5 cm szélesek, oválisak vagy hosszúkás-tojásdadok, bőrszerűek, fényes sötétzöld színűek, szélük ép. A levelek egész évben a növényen maradnak, ami a növényt télen is dekoratívvá teszi.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a levélhónaljakban magányosan nyílnak, 2-3 cm átmérőjűek, tölcsér alakúak, ötkaréjosak, és az alapfajnál ibolyáskék színűek. A virágzási időszak a kora tavasztól a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően áprilistól augusztusig, a legbőségesebb virágzás májusban figyelhető meg. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, hüvelyszerű terméseket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (hajtásdugványozással, tőosztással) egyaránt szaporítható. A vegetatív szaporítás a leggyakoribb, mivel a hajtások könnyen gyökeret eresztenek, és a növény gyorsan terjed.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kis télizöld napos vagy félárnyékos, de árnyékos fekvést is jól tűri. A virágzás bőségesebb napos helyen, de a növény árnyékban is jól fejlődik, és sűrű, gyomelnyomó talajtakarót képez.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, nedves, humuszban gazdag talajban érzi magát, de a szárazságot és a szegényes talajokat is elviseli. A pangó vizet nem tolerálja.

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőek, és a természetes csapadék általában elegendő számukra. A legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágya, vagy egy réteg (2-3 cm) érett komposzt a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A kis télizöld metszése fontos a növény sűrűségének és virágzásának fenntartása érdekében. A metszést kora tavasszal (február-március) kell elvégezni, hogy serkentsük az új hajtások képződését. A virágzás serkentése érdekében érdemes a régi, elnyílt hajtásokat visszavágni, hogy a növény új, virágzó hajtásokat fejlesszen. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal javasolt.

Telelés és fagytűrés: A kis télizöld kiválóan télálló; a kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad.

Fontos tudnivaló a terjedésről: A kis télizöld gyorsan terjed a legyökerező hajtásaival. A kertben a növényt érdemes ellenőrzött körülmények között nevelni, és a nem kívánt terjedést metszéssel vagy gyökérgáttal korlátozni. A növény a gyomokat hatékonyan elnyomja, de a kertben más növényeket is kiszoríthat, ha nem szabályozzuk a terjedését.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A kis télizöld a sűrű, örökzöld lombozatának, kiváló talajtakaró képességének, árnyéktűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb talajtakaró növény a kertekben és parkokban:

Talajtakaróként fák és cserjék alá, árnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Lejtőkön, rézsűkön – a gyökérzete és a sűrű hajtásai kiválóan rögzítik a talajt, és megakadályozzák az eróziót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Sírkertekbe – az örökzöld lombozat és a finom virágok miatt gyakran választott sírkerti növény.

Rózsák és cserjék aláültetésére – a növény alacsony termete és talajtakaró képessége miatt kiváló aljnövényzet.

Konténerekbe, balkonládákba – a lecsüngő hajtások miatt függőkosarakba és magasított ágyásokba is ültethető.

Városi kertekbe, közterületekre – jól tűri a városi környezetet.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kis télizöld sötétzöld lombozata és ibolyaskék virágai számos más árnyéki növénnyel kombinálhatók:

Hagymás növényekkel: Krókusz, hóvirág, tulipán – a hagymások kora tavasszal nyílnak, mielőtt a télizöld teljesen kiterjedne.

Páfrányokkal: Erdei pajzsika, hölgypáfrány – a páfrányok finoman szeldelt lombozata kiváló kontrasztot alkot a télizöld tömöttebb leveleivel.

Hostákkal (Hosta) – a hosták nagy, dekoratív levelei szépen kiegészítik a télizöld sötétzöld szőnyegét.

Árnyéki évelőkkel: Télirozsda (Bergenia), tűzgyöngyvirág (Epimedium) – a hasonló termőhelyi igényű növényekkel együtt harmonikus, árnyékos együttest alkotnak.

USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon a kis télizöld teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad, és a téli időszakban nem igényel külön védelmet.)

Kúszó kecskerágó	**Euonymus fortunei 'Radicans'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Euonymus fortunei 'Radicans', vagyis a kúszó kecskerágó a kertészek egyik legkedveltebb talajtakaró növénye, és nem véletlenül. Ez a rendkívül alkalmazkodóképes, örökzöld cserje szinte bárhol megél, és egész évben üde zöld szőnyeget biztosít ott is, ahol más növények már feladják. Ázsiából, elsősorban Japánból és Kínából származik.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Radicans' változat jellegzetessége a terülő, gyökerező szárakkal terjedő habitus. Levelei egyszerűek, bőrszerűek, fényes sötétzöldek, tojásdadok vagy lándzsás alakúak, szélük finoman fűrészes. Ősszel és télen a hideg hatására a levelek enyhén bronzos vagy bordós árnyalatot ölthetnek.

Talajtakaróként: Magassága eléri az 50-100 cm-t, de terjedése szinte korlátlan, mivel a földön kúszó szárak könnyen legyökereznek.

Kúszónövényként: Falak, kerítések, fatörzsek támasztékán a kis légyökereivel felkapaszkodva akár 2-3 méter magasra is felkúszhat. Nyáron megjelenő virágai jelentéktelenek, zöldes-fehérek, de ősszel néha rózsaszínes toktermeséket hozhat, narancssárga magokkal.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Az egyik legárnyéktűrőbb örökzöld növény. Teljes napsütésben, félárnyékban és mélyárnyékban is kiválóan fejlődik. Napos helyen a levelek színe élénkebb lehet, sűrűbb a növekedés.

Talaj: Nem igényes, szinte bármilyen jó vízelvezetésű kerti talajban megél. Az agyagos, vályogos vagy homokos talajokat egyaránt tolerálja, a pH-értékre sem érzékeny.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a berácsozódásig. Idősebb korában szárazságtűrő, de a hosszan tartó aszályos időszakokban hálás a locsolásért.

Télállóság (USDA-zóna): A növény USDA 5-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén megbízhatóan télálló, különösebb védelem nem szükséges számára. A fiatal hajtások tavaszi fagyoktól való védelme nem szokott problémát okozni.

Metszés: Metszése tavasszal vagy nyáron, a kívánt formára igazítva végezhető. Visszavágással sűrűbb növekedésre ösztönözhetjük. Ha nem szeretnénk, hogy felkússzon a falra vagy fákra, a felnyúló hajtásokat időben vágjuk vissza.

Ellenállóság: Általában ellenálló, de fogékony lehet a takácsatkákra és a kecskerágó-pajzstetűre. Ritkán lisztharmat is megjelenhet rajta.

Figyelmeztetés: A növény minden része enyhén mérgező, fogyasztása nem ajánlott.

Kertstílus és növénytársítások:
Rendkívül sokoldalúan felhasználható növény:

Talajtakaró: Fák, bokrok alatt, nehezen megművelhető lejtőkön, árnyékos ágyásokban. Olyan sűrűn nő, hogy kiszorítja a gyomokat, ami fenntartható kert kialakításában nagy segítség.

Futónövény: Északi falak, kerítések, pergolák befuttatására, ahol más növények (pl. borostyán) mellett alternatívát kínál.

Sírkert: Örökzöld mivolta miatt gyakran ültetik temetőkbe is.

Sziklakert, évelőágyás: Alacsony, terjedő növekedésével szép hátteret vagy zöld foltot biztosít.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténeres növény: Erkélyen, teraszon cserépben is tartható, ahol lelógó hajtásaival díszít. Ajánlott növénytársítások: Tavaszi hagymások: A sűrű, sötétzöld lombszőnyegből gyönyörűen kiemelkednek a kora tavaszi hagymásokat. Árnyékliliomok (Hosta): Különböző levelű árnyékliliomokkal társítva izgalmas textúrájú, örökzöld alapú árnyékágyást hozhatunk létre. Páfrányok: A könnyed, áttört lombozatú páfrányok szépen kiegészítik a kecskerágó tömör szövetét. Díszfüvek: Naposabb helyen ültethetjük alacsony díszfüvek, mint a kék csenkesz (Festuca glauca) mellé. Téli díszű növények: Örökzöld lombozata kiváló hátteret ad a télen termést viselő cserjéknek, mint a som (Cornus) vagy a csodabogyó (Gaultheria). 6b-9b USDA-zóna			
Kúszó madárbirs	Cotoneaster dammeri	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Treemail Kertészet ajánlja: A Cotoneaster dammeri tökéletes választás alacsony karbantartású, látványos kertterületekhez.
Megjelenés és jellemzők

Növekedési forma: Alacsony, kúszó habitusú, gyorsan terjedő talajtakaró.

Levelek: Tojásdad, fényes, sötétzöld levelei ősszel bronzos árnyalatot öltenek.

Virágok: Május-júniusban apró, fehér virágok nyílnak, melyek vonzóak méhek és más beporzók számára.

Termések: Augusztustól őszig piros, 6-8 mm-es bogyók fejlődnek – madárbarát választás.

Ültetési javaslatok

Hely: Napos vagy félárnyékos terület. Rézsűk, dombok stabilizálására is ideális.

Talaj: Jó vízelvezetésű, közepes tápanyagtartalmú talaj (pH 6-7). Tűr homokos vagy agyagos talajt is.

Távolság: Ültetéskor 1-1,5 méter távolságot hagyj a növények között a terjedéshez.

Mulcsozás: 5-10 cm vastag mulcsréteg segít megtartani a talajnedvességet és csökkenti a gyomok növekedését.

Gondozás

Öntözés: Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, éretteket csak száraz időszakokban. Kerülje a víz álló helyzetét.

Metszés: Tavasszal (március-április) vágja vissza az alakítás és sűrűsödés érdekében. Kerülje a túlzott metszést.

Trágyázás: Tavasszal 10-10-10 arányú műtrágyával tápoldatozás javasolt a virágzás és termés ösztönzésére.

Szaporítás: Félfás ágdugványokkal (késő nyár vagy ősz) vagy tőosztással.

Toxicitás
A bogyók nagy mennyiségben enyhén mérgezőek lehetnek (hányást vagy hasmenést okozhatnak), de madarakat nem veszélyeztetik.

Fontos tudnivalók

Felhasználás: Talajtakaró, térelválasztó, domboldalak beültetése, díszes kerítések kialakítása.

Díszítő érték: A piros bogyók és bronzos őszi lombozat kiemelik a kerti kompozíciókat.

Ötletek a kerthez

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Talajtakaróként: Ültesse domboldalakra vagy kőkertekbe a talajerózió megakadályozására.

Kontrasztok: Kombinálja fehér virágú növényekkel (pl. Gyöngyvirág) vagy sötétzöld örökzöldekkel.

Madárbarát kert: A piros bogyók télen is táplálékforrást biztosítanak madaraknak.

6a USDA-zóna

Maculata tarka nagylevelű meténg	**Vinca major 'Maculata'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Tarka nagylevelű meténg 'Maculata' (Vinca major 'Maculata') – A tarkalevelű, erőteljes talajtakaró

A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' a meténgfélék családjába tartozó, Dél-Európából származó, örökzöld, elfekvő hajtású félcserje. A 'Maculata' fajtajelzés a levelek közepén található, feltűnő világos foltra utal. A fajta másik neve Vinca major 'Surrey Marble'. Ez a növény a talajtakarók egyik leglátványosabb képviselője, amely a sűrű, szőnyegszerű növekedésével, örökzöld, tarka lombozatával és hosszú virágzási időszakával az egyik legkedveltebb talajtakaró a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, kiváló árnyéktűrése és a gyors, sűrű növekedése miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' egy alacsony termetű, elfekvő hajtású, örökzöld félcserje. Kifejlett magassága 20-30 cm, szélessége 40-100 cm között alakul. A hajtások elfekvők, a talajon kúsznak, és a nóduszoknál legyökereznek, ami elősegíti a növény gyors, szőnyegszerű terjedését. A hajtások az alapfajnál hosszabbak és erőteljesebbek, ami a növényt különösen alkalmassá teszi nagyobb felületek gyors beborítására.

A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek nagyok, 3-7 cm hosszúak, szív alakúak, bőrszerűek, fényesek, szélük pillás. A 'Maculata' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek tarkasága: a levél alapszíne sötétzöld, míg a levél középső része feltűnő világoszöld vagy sárgászöld folttal díszített, ami a növényt távolról is mutatós, márványos megjelenésűvé teszi. A lombozat egész évben a növényen marad, ami a növényt télen is dekoratívvá teszi.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a levélhónaljakban magányosan nyílnak, 4-5 cm átmérőjűek, csillag vagy kerék alakúak, ibolyaskék vagy világoskék színűek, gyakran fehér középpel. A virágzási időszak a tavasztól az őszig tart: Magyarországon jellemzően májustól októberig, ami rendkívül hosszú virágzási időszakot biztosít. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, hüvelyszerű terméseket fejleszt. A növény vegetatív úton (hajtásdugványozással, tőosztással) szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' napos vagy félárnyékos, de árnyékos fekvést is jól tűri. A virágzás bőségesebb napos helyen, de a növény árnyékban is jól fejlődik, és sűrű, gyomelnyomó talajtakarót képez.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos, agyagos és meszes talajokon egyaránt megél. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, humuszban gazdag talajban érzi magát, de a szárazságot és a szegényes talajokat is elviseli. A pangó vizet nem tolerálja.

Öntözés: A növény mérsékelt vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőek.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, dísznövények számára kifejlesztett műtrágya, vagy egy réteg (2-3 cm) érett komposzt a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' metszése fontos a növény terjedésének szabályozása, a sűrűség fenntartása és a virágzás serkentése érdekében. A metszést kora tavasszal (február-március) kell elvégezni: vágjuk vissza a hajtásokat a kívánt hosszúságra, hogy serkentsük az új, fiatal hajtások képződését, és megakadályozzuk a növény túlzott terjedését. A rendszeres visszavágás serkenti a bokros növekedést.

Telelés és fagytűrés: A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' jó télállóságú; az USDA 6-10-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -15°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország nagy részén (USDA 6-7-es zóna) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad, és a téli időszakban nem igényel külön védelmet, bár hidegebb, szélvédett helyeken a talajtakarás előnyös lehet.

Fontos tudnivaló a terjedésről: A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' erőteljesen és gyorsan terjed a legyökerező hajtásaival. A kertben a növényt érdemes ellenőrzött körülmények között nevelni, és a nem kívánt terjedést metszéssel vagy gyökérgáttal korlátozni. A növény a gyomokat hatékonyan elnyomja, de más növényeket is kiszoríthat, ha nem szabályozzuk a terjedését. Fontos tudni: a növény minden része mérgező.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' a tarka, örökzöld lombozatának, erőteljes talajtakaró képességének, árnyéktűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb talajtakaró növény a kertekben és parkokban:

Talajtakaróként fák és cserjék alá, árnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Lejtőkön, rézsűkön – a gyökérzete és a sűrű hajtásai kiválóan rögzítik a talajt.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Sírkertekbe – az örökzöld lombozat és a hosszú virágzás miatt gyakran választott sírkerti növény.

Függőkosarakba és konténerekbe – a lecsüngő hajtások miatt kiváló "spiller" növény.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A tarka nagylevelű meténg 'Maculata' tarkalevelű lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Páfrányokkal – a páfrányok finoman szeldelt lombozata kiváló kontrasztot alkot a meténg tömöttebb leveleivel.

Hostákkal – a hosták nagy, dekoratív levelei szépen kiegészítik a meténg tarkalevelű szőnyegét.

Árnyéki évelőkkel: Télirozsdával, tűzgyöngyvirággal – a hasonló termőhelyi igényű növényekkel együtt harmonikus, árnyékos együttest alkotnak.

USDA besorolása: 6-10 (Magyarországon a tarka nagylevelű meténg 'Maculata' jó télállóságú; az USDA 6-os és 7-es zónáiban takarással, védett helyen áttelelhet. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -15°C-ig terjedő hőmérsékletet is. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Missionario Chiandetti mini kivi	**Actinidia arguta 'Missionario Chiandetti'**	4 450 Ft	4 750 Ft

A 'Missionario Chiandetti' mini kivi egy olasz nemesítésű, rendkívül bőséges termésű fajta, amely a közönséges kivi (Actinidia deliciosa) közeli rokona, de annál jóval igénytelenebb és fagyállóbb. Nevét nemesítőjéről, Chiandetti missionáriusról kapta, aki évtizedeken át dolgozott a mini kivi fajták tökéletesítésén. A fajta kiváló terméshozamáról és rendkívül édes, aromás gyümölcseiről ismert.
Erőteljes növekedésű, lombhullató kúszónövény, amely kifejlett állapotban 5-8 méter magasra is felkapaszkodhat. Hajtásai vékonyak, rugalmasak, zöldesbarna színűek, a fiatal hajtások enyhén szőrözöttek. Levelei szív alakúak, 8-15 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, a levélnyél gyakran vöröses árnyalatú. A lombozat sűrű, kellemes árnyékot nyújt a nyári hónapokban.
Június folyamán a levelek hónaljában apró, illatos, krémszínű vagy fehér virágok nyílnak. A virágok 1-2 cm átmérőjűek, csillag alakúak, kellemes, édeskés illatot árasztanak. A fajta porzós klón, ezért termékenyüléshez hímnemű porzópartnerre van szükség.
A gyümölcsök szeptembertől, a nyári meleg elmúltával érnek be. A mini kivi termése sima héjú, 2-3 cm hosszú, tojás vagy henger alakú. A héj zöldesbarna, fényes, teljesen kopasz – ami a legnagyobb előnye a közönséges kivihez képest, mert nem kell hámozni, a gyümölcs héjastul fogyasztható. Belseje élénkzöld, apró, ehető magokkal tarkított. Íze rendkívül édes, aromás, a közönséges kivihez hasonló, de annál intenzívebb, gyakran ananászra, eperre vagy passiógyümölcsre emlékeztető jegyekkel. A 'Missionario Chiandetti' az egyik legédesebb mini kivi fajtának számít.
Igényei és gondozása
A 'Missionario Chiandetti' mini kivi napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legjobb terméshozamot teljes napsütésben hozza, de félárnyékot is elfogad. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, enyhén savanyú kémhatású (pH 5,5-6,5) kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.
A fajta termő klón, ezért termékenyüléshez hímnemű porzópartnerre van szükség. Javasolt egy hímnemű mini kivi fajta (pl. 'Weiki' vagy 'Japsai' hím) ültetése 5-10 nőivarú növényre. Porzópartner hiányában a terméshozam jelentősen csökkenhet.
Gondozása egyszerű, de rendszeres metszést igényel. Metszését téli nyugalmi időszakban (február-március) végezzük: távolítsuk el az elhalt, sérült, egymást keresztező hajtásokat, a termőhajtásokat pedig rövidítsük vissza 5-6 rügyre. Nyáron a túl hosszúra nőtt hajtásokat is visszavághatjuk, hogy a növény ne fojtsa el a termést.
Támrendszert igényel: pergola, lugas, erős drótokkal ellátott kerítés vagy rács szükséges számára. A hajtásokat rendszeresen vezessük a támasztékra. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága kiváló, akár -25 °C-ig is ellenáll, így hazánkban gond nélkül teleltethető.
Felhasználás a kertben
A 'Missionario Chiandetti' mini kivi kiválóan alkalmas pergolák, lugasok, kerítések, rácsok, házfalak befuttatására. Sűrű lombozatával kellemes árnyékot ad nyáron, ősszel pedig bőséges termésével örvendeztet. Friss fogyasztásra a legideálisabb, de lekvárnak, befőttnek, gyümölcsleveknek, sütemények díszítésére is alkalmas. A gyümölcsök szobahőmérsékleten utóérnek, hűtőben hosszabb ideig eltarthatók.
Növénytársítási ötletek
Társításakor más futónövényekkel, például iszalaggal (Clematis) vagy lonccal (Lonicera) kombinálva izgalmas, rétegzett felületeket alakíthatunk ki. Tövébe ültethetünk alacsony termetű, félárnyéktűrő évelőket, mint a hunyor (Helleborus), a tüdőfű (Pulmonaria) vagy a páfrányok, amelyek a kúszónövény alsó részét takarják. Napos helyen alacsony talajtakaró évelők, mint a levendula (Lavandula) vagy a macskamenta (Nepeta) szintén jól illeszkedhetnek a tövébe.
USDA 5b

Nagy meténg	**Vinca major**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A nyugat-mediterrán területekről, származó örökzöld talajtakaró, de mostanra Európa szerte elterjedt örökzöld talajtakaró növény. Levelei örökzöldek, kerekdedek, vagy eliptikusak, ép szálűek. Világoskék virágait tavasszal, áprilisban, és májusban hozza. Telepíthető a legtöbb kerttípusba talajtakarónak. Kertépítészeti gyakorlatunkban sokszor használjuk nagyobra növő cserjefoltok alatt árnyéki talajtakarónak. Jobb, mint a mulcs, mert nem kopik el, és teljesen önnfenntartó. A cserjék alól kifutva viszont gyönyörű virágos szőnyeget alkot. Túlterjeszkedése esetén egyszerűen sövénynyíró ollóval a burkolatok határain le kell metszeni.
USDA zóna: 6a-9b

Nagyvirágú lednek	**Lathyrus latifolius**	1 950 Ft	2 450 Ft

A nagyvirágú lednek (Lathyrus latifolius) a hüvelyesek családjába tartozó évelő, közeli rokona a hazánkban jól is mert bükkönyöknek. Levelei halványzöldek, keskeny ovális formájúak. Virágai fehér – rózsaszín színtartományban játszanak. Gyorsan növő szárával fel tud kapaszkodni támasztékra, amit ha nem kap, akkor inkább nagyobb kusza gömbölyű bokorrá fejlődik.
Extenzívebb évelőágyásokba, a kert nem használt peremi részére javasolható növény, mely gyors növekedésével ügyesen megvédi magát, különösebb gondozásával nem kell foglalkozni, ha nem szeretnénk támasztékra felfuttatni. Ha igen, akkor érdemes Neki kicsit segíteni és irányítani.
Ugyan csak érdemes lehet tűrőképességeinek határait feszegetve száraz, napos virágágyakba telepíteni. Ilyen körülmények között növekedése visszafogottabb lesz, ízközei rövidülnek, viszont többet virágzik. Rózsaszín virágaival jól társítható lila-fehér virágú mediterrán évelőkkel, pl.: levendulával, rozmaringgal, varjúhájakkal. Virágait méhek, és a lepkék látogatják. Leveleit csigák károsíthatják, de az ilyen károsodásokat a gyors növekedésével kinövi. Magjait nyár végén hullatja, melyek kissé gyomosítanak, és emellett mérgezőek is. A fagy nem tesz benne kárt, enyhébb teleket zölden átvészeli.
USDA zóna: 9b-4a

Needlepoint borostyán	**Hedera helix 'Needlepoint'**	1 950 Ft	2 250 Ft

A 'Needlepoint' borostyán, egy elegáns, örökzöld kúszónövény, amely megbízhatóan díszít kerteket és belső tereket egyaránt. Levelei karcsúbbak és hosszúkásabbak a közönséges borostyánéhoz képest, finoman íveltek, így szép, texturált megjelenést kölcsönöznek. A növény magassága és terjedelme különösen ideális kompozíciókhoz: kúszó szárai akár 6-9 méterre is megnőhetnek, ha megfelelő támasztékkal rendelkeznek. Árnyékban és részleges napfényben is jól boldogul, és kevés gondozást igényel.
Ültetési javaslat:

Ültetési időszak: Tavasz vagy ősz a legideálisabb ültetési időszak. Konténeres növényeket egész évben.
Talaj: Jól érzi magát a leggazdagabb és legrosszabb talajú környezetekben is, de a jó vízelvezetés előnyösebb.
Hely: Árnyékos, félárnyékos helyet kedveli, de napos helyen is megél.
Öntözés: Az ültetés utáni első évben rendszeresen öntözzük, hogy a gyökérzet megerősödhessen. Később már mérsékelt vízigénye van.
Társítás: Kiválóan kombinálható más árnyékkedvelő növényekkel, például páfrányokkal, árnyékliliomokkal és íriszekkel.

Örökzöld japán lonc	**Lonicera japonica 'Halliana'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Erőteljes növekedésű, 6 m-re is felkapaszkodó kúszócserje. Az alapfajnál sokkal dúsabban virágzik, s a virágok nagyon erős, de kellemes illatúak. Gyakorlatilag örökzöld, lombja csak nagyon kemény teleken fagy le. Az egyik legismertebb, legkedveltebb japán lonc, nagy felületek takarására elsőrendű, de egy egyszerű akácoszlopra is felfuttathatjuk (a többi japán loncot úgyszintén). Előzőleg néhány hajtásnak segítenünk kell, hogy az oszlop tetejéig eljusson (pl. felkötözéssel), de ettől kezdve azt gyorsan befutja, és nagyon mutatós, dúsan virágzó, vízesés-szerűen lecsüngő sűrű hajtástömeget alkot.
A levelek ovális formájúak és sötétzöld színűek, melyek egész évben megőrzik frissességüket, hozzájárulva a kert állandó zöld színvilágához. A 'Halliana' fajta különlegessége a dús és illatos virágzás. A fehér és sárga virágok nagyon kellemes illatot árasztanak, különösen nyáron és kora ősszel. Ez nemcsak a kert szépségét fokozza, hanem vonzza a méheket és pillangókat is. Az örökzöld japán lonc jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a napos vagy félárnyékos helyeken fejlődik a legjobban. Ez a növény nem válogatós a talaj típusát illetően, de a jó vízelvezetés és a laza, tápanyagban gazdag talaj előnyös a számára. A 'Halliana' kúszónövény kiválóan alkalmas kerítések, pergolák vagy egyéb szerkezetek befuttatására. Dekoratív megjelenése miatt önmagában is kiváló választás lehet, de más növényekkel kombinálva is szépen mutat. Ellenálló a hidegebb időjárási viszonyokkal szemben, így télen is megőrzi díszítő értékét.

6a-9b USDA-zóna

Örökzöld orbáncfű	**Hypericum calycinum**	2 250 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Örökzöld orbáncfű különösen ideális talajtakaráshoz, hiszen gyorsan terjed, és hatékonyan megakadályozza a gyomok növekedését. Akár napos, akár félárnyékos helyen fejlődik, a növény jól tűri a változó talajviszonyokat és a szárazságot is, így rendkívül strapabíró.
Gondozási Útmutató:

Öntözés: Általában mérsékelt vízszükségletű, célszerű a túlzott öntözés elkerülése.
Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet igényel, de a teljes napsütésben a legszebben fejlődik.
Tápanyag: Érdemes tápoldatot alkalmazni tavaszi és nyári időszakban, hogy fokozzuk a virágzást.
Ápolás: A virágzás után ajánlott a visszavágás a sűrűbb növekedés érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

Talajtakaráshoz, kerti szegélyekhez
Sziklakerti elemekhez és alacsony növényalkalmazásokba
Használhatjuk szegélyként
gyomosodás ellen, miközben színt és teksztúrát ad a kerthez

Eurázsia déli részein elterjedt, 30-50 cm magas örökzöld félcserje. Vagyis a tövénél kissé fásodott szára a hajtás vége felé már lágy szárba megy át. Több, nem elágazó hajtása ívesen egymásra hajlik, így habitusa puha hamvaszöld leveleivel egy nagy zöld párnára emlékeztethet. A növény indákkal terjed, jól tűri a szárazságot, ezért száraz, pázsit számára elfoglalhatatlan területeket is szépen lefedi, kiváló talajtakaró. Virágai nyáron, május végétől augusztusig láthatóak, jellegzetes illatúak. Bár levelei egy részét fenntartja télen, egy intenzívebb levélhullás tapasztalható a késő őszi időszakban, ami nem jelent veszélyt a növényre nézve. Gyors terjedése, és igénytelensége miatt inkább nagyobb kertekbe, vagy mostoha tulajdonságokkal bíró felületekre javasolható. Szárazságtűrése mellett egy kis gondozást, öntözést meghálál, ugyanakkor hasznos tavasszal erősebb visszametszése annak érdekében, hogy dúsabb lombozatot neveljen.

6b USDA-zóna

Parsley Crested borostyán	**Hedera helix 'Parsley Crested'**	3 950 Ft	4 250 Ft

A Parsley crested borostyán egy különlegesen mutatós kúszónövény leveleivel, amelyek finoman fodrosak, és ezzel szép textúrát adnak a kerthez vagy a belső térhez. A levelek örökzöldek, így egész évben zöldellnek, frissességet és életerőt kölcsönözve a környezetnek.
A Parsley crested borostyán kúszó hajtásai kiválóan alkalmasak falak, kerítések, vagy egyéb felületek beborítására. Levelei változatos helyzettel díszítik a kerteket, ami fiatalos frissességet biztosít. A levelek zöld színe élénkít minden szegletet, míg a kúszónövények edzett természetük révén szinte bármilyen környezetben megélnek.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A részben árnyékos helyet kedvel, de a közvetlen napfényt is elviseli. Az ideális fejlődés érdekében a részleges árnyék a legelőnyösebb.
Talaj: A jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj a legideálisabb. A borostyán jól tűri a különböző talajtípusokat, beleértve a mész- és agyagos talajokat is.
Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges a fiatal növények esetében, hogy segítsük a gyökerek stabilizálását. Az idősebb példányok a szárazabb körülményeket is elviselik, de a tápanyagfelszívás és növekedés érdekében hasznos a rendszeres öntözés.
Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott műtrágya használata a növény aktív növekedési időszakában.
Téliesítés: A Hedera helix 'Parsley Crested' fagyálló, de a legnagyobb hidegben érdemes védett helyre ültetni, hogy megóvjuk a fagyás következményeitől.

Felhasználási lehetőségek:

A Parsley Crested Borostyán kúszó növény ideális szoliter növényként, valamint kerítések, falak vagy pergolák beborítására.
Dekoratív kosarakban vagy balkonládákban is gyönyörűen mutat, elegáns látványt nyújtva.
Kert szépségének fokozására is alkalmas, különböző növényekkel kombinálva érdekes és változatos kompozíciót alkothatnak.

A Parsley crested borostyán könnyen gondozható és vonzó megjelenésével ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni egyaránt a kerteket és az otthonokat.

Rozsdás szőlő	**Vitis coignetiae**	6 950 Ft	6 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Rozsdás szőlő (Vitis coignetiae) – A robusztus, gyors árnyékadó kúszónövény
A rozsdás szőlő a szőlőfélék (Vitaceae) családjába tartozó, Japánban, Koreában és Oroszország távol-keleti részén őshonos, lombhullató kúszónövény. A fajt a 19. században fedezte fel Père Armand David francia misszionárius és botanikus, és Henri Ernest Baillon francia botanikus írta le. A faj névadója a francia Coignet család nevéből származik, akik elsőként hozták be Európába. A növény angol neve crimson glory vine, ami a levelek őszi karmazsinvörös színére utal. Ez a növény nem terméséért, hanem a nyári zöld lombozatáért, a lenyűgöző őszi színpompájáért és a gyors árnyékadó képességéért az egyik legkedveltebb kúszónövény a nagy kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a betegségekkel szembeni ellenállósága és a gyors növekedése miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás, azonban a mérete és növekedési erélye miatt nagy területet igényel.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A rozsdás szőlő egy rendkívül erőteljes növekedésű, kúszó hajtású, lombhullató növény. A hajtások hossza elérheti a 15-20 métert is, és egy jól begyökeresedett példány évente akár 5-6 méter hosszú hajtásokat is képes növeszteni. A növény habitusa kúszó, kapaszkodó, a hajtások erős kacsáikkal a támaszték köré csavarodnak, és bármire felfuthatnak, amire rá tudnak kapaszkodni. A hajtások fiatalon rozsdás-barnás szőrözöttek, ami a faj névadója is. A levelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A levelek nagyok, szív alakúak, 10-25 cm szélesek, szélük karéjos vagy szabálytalanul karéjos. A levél felszíne sötétzöld, fonákja rozsdás-szőrös, ami a növény egyik jellegzetessége. A rozsdás szőlő legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek őszi színpompája: a levelek ősszel gyönyörű narancspiros, skarlátvörös és bíborvörös színekben pompáznak, ami a kert egyik leglátványosabb őszi színfoltjává teszi. A levelek a fagyok beálltával hullanak le.
A virágzat és a termés a növény másodlagos díszítőelemei. A virágok kicsik, zöldessárgák, jelentéktelenek, a nyár közepén jelennek meg. A termések aprók, gömbölyded, 5-8 mm átmérőjű, fekete vagy sötétlila bogyók, amelyek ehetetlenek és értéktelenek. A növényt nem terméséért, hanem gyors árnyékadó és díszítő tulajdonságaiért ültetik.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A rozsdás szőlő napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legintenzívebb őszi lombszínt napos helyen hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb, a levelek színe kevésbé intenzív.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos és agyagos talajokon egyaránt megél. A legjobban a mély, jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag, üde talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a begyökeresedés után kifejezetten szárazságtűrő.

Öntözés: A rozsdás szőlő közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. A begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot jól tűrik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy adag lassan oldódó, kúszónövények vagy gyümölcsfák számára kifejlesztett műtrágyát.

Metszés és ápolás: A rozsdás szőlő metszése fontos a növény méretének kordában tartása és az egészséges növekedés serkentése érdekében. A metszést kora tavasszal (február-március) vagy a virágzás után kell elvégezni. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült vagy gyenge hajtásokat.

Formázó metszés: A túl hosszú hajtásokat vágjuk vissza a kívánt hosszúságra, hogy serkentsük az elágazódást.

Fiatalító metszés: Idős, elöregedő növényeket néhány évente erőteljesen is visszavághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk.

Telelés és fagytűrés: A rozsdás szőlő kifejezetten kiváló télállóságú; akár -28,9°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elveszítik leveleiket, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Kártevők és betegségek: A rozsdás szőlő rendkívül ellenálló; évek óta termesztik permetezés nélkül is, és semmilyen kártevő vagy betegség nem támadja meg. Ez az egyik legigénytelenebb és legellenállóbb kúszónövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A rozsdás szőlő a gyors árnyékadó képességének, a lenyűgöző őszi színpompájának és az igénytelenségének köszönhetően az egyik legpraktikusabb és legkedveltebb kúszónövény a nagy kertekben és parkokban:

Pergolák, lugasok, nagy teraszok befuttatására – gyorsan sűrű, árnyékot adó lombkoronát nevel.

Kerítések, falak befuttatására – erős kacsáival bármire felfut, amire rá tud kapaszkodni.

Nagy fák őszi díszítésére – ha olyan fára engedjük felfutni, amelynek őszi lombja nem különösebben szép, a rozsdás szőlő gyönyörű narancspiros őszi lombszíne látványos díszítőelemmé válik.

Gyors árnyékadó növényként – a sűrű lombozat miatt kiváló árnyékot biztosít.

Őszi színű kertekbe, tájképi kertekbe – a narancspiros őszi szín miatt kiváló választás.

Vadaskertekbe, természetes kertekbe – a termések a madarak számára táplálékot nyújtanak.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A rozsdás szőlő őszi narancspiros színe és zöld lombozata számos más növénnyel kombinálható:

Más kúszónövényekkel: Iszalag (Clematis) fajtákkal – a különböző virágzási időszakok és színek egymás mellett változatos, hosszan virágzó hatást keltenek.

Virágos cserjékkel és évelőkkel: Hortenziával, rododendronnal – a virágzó cserjék színei kiegészítik a növény strukturális megjelenését.

Őszi színű növényekkel: Japán juharral (Acer palmatum) – a különböző őszi színek egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a rozsdás szőlő teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -28,9°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. A növény lombhullató, a téli időszakban nem igényel külön védelmet.)

Sárga trombitafolyondár	**Campsis radicans 'Flava'**	5 450 Ft	5 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Flava' sárga trombitafolyondár, más néven arany trombitafolyondár, Észak-Amerika keleti részéről származó, rendkívül erőteljes növekedésű lombhullató kúszónövény. A Campsis radicans ritkább, de annál látványosabb, élénksárga virágú fajtája, amely a kertbe a napsütés színét varázsolja.
Erőteljes növekedésű, önmagán is kapaszkodó, lombhullató kúszónövény, amely kifejlett állapotban 5-10 méter magasra is felkapaszkodhat. A növény léggyökerekkel és tapadókorongokkal rögzíti magát a támasztékhoz, így külön támrendszer nélkül is feljut a falakra, kerítésekre. Hajtásai hosszúak, rugalmasak, idősebb korban a kéreg hosszanti irányban repedezik.
Levelei páratlanul szárnyaltak, 20-40 cm hosszúak, 7-11 darab fogazott szélű, tojásdad vagy lándzsás levélkéből állnak. A levélkék felszíne sötétzöld, fényes, fonákjuk világosabb. A lombozat sűrű, dús, kellemes árnyékot nyújt a nyári hónapokban.
A növény igazi dísze a nyári virágzat. Júliustól egészen szeptemberig, sőt kedvező időjárás esetén akár októberig bőségesen hozza a hajtások végén, fürtökben nyíló, 5-7 cm hosszú, tölcsér vagy trombita alakú virágait. A virágok színe élénksárga, aranysárga, torkukban narancssárgás árnyalattal, ami még feltűnőbbé teszi a virágokat. A virágok cső alakúak, hosszúkásak, a méhek és a kolibrik (ahol előfordulnak) kedvelt nektárforrásai. A virágzás időszaka hosszan tartó, a növény a késő nyári kert egyik legszínpompásabb dísze.
Igényei és gondozása
A 'Flava' sárga trombitafolyondár napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza; félárnyékban virágzása mérsékeltebb lehet, és a virágok színe is halványabb lehet. Talaj tekintetében nem igényes, a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású kerti talajokban fejlődik a legszebben. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot a kiültetett példányok már jól elviselik.
Gondozása egyszerű. Metszését kora tavasszal, a rügyfakadás előtt végezzük: távolítsuk el az elhalt, sérült vagy túl sűrűvé vált hajtásokat. Mivel a virágok az új hajtásokon képződnek, a visszavágás serkenti a virágzást. A növény erőteljes növekedésű, ezért időnként erőteljes visszavágásra is szükség lehet, hogy a kívánt formában tarthassuk. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. Télállósága jó, a keményebb teleken a fiatal hajtások visszafagyhatnak, de tavasszal megbízhatóan újrahajt. Hazánkban a legtöbb területen gond nélkül teleltethető.
Felhasználás a kertben
A 'Flava' sárga trombitafolyondár kiválóan alkalmas pergolák, lugasok, kerítések, rácsok, házfalak befuttatására. Sűrű lombozatával kellemes árnyékot ad nyáron, élénksárga virágaival pedig a késő nyári kert egyik leglátványosabb dísze. Gyors növekedésű, így nagyobb felületek gyors zöldítésére is ideális. Dézsában, konténerben is nevelhető, ahol teraszok, erkélyek dísze lehet – ilyenkor a téli védelem is könnyebben megoldható. A sárga virág különösen jól mutat sötét hátterek, például tuják, borókák vagy sötét levelű cserjék előtt.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos fekvést kedvelő kúszónövényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a piros virágú trombitafolyondár (Campsis radicans 'Flamenco') vagy a piros virágú iszalagfajták (Clematis), amelyek színben is gyönyörűen kiegészítik a sárga trombitafolyondárt. Lila vagy kék virágú loncfajtákkal (Lonicera) ültetve izgalmas színkontrasztot hozhatunk létre. Tövébe ültethetünk alacsony termetű, napos fekvést kedvelő évelőket, mint a levendula (Lavandula) vagy a macskamenta (Nepeta), amelyek a kúszónövény alsó részét takarják. Mediterrán hangulatú kertekben jól mutat olajfa, gránátalma vagy füge társaságában.

Sisakviráglevelű vadszőlő	**Ampelopsis aconitifolia**	3 350 Ft	3 350 Ft

A tarka levelű vadszőlő (Ampelopsis aconitifolia) igazi vadszőlő különlegesség.Dekoratív, nem szokványos megjelenésű lombhullató kúszó díszcserje. Mélyen karéjos levelei kihajtáskor bordó, majd később sötét zöld színűek, ősszel pedig sárgára színeződik.
Felhasználása azonos az alapfajéval: pergolák, rézsűk befuttatására, támfalak, vagy akár épületek falainak befuttatására kiválóan alkalmas.

Star of Milano csillagjázmin	**Trachelospermum jasminoides 'Star of Milano'**	3 250 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Star of Milano csillagjázmin a metélőpetrezselyemfélék (Apocynaceae) családjába tartozó, népszerű örökzöld kúszónövény, a Trachelospermum jasminoides egyik legújabb, legszebb nemesített változata. Ez a lenyűgöző fajta a klasszikus fehér virágú csillagjázmin minden előnyös tulajdonságát (örökzöld lombozat, bódító illat, igénytelenség) ötvözi a tarka lombozat és a ritka, halványrózsaszín virágok különlegességével.
Külső megjelenés
A Star of Milano erős növekedésű, csavarodó hajtású kúszónövény, amely támasz mellett szépen felkapaszkodik, de talajtakaróként is tartható. Kifejlett magassága a támasz magasságától függően 3-4 méter, szélessége 2-3 méter között alakul.
A növény legnagyobb dísze a lombozat és a virágzat együttes hatása. A levelek fényesek, bőrszerűek, hegyes végűek. A sötétzöld alapszínt világoszöld mintázat és krémszínű szegély díszíti, ami a növénynek még virágzás nélkül is különleges, texturált megjelenést kölcsönöz egész évben. A tarkaság a fiatal hajtásokon a legélénkebb, de az idősebb leveleken is megmarad.
A virágok májustól egészen szeptemberig (akár az első fagyokig) nyílnak, vagyis a növény gyakorlatilag az egész nyarat és a kora őszt virágzik. A virágzat a hajtások végén, csillag alakú, 2-3 cm átmérőjű, halványrózsaszín virágokból álló csoportokban jelenik meg. A virágok intenzív, édes, kellemes jázminillatot árasztanak, amely különösen az esti órákban erősödik fel, és az egész kertet betöltheti. A virágok vonzzák a méheket és pillangókat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel, de a legbőségesebb virágzást és a legszebb lombozatszínt teljes napfényben hozza. Napos fekvésben a virágok illata is erőteljesebb.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, termékeny, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A savanyú talajokat is tolerálja.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már szárazságtűrők.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést, de jól tűri a metszést. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a túl hosszú hajtások visszavághatók. A legjobb időpont a metszésre a virágzás után, késő nyáron vagy kora ősszel.

Támrendszer: A növény önmagát is tudja tartani (önkapaszkodó) a fiatal, csavarodó hajtások segítségével, de a legjobb eredményt akkor érjük el, ha rácsot, feszített drótkötelet vagy más támrendszert biztosítunk számára.

Telelés: A növény mérsékelten télálló, a kifejlett példányok rövid ideig -10 °C-ig is ellenállhatnak. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, lépcsőház, üvegezett terasz) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, betegségek és kártevők ritkán támadják meg. A pangó vizes talajban gyökérrothadás előfordulhat.

Felhasználás a kertben
A Star of Milano csillagjázmin a sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokféleképpen felhasználható:

Falak, kerítések, pergolák, lugasok befuttatására

Talajtakaróként – alacsonyan kúszó hajtásaival nagyobb felületeket is beboríthat

Alacsony sövényként – sűrűn, bokrosan nő, ezért metszéssel alacsony, illatos sövénnyé alakítható

Konténeres teraszokra, erkélyekre – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültetve

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Változatos növénytársítások
A Star of Milano halványrózsaszín virágai és tarka lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel:

Lila és kék virágú évelők: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta)

Fehér virágú növények: Fehér rózsák, gyöngyvirág

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca)

Díszfüvek: Tollbuga (Molinia), kínai ezüstpázsit (Miscanthus)

Más kúszónövények: Rózsákkal, klematisszal (Clematis) társítva

USDA besorolása: 7b-10 (Magyarországon a növény mérsékelten téléálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Star of Toscana csillagjázmin	**Trachelospermum jasminoides 'Star of Toscana'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Star of Toscana csillagjázmin, népszerű örökzöld kúszónövény, a Trachelospermum jasminoides egyik legújabb, legszebb nemesített változata. Ez a lenyűgöző fajta a klasszikus fehér virágú csillagjázmin minden előnyös tulajdonságát (örökzöld lombozat, bódító illat, igénytelenség) ötvözi a ritka, sárga virágok különlegességével.
Külső megjelenés
A Star of Toscana erős növekedésű, csavarodó hajtású kúszónövény, amely támasz mellett szépen felkapaszkodik, de talajtakaróként is tartható. Kifejlett magassága a támasz magasságától függően 8-12 méter, szélessége 2,5-4 méter között alakul. Növekedési erélye erős, de a kifejlett méretet 5-10 év alatt éri el.
A növény legnagyobb dísze a lombozat és a virágzat együttes hatása. A levelek fényesek, bőrszerűek, lándzsás alakúak, sötétzöldek. A lombozat egész évben díszít, télen gyakran bronzos árnyalatot öltenek a levelek. A fiatal hajtások világosabb zöldek, a levelek fonákja világosabb.
A virágok nyáron, júniustól szeptemberig nyílnak. A virágzat a hajtások végén, csillag alakú, 2-3 cm átmérőjű, krémszínű vagy halványsárga virágokból álló csoportokban jelenik meg. A virágok közepe felé sötétebb sárga árnyalattal. A virágok intenzív, édes, kellemes jázminillatot árasztanak, amely különösen az esti órákban erősödik fel, és az egész kertet betöltheti. A virágok vonzzák a méheket és pillangókat.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel, de a legbőségesebb virágzást teljes napfényben hozza. Napos fekvésben a virágok illata is erőteljesebb.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, termékeny, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. A savanyú talajokat is tolerálja.

Öntözés: Közepes vízigényű. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok már szárazságtűrők.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést, de jól tűri a metszést. Metszéssel formázható, ritkítható, illetve a túl hosszú hajtások visszavághatók. A legjobb időpont a metszésre kora tavasszal (február-március).

Támrendszer: A növény önmagát is tudja tartani a fiatal, csavarodó hajtások segítségével, de a legjobb eredményt akkor érjük el, ha rácsot, feszített drótkötelet vagy más támrendszert biztosítunk számára.

Telelés: A növény mérsékelten télálló. A kifejlett példányok rövid ideig -10°C-ig, -15°C-ig is ellenállhatnak. Magyarországon a növényt védett, szélvédett fekvésbe (déli oldal, házfal mellé) érdemes ültetni. A konténerben nevelt növényeket mindenképpen védett, fagymentes, hűvös helyen (pl. garázs, lépcsőház, üvegezett terasz) kell teleltetni.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, betegségek és kártevők ritkán támadják meg. A pangó vizes talajban gyökérrothadás előfordulhat. A tejszerű nedv bőrirritációt okozhat, ezért metszéskor viseljünk kesztyűt.

Felhasználás a kertben
A Star of Toscana csillagjázmin a sokoldalúságának köszönhetően rendkívül sokféleképpen felhasználható:

Falak, kerítések, pergolák, lugasok befuttatására

Talajtakaróként – alacsonyan kúszó hajtásaival nagyobb felületeket is beboríthat

Konténeres teraszokra, erkélyekre – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültetve

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Városi udvarokba, előkertekbe – jól bírja a városi körülményeket

Változatos növénytársítások
A Star of Toscana sárga virágai és sötétzöld lombozata kiválóan kombinálható más növényekkel:

Lila és kék virágú évelők: Levendula, macskamenta, klematisz – a lila-kék színek a sárgával harmonikus kontrasztot alkotnak

Fehér virágú növények: Fehér rózsák, gyöngyvirág

Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz

Díszfüvek: Tollbuga, kínai ezüstpázsit

Más kúszónövények: Rózsákkal társítva a különböző virágzási időszakokkal egész nyáron díszíthetnek

USDA besorolása: 8-10 (Magyarországon a növény mérsékelten télálló; a délebbi, védettebb fekvésű kertekben (7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén konténerben, teleltetve nevelhető biztonságosan).

Tarka nagy meténg	**Vinca major 'Variegata'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Kedves kis kúszónövény, leveleinek szegélye krémfehér, de a levéllemez is krémfehérrel márványozott. Égszínkék virágai májusban nyílnak. MInden kerttípusban jól alkalmazható. Egészen árnyékos helyeken ls jól mutat, ilyen helyeken is hozzák a levelei a fehértarka színvilágot, így szinti világít a földön. Erősebb teleken károsodhatnak hajtási, ilyenkor vissza kell vágni és tavasszal nekifut újra a feladatának.
Ezt a változatot kifejezetten azért választhatják sokan, mert nemcsak gyönyörű, hanem viszonylag alacsony karbantartási igényű is. A tarka levelekkel rendelkező Tarka nagy meténg éves színes látványt nyújt, különösen tavasztól őszig. Az évelő növényként ismert Tarka nagy meténg kifejezetten ellenálló a szárazsággal és a közepes fényviszonyokkal szemben, így ideális választás lehet azoknak, akik szeretnék élénkíteni kertjüket minimalista gondozási igények mellett. Zóna:5a - 9b

Terülő mirtuszlonc	**Lonicera nitida 'Maigrün'**	2 450 Ft	2 950 Ft

A Lonicera nitida 'Maigrün' (Terülő mirtuszlonc) 50-80 cm-nél magasabbra ritkán nő meg, de oldal irányba már nagyobb területeket is befuthat. Elterülő növésű, sűrű ágú örökzöld cserje. Lombozata télen is élénk, fényeszöld. Kiváló talajtakaró.
A levelek kicsik, tojásdad alakúak és élénkzöld színűek. A lombozat rendkívül sűrű és kompakt, ezáltal a cserje egyenletes és rendezett megjelenést kölcsönöz. A 'Maigrün' fajta terülő növekedésű, alacsony cserje, amely földhöz simuló ágakkal rendelkezik. Ennek köszönhetően kitűnően alkalmazható talajtakaróként, sziklakertekben vagy akár díszítőelemként is. A 'Maigrün' jól alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz, de a naposabb vagy félárnyékos területeken érzi magát a legjobban. Ez a növény nem igényel különleges talajtípust, de a jó vízelvezetésű, laza talajt részesíti előnyben. A terülő mirtuszlonc kiválóan alkalmas alacsony sövények, határok és talajtakarók kialakítására. Szép megjelenése miatt díszítőelemként is funkcionálhat kertekben és parkokban. A Lonicera nitida 'Maigrün' ellenálló a hidegebb éghajlatokkal szemben, így télen is megőrzi örökzöld lombozatát.
6b-9b USDA-zóna

Tomuri porzós kivi	**Actinidia chinensis 'Tomuri'**	4 900 Ft	6 950 Ft

Az Actinidia deliciosa (chinensis) 'Tomuri' (Tomuri porzós kivi) származási helyének éghajlata a meleg-temperált mérsékelt öv (nedves szubtrópus), egész évben bőséges csapadékkal, télen kisebb-nagyobb fagyokkal: a babérlombú erdőségek hazája. Fontos hogy a magas vízigénye mellett a magas hőigénye is ki legyen elégítve, ezért a kert egy félárnyékos részére ültessük. Ültetéskor talajjavítás javasolt, mert kifejezetten a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajokban érzi jól magát. A vezérhajtás kinevelésére időnként metszéssel be kell segítenünk. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja. A legnépszerűbb porzója a termő Actinidia deliciosa/chinensis 'Hayward' kivinek. 7a-9b USDA-zóna

Ursynow narancsszín virágú trombitafolyondár	**Campsis Ursynow**	5 450 Ft	5 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Ursynow narancsszín virágú trombitafolyondár (Campsis Ursynow) a trombitafolyondárok egyik legkedveltebb európai nemesítése, amely a lengyel Ursynow kutatóintézetből származik. Ez a hibrid a fajta strapabíróságát ötvözi a virágok páratlanul tiszta, élénk narancsszínével és a rendkívül bőséges virágzással, amely hónapokon át díszíti a kertet.
Kifejlett mérete és megjelenése: Az Ursynow közepes növekedési erélyű, kifejlett magassága 4-6 méter, szélessége 2-4 méter körül alakul. Kapaszkodógyökereivel önállóan, drótozás nélkül is felkúszik a falakra, kerítésekre és fatörzsekre. Lombozata élénkzöld, páratlanul szárnyalt levelekből áll, amelyek dús, egészséges megjelenést biztosítanak. A virágok a növény legnagyobb díszei: hosszúkás, trombitaszerű formájúak, 6-8 cm hosszúak, és élénk, tiszta narancsszínben pompáznak, gyakran sárgás torokkal. A virágok nagy, tömött fürtökben nyílnak júniustól egészen szeptemberig-októberig, folyamatosan vonzva a poszméheket, lepkéket és más beporzó rovarokat.
Igényei és gondozási útmutató: Az Ursynow a legszebb virágdíszét teljes napos helyen hozza, ahol napi legalább 6-8 óra közvetlen napfényt kap. Félárnyékban is fejlődik, de ilyenkor a virágzás mérsékeltebb lehet. Talajban nem válogatós: a közepesen termékeny, jó vízelvezetésű talajokat kedveli, de a meszes, homokos vagy kavicsos talajokban is megél. A pangó vizet nem tűri. Fiatal korában rendszeres öntözést igényel, de idősebb korban már jól tűri a rövid aszályos időszakokat. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal, lassú felszívódású műtrágyával vagy komposzttal érdemes gondoskodni. Metszése kulcsfontosságú a bőséges virágzás szempontjából: kora tavasszal, a rügyfakadás előtt a tavalyi hajtásokat 2-3 rügyre visszavágjuk, ami serkenti az új, virágzó hajtások képződését. A formázó metszés nyáron, virágzás után is elvégezhető. Teljesen fagytűrő, takarást nem igényel.
Kertstílus és növénytársítások: Az Ursynow sokoldalúságának köszönhetően számos kertstílusban megállja a helyét. Mediterrán kertekben a délies hangulatot erősíti, különösen fehérre meszelt falakon vagy terrakotta elemekkel kombinálva. Természetes és vadvirágos kertekben a narancsszínű virágok vonzzák a rovarokat, és vidéki bájjal ruházzák fel a lugasokat és kerítéseket. Városi kertekben és udvarokban a légszennyezést is jól tűri, így homlokzatok zöldítésére is kiváló. Kortárs kertekben a letisztult vonalakhoz, beton- és acélelemekhez a narancsszínű virágok izgalmas, meleg színfoltot jelentenek.
Változatos növénytársítások: Lila virágú kúszónövényekkel: A lila iszalag (Clematis viticella) fajtákkal, például Polish Spirit vagy Étoile Violette, ültetve a narancs és a lila egymást erősítve, egzotikus, mediterrán hangulatot teremt. Sötét lombozatú cserjékkel: A vöröslevelű díszszilva (Prunus cerasifera Nigra), a sötét levelű csodamogyoró (Corylus maxima Purpurea) vagy a vérsom (Cornus sanguinea) mellett az Ursynow élénk narancsszínű virágai ragyogóan érvényesülnek. Fehér virágú növényekkel: A hófehér gyöngyvessző (Spiraea arguta), a fehér virágú kerti hortenzia (Hydrangea arborescens Annabelle) vagy a habvirág (Schizophragma) elegáns, tiszta kontrasztot ad a meleg narancsszínhez. Alacsony kísérők: A növény tövébe ültetett levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), kakukkfű (Thymus) vagy törpe virágosnád (Miscanthus sinensis Adagio) tökéletesen kiegészíti a futónövény függőleges hatását. Futótársak: Tavasszal virágzó lonccal (Lonicera periclymenum Belgica) vagy rózsákkal együtt ültetve folyamatos virágzást biztosíthatunk a tavaszi hónapoktól egészen az őszi fagyokig.
Az Ursynow az egyik legmegbízhatóbban és legbőségesebben virágzó trombitafolyondár fajták közé tartozik, ezért kezdő kertészek számára is kiváló választás. USDA besorolása: 5-9.

Yellow Ripple borostyán	**Hedera helix 'Yellow Ripple'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Lassan növekvő borostyánfajta, melynek levelei mélyen karéjosak, sárga-tarkák. A krémsárga színű csík a karéjok mentén helyezkedik el. A borostyánok levelei sokféle alakúak lehetnek. Akár egy növényen is felfedezhető ez a polimorfizmus. A tarka fajták viszonylag lassan fejlődnek, de amennyiben jó helyre telepítjük könnyen megindulhatnak, és gyorsan benövik a rendelkezésre álló felületet. A borostyánok jól nyírhatóak, formázhatóak. Visszavágáskor jól sarjadnak, így akár áttört kerítések hálók befuttatására, és ilyen formán elválasztó sövény kialakítására is alkalmasak. Jól mutatnak cserépben, balkonládában. Ügyes kertészek kaspókba telepítve könnyen kis színes levlű bokorrá nyeshetik.
Első sorban árnyékos, párás termőhelyek növénye. Ilyen helyen telepítve törekszik a fény felé, a felszínen kúszva, ill. felfelé növekvő tárgyakra, más növényekre felkapaszkodva. Falusi, romantikus kertek fontos növénye, de kisvárosi kertekbe, belső átrium szerű udvarokban is jól használható, akár kevésbé szép lábazatok tartószerkezetek eltakarására.

6a USDA-zóna

pálmák

Európai lószőrpálma	**Chamaerops humilis**	7 500 Ft	8 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az európai lószőrpálma kiválóan mutat bármilyen környezetben. Gyakorlatilag az egész növény pálmalevelek tömegéből áll. Több törzset nevel, ezért a bokorpálmák közé soroljuk. Alacsony termete miatt a mediterrán térségben főleg nagyobb fák, pálmák, vagy falak tövébe ültetik, de dézsás növénynek is kiváló! Nálunk teljes napot igényel, de a klasszikus mediterrán éghajlaton félárnyékos helyeken is jól érzi magát. A hűvösebb, nedvesebb éghajlaton hajlamos a gombás megbetegedésekre. Ha minden igénye ki van elégítve is, elég lassú növekedésű, ezért nem szerencsés teljesen magára hagyni, bár kiváló szárazságtűrésű, nagyon strapabíró pálma. Ha megszeretnénk mutatni törzsét, távolítsuk el a törzsre lapuló száraz leveleit. Ehhez használjunk vastag bőrkesztyűt, mert a levélnyelein fűrészfogasan helyezkednek el tövisek sokasága. Botanikai, latin nevének második tagja 'humilis' a termetére utal, mert latinban alacsonyat jelent. Hazájában, a Földközi-tenger térségében a legidősebb példányok is csak ritkán haladják meg az 5 méteres magasságot. Természetes élőhelye a Földközi-tenger nyugati medencéje, Olaszország délnyugati részétől a Riviérán keresztül Spanyolország keleti, délkeleti partján végig haladva egészen Portugália déli részéig. Élőhelye átnyúlik Afrika északnyugati részébe, az Atlasz-hegységbe, ahol a kék változata (Chamaerops humilis var. cerifera) él. Még egy változata él a természetben, méghozzá Sziciliától északra található Lipari-szigeteken, az alapfajnál kompaktabb Chamaerops humilis var. vulcano. Sokáig az egyedüli honos pálmának tartották Európában, de a botanikusok pár évtizede a krétai datolyapálmát (Phoenix theophrasti) is önálló fajnak és honosnak minősítették.
1. Fény: Napos, félárnyékos helyre ültessük
2.Talaj: Laza és jó vízelvezetéssel rendelkező talajba ültessük.
4. Öntözés: A pálma nem szereti a túlzott öntözést.
5. Trágyázás:Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a növényt lassú felszívódású műtrágyával.
6. Metszés: Ha szükséges, távolítsuk el a hervadt vagy sérült leveleket, de ne metszük vissza a friss hajtásokat, hacsak nincs rá valós szükség.

8b-10b USDA-zóna

Wagner kenderpálma	**Trachycarpus wagnerianus**	17 500 Ft	17 500 Ft

Az alapfajtól levélzetének spirális szerkezetében tér el. A levéllemezek 'ujjai' szabályos sugárirányban rendezettek, merevek, a végük sosem hajlik le. A levelek a kifejlett növényeken hamvas, kékes árnyalatúak. Lélegzetelállítóan gyönyörű növény! Ellenállósága, fagytűrése a Trachycarpus fortunei-éhez hasonló.
A Wagner kenderpálma lassú növekedésű, ami lehetővé teszi, hogy kontrollált körülmények között neveljék, akár cserépben is. Maximális magassága elérheti a 8-12 métert, de ez évtizedek alatt valósul meg. Levélzetét sűrű, fényes, kékeszöld levelek alkotják, melyek ellenállnak az erős szélnek és viszonylag kis méretüknek köszönhetően nem törik le könnyen. A fajta virága nem különösebben feltűnő, de érdekes struktúrát ad a növénynek.
Gondozási útmutató
Fényigény: A Wagner kenderpálma részleges árnyékban vagy közvetlen napfényben is jól fejlődik. Fiatal korában érdemes inkább árnyékosabb helyre tenni, míg megerősödik.
Öntözés: Mérsékletesség ajánlott; hagyja, hogy a földje az öntözések között kicsit megszáradjon. Túlöntözés esetén az erős nedvesség gyökérrothadást okozhat.
Talaj: Jól lecsapolódó, tápdús talajt igényel. A tömött, agyagos talaj kerülendő.
Hőmérséklet: A Wagner kenderpálma meglepően jól tűri a hideget, akár -10°C-ig is ellenálló, de fiatal korban védelemre szorul a fagyokkal szemben.
Tápoldatozás: Tavasztól őszig, havonta tápoldatozás szükséges, hogy támogassa a növekedését és a sűrű, egészséges levélzet kifejlődését.
7a-9a USDA-zóna

SPECIÁLIS FŰMAGKEVERÉKEK ÉS MŰTRÁGYÁK

Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 1 kg		4 100 Ft	4 100 Ft

Megakadályozza a mohásodást
Sűrű pázsitot alkot
Kiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítésére
Hosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad

10 M - 10 növényes talajtakaró mix mikorrhizával	**365 napban takarja a talajt, hiszen a természet is ezt tenné**	57 950 Ft	59 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Hogyan kell kijuttatni:
A vetőmagkeveréket 2-4 cm mélyen kell elvetni. Száraz talaj esetén érdemes a vetés után öntözni a gyorsabb kelés érdekében. 5 kg termék elegendő 500-1 000 m² terület „takaráshoz/vitalizáláshoz". Ideális vetési időszak: március-május vagy augusztus vége-október.
Miért érdemes ezt a talajtakarót választani?
A képen látható különböző takarónövények gyökérmérete jól illusztrálja, hogy gyökereik sűrűn átszövik a talajt, így javítva annak szerkezetét, valamint kiváló gyomelnyomó képességgel rendelkeznek. Emellett a termék mikorrhiza tartalma nemcsak a talajtakaró növényeket támogatja, hanem a következő vetett haszonnövények fejlődését is segíti!
A termék előnyei:

Talaj egészségének javítása
Tápanyag-kimosódás megakadályozása
Erozió csökkentése
Gyomelnyomás növelése
Biodiverzitás fokozása

A virágok legjobb barátja
A termékben található pillangós virágú növények (fehérvirágú csillagfu, tavaszi bükköny, bíborhere, alexandriai here, somkóró) nitrogént kötnek meg a levegőből. A növények elpusztulása után lebomlanak a talajban, így a nitrogén hozzáférhetővé válik a következő növények számára. E pillangósok aránya a keverékben közel 60%.
A termék összetevői:

26% Takarmányborsó

Szinte bármilyen talajon termeszthető
Nagy mennyiségű nitrogént köt meg
Mélyre hatoló gyökere jól lazítja a talajt
Jelentős zöldtömege növeli a talaj szervesanyag-tartalmát
Mélyebb talajrétegben felhalmozódott nitrogént is képes feltárni
Homoktalajokon kiváló talajjavító képességgel bír

20% Takarmánybükköny

Sikeresen termeszthető szinte bármilyen talajon, de a jobb talajok előnyösek számára
Hideg- és fagytűrő növény, így akár mulcsként is megtartható a téli hónapokban
Fejlődése csupán 2-3 hónap és ez idő alatt nagy zöldtömeget hoz létre
Leverői leveleinek végén kacsok segítik a támaszra való kapaszkodást
Hosszú gyökerei akár 110 cm-re is lehatolnak
Képes 50-150 kg N megkötésére, ami 200-500 kg/ha Pétisónak felel meg

16% Traktor rozs

Mélyre növő erős gyökere fellazítja a talajt
Szikeseket kivéve szinte bármilyen talajon termeszthető
Rövid tenyészidejű, így később vetve is nagy biomasszát eredményez
Sűrű növényállománya jó gyomelnyomó és fékező hatással van a talaj eróziójára
Erőteljes gyökerei tárolják a nitrogént és más tápanyagokat
Kiváló támasztónövény a pillangósok számára
Szárazságtűrő
Gyors növekedése miatt megőrzi a levegő páratartalmát, lehetővé téve a talaj felső rétegének vízmegerősítését a következő kultúrnövény számára

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

1 % Somkóró

Igénytelen, fagy- és szárazságtűrő növény, amely akár meszes homoktalajokon is jól megterem.
Képes 90-150 kg/ha nitrogén hatóanyagot megkötni, ami 300-500 kg/ha Pétisónak felel meg.
Főgyökere akár 1,5 méter mélyre is lehatol, ezáltal lazítva a talajt, ami javítja a talaj szerkezetét és levegőztetését.

12% Érdes (fekete) zab

Szinte bármilyen talajtípuson termeszthető, beleértve a savanyú vagy homokos talajokat is.
Nagy zöldtömeget fejleszt, amely később növeli a talaj szervesanyag-tartalmát.
Gyors növekedése és jelentős zöldtömege miatt jó gyomelnyomó hatással rendelkezik.
Csökkenti a szél- és vízeróziót, védve a talajt az erosív hatásoktól.
Kiváló támasztónövénye a pillangósoknak, mivel elősegíti azok fejlődését a talaj megfelelő levegőztetésével.
Szárazságtűrő, és gyorsan növő, nagy zöld tömegének köszönhetően képes megőrizni a levegő páratartalmát, elősegítve a talaj felső rétegének vízmegerősítését a következő kultúrnövény számára.

8% Meliorációs retek

Nagy karógyökere áttöri az eketalpat, így elengedhetetlen a csökkentett talajművelés esetén
Jelentős N, K, Ca, S és mikroelem megkötő hatása van
Jól fedi a talajt, így jelentős gyomelnyomó hatású „aljfű”
Képes csökkenteni a víz- és szélerózió hatásait
Nagy mennyiségű szerves anyagot hagy vissza, amely növeli a humusztartalmat, különösen a föld alatti részek hasznosulása révén gyorsan és jobb minőségű humuszt biztosít
Zöldítésben is alkalmazható
Már 30 nap alatt jelentős gyökér- és zöldtömeget fejleszt
Több napos, mínusz 10 fok alatti hőmérséklet esetén kifagy

8% Bíborhere

Képes akár 60-160 kg/ha N megkötésére (ami 200-600 kg Pétisónak felel meg)

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Jól fedi a talajt, így jelentős gyomelnyomó hatást fejt ki
Karógyökere 40-60 cm mélyen beszövi a talajt, ezáltal javítja annak szerkezetét
Táplálja a talajban lévő hasznos gombákat és baktériumokat

5% Facélia (Mézontófű)

Kiváló talajszerkezet-javító hatása van a feltalajban
Gazdagítja a hasznos mikroorganizmusok számát
Igénytelen a talajjal szemben
Sok tápanyagot köt meg a gyökere, amely a lebomlása után hasznosul a következő növények számára
Nincs kártevője, illetve kórokozója
Ökológiai gazdálkodásban népszerű növény, mivel kiváló gyomelnyomó képességének és biológiai talajfertőtlenítő hatásának köszönhetően előnyös (ciántartalmú bomlástermékei távol tartják a fonálférgeket)

4% Alexandrai here

Képes akár 100-140 kg/ha nitrogén megkötésére, ami 300-400 kg Pétisónak felel meg
Gyökere sűrűn átszövi a talajt, így javítja a feltalaj szerkezetét
Jó talajon gyorsan és sűrűre nő, így kiváló gyomelnyomó képességgel bír, miközben csökkenti a szél- és vízeróziót
Két őszi vetésű növény között ideális választás, mivel gyorsan nő és sok nitrogént köt meg

4% Len

Minimális csapadék is elegendő a csírázásához, valamint a szárazságot is jól tűri
Gyors kezdeti fejlődése jellemzi
Erős szárával kiváló támasztékot nyújt a többi növénynek
Gyökerei sűrűn átszövik a feltalajt, javítva annak szerkezetét

Mikorrhiza gomba

Spórái érzékelik a közelben lévő élő gyökeret, és a hifákkal belenőnek abba.
A kultúrnövénnyel szimbiózisba lép, amely mindkét élőlény számára előnyös.
Távolról képes több vizet és tápanyagot szállítani a kultúrnövényekhez.
Százszorosára növeli a gyökér víz- és tápanyagfelvevő felületét.
A kultúrnövény cserébe táplálékot, például cukrokat és aminosavakat ad a mikorrhiza gombának.
Terminálása után a télen “áttelel”, majd a tavasszal vetett kultúrával újra szimbiózisba lép, és segíti annak víz- és tápanyagfelvételét.

Ez a takarónövény-keverék gazdag ökológiai rendszert teremt a talajban, javítja a termőföld minőségét, és hozzájárul a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokhoz.

Tárolás: Az anyagot 5-30 °C között, eredeti csomagolásában legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonnal felhasználható, de ha szorosan visszazárva, hűvös, fagymentes helyen tárolják, akkor 6 hónapig megőrzi minőségét.

Asco Alga 10 l	**Tengeri alga az intenzív növekedésért**	60 960 Ft	62 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

sco Alga - Tengeri alga kivonat a növények természetes vitalitásáért
Az Asco Alga egy 100%-ban organikus, vegyszermentes növénykondicionáló, amely tengeri algákból készült. A természet erejét használja fel a növények egészségének és ellenálló képességének fokozására, a gyökeresedéstől egészen a termés tárolhatóságáig.
Hogyan segíti a növényeket? A tengeri algák évmilliók alatt fejlesztették ki túlélési stratégiájukat az állandóan változó, szélsőséges környezeti feltételek (apály-dagály, hőingadozás) között. Közel 100 féle bioaktív hatóanyagot, növényi hormont, vitamint és ásványi anyagot halmoztak fel, amelyek a permetezést követően néhány órán belül felszívódnak a növény szöveteibe, és heteken át táplálják, erősítik azt.
Az Asco Alga alkalmazásának előnyei:

Stressztűrés fokozása: Segít átvészelni az aszályos időszakokat, a hőhullámokat és a tavaszi fagyokat.

Növekedés és regeneráció: Támogatja a gyökeresedést, a hajtásnövekedést és a sérült növényi részek gyorsabb regenerálódását.

Minőség javítása: Hozzájárul a termés színesedéséhez, jobb beltartalmi értékeihez és hosszabb tárolhatóságához.

Termékenyülés segítése: Elősegíti a virágok megtermékenyülését és a kötődést.

Kijuttatás és dózis: A permetlevet 1-2%-os koncentrációban készítse el, azaz 10 liter vízhez adjon 1-2 deciliter Asco Algát. A kezelést a vegetációs időszakban 2-3 hetente javasolt megismételni a maximális hatékonyság érdekében.
Kombinálható készítmények: Az Asco Alga kiválóan alkalmazható integrált növényvédelemben. Hatékonyan kiegészíti a Tricho Immun és a SoftGuard termékek hatását. Javasolt kezelési sorrend:

Alapozásként Tricho Immun + Asco Alga.

1 hét múlva SoftGuard + DanuVital Bio.

Ezt követően 2-3 hetente váltogassa a SoftGuard + Asco Alga és a SoftGuard + DanuVital Bio kombinációkat.

Figyelem: Az 1 literes kiszerelésű flakon a szállítás során deformálódhat. Ez a termék minőségére és hatékonyságára nincs befolyással.
sco Alga - Tengeri alga kivonat a növények természetes vitalitásáért
Az Asco Alga egy 100%-ban organikus, vegyszermentes növénykondicionáló, amely tengeri algákból készült. A természet erejét használja fel a növények egészségének és ellenálló képességének fokozására, a gyökeresedéstől egészen a termés tárolhatóságáig.
Hogyan segíti a növényeket? A tengeri algák évmilliók alatt fejlesztették ki túlélési stratégiájukat az állandóan változó, szélsőséges környezeti feltételek (apály-dagály, hőingadozás) között. Közel 100 féle bioaktív hatóanyagot, növényi hormont, vitamint és ásványi anyagot halmoztak fel, amelyek a permetezést követően néhány órán belül felszívódnak a növény szöveteibe, és heteken át táplálják, erősítik azt.
Az Asco Alga alkalmazásának előnyei:

Stressztűrés fokozása: Segít átvészelni az aszályos időszakokat, a hőhullámokat és a tavaszi fagyokat.

Növekedés és regeneráció: Támogatja a gyökeresedést, a hajtásnövekedést és a sérült növényi részek gyorsabb regenerálódását.

Minőség javítása: Hozzájárul a termés színesedéséhez, jobb beltartalmi értékeihez és hosszabb tárolhatóságához.

Termékenyülés segítése: Elősegíti a virágok megtermékenyülését és a kötődést.

Kijuttatás és dózis: A permetlevet 1-2%-os koncentrációban készítse el, azaz 10 liter vízhez adjon 1-2 deciliter Asco Algát. A kezelést a vegetációs időszakban 2-3 hetente javasolt megismételni a maximális hatékonyság érdekében.
Kombinálható készítmények: Az Asco Alga kiválóan alkalmazható integrált növényvédelemben. Hatékonyan kiegészíti a Tricho Immun és a SoftGuard

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

termékek hatását. Javasolt kezelési sorrend:

Alapozásként Tricho Immun + Asco Alga.

1 hét múlva SoftGuard + DanuVital Bio.

Ezt követően 2-3 hetente váltogassa a SoftGuard + Asco Alga és a SoftGuard + DanuVital Bio kombinációkat.

Figyelem: Az 1 literes kiszerelésű flakon a szállítás során deformálódhat. Ez a termék minőségére és hatékonyságára nincs befolyással.
Az Asco Alga felbontás után 6 hónapig még felhasználható, ha - kiöntés után azonnal jól visszazárjuk, valamint közvetlen nappfénytől védett, száraz, és hűvös helyen tároljuk (a felbontás utáni hűtés fontos).

Asco Strat Bio Bakter 1kg	Robbanásszerű kelés a növényeinknek	5 450 Ft	5 450 Ft

Mik is ezek a baktériumok, és milyen szerepet töltenek be?
Bacillus megaterium

Képes a talajban található ásványi kötött foszfort oldható formába alakítani.
Növényi hormonokat termel.
Elősegíti a csírázást.
Jellemző rá a gyors növekedés és kiváló alkalmazkodóképesség különböző talajtípusokhoz.
A lúgos talajban is hatékonyan oldja fel a lekötött foszfort.

Streptomyces beta-vulgaris

Jelentős mértékben termeli a növényi hormonokat, különösen az auxinokat.
Serkenti a gyökérrendszer fejlődését.
Növeli a talaj mikrobiológiai aktivitását.
Képes nagyobb távolságra elterjedni, így kiszorítja a többi mikroorganizmust.
Megköti a talajban lévő vasat (Fe), és gátolja a káros mikroorganizmusok szaporodását.

Burkholderia sp.

Gyorsan növekszik és jól alkalmazkodik a környezeti feltételekhez.
A szerves foszfort felvehetővé teszi.
Fokozza az auxin gyökérnövelő hormon termelését.
Szideroforokat termel, amelyekkel a káros mikroorganizmusoktól vonja el a vasat.
Mind savas, mind lúgos talajban mobilizálja a foszfort.

Magyarországon ez az első bio-termesztésben is alkalmazható starter mikrogranulátum, amely hasznos baktérium kiegészítéssel van ellátva. Magas foszfortartalma elősegíti az energiaigényes gyökeresedést. Ajánlott dózis: 15-20 kg/hektár.

Barenbrug mikrohere 0.5 kg	5 950 Ft	5 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Takarékoskodjon a tápanyag- és vízellátás költségein!
A Barenbrug Mikrohere a fehér here apró levelű változata, amely kiváló szárazságtűrő képességgel rendelkezik. Légköri nitrogén megkötésével növeli a talaj nitrogénkészletét, ezáltal elősegíti a fűfélék egészséges növekedését. Ennek köszönhetően egy önellátó, tápanyagokban gazdag zöldfelületet hozhat létre, amely a nyári hónapok viszontagságait is jól elviseli.
Önállóan vagy fűmaggal együtt is vethető
A Mikrohere önálló elvetése esetén sűrű zöldfelület alakul ki, de fűmaggal is kiválóan keverhető. Az önállóan elvetett Mikrohere területek mérsékelt igénybevételre ajánlottak, míg fűmaggal együtt vetve egy erősebb, jobban ellenálló felületet kapunk. Minden Barenbrug fűmagkeverékkel jól kombinálható, így a kiszórt tápanyag mennyiségét is csökkenthetjük.
Sűrű, tömött pázsit
A Mikroherével kevert pázsit rendszeres nyírásával egy sűrű, gyomtalan területet érhet el. A gyakori nyírás hozzájárul egy egységes, esztétikus felület kialakításához, amely jobban ellenáll a házi kedvencek vizelete által okozott káros hatásoknak.
A Mikrohere használatával növelheti a biodiverzitást és támogathatja a fenntartható környezet kialakítását.
Vetés ideje és módja:
A Mikrohere tavaszi és őszi vetésre egyaránt alkalmas. Az önálló vetéshez ajánlott mennyiség 10 g/m², míg fűmaggal való keverés esetén 50 g/1 kg fűmag. A vetés mélysége körülbelül 0,5 cm legyen. A telepítést követően ügyeljen a gyakori, kis adagú öntözésre az optimális kelés érdekében.

Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék	**1 kg**	4 600 Ft	4 600 Ft

Összetétel:
Fajok
20% Resilient Blue /Poa pratensis - Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz
Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódni! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!
Tűrőképesség a legnehezebb időszakokban
Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.
Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedi a Resilient Blue®!

Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után
Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.
Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállásában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékeknél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.

Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben
A Resilient Blue® a rendkívül erőteljes RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!
Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség
A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyep ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyep használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.
A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápolt pázsitok esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

Resilient Blue katalógus letöltés >>>

Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék 15 kg	**Állja a sarat a legnehezebb időszakokban is!**	62 500 Ft	65 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Összetétel:
Fajok
30% Resilient Blue /Poa pratensis – Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz

Készüljön fel a kihívásokra! Az éghajlat globálisan változik, és a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Tanúi vagyunk hatalmas felhőszakadásoknak, perzselő hőségeknek és hosszú, száraz nyaraknak. Ennek következtében gyakran szembe kell néznünk nehézségekkel. Azonban nem kell aggódnia! Létezik egy új technológia, amely ellenáll ezeknek a szélsőségeknek: a Resilient Blue! Ez a megoldás a legszigorúbb körülmények közt is helytáll.
Kitartás a legnehezebb időszakokban
Az elhúzódó szárazság, a forróság, a betegségek fokozott jelenléte és a tartósan alacsony tápanyagellátottság olyan tényezők, amelyek végzetesek lehetnek a pázsit számára, és Önnek kihívást jelenthetnek. A Resilient Blue® azonban az általános réti perjével szemben képes megőrizni stabilitását, és ellenáll a különböző stresszfaktoroknak. Az időben történő regenerálódás révén a Resilient Blue® visszatér, biztosítva a maximális borítottságot. Ez teszi a Resilient Blue®-t igazán különlegessé!

Gyors regenerálódás a szárazság és forróság után
Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését, hanem ezek után a gyors regenerációt is jelenti.
Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság hatása alatt áll, megnyugtató, hogy a Resilient Blue® erejére támaszkodhat, és az eredeti állapot gyorsan helyreállítható. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékeknél nagyobb ellenálló képességű, és sokkal gyorsabban regenerálódik a nehéz körülmények után.

Magas fokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben
A Resilient Blue® az innovatív RPR® technológiát alkalmazza, amely rendkívüli ellenállóságot biztosít. Az RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat fejleszt, amelyek gyors regenerációt tesznek lehetővé bármilyen károsodás után. E funkciók hiányoznak a hagyományos, csomós típusú angolperjéből. A gyökerező oldalhajtások adják az RPR® erejét a regeneráció során, hiszen gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® és a Resilient Blue® technológiák szinergiában működnek, fokozva egymás hatékonyságát, így létrehozva egy igazán erőteljes és ellenálló kombinációt.
Magas fokú ellenállás a betegségekkel szemben
A szélsőséges időjárási körülmények gyakran stresszes helyzetekhez és növényi betegségek megjelenéséhez vezetnek. A Resilient Blue® kivételes ellenállósága biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen érzékeny a gombás fertőzésekre, és hogy a gyep ne csupán zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatosan használható a gyep, ami lehetőséget biztosít a karbantartási, kárhelyreállítási és növényvédő szer költségek megtakarítására.
A Resilient Blue® Lawn alacsonyabb ráfordítással is jobban teljesít, mint a hagyományos parkfű keverékek. Ezért ideális választás erősebb igénybevételű, de alacsonyabb ápolási szinttel rendelkező pázsitok esetén. Összességében elmondható, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb lehetőség kertek és parkok pázsitjainak telepítésére. Ez a technológia lesz a legjobb megoldás a meglévő fűterületek felülvetésére is. Fontos megjegyezni, hogy az angolperjéhez képest a réti perje teljes potenciáljának elérése valamivel hosszabb időt vehet igénybe.

Barenbrug Resilient Blue Lawn fűmagkeverék 5 kg		21 200 Ft	21 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Összetétel:
Fajok
20% Resilient Blue /Poa pratensis – Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 15 % Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos) 15 % Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15 % Festuca trachyphylla - Keménylevelű csenkesz
Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Így egyre gyakrabban kell nehézségekkel szembe néznie. De nincs oka aggódni! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is!
Tűrőképesség a legnehezebb időszakokban
Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat.
Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue® ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét”, és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue® visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedi a Resilient Blue®!

Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után
Az ellenálló képesség nemcsak a szélsőséges időjárási viszonyok elviselését jelenti, hanem mindenekelőtt az ilyen körülmények utáni, gyors regenerációt is.
Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue® erejében és a kívánt állapot helyreállásában. A Resilient Blue® az átlagos fűmagkeverékeknél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után.
Nagyfokú ellenállóság az erős igénybevétellel szemben
A Resilient Blue® a rendkívül erőteljes RPR® technológiát is alkalmazza. A RPR® (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, csomós típusú angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR®-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR® gyorsan csírázik és fejlődik. Az RPR® technológia és a Resilient Blue® technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció!
Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség
A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek a stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue® ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyep ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyep használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában.
A Resilient Blue® Lawn jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos park fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az erősebb igénybevételnek kitett, de alacsonyabb ráfordítási szinten ápolt pázsitok esetében. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue® az egyik legjobb választás a kertek, parkok pázsitjainak telepítéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue® technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő füves területek felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

Barenbrug Resilient Blue Sport fűmagkeverék 15 kg		60 000 Ft	62 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Legyen felkészülve a szélsőségekre! Az éghajlat világszerte változik, a szélsőségek egyre gyakoribbá, megszokottabbá válnak. Óriási felhőszakadásoknak, tikkasztó hőségnek és rettentő száraz nyaraknak vagyunk szemtanúi. Ön, a gyep szakértőjeként egyre gyakrabban néz szembe nehézségekkel. Kell-e öntöznöm? Mennyit? Kimosódott a műtrágya? Nyírhatok füvet, ha az nedves? De nincs oka aggódni! Van egy új technológia, amely ellenáll ezen szélsőségeknek: a Resilient Blue! Kiállja a próbát és ellenáll a legnehezebb körülmények között is! Az elhúzódó szárazság és hőség, a betegségek általi nagyfokú fenyegetettség és a tartósan alacsony tápanyagellátottság mind olyan tényező, amely végzetes lehet a pázsit számára, Önnek pedig dilemmát okozhat. Az általános réti perjétől eltérően a Resilient Blue ilyen körülmények között is „megőrzi a hidegvérét", és ellenáll a stresszfaktorok széles körének. A megfelelő időben történő regeneráció által a Resilient Blue visszavág, és biztosítja az optimális borítottságot. Ettől olyan egyedi a Resilient Blue! A Resilient Blue technológia A Resilient Blue® fűmagkeverék olyan fűfajtákat tartalmaz, amelyeknek kiváló az ellenálló képessége. A Resilient Blue® fűmagkeverékek alapját a speciális fejlesztésű, különleges ellenálló képességű Poa pratensis (réti perje) fajták alkotják. A Resilient Blue® fűmagkeverékben található réti perje magok Yellow Jacket Water Manager bevonattal vannak ellátva. Ez az egyedülálló vetőmagkezelési eljárás optimális nedvességtartalmat biztosít az elvetett magok környezetében. A fűmagok sikeresen és gyorsan csíráznak, a fiatal, még sérülékeny növények gond nélkül egészséges, életerős pázsittá fejlődnek. Így a Resilient Blue® technológia olyan megbízható alapot képez, amely biztosítja, hogy a pázsit felkészült legyen a jövő szélsőségeire. Gyors regenerálódás a forróság és szárazság után Ha a pázsitja súlyos szárazság és forróság általi igénybevételnek van kitéve, jó tudni, hogy bízhat a Resilient Blue erejében és a kívánt állapot helyreállásában. A Resilient Blue az átlagos fűmagkeverékeknél nagyobb ellenálló képességű, és jóval gyorsabban regenerálódik a szélsőségek után. Ellenálló az erős igénybevétellel szemben Resilient Blue a rendkívül erőteljes RPR technológiát is tartalmazza. A RPR (regenerálódó angolperje) a normál angolperjétől eltérően olyan gyökerező oldalhajtásokat hoz létre, amelyek biztosítják a villámgyors regenerálódást bármilyen károsodást követően. Az általános, bokros növekedésű angolperje nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal. A gyökerező oldalhajtások teszik az RPR-t ennyire erőssé a regeneráció terén. Az RPR gyorsan csírázik és telepszik meg. Az RPR technológia és a Resilient Blue technológia kéz a kézben járnak, egymás hatékonyságát fokozva. Ez igen erős és ellenálló kombináció! Nagyfokú, betegségekkel szembeni ellenálló képesség A szélsőséges időjárási viszonyok gyakran vezetnek stresszkörülmények kialakulásához és a növényi betegségek előfordulásához. A Resilient Blue ellenálló képessége biztosítja, hogy pázsitja kevésbé legyen fogékony a gombák általi támadásra, és hogy a gyep ne csak zöldebb, hanem egészségesebb is maradjon. Ennek köszönhetően folyamatos a gyep használatának a lehetősége. Ezáltal megtakarítást érhet el a karbantartás, a kárhelyreállítás és a növényvédő szerek költségeinek vonatkozásában. A Resilient Blue Sport jobban teljesít alacsonyabb ráfordítás mellett is, mint a szokványos sport fűmagkeverékek. Ezért a legjobb megoldás az intenzíven használt és karbantartott sportpályákhoz, sportgyepekhez, szabadidős játékfelületekhez. Összességében kijelenthetjük, hogy a Resilient Blue az egyik legjobb választás az új sportpályák vetéséhez. Ez az, ahol a Resilient Blue technológia értelmet nyer. Természetesen alkalmas a meglévő pályák felülvetéséhez is. Ne feledje, hogy az angolperjéhez képest valamivel hosszabb ideig tart, amíg a réti perje eléri teljes potenciálját.

Barenbrug RPR Lawn 1 kg	**Pázsit, amely erős, mint a vas!**	4 250 Ft	4 650 Ft

Összetétel:
Fajok
30% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 30% Lolium perenne - Angol perje 25% Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15% Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos)
Tudjon meg többet a PRP-ről!
Gyorsan fejlődő, erős pázsit
Az RPR Lawn egy kiváló minőségű fűmagkeverék, amely gyors növekedést biztosít, létrehozva ezzel egy erős és strapabíró pázsitot. Használatával gyorsan használatba vehető a füvesített terület, hiszen rövid időn belül elég sűrű és ellenálló pázsit alakul ki, amely tökéletes helyszín a szabadidős tevékenységekhez. A regeneráló angol perje, amely a fűmagkeverék része, a strapabírás szempontjából ideális, és versenytársaihoz képest is kiemelkedik. Az RPR Lawn fűmagkeverék kiválóan alkalmazkodik az erős igénybevételhez.
Széleskörű alkalmazás
Ez a fűmagkeverék ideális megoldás kertek, parkok és sportfelületek létesítésére. Az erős igénybevételre való ellenállás mellett esztétikus megjelenést is biztosít, így az RPR Lawn használatával mindig dús, szép pázsitot érhet el.
Új telepítéshez és felülvetéshez is alkalmas
Az RPR Lawn fűmagkeverék új telepítésekhez és felülvetéshez egyaránt ideális. Rendszeres felülvetéssel pázsitját folyamatosan jó állapotban tarthatja, lehetővé téve, hogy egész évben élvezhesse a gyönyörű, zöld füves területet.
Gyors kelés és kezdeti fejlődés
Az RPR Lawn fűmagkeverék angol perje gyors kelést és erőteljes kezdő fejlődést biztosít, míg a vörös csenkesz sűríti a pázsitot. Az eredmény egy rövid idő alatt kialakuló, esztétikus és strapabíró gyepfelület.
Zöld Bolygó címke
A Barenbrug különös figyelmet fordít a környezetbarát és gazdaságos pázsitfenntartásra. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékek hozzájárulnak a pázsitok fenntartható használatához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata segítik a Barenbrugot abban, hogy a legmegfelelőbb fűfajtákat és keverékeket válassza a fenntartható pázsitok ápolásához.

Barenbrug RPR Lawn 15 kg	**Pázsit, amely erős, mint a vas!**	56 700 Ft	59 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Összetétel:
Fajok
30% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 30% Lolium perenne - Angol perje 25% Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15% Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos)
Tudjon meg többet a PRP-ről!
Gyorsan fejlődő, erős pázsit
Az RPR Lawn egy kiváló minőségű fűmagkeverék, amely gyors növekedést biztosít, létrehozva ezzel egy erős és strapabíró pázsitot. Használatával gyorsan használatba vehető a füvesített terület, hiszen rövid időn belül elég sűrű és ellenálló pázsit alakul ki, amely tökéletes helyszín a szabadidős tevékenységekhez. A regeneráló angol perje, amely a fűmagkeverék része, a strapabírás szempontjából ideális, és versenytársaihoz képest is kiemelkedik. Az RPR Lawn fűmagkeverék kiválóan alkalmazkodik az erős igénybevételhez.
Széleskörű alkalmazás
Ez a fűmagkeverék ideális megoldás kertek, parkok és sportfelületek létesítésére. Az erős igénybevételre való ellenállás mellett esztétikus megjelenést is biztosít, így az RPR Lawn használatával mindig dús, szép pázsitot érhet el.
Új telepítéshez és felülvetéshez is alkalmas
Az RPR Lawn fűmagkeverék új telepítésekhez és felülvetéshez egyaránt ideális. Rendszeres felülvetéssel pázsitját folyamatosan jó állapotban tarthatja, lehetővé téve, hogy egész évben élvezhesse a gyönyörű, zöld füves területet.
Gyors kelés és kezdeti fejlődés
Az RPR Lawn fűmagkeverék angol perje gyors kelést és erőteljes kezdő fejlődést biztosít, míg a vörös csenkesz sűríti a pázsitot. Az eredmény egy rövid idő alatt kialakuló, esztétikus és strapabíró gyepfelület.
Zöld Bolygó címke
A Barenbrug különös figyelmet fordít a környezetbarát és gazdaságos pázsitfenntartásra. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékek hozzájárulnak a pázsitok fenntartható használatához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata segítik a Barenbrugot abban, hogy a legmegfelelőbb fűfajtákat és keverékeket válassza a fenntartható pázsitok ápolásához.

Barenbrug RPR Lawn 5 kg	**Pázsit, amely erős, mint a vas!**	19 500 Ft	21 000 Ft

Összetétel:
Fajok
30% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) 30% Lolium perenne - Angol perje 25% Festuca rubra ssp. commutata - Vörös csenkesz (törpe) 15% Festuca rubra ssp. rubra - Vörös csenkesz (tarackos)
Tudjon meg többet a PRP-ről!
Gyorsan fejlődő, erős pázsit
Az RPR Lawn egy kiváló minőségű fűmagkeverék, amely gyors növekedést biztosít, létrehozva ezzel egy erős és strapabíró pázsitot. Használatával gyorsan használatba vehető a füvesített terület, hiszen rövid időn belül elég sűrű és ellenálló pázsit alakul ki, amely tökéletes helyszín a szabadidős tevékenységekhez. A regeneráló angol perje, amely a fűmagkeverék része, a strapabírás szempontjából ideális, és versenytársaihoz képest is kiemelkedik. Az RPR Lawn fűmagkeverék kiválóan alkalmazkodik az erős igénybevételhez.
Széleskörű alkalmazás
Ez a fűmagkeverék ideális megoldás kertek, parkok és sportfelületek létesítésére. Az erős igénybevételre való ellenállás mellett esztétikus megjelenést is biztosít, így az RPR Lawn használatával mindig dús, szép pázsitot érhet el.
Új telepítéshez és felülvetéshez is alkalmas
Az RPR Lawn fűmagkeverék új telepítésekhez és felülvetéshez egyaránt ideális. Rendszeres felülvetéssel pázsitját folyamatosan jó állapotban tarthatja, lehetővé téve, hogy egész évben élvezhesse a gyönyörű, zöld füves területet.
Gyors kelés és kezdeti fejlődés
Az RPR Lawn fűmagkeverék angol perje gyors kelést és erőteljes kezdő fejlődést biztosít, míg a vörös csenkesz sűríti a pázsitot. Az eredmény egy rövid idő alatt kialakuló, esztétikus és strapabíró gyepfelület.
Zöld Bolygó címke
A Barenbrug különös figyelmet fordít a környezetbarát és gazdaságos pázsitfenntartásra. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékek hozzájárulnak a pázsitok fenntartható használatához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata segítik a Barenbrugot abban, hogy a legmegfelelőbb fűfajtákat és keverékeket válassza a fenntartható pázsitok ápolásához.

Barenbrug Speedy Green fűmagkeverék 15 kg	**Gyors növekedésű fűmagkeverék sportpályák és egyéb füves területek számára.**	52 350 Ft	55 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Összetétel:
Fajok:
100% Lolium perenne – Angol perje (minimum 2 fajta)
Gyors csírázás és fejlődés:
A Speedy Green fűmagkeverék különösen a meglévő füves területek felülvetésére lett optimalizálva. Rendkívül gyorsan csírázik és indul fejlődésnek, így használatával pillanatok alatt helyreállíthatja a kikopott gyep eredeti állapotát.
Ez a lehetőség a nyári hónapokban is érvényes, hiszen a felhasználásával a füves terület újra sűrű és jól terhelhető lesz.
A Speedy Green nemcsak sportpályák felülvetésére alkalmas, hanem parkok, otthoni kertek és egyéb intenzíven használt füves területek felújítására is ideális megoldást nyújt. E fűmagkeverék használatával pedig biztosíthatja a gyep egészségét és esztétikai értékét hosszú távon.

Barenburg Bermuda csillagpázsit 0,5 kg	**No. 1 megoldás száraz, forró időjárás esetén is!**	4 800 Ft	5 200 Ft

A Barenbrug Bermuda fűmagkeverék a csillagpázsit nemesített változatait tartalmazza. A csillagpázsit a meleg égövi fűfélék közé tartozik és évelő növény. Télen nyugalmi állapotba kerül, így késő ősszel és tavasszal, a meleg időjárás visszatéréséig elveszíti zöld színét. Tavasszal (áprilisban) a levegő- és talajhőmérséklet emelkedésével újból kizöldül. Melegigényes növény, amely a napos, pangó víztől mentes területeket kedveli. Kiváló szárazság-, hő- és sótűrőképességgel rendelkezik.
Alkalmas kertek, parkok, strandok és egyéb zöldfelületek füvesítésére.
A javasolt nyírási magasság 2-4 cm között legyen; alacsonyabb nyírási magasság esetén intenzívebb fenntartási munkákra lesz szükség.
Vetés ideje és módja:
A telepítés évében fokozott gondoskodást igényel a Barenbrug Bermuda fűmagkeverékkel telepített pázsit, hogy erős, gyommentes állomány jöjjön létre. Az eredményes telepítés érdekében teljesen napos területre vessük el, kerülve az árnyékos részeket. A vetés optimális ideje akkor érkezik el, amikor a talaj hőmérséklete tartósan eléri vagy meghaladja a 18 Celsius fokot. Az aktuális talajhőmérsékletet a következő linken is ellenőrizhetjük: https://corteva.meteoplaza.hu/.
A magok kb. 0,5 cm mélyen kerüljenek az aprómorzsás magágyba. A telepítést követő 3-4 hétben biztosítsuk a gyakori, kisadagú öntözést, hogy a magok környezete folyamatosan nedves maradjon. Az elvetett magok körülbelül 9-10 napon belül kikelnek, és a növények a telepítéstől számítva 30-40 napon belül beállt állományt alkotnak. Amint a pázsitfelület beáll, csökkentsük az öntözést.
A vetéshez ajánlott vetőmag mennyisége kb. 15 g/m².

BARENBURG Dichondra, Kúszó pázsitszulák	**Dichondra repens**	7 500 Ft	7 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Dichondra – Zöld talajtakaró
Dichondra repens /kúszó pázsitszulák/ – egy évelő, apró levelű, élénk zöld színű, gyorsan növő talajtakaró növény. A kertekben a gyep helyettesítését szolgálhatja, oldalhajtásaival terjed, így a talajt sűrűn beborítja. 3-5 cm-es magasságú szőnyegszerű talajtakaró. Naposabb, szárazabb helyeken alacsonyabbra nő és levelei is kisebbek, árnyékos, nedves helyen nagyobbak lesznek a levelei és magasabbra növekszik.
Különösen alkalmas fák, kerti növények közötti talajborításra, kerti tipegők közeinek kitöltésére vagy olyan helyeken, ahol a fű ápolása nehézkes. Jól tolerálja a különböző talajtípusokat, valamint a napos és árnyékos területeket egyaránt.
A taposást, igénybevételt mérsékelten tűri, különleges zöld színét egész évben megőrzi. -5°C alatt levelei barnulhatnak, azonban az áttelelést követően tavasszal regenerálódik.
Talaj előkészítése a vetéshez:
Lazítsuk a talajt kb. 15 cm mélyen és egy aprómorzsás, egyenletes, jól elmunkált magágyat készítsünk a vetéshez. Fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy a telepítendő terület vízelvezetése megfelelő legyen, hiszen ez jelentősen hozzájárul majd az egészséges, sűrű növényzet kialakulásához. Célszerű a gyep telepítéséhez ajánlott műtrágya használata a vetést megelőzően.
Vetés ideje, módja:
A Dichondra telepítéséhez legalkalmasabb időpont, amikor a nappali hőmérséklet 20 °C felett van, az éjszakai hőmérséklet pedig nem süllyed 10 °C alá. Ez egyaránt lehet tavaszi vagy őszi időszak. A csírázási idő 7-14 nap, a körülmények függvényében.
A vetéshez ajánlott vetőmag mennyisége 10 g/m2, a vetés mélysége kb. 0,5 cm legyen. A telepítést követően gondoskodjunk a gyakori, kisadagú öntözésről az eredményes kelés érdekében.
Öntözés
A vetést követően szükség van gyakoribb öntözésre a gyors csírázás és kezdeti fejlődés elérése érdekében. A kellően megerősödött, kifejlett növényeket viszont ritkábban, ám nagyobb vízmennyiséggel ajánlott öntöznünk. Mindezzel elősegíthetjük a mélyre hatoló gyökérzet kialakulását. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a Dichondra inkább szenved a túl sok öntözéstől, mint a ritkább öntözés következményeitől.
Nyírás
Az első nyírásra akkor kerüljön sor, amikor a növényzet eléri az 5 cm-es magasságot. A későbbiekben az ajánlott nyírási magasság 3-5 cm, azonban arra ügyeljünk, hogy a nyírási magasságot lassan, fokozatosan és kis léptékben csökkentsük. Kéthetente ajánlott nyírnunk, de tetszés szerint nyírás nélkül is hagyhatjuk.
Tápanyagellátás
A tavasszal elvégzett vetés utáni kelést, kezdeti fejlődést követően 4-6 g/m2 N hatóanyagot juttassunk ki, amit a későbbiekben 4-6 hetenként megismétlünk a nyár folyamán. Arra ügyeljünk, hogy a műtrágya kijuttatásakor a levélzet száraz legyen és a tápanyagellátást követően a levélzetről mossuk le a talajra a granulátumokat.

BARENBURG Happy Lawn® nyírható virágos pázsit 5 kg	Vigyen egy kis színt és vidámságot a pázsitba!	37 900 Ft	37 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Happy Lawn® technológia
A Happy Lawn® innovatív megoldása segítségével környezetbarát módon varázsolhatja át kertjét. Ez a technológia egyedülálló módon ötvözi a extrém körülményekkel szemben is ellenálló gyepet és olyan különleges növényzetet, amelyet akár rendszeresen nyírhat is. A speciálisan nemesített virágfajtáknak köszönhetően a növények egyedi élettartammal rendelkeznek: a gyakori nyírás ellenére folyamatosan regenerálódnak, így a füves terület mindig életvidám, egységes megjelenést ölt. Az eredmény egy minimális odafigyelést igénylő, mégis sűrű szőnyegszerű gyep, amelyben a színes virágok harmonikusan kiegészítik a zöld felületet, évszaktól függetlenül.

Nyírható virágok
Mit takar pontosan a „Nyírható virágok" jelző? Olyan növényekről van szó, amelyek képesek tűrni a rendszeres nyírás mechanikai terhelését anélkül, hogy ez károsítaná életképességüket. Ezeket a növényeket nem véletlenül választották ki: hosszú élettartamú, adaptív fajták, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a hagyományos gyepterületekbe. Ideálisak városi parkok, kertvárosi pázsitok, vagy akár sportpályák számára is – minden olyan helyre, ahol a gyakori nyírás szükségszerű, ugyanakkor a szépségre is szükség van. A vágásálló virágok különlegessége éppen abban rejlik, hogy a nyírógép pengéje után is gyorsan helyreállnak, így a zöld felület egész évben színes és harmonikus marad.

Megnövelt biodiverzitás
A nyirható virágok nem csupán látványos szépséget kölcsönöznek a környezetnek, hanem fenntartható ökoszisztéma részévé is válnak. Ha ezeket a különleges növényeket a gyepbe ültetik, a hagyományos pázsit egy élő, virágzó biodiverzitási központtá változik – ahol a szépség és a természet harmóniája találkozik.
Ezek a növények valódi életörvényt teremtenek: bőven termelnek nektárt és virágport, létfontosságú táplálékot nyújtva a beporzó rovaroknak. A méhek, pillangók, dongók és egyéb hasznos élőlények vonzalmában a gyep átalakul egy izgalmas mikroökológiává. Képzelje el, hogy füves területén nem csak zöldellő füvet, hanem egy dongóktól zsongó, színes pillangók által benépesített élő szőnyeget lát!
A vágásálló virágok és a természetes ökoszisztéma szimbiózisa nem csupán „feldobja" a gyepet – egy olyan dinamikus élőhelyet hoz létre, amely ösztönzi az élet sokszínűségét. Így a pázsija nem csak szemet gyönyörködtet, hanem aktívan hozzájárul a helyi biodiverzitás erősítéséhez, miközben tökéletes harmóniába kerül a környezetével.

Rendkívül könnyű gondozás
A nyírható virágok nem csak káprázatosan szépek, hanem egyúttal rendkívül könnyű őket gondozni is. Szemben a hagyományos gyepekkel, amelyek gyakori vágást és tápanyagutánpótlást igényelnek, a Happy Lawn virágainak csekély gondozásra van szükségük. Minimális mennyiségű vizet és tápanyagot igényelnek, valóban "feldobják" a gyepet és ezen tulajdonságaiknak köszönhetően időt és energiát lehet velük megtakarítani.
Ellenálló gyep
A Resilient Blue® technológia a Happy Lawn ellenállóképességének a sarokköve. A rendkívüli körültekintéssel és hozzáértéssel kiválasztott réti perje (Poa pratensis) fajták adják az alapját ennek az innovatív megközelítésnek. A Resilient Blue-nak köszönhetően a gyep nem csak keményen ellenáll a szélsőséges körülményeknek, mint például az aszály, vagy a rekkenő hőség, hanem az ilyen megpróbáltatások után gyorsan is regenerálódik. A Resilient Blue és a Happy Lawn technológia "kéz a kézben" dolgozik, közös munkájuk eredménye egy olyan pompás gyep, amely nem csak csodaszép, hanem tartós és hosszú élettartamú.

Tudjon meg többet a Resilient Blue Technológiáról: https://www.youtube.com/watch?v=DJudiwUw4l4
Amennyiben Ön a Happy Lawn-t választja, akkor nem pusztán egy csodálatosan szép látványt nyújtó gyepet teremt magának, hanem láthatja és nap, mint nap tapasztalhatja a természet ellenállóképességének olyan bizonyítékát is, amely garantáltan évekig fog Önnek örömet okozni.

BARENBURG SOS - Fűmagkeverék pázsitja felújításához 1 kg		4 200 Ft	4 200 Ft

Összetétel:
50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne – Angol perje
Az SOS technológia forradalmasítja a sportpályák fenntartását, lehetővé téve a gyors felújítást az év legkritikusabb időszakaiban. A sportolók számára készült pályák gyakori használata miatt a gyepszőnyegek télen gyorsan leromlanak. Az SOS innovatív fűmagkeverék képes helyreállítani a pályák integritását, még alacsony talajhőmérsékleten is, mindössze 4 °C-on. A felülvetést követően az SOS gyors regenerációt biztosít, amely akár 50%-kal csökkentheti a normalizálódáshoz szükséges időt. Az SOS pázsit gyors csírázása és intenzív növekedése révén a fűborítottság már egy hónapon belül elérheti a 60%-ot, így a pályák sokkal tovább használhatók. A versenytársakkal ellentétben, az SOS garantálja a kiemelkedő minőséget, amelyet több mint 10 évnyi kutatás-fejlesztés eredményezett. Szerezze meg az SOS-t, hogy a pályája mindig zöld és játékra készen várja a sportolókat!
Miért válasszam ? Ez a leggyorsabb megoldás sportpályák megújításához. Csökkenti a regenerációhoz szükséges időt. Alacsony talajhőmérsékleten is csírázik és fejlődik. Elnyomja az egynyári perjét. Használatával a játékidő megnövekszik. Jó gyökérképzési képességekkel bír. Egyenletesebb és kényelmesebb pályafelületet biztosít, így kevesebb lesz a sérülés. Jobb labda- és játéktulajdonságokat ad a pályának.
Tudjon meg többet >>> Super Over Seeding

BARENBURG Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 1 kg	**Győzze le az aszályt szárazságtűrő füvekkel!**	4 200 Ft	4 200 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Összetétel:
Fajok:
80% Festuca arundinacea - Nádképű csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje

A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotják
A keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképű csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jó
A réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosít
Víztakarékos, ezáltal költségtakarékos is

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.
A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.
A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.

Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 – 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.
A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Nézze meg videós ismertetőnket!

Beckmann Mastercote hosszú hatású virágtáp 500g		2 450 Ft	2 450 Ft

TERMÉKLEÍRÁS Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára. 6 hónapos hatástartama növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosításagazdag, tartós virágzásérzékeny, fiatal növények számára is alkalmas ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása.
SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRETEK 15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott. Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m²
Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

Beckmann nyári stresszkezelő gyeptrágya 10 kg	NPK gyeptrágya 15+0+20 magnéziummal és kénnel	16 500 Ft	16 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Valamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári hőség előtt kijuttatva felkészíti a gyepet a stresszes időszakokra és fokozza annak szárazságtűrését.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti a betegségek kockázatát.
Segíti a gyepet a nyári megterhelő időszak sikeres átvészelésében.
A különböző nitrogénformák biztosítják az egyenletes, hosszan tartó tápanyagutánpótlást a gyepünk számára.
Magas kén tartalma is segíti a füvek stresszel szembeni ellenálló képességének növelését.
Egységes szemcseméretű gyeptrágya, akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS:
Májustól szeptemberig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését.
JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MENNYISÉG:
Adagolás: 25-30 g/m².
TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:
Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeptrágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat, ezért a rászóródott terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.

Beckmann nyári stresszkezelő gyeptrágya 5 kg	**NPK gyeptrágya 15+0+20 magnéziummal és kénnel**	9 500 Ft	9 500 Ft

Valamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári hőség előtt kijuttatva felkészíti a gyepet a stresszes időszakokra és fokozza annak szárazságtűrését.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti a betegségek kockázatát.
Segíti a gyepet a nyári megterhelő időszak sikeres átvészelésében.
A különböző nitrogénformák biztosítják az egyenletes, hosszan tartó tápanyagutánpótlást a gyepünk számára.
Magas kén tartalma is segíti a füvek stresszel szembeni ellenálló képességének növelését.
Egységes szemcseméretű gyeptrágya, akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS
Májustól szeptemberig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését.
JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI MENNYISÉG:
Adagolás: 25-30 g/m².
TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:
Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeptrágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat, ezért a rászóródott terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.
ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: májustól szeptemberig.

Beckmann Plurafert univerzális szerves-ásványi növénytáp kerti növényekhez 1 kg		2 500 Ft	2 500 Ft

TERMÉKLEÍRÁS
Univerzális komplex szerves-ásványi trágya minden kerti kultúrához. Ez a kerti trágya kiváló minőségű szerves alapanyagokból és könnyen oldódó ásványi összetevőkből áll. A szerves alapanyagok kíméletes, fenntartható, hosszú ideig egyenletes tápanyagellátást biztosítanak.
FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS
A vetés/ültetés előtt vagy után szórjuk az ágyásra, és egyenletesen dolgozzuk be a talaj felső rétegébe. Ne ássuk be, és ne alkalmazzuk közvetlenül a gyökereknél az ültetőgödrökben. Évelő növények esetében szórjuk a növények köré. Zöldségfélék Magasabb tápanyagigényű zöldségfélék pl. káposzta, zeller, póréhagyma és paradicsom Vetés/ültetés: kb. 90 g/m2 Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 60 g/m2 Közepes tápanyagigényű zöldségfélék pl. uborka, sárgarépa, retek, saláta és spenót Vetés/ültetés: kb. 70 g/m2 Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 50 g/m2 Alacsony tápanyagigényű zöldségfélék pl. bab, borsó, retek és fejes saláta Vetés/ültetés: kb. 60 g/m2 Későbbi fenntartó trágyázás: kb. 40 g/m2 Eper és egyéb bogyós gyümölcsök Tavasszal és az érési időszak után szórjunk ki kb. 60 g/m2 növénytápot a növények köré, és dolgozzuk be a talajba. Cserepes és balkonnövények Kb. 7-9 g/l ültető közegbe alaposan bedolgozva. Virágok, évelők, díszcserjék Tavasszal és nyár végén 60-90 g/m2 mennyiségben a talajba dolgozva és beöntözve. Fák és bokrok Tavasszal és nyár végén szórjunk ki 50-60 g/m2 növénytápot a korona által takart területre, és dolgozzuk be a talajba. Gyep, pázsit Márciustól/áprilistól kb. 6 hetente 50-60 g/m2 kijuttatása javasolt. A trágyát minden esetben ajánlott egyenletesen kiszórni, a talajba dolgozni majd beöntözni.
ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig

Blackjak 0,2L	**Leonardit alapú humusznövelő talajkondícionáló biostimuláns**	4 400 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Tarolasa
5-30 Celsius kozott eredeti csomagolasban legalabb 36 honapig megorzi a szavatossagat. Felbontas utan mihamarabb kijuttatando, de szorosan visszazarva huvos, fagymentes helyen tarolva 6 honapig minoseggromlas nelkul felhasznalhato.

Részletes leírás
A Blackjak-ben lévő humuszt a növényünk gyökeréhez juttatva ott képes jelentősen megnövelni a víz és tápanyag felvehetőséget és javítani a talajminőséget. A kijuttatott Balckjak képes a környezetében ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének még akkor is, ha az egyébként szervesanyaggal, tápanyaggal rosszul ellátott, vagy rossz pH-val rendelkezik! Így használata rosszabb talajoknál szinte kötelező!

Mire is jó?
A Blackjakkel lombot és talajt is kezelhet 1-2 dl/10 liter víz dózisban. A készítmény fekete színű, ami lombról néhány nap alatt eltűnik, de óvatosan kell kezelni járda, fehér fal mellett, mert bizony okozhat elszíneződést. A terméket használat előtt fel kell rázni, mert a palack falára, aljára ülepszik. Pont emiatt az öntözőkannát vagy permetezőt is jó többször még kiöblíteni, hogy egy csepp termék se vesszen kárba.

Mire jó a Blackjak?
A Blackjakkel lombot és talajt lehet kezelni 1-2 dl/10 liter víz arányban. A termék fekete színű, amely a lombról néhány nap alatt eltűnik, azonban óvatosan kell kezelni járdák és fehér falak közelében, mert elszíneződést okozhat. Az előzetes felhasználás előtt alaposan fel kell rázni a terméket, mivel az ülepedhet a palack falára és aljára. Emiatt érdemes az öntözőkannát vagy permetezőt is többször kiöblíteni, hogy az összes termék felhasználásra kerüljön.
Mi tartalmazza a Blackjak?
A Blackjak legalább 28% szervesanyagot tartalmaz, melynek legalább 20%-a természetes humuszképző anyagokat (Humin, fulvosavak, ulmik savak és huminok) tartalmaz. A Blackjak pH-ja egyedülállóan az optimális 4-5 között helyezkedik el a piacon, ami sokkal hatékonyabbá teszi, mint a többi nátrium-/kálium-hidroxidos (lúgos) kivonószer.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Blackjak erősen fekete színű és nagyon jól oldódik a vízben, azonban a flakont minden használat előtt alaposan fel kell rázni, valamint többször ki kell öblíteni, mivel szuszpenziót képez (szilárd részecskék lebegnek a folyadékban).
Hogyan segít a Blackjak a növényeknek és a talajnak?
A Blackjak humusza, amelyet a talajba juttatnak, jelentősen növeli a víz és tápanyag felvételeképességet és javítja a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének körülötte, még akkor is, ha a talaj egyébként rossz pH-val rendelkezik, vagy alacsony szervesanyaggal és tápanyaggal van ellátva.

A Blackjak biostimulánsként a lombon alkalmazva számos előnnyel jár:

A benne lévő kismolekulájú fulvosavak könnyen bejutnak a levélbe, és ha más anyaggal kombinálva adjuk hozzá, például lombtrágyával vagy felszívódó növényvédő szerrel, akkor azok bejutását gyorsítja.
A Blackjak lombon történő alkalmazása fokozza a növény tápanyagfelvételét, ami növeli a tápelemek koncentrációját a növényben, és szívó hatást vált ki a talajban lévő vízre. Ennek eredményeként beindul egy tápanyag- és vízpumpa a talajból a növénybe, ami nagyobb növénytömeget eredményez.
A vízpumpa hatása intenzívebb párologtatást eredményez, ami hűti a növényt, így a növény tovább fotoszintetizál és növeli a biomasszát.

Ami a Leonarditet illeti:
A legjobb minőségű szervesanyag a talajban a humusz, amely szivacsként köti meg a tápanyagokat és a vizet, valamint életteret és táplálékot biztosít a talaj hasznos baktériumainak és gombáinak. Leonard professzorról elnevezett Leonardit anyagok több tízmillió év alatt alakulnak ki, és csak nagyon kevés helyen bányászhatóak jó minőségben. A Danuba humusztartalmú termékei mind Leonardit alapúak.

Blackjak és a tápelemek

Padova Egyetem meŕeśe szerint a Blackjak az össżes taṕelem felveteleť keṕes fokozni.

Happy Lawn® nyírható virágos pázsit		5 250 Ft	5 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Megnövelt biodiverzitás
A nyírható virágok nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem pazar kiegészítői is a helyi környezetnek. Ha ezek a pompás növények a gyepbe kerülnek, akkor nem csak csodaszép látványt nyújtanak, hanem egy valóban virágzó ökoszisztémát is létre lehet velük hozni.
A nyírható virágok magukhoz csalogatják a beporzást végző rovarokat, nektárt, virágport és más rendkívül hasznos alapvető táplálékot termelnek. Ez a bőséges táplálékforrás odacsábítja a méheket, a pillangókat, a dongókat és még megannyi rovart, így a gyep egy varázslatosan izgő-mozgó, döngicsélő életközösséggé alakul.
A nyírható virágok és a pillangósvirágú növények, valamint az általuk létrehozott ökoszisztéma együtt valóban “feldobja” a gyepet. Az Ön pázsitja így nem pusztán csodaszép látványt nyújt, hanem egy nyüzsgő élőhely is lesz, amely összhangban van a természetes környezettel.
Rendkívül könnyű gondozás
A nyírható virágok nem csak káprázatosan szépek, hanem egyúttal rendkívül könnyű őket gondozni is. Szemben a hagyományos gyepekkel, amelyek gyakori vágást és tápanyagutánpótlást igényelnek, a Happy Lawn virágainak csekély gondozásra van szükségük. Minimális mennyiségű vizet és tápanyagot igényelnek, valóban “feldobják” a gyepet és ezen tulajdonságaiknak köszönhetően időt és energiát lehet velük megtakarítani.
Ellenálló gyep
A Resilient Blue® technológia a Happy Lawn ellenállóképességének a sarokköve. A rendkívüli körültekintéssel és hozzáértéssel kiválasztott réti perje (Poa pratensis) fajták adják az alapját ennek az innovatív megközelítésnek. A Resilient Blue-nak köszönhetően a gyep nem csak keményen ellenáll a szélsőséges körülményeknek, mint például az aszály, vagy a rekkenő hőség, hanem az ilyen megpróbáltatások után gyorsan is regenerálódik. A Resilient Blue és a Happy Lawn technológia “kéz a kézben” dolgozik, közös munkájuk eredménye egy olyan pompás gyep, amely nem csak csodaszép, hanem tartós és hosszú élettartamú.
Tudjon meg többet a Resilient Blue Technológiáról: https://www.youtube.com/watch?v=DJudiwUw4l4
Amennyiben Ön a Happy Lawn-t választja, akkor nem pusztán egy csodálatosan szép látványt nyújtó gyepet teremt magának, hanem láthatja és nap, mint nap tapasztalhatja a természet ellenállóképességének olyan bizonyítékát is, amely garantáltan évekig fog Önnek örömet okozni.

A Happy Lawn® technológiának köszönhetően Ön kedvező hatást gyakorolhat közvetlen környezetére. Egy olyan megoldás, amely ötvözi magában az ellenálló pázsitot, valamint a nyírható virágokat. Ezek olyan virágok, amelyeket újra és újra le lehet nyírni a fűvel együtt, azonban minden nyírás után megújulva visszanőnek, ezáltal az Ön pázsitja könnyen kezelhetővé, dússá és színessé válik.

Indító gyeptrágya fűmagvetéshez 10 kg	15 999 Ft	15 999 Ft

Starter gyeptrágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig

Indító gyeptrágya fűmagvetéshez 25 kg	29 999 Ft	29 999 Ft

Starter gyeptrágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK márciustól októberig

Indító gyeptrágya fűmagvetéshez 5 kg	8 900 Ft	8 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Starter gyeptrágya fűmagvetéshez, gyepszőnyegfektetéshez, illetve pázsit és sportgyep felülvetése esetén történő használatra. Foszforhiányos gyepfelületek tápanyagellátására is kiváló.A foszfor elősegíti a gyökérnövekedést, fejlődést, a nagy mennyiségű, vízben oldódó foszfortartalma különösen tavasszal hasznos, amikor a hideg talajból nehéz a foszforfelvétel.Közvetlenül a gyepszőnyeg fektetése előtt használható.Az ammónium-nitrogén és vas tartalma biztosítja a levelek erőteljes zöld színét és visszaszorítja a mohát.Pormentes, finom szemcséjű termék, amely már minimális mennyiségű csapadék esetén is jól oldódik, kézi és gépi szórásra egyaránt alkalmas.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS30-35 g/m² mennyiséget szórjon ki száraz felületre. Gyepfelújítás esetén a kiszórás ideális ideje a fűnyírást követő néhány nap. A kijuttatást követően alapos öntözés javasolt. Az egyenletes kijuttatás érdekében két menetben, egymást keresztező irányban szórja ki. A kiszórás a teljes vegetációs időszak alatt lehetséges, március és október közötti időszakban. A kijuttatást követő 4-6 hét elteltével gondoskodjon a további tápanyag-utánpótlásról.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig			
Mastercote hosszú hatású virágtáp 1kg		3 550 Ft	3 550 Ft
TERMÉKLEÍRÁS Részben burkolt, teljesértékű műtrágya, hosszútávú tápanyagellátás minden balkon- és cserepes növény, ágyásnövények, valamint cserjék és rózsák számára. 6 hónapos hatástartam a növény igényeihez igazított, egyenletes és hosszantartó tápanyag biztosítása gazdag, tartós virágzás érzékeny, fiatal növények számára is alkalmas ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS Kora tavasztól késő nyárig lehet használni. Legjobb, ha a növekedés beindulásakor tavasszal, vagy az ültetéskor alkalmazzuk. Balkon- és cserepes növények ültetése előtt egyenletesen keverjük el a virágfölddel a Mastercote hosszú hatású virágtápot. Már korábban elültetett növények esetében szórjuk ki és óvatosan dolgozzuk bele a talaj felső rétegébe, vagy kis lyukakat is kialakíthatunk és azokba tölthetjük, majd takarjuk vissza földdel. A jobb hatás érdekében locsoljuk meg a növényeket. Minden granulátum egyenlő arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A granulátumok mintegy fele azonnali tápanyagszolgáltatást biztosít, míg másik fele elnyújtott hatással bír. Ez biztosítja a lassabb tápanyagfeltáródást és a hosszútávú hatást, így 6 hónapon keresztül egyenletes a növények tápanyagellátása. SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK ÉS VIRÁGLÁDA MÉRETEK 15 x 20 x 100 cm = 140 g 15 x 15 x 100 cm = 100 g 15 x 15 x 80 cm = 80 g 15 x 15 x 60 cm = 60 g Cserepesvirág: 10 liter virágföldhöz 50-60 g ajánlott. Egynyári virágok: 80 g/m² Rózsák, cserjék, évelő növények és fásszárúak: 40-80 g/m² Adagolás: 1 teljes evőkanál kb. 20 grammnak felel meg. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól októberig			
MikoMax Garden 360g	Mikorrhiza tartalmú biostimuláns	5 950 Ft	5 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A mikorrhiza gombafajok szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki a gazdanövénnyel, amely megnöveli annak víz- és tápanyagellátottságát, stressztűrő képességét, valamint kártevőkkel szembeni ellenállóképességét.
Mikorrhiza további információk: Amikor a mikorrhiza gombák szimbiózisra lépnek a gazdanövénnyel, támogatják azt stresszhelyzetekben, például fagy vagy aszály esetén, segítve a megfelelő mennyiségű víz- és tápanyagfelvételt. A mikorrhiza gomba sokszoros méretű hifa fonalával hatékonyan képes tápanyagokat szállítani a gazdanövény számára a gyökereihez képest messzebbről.
A mikorrhiza gomba gyökérkapcsolatra van szükség, ezért elengedhetetlen, hogy a kijuttatáskor a gyökérhez közel, legfeljebb 1-2 cm távolságra juttassuk el. Nagyobb fák esetén célszerű a lombkorona tövébe, több ponton elhelyezni. A kisebb, vékonyabb gyökerekhez való alkalmazás ajánlott.

A mikorrhiza gomba behatolva a gazdanövénybe erősíti annak természetes immunrendszerét, így ellenállóbb lesz a gombabetegségekkel szemben. A mikorrhiza olyan anyagokat választ ki, melyek növelik és javítják a talaj aggregátumokat, melyek a talaj legfontosabb alkotóelemei közé tartoznak.
Az együttműködés a kultúrnövény és a mikorrhiza gombák között miért előnyös, valamint hogyan jön létre:
A növények növekedési időszakának kezdetén a mikorrhiza gombáktól természetes segítséget kapnak azzal, hogy segítségükkel hatékonyabban tudnak vizet és tápanyagokat felvenni. Ebben az időszakban a növények olyan anyagokat választanak ki, amelyek vonzzák ezeket a gombákat, és arra ösztönzik őket, hogy hifa fonaluk bejusson a kultúrnövény gyökerébe.

A növény képes érzékelni, hogy egyedül képes-e hatékonyan megbirkózni a talajban lévő víz és tápanyagok felvételével, vagy szüksége van-e a természet segítségére. Amennyiben úgy érzékeli, hogy segítségre van szüksége, a növény által előállított kész tápanyagokat, szénhidrátokat, aminosavakat és egyéb jelzőanyagokat kibocsát a gyökerein keresztül a talajba. Ezt a jelzést érzékelve a mikorrhiza gomba elkezdi a gyökér felé mozogni, majd behatol a növény gyökerébe, ahol kialakítja a szimbiotikus kapcsolatot.

Gyepesítés Mikorrhizával: Az arbuszkuláris vagy endo mikorrhiza olyan szimbiózist alakít ki a növényekkel, ami elterjedt a növényvilágban, beleértve például a gyepet is. A terméket célszerű az alábbi módok valamelyikén alkalmazni:

A gyepesítés előtt a terméket szétszórjuk és sekélyen bekeverjük.
A gyep magjainkkal összekeverjük, majd egyszerre juttatjuk ki a keveréket

Miután a gyepesítés megtörtént, további lehetőségek vannak a mikorrhiza kijuttatására:

Gyepszellőztetéskor: A mikorrhiza gombákat be lehet juttatni a talaj felső rétegébe gyepszellőztetés során, majd alaposan öntözni kell azt.

Hatékonyabb módszer: Az Ino-Myc folyékony mikorrhiza termék alkalmazása a gyepen permetezéssel vagy bőséges vízzel való öntözéssel

Tárolás:
Az eredeti csomagolásban tárolva 5-30 Celsius fok között legalább 18 hónapig megőrzi a szavatosságát. Felbontás után célszerű minél hamarabb felhasználni, de szorosan visszazárva, hűvös, fagymentes helyen tárolva akár 6 hónapig is minőségromlás nélkül használható.

Mow Saver - fűmagkeverék robotfűnyíróhoz 15 kg	67 400 Ft	67 400 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Mow Saver - gyors eredés, mérsékelt növekedés! Kevesebb nyírásszámAz ápolt gyepfelület mindig hangsúlyos szerepet kap, legyen szó akár városi parkról vagy éppen az otthonunkat körülölelő kertről. A szép pázsit létrehozása, fenntartása azonban sok munkát, erőfeszítést igényel. Ennek a mérsékléséhez járul hozzá nagyban a Barenbrug új fejlesztése, a Mow Saver fűmagkeverék, melynek használatával jelentősen csökkenthető a füves területünk évenkénti nyírásszáma. A Mow Saver keverékkel egy régi vágya válik valóra a kerttulajdonosoknak és a közterületekért felelős szakembereknek: a füves terület, a pázsit ápolási igényének jelentős csökkentése, mellyel idő és pénz takarítható meg. A gyors eredésű, alacsonyra növő Mow Saver kevesebb levéltömeget nevel, ezáltal a fűnyíráskor keletkező nyesedék mennyisége is jóval csekélyebb, a Mow Saver pázsit nyírásigénye közel 35 %-al kisebb, mint a hagyományos fűmagkeverékek esetében. A kevesebb nyírásszám gazdasági és környezetvédelmi előnyöket is hordoz magában: kisebb munka – munkaerő igény, üzemanyag megtakarítás, kisebb károsanyag kibocsátás, valamint az eltávolított nyesedék elszállítása és tárolása is kevesebb gondot jelent. A Barenbrug kísérletei azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 30 %-al alacsonyabbra nőtt a fűnyírást követően 14 nap alatt, mint egy hagyományos fűmagkeverékből vetett pázsit. Míg egy standard fűmagkeverékből létrehozott pázsit nyírásszáma évente átlagosan 20, addig ez a szám a Mow Saver esetében mindössze 13, tehát jelentősen csökkenthető a nyírásszám. Kisebb mennyiségű nyesedék – kevesebb gond!Miután kevesebbszer kell nyírnunk a Mow Saver pázsitunkat – mely egyébként is alacsony növekedésű – értelemszerűen a képződő nyesedék mennyisége is kisebb. A Barenbrug által elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mow Saver pázsit 50 %-al kevesebb levéltömeget fejleszt, mint a hagyományos fűmagkeverékből létrehozott pázsit és ami nem keletkezik azzal nem is kell törődnünk! Nincs szükség arra, hogy hetente nyírjon füvet, az eddig fűnyírással eltöltött idejének 65 %-a elegendő lesz arra, hogy ugyanazt a feladatot elvégezze, a korábbi fűnyírással töltött idejének 35 %-át bármi másra fordíthatja. Gyors eredés, kezdeti fejlődésA Mow Saver gyors eredésű, a pázsit beálltát követően is alacsony marad a hagyományos fűmagkeverékekkel ellentétben, melyeknek nagyobb a növekedési erélye. A Mow Saver gyors csírázása és kezdeti fejlődése biztosítja az erőteljes, sűrű pázsit kialakításának lehetőségét. A Mow Saver mindamellett, hogy gyönyörű pázsitot ad gyors kezdeti fejlődésével és rendkívüli sűrűségével a gyomosodás mérsékléséhez is hozzájárul. Ideális robot fűnyírókhozA Mow Saver kiváló választás robot fűnyíró alkalmazása esetén, hiszen a mérsékelt növekedésű Mow Saver pázsit folyamatos nyírásakor egyenletesen csekély mennyiségű nyesedék keletkezik, melynek összegyűjtése nem szükséges. Zöld Bolygó CímkeA Barenbrug termékfejlesztése során kiemelt figyelmet fordítanak a pázsit felületek környezetkímélő és gazdaságos fenntartására és használatára. A Zöld Bolygó címkével ellátott fűmagkeverékekkel a Barenbrug hozzájárul a pázsitok fenntartható használatához és fenntartásához. Kiterjedt kutatási tevékenység és hosszú évek tapasztalata biztosítja a Barenbrug részére azt a hozzáértést, amellyel kiválasztják a legmegfelelőbb fűfajtákat és fűmagkeverékeket a füves területek fenntartható használatához és ápolásához.			
Őszi gyeptrágya kénnel és vassal 10 kg		15 500 Ft	16 500 Ft
TERMÉKLEÍRÁS Valamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet. A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát. A magas vastartalom biztosítja a gyep zöldebb színét és visszaszorítja a mohát. Az őszi gyeptrágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását. A gyeptrágya vízoldékonysága kiváló. A finom szemcséjű gyeptrágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható. FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS Szeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyors Tárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeptrágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is. ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember-október			
Őszi gyeptrágya kénnel és vassal 5 kg		9 500 Ft	9 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

TERMÉKLEÍRÁS
Valamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet.

A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát.
A magas vastartalom biztosítja a gyep zöldebb színét és visszaszorítja a mohát.
Az őszi gyeptrágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását.
A gyeptrágya vízoldékonysága kiváló.
A finom szemcséjű gyeptrágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS
Szeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást.
Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepfelületek esetén 40-50 g/m².
Hatás: gyors
Tárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeptrágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.
ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október

Rapide fűmagkeverék 15 kg	**Gyors és tartós megoldás sportpályákra és kertekbe egyaránt**	56 200 Ft	56 200 Ft

Összetétel:
Fajok
75% Lolium perenne - Angol perje 25% Poa pratensis - Réti perje

A Barenburg Rapide fűmagkeverék egy kiváló minőségű, gyorsan csírázó és fejlődő fűmagkeverék, amelyet különösen ideális sportpályák, kertek és parkok számára terveztek. Íme néhány fontos információ a termékről:

Gyors Csírázás: A Rapide fűmagkeverék jellemzője a rendkívül gyors csírázási idő, amely lehetővé teszi a gyorsan használható pázsit kialakítását. Ezt különösen új telepítéseknél és felülvetéseknél értékelik.

Erős Növekedés: A keverék erős és ellenálló fajtákból áll, amelyek bírják a nagy igénybevételt és a különböző környezeti stresszeket, mint például a lábnyomás és az időjárási viszontagságok.

Kiváló Esztétika: A Barenburg Rapide fűmagkeverék nemcsak tartós, hanem esztétikus megjelenést is biztosít, dús és zöld pázsitot eredményezve.

Alkalmazások: Ideális választás sportpályák, játszóterek, kertek és parkok számára, de alkalmazható magánkertekben is.

Környezetbarát: A Barenburg Rapide fűmagkeverék termesztése során fenntartható gyakorlatokat alkalmaznak, így a keverék környezetbarát megoldást kínál.

Tartósság: A fűmagkeverék a gyep hosszú élettartamát és tartósságát segíti elő, így a pázsit sokáig megőrzi szépségét és egészségét.

Javasolt Telepítési Körülmények: A Rapide fűmagkeverék jól alkalmazható különböző talajtípusokban, előnyösen közepes és jó tápanyagellátottságú talajokon.

Összességében a Barenburg Rapide fűmagkeverék ideális választás mindazok számára, akik gyors megoldást keresnek a pázsit kialakítására, miközben tartós és esztétikus eredményt szeretnének elérni.

Resilient Blue Sport 5 kg	**Ellenáll a kihívásoknak, bármilyen időben!**	21 600 Ft	23 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Összetétel:
Fajok
20% Resilient Blue /Poa pratensis – Réti perje/ (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 10% Poa pratensis – Réti perje (Yellow Jacket Water Manager bevonattal kezelve) 45% Lolium perenne - Angol perje 25% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje)

Készüljön fel az éghajlati szélsőségekre! A világban egyre gyakoribbá és szokásosabbá válnak a szélsőséges időjárási jelenségek, mint például az intenzív zivatarok, a perzselő forróság és a hosszú, száraz nyarak. Gyep szakértőként ezek a kihívások mindennapossá válnak Ön számára. Mérlegelnie kell, hogy szükséges-e az öntözés, és ha igen, mennyit; kimosódott-e a műtrágya; valamint szabad-e nyírni a nedves füvet. Aggodalomra azonban semmi ok! Az új Resilient Blue technológia megoldást kínál, mivel ellenáll a legszélsőségesebb körülményeknek is!
A hosszan tartó szárazság, a hőség, a betegségekkel szembeni magas fenyegetettség és a tápanyaghiány végzetes lehet a pázsit számára, ami Önnek dilemmát okozhat. Ezzel szemben a Resilient Blue megőrzi hidegvérét ezek között a megpróbáltatások között is, ellenállva számos stresszténye zőnek. Az időben történő regeneráció révén a Resilient Blue hatékonyan alkalmazkodik, biztosítva az optimális gyepborítást. Ez teszi a Resilient Blue-t különlegessé!
A Resilient Blue technológia előnyei:
A Resilient Blue® fűmagkeverék rendkívüli ellenállóképességű fűfajtákat tartalmaz. Alapját a speciálisan kifejlesztett, kiemelkedően ellenálló Poa pratensis (réti perje) fajták adják, melyek Yellow Jacket Water Manager bevonattal rendelkeznek. Ez a különleges vetőmagkezelés optimális nedvességet biztosít a magok környezetében, elősegítve a gyors csírázást és az egészséges, erős pázsit kialakulását. A Resilient Blue így biztos fundamentumot nyújt, hogy pázsitja készen álljon a jövő kihívásaira.
Gyors regenerálódás: Szárazság és hőség okozta stressz esetén a Resilient Blue gyorsan helyreáll, nagyobb ellenállóképességgel, mint az átlagos keverékek.
Intenzív igénybevétel tűrése: Az erős RPR technológia révén a Resilient Blue regenerálódó angolperjét is tartalmaz, ami gyors gyökerezést és regenerálódást biztosít.
Betegségekkel szembeni ellenállás: A Resilient Blue csökkenti a gombás fertőzések esélyét, így egészséges és zöld marad a gyep, miközben csökkennek a karbantartási és helyreállítási költségek.
A Resilient Blue Sport kiemelkedő teljesítményt nyújt kevesebb ráfordítással is, ezért optimális választás intenzíven használatban lévő sportpályák és szabadidős területek számára. Ideális új sportpályák telepítéséhez és a meglévők felülvetéséhez, bár érjen hozzá, hogy a réti perje teljes mértékben kicsit tovább tart, mint az angolperje.

Resilient Blue katalógus letöltés >>>

RPR - Sport fűmagkeverék 15 kg	**Intenzív használatban lévő felületeken jól teljesít, kiváló a regenerálódó képessége**	60 000 Ft	63 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tudjon meg többet >>> RPR – Regenerálódó Angol perje Összetétel: Fajok 50% Lolium perenne - Angol perje 50% RPR - Lolium perenne - Angol perje (Regenerálódó Angol perje) RPR – Regenerálódó Angol perje Regenerálódó képesség és nagyfokú tolerancia az erős igénybevétellel szemben! RPR Angol Perje Az RPR Angol perje (Lolium perenne stoloniferum) az Angol perje (Lolium perenne) egyik megújuló képességgel rendelkező alfaja, amely földfelszín közeli hajtásokat fejleszt, melyekből új növények nőnek ki. Ez a fűfajta kiválóan ellenáll az erős igénybevételnek, miközben esztétikusan is megjelenik a felületen. A gyors telepítési lehetőség, a tavasszal tapasztalható korai regenerálódás és a magas fokú tolerancia a megterhelésre miatt ideális választás fokozott igénybevételnek kitett területekhez, beleértve a sportpályák telepítését és felújítását, valamint a kertek füvesítését. Erős és Megújuló! A földfelszín közeli hajtások vízszintesen terjednek, lehetővé téve az új növények gyors kinövését a kikopott vagy hiányos gyepfelületeken. Ezeknek a hajtásoknak a elterjedése révén egy sűrű és ellenálló gyökérhálózat alakul ki, amely növeli a fű toleranciáját az intensív használattal és taposással szemben, így a gyepfelület nehezebben sérül. A gyors telepítést követően az RPR fűmagkeverék intenzíven használható felületet biztosít, amely jól tolerálja az alacsony nyírást, emellett kiváló szárazságtűrő képességgel is rendelkezik. Rendkívül erős, gyorsan fejlődő pázsit! Az RPR két kiemelkedő tulajdonságot ötvöz: rendkívül ellenáll az erős igénybevételnek és egyben gyorsan csírázik és fejlődik. A hagyományos angol perje gyakran réti perjével kombinálva éri el ezeket a jellemzőket, azonban az RPR teljesítménye és terhelhetősége még így is meghaladja e keverékek hatékonyságát.			
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 15 kg Megakadályozza a mohásodást Sűrű pázsitot alkot Kiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítésére Hosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad		54 700 Ft	54 700 Ft
Shadow - Fűmagkeverék erősen árnyéktűrő füvekkel 5 kg Megakadályozza a mohásodást Sűrű pázsitot alkot Kiválóan alkalmas árnyékos területek füvesítésére Hosszú éveken keresztül élvezhető pázsitot ad		18 700 Ft	18 700 Ft
Soft Guard 0,5L szórófejes kiszerelés	**Kitozán alapú baktériuim- gomba- és rovarölő szer**	5 450 Ft	5 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Baktérium -, gomba- és rovarölő hatású, de nem növényvédő szer
A SoftGuard kitozánt, egy halászaíti meléktermékből előállított, a természetben is sok helyen előforduló anyagot tartalmaz, melyet a tudomány manapság igen sok területen felhasznál. A növények felületén alkalmazva háromféle módszerrel szorítja vissza a kórokozókat:
1. fokozza a növény védekező képességét úgy, hogy olyan anyagok termelésére serkenti, amelyek megvédik a külső káros hatásoktól pl.: szalicil sav, kitenáz enzim stb.
2. Segíti a növény sebgyógyulását. Rápermetezve a sérült felületre segít a növénynek azt befedni.
3. kitint bontó enzimeket tartalmaz, ami a kártevő rovarok táplálkozását akadályozza.
Ezen kívül a növényekre ható külső abiotikus eredetű stresszhatások ellen is jótékony hatással van, így növekszik a növény hideggel, aszállyal, UV hatással szembeni ellenállóképessége is.
A spriccelőfejes palackkal ellátott 0,5 Literes kiszerelés könnyen alkalmazható, beltérben is jól használható.
Hogyan kell kijuttatni?
A termeket 1-2%-os koncentraćioban kell feloldani, vagyis 10L permetlebe 1-2dl SoftGuard szukseges. A kezelest 2-3 hetente erdemes megismetelni vagy Ino Si (magas szilićium tartalmu) termekkel felvaltva alkalmazni. Szobanövenyek vedelmere konnyedeń hasznalhato´az elore bekevert 0,5 literes szoroflakonos kiszereles.

Tarolasa
5-30 Celsius között eredeti csomagolasban legalabb 36 honapig megőrzi a szavatossagat. Felbontas utań mihamarabb kijuttatando´ de szorosan visszazarva hűvos, fagymentes helyen tarolva 6 honapig minősegromlas neľkul felhasznalhato´

Soft Guard 1L		6 450 Ft	6 450 Ft

A SoftGuard kitozánt, egy halászaíti meléktermékből előállított, a természetben is sok helyen előforduló anyagot tartalmaz, melyet a tudomány manapság igen sok területen felhasznál. A növények felületén alkalmazva háromféle módszerrel szorítja vissza a kórokozókat:
1. fokozza a növény védekező képességét úgy, hogy olyan anyagok termelésére serkenti, amelyek megvédik a külső káros hatásoktól pl.: szalicil sav, kitenáz enzim stb.
2. Segíti a növény sebgyógyulását. Rápermetezve a sérült felületre segít a növénynek azt befedni.
3. kitint bontó enzimeket tartalmaz, ami a kártevő rovarok táplálkozását akadályozza.
Ezen kívül a növényekre ható külső abiotikus eredetű stresszhatások ellen is jótékony hatással van, így növekszik a növény hideggel, aszállyal, UV hatással szembeni ellenállóképessége is.
A spriccelőfejes palackkal ellátott 0,5 Literes kiszerelés könnyen alkalmazható, beltérben is jól használható.
Hogyan kell kijuttatni?
A termeket 1-2%-os koncentraćioban kell feloldani, vagyis 10L permetlebe 1-2dl SoftGuard szukseges. A kezelest 2-3 hetente erdemes megismetelni vagy Ino Si (magas szilićium tartalmu) termekkel felvaltva alkalmazni. Szobanövenyek vedelmere konnyedeń hasznalhato´az elore bekevert 0,5 literes szoroflakonos kiszereles.

Tarolasa
5-30 Celsius között eredeti csomagolasban legalabb 36 honapig megőrzi a szavatossagat. Felbontas utań mihamarabb kijuttatando´ de szorosan visszazarva hűvos, fagymentes helyen tarolva 6 honapig minősegromlas neľkul felhasznalhato´

SOS - Fűmagkeverék pázsitja felújításához 5 kg		18 400 Ft	18 400 Ft

Összetétel:
Fajok 50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne – Angol perje Gyorsan megújítható a gyepfelület hideg időjárás esetén is

Ajánlott felülvetésekhez alacsonyabb hőmérséklet esetén is (4-5 °C talajhőmérséklettől)
Futballpályák és egyéb sportpályák gyepfelületeinek helyreállítását gyorsan elvégezhetjük használatával, így javíthatjuk azok kihasználtságát
Felülvetésre

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
SOS - Super Over Seeding - Pázsitfelújító fűmagkeverék 15 kg	**Gyorsan megújítható a gyepfelület hideg időjárás esetén is**	51 500 Ft	51 500 Ft

Összetétel:
Fajok
50% Lolium multiflorum var. westerwoldicum - Westerwoldi perje 50% Lolium perenne – Angol perje
Gyors segítség rendkívüli helyzetekben!

Eredményes felülvetés hideg időjárási körülmények között is!
A sportpályák használatának intenzitása folyamatosan növekszik, ami a szezon végére, különösen a késő őszi időszakra, kritikus állapotokhoz vezet. Erősen növényhiányos, kopott felületek alakulnak ki, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik a pálynak későbbi használatát.
Az SOS fűmagkeverék ideális megoldás ilyen helyzetekben, hiszen hideg időjárás mellett is gyorsan csírázik és fejlődik, biztosítva ezzel egy használatra alkalmas felületet. Az SOS a szélsőséges időszakokban nyújt segítséget: késő ősszel, tél elején és tél végén, valamint kora tavasszal, amikor a pályán lévő fű növekedése mérsékelt vagy minimális.
Az SOS fűmagkeverék alkalmazható hideg környezetben is, amíg a talajhőmérséklet 4-5 felett van, gyors eredményeket biztosítva.

Felülvetésre használt fűmagkeverékek fejlődése 6 talajhőmérséklet esetén

Az SOS használatával a pálya felülete ismét használatra alkalmas állapotba hozható. A hiányos, kopott területek újra fűvel borítottak lesznek, így a pálya ismét játékra készülhet.
Az SOS keveréket számos stadionban eredményesen alkalmazzák Európa-szerte, mivel segít fenntartani a pálya megfelelő állapotát kritikus időszakokban is.

Supersport - erős igénybevételű sportpályák fűmagkeveréke 15 kg		66 800 Ft	66 800 Ft

Összetétel:
Fajok
50% Lolium perenne - Angol perje 50% Poa pratensis - Réti perje

A Barenburg Supersport fűmagkeverék egy kiváló minőségű fűmagkeverék, amelyet kifejezetten nagy igénybevételnek kitett területek, például sportpályák, kertek és parkok számára fejlesztettek ki. Itt van néhány fontos információ a termékről:

Alkalmazás: Ideális megoldás sportpályák, játszóterek, kertek és parkok számára, ahol tartós és esztétikus pázsit kialakítása a cél.

Erős Túlélési Képesség: Kiváló teljesítménnyel bír még erős használat és fokozott igénybevétel mellett is.

Növényfajták: A keverék több megbízható és tartós fajtából áll, amelyek ellenállnak a különböző környezeti stresszeknek.

Alacsony Nyírási Magasság: A Supersport fűmagkeverék jól bírja az alacsonyabb nyírási magasságot, ami különösen fontos a sportpályák és intenzíven használt területek esetében.

Gyors Növekedés: Kiváló csírázási és növekedési képességgel rendelkezik, lehetővé téve a gyors helyreállítást és a dús pázsit kialakulását.

Fenntarthatóság: A Barenburg Supersport fűmagkeverék fenntartható megoldásokat kínál, amelyeket környezetbarát módon lehet alkalmazni.

Használati Javaslat: Ideális új telepítésekhez és felülvetéshez is, különösen olyan területeken, ahol a gyep ki van téve a rendszeres igénybevételnek.

Ez a fűmagkeverék kiváló választás mindazok számára, akik tartós, szép és jól bírja a használatot jelentő pázsitot szeretnének.

Tricho Immun 100g	**Probiotiuks hatású biostimuláns trichoderma gombával**	6 250 Ft	6 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Tricho Immun felgyorsítja a növény fejlődését, ami zöldfelület növekedést, és termés mennyiség növekedést von maga után. Fokozza a növény ellenálló képességét a gomba kórokozókkal szemben. Segít a növény számára a sebfelületek begyógyításában, megvédi azt a sebfelületeken támadó kórokozóktól. Véd a stressz faktorokkal szemben.

Ideális kiskerti körülmények között a következő célok elérésére:
Dísznövény kultúrákban a tavaszi és őszi metszésekkor, évközi alakító metszéekkor, sövénynyírást követően a növények jobb regenerálódása érdekében, és a sebfelületeken bejutó kórokozók ellen.
Gyümölcsösökben a téli - tavaszi metszésekkor a sebfelületek kezelésére, virágzás idején a virágokon keresztül bejutó kórokozókkal szemben, lombhullatáskor a levélripacsokon keresztül történő jó felszívódés, és későbbi kedvező hatások elérése érdekében. Lombfakadáskor a friss leveleken keresztül történő felszívódással az egészszezonon keresztül tartó pozitív hatások érvényesülése érdekében.
Gyepfelületen a gyepet támadó kórokozókkal (leginkább gombafélékkel) szemben, valamint a jobb stressztűrő képesség elérése érdekében.
Fontos, hogy csak azon gombáktól véd megfelelően, amelyek fejlődésmenetük során behatolnak a növény szervezetébe. Pl. alma esetén a lisztharmat ellen nem igazán hatékony, de a varrosodás, vagy pl. a szőlőben a peronoszpóra ellen hatásos.

Mikor kell kijuttatni?
A megfelelő védelem kialakulása érdekében a Tricho Immunt a növény minél korábbi vegetációs stádiumában juttassuk ki. Optimális időpontok lehetnek:
Téli-tavaszi metszést követően, amikor sok sebfelület van a növényen a metszés nyomán.
Kora tavasszal, amikor már van zöld lombfelület.
Virágzás idején.

Hogyan juttassuk ki?
Hatipermetezőbe kiskerti körülmények között a Tricho Immun 100 grammos kiszerelest javasoljuk, mely kef 10-15 literes tartalyba is elegendő. A permetezest – mint ahogy minden termek esetében – 22 fok alatt, lehetőség szerint keső delutań, vagy kora reggel vegezzuk el.

Tárolás:
5-30 Celsius fok tartományban, az eredeti csomagolásában bontatlanul legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonban mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Tricho Immun 1kg	**Probiotiuks hatású biostimuláns trichoderma gombával**	29 900 Ft	33 480 Ft

A Tricho Immun felgyorsítja a növény fejlődését, ami zöldfelület növekedést, és termés mennyiség növekedést von maga után. Fokozza a növény ellenálló képességét a gomba kórokozókkal szemben. Segít a növény számára a sebfelületek begyógyításában, megvédi azt a sebfelületeken támadó kórokozóktól. Véd a stressz faktorokkal szemben.

Ideális kiskerti körülmények között a következő célok elérésére:
Dísznövény kultúrákban a tavaszi és őszi metszésekkor, évközi alakító metszéekkor, sövénynyírást követően a növények jobb regenerálódása érdekében, és a sebfelületeken bejutó kórokozók ellen.
Gyümölcsösökben a téli - tavaszi metszésekkor a sebfelületek kezelésére, virágzás idején a virágokon keresztül bejutó kórokozókkal szemben, lombhullatáskor a levélripacsokon keresztül történő jó felszívódés, és későbbi kedvező hatások elérése érdekében. Lombfakadáskor a friss leveleken keresztül történő felszívódással az egészszezonon keresztül tartó pozitív hatások érvényesülése érdekében.
Gyepfelületen a gyepet támadó kórokozókkal (leginkább gombafélékkel) szemben, valamint a jobb stressztűrő képesség elérése érdekében.
Fontos, hogy csak azon gombáktól véd megfelelően, amelyek fejlődésmenetük során behatolnak a növény szervezetébe. Pl. alma esetén a lisztharmat ellen nem igazán hatékony, de a varrosodás, vagy pl. a szőlőben a peronoszpóra ellen hatásos.
Mikor kell kijuttatni?
A megfelelő védelem kialakulása érdekében a Tricho Immunt a növény minél korábbi vegetációs stádiumában juttassuk ki. Optimális időpontok lehetnek:
Téli-tavaszi metszést követően, amikor sok sebfelület van a növényen a metszés nyomán.
Kora tavasszal, amikor már van zöld lombfelület.
Virágzás idején.

Hogyan juttassuk ki?
10-15 literes tartállyal rendelkező háti permetezőbe 50 gramm készítményt kell feloldani. Nagyobb területeke 1-3 kg/ha (a mennyiség a telepített növények méretétől, tőszámától függ). Fontos figyelembe venni a kijuttatásnál a megefelelő időpontot. A tűző napon történő permetezést kerüljük. Optimális a hajnali, vagy esti időszakban történő kijuttatás. A permetezést megelőzően, és követően vízzel tisztítsuk ki a permetező tartályát.
A Trichoderma gombákat a növény fel tudja veni a talajból is. Viszont csak a talajra kijuttatva a gomba nem marad életben. Legjobban a metszési sebeken, egyéb sebfelületen, a lombon lévő gázcserenyílásokon keresztül jut be a növénybe.

Tárolás
5-30 Celsius fok tartományban, az eredeti csomagolásában bontatlanul legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után azonban mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva hűvös, fagymentes helyen tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Vastápsó 10 kg		12 350 Ft	12 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét.

Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában.
A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez.
Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható.
Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS
Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 – 25 g/m2 vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 – 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepnek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtalpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba.
FIGYELEM!

A lenyelt műtrágya mérgezést okoz.
Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt.
Allergiás bőrreakciókat válthat ki.
Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni.

Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben.
ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig

Vastápsó 5 kg		6 450 Ft	6 450 Ft

TERMÉKLEÍRÁS
Vastartalmú műtrágya fokozottan igénybe vett, sűrű gyepek számára. Felhasználható még kerti növények vastápanyag-ellátására is. Sok vasat tartalmaz, ami növeli a gyepek mohával, illetve gyomokkal szembeni ellenállóképességét.

Ellátja a növényeket vassal, amely tápanyag rendkívül fontos a zöld levelek kialakulásában.
A magas vastartalomnak köszönhetően, jól illeszkedik a mohával fedett gyepek igényeihez.
Vízben könnyen oldódik, az így elkészített oldat azonnal felhasználható.
Karbantartja a gyepet, a fontos tápanyagok rendszeres kijuttatása eredményeként a gyep sűrű és strapabíró lesz.

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS
Ősz elején (szeptember / október), egyenletesen 20 – 25 g/m2 vasműtrágyát kell kijuttatni. Kijuttatható kézzel /védőkesztyűben/, illetve erre alkalmas műtrágyaszóró berendezéssel is. A kijuttatás után a területet alaposan meg kell öntözni. 1 púpozott evőkanál nagyjából 18 gramm, egy maréknyi pedig hozzávetőlegesen 50 gramm tömegű. Kijuttatása után a moha megbarnul, illetve megfeketedik. Ily módon, gereblyével, könnyen eltávolítható. A kijuttatni kívánt mennyiséget vízben is fel lehet oldani (például egy 5 négyzetméteres területhez szükséges 100 gramm műtrágyát 5 liter vízben lehet feloldani), majd az elkészült oldatot egyenletesen kell a gyepre kijuttatni. A műtrágya hatása fokozható, amennyiben pár nappal nyírás után, 10 Celsius fok feletti hőmérsékleten juttatják ki. Fokozottan igénybe vett területeken a kezelés 8 – 10 hét után megismételhető. Amennyiben a kerti növényeken vashiányos tünetek jelentkeznek, mint például levélfakulás, illetve a fiatal hajtások sárgulása, akkor oldjunk fel 20 g műtrágyát az öntözővízben és egyenletesen juttassuk ki négyzetméterenként. A vastartalmú műtrágya nem tekinthető teljes műtrágyának. A gyepnek, az egészséges növekedéshez, olyan teljes műtrágyára van szüksége, amely nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmaz. FIGYELEM! A vas műtrágya foltokat okozhat a padlóburkolatokon (betonlapok, járólapok, csempék stb.) és a ruházaton. A véletlenül kiömlött műtrágyát azonnal el kell távolítani a felületről. Továbbá, ügyeljen arra, hogy ne maradjon műtrágya a cipőtalpakon, illetve az állatok lábain. Ne lépjen a műtrágyázott területre addig, amíg a műtrágya be nem mosódott a talajba.
FIGYELEM!

A lenyelt műtrágya mérgezést okoz.
Súlyosan károsítja a szemet és a bőrt.
Allergiás bőrreakciókat válthat ki.
Alkalmazás közben tilos enni, inni és dohányozni.

Védőkesztyűt, védőruházatot, védőszemüveget, illetve arcvédőt kötelező viselni kijuttatás közben.
ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: márciustól szeptemberig

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 15 kg 53 450 Ft 55 450 Ft

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.
A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.
A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.
Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 – 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.
A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

Water Saver- Szárazságtűrő fűkeverék 5 kg 18 700 Ft 18 700 Ft

Összetétel:
Fajok:
80% Festuca arundinacea - Nádképű csenkesz 10% Lolium perenne - Angol perje 10% Poa pratensis - Réti perje

A Water Saver keveréket szárazságtűrő fűfajták alkotják
A keverékben mélyre hatoló gyökérzettel rendelkező nádképű csenkesz található, következésképpen a szárazságtűrő képessége is jó
A réti perje jó megújuló, regenerálódó képességet biztosít
Víztakarékos, ezáltal költségtakarékos is

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről, valamint a száraz periódusok utáni gyors regenerálódásukról ismertek. Míg sok réti perje fajtát rendkívüli módon megvisel a száraz és meleg nyári időszak, addig az itt alkalmazott fajták, mint pl. a Barimpala gyorsan visszazöldülnek és helyreállnak.
A réti perje meghatározó a Water Saver keverékben A Water Saver fűmagkeverékben a réti perje meghatározó fűfaj. A réti perje fajták köre rendkívül széles, azonban a Water Saver a Barenbrug kutatásaira alapozva csak olyanokat tartalmaz, amelyek a legjobbnak bizonyultak a szárazságtűrő képesség, télállóság és a taposástűrés tekintetében. A Barimpala például olyan réti perje fajta, amely jól teljesít száraz körülmények között és jó a télállósága is.
A Barenbrug egyedi nádképű csenkesz fajtái! A Barenbrug nádképű csenkesz fajtái mély gyökérzettel, finom levélzettel és kiemelkedő szárazságtűrő képességgel rendelkeznek. A keverékben alkalmazott angol perje fajta gyors kezdeti fejlődést biztosít, melynek kiválasztásánál a szárazságtűrő képességet is figyelembe vették. A Water Saver keverék kísérleteken alapuló nádképű csenkesz, angol perje és réti perje aránya kiváló szárazság- és hőtűrő képességet biztosít.

Mélyre hatoló gyökérzet, mely akár a 60 cm-t is meghaladja!A Water Saver keverékből létrehozott pázsit mélyebb talajrétegek vízkészleteit hasznosítja, míg a legtöbb fűfaj kevésbé mélyre hatoló gyökérzettel bír és így a felsőbb talajrétegekből /talaj felső 10 – 15 cm-es rétege/ veszi fel a vizet. Az ilyen pázsitok a szárazabb időszakokat nehezen vészelik át vagy akár ki is pusztulhatnak, esetenként még a rendkívüli forró és száraz periódusokat megelőzően is.
A Water Saver keverékben található nádképű csenkesz fajták gyökérzete 60 cm-t meghaladó mélységbe hatol le és a gyökerek vizet, valamint tápanyagot raktároznak tartalékot képezve a száraz időszakokra. A keverék másik meghatározó faja, a réti perje vízszintesen futó tarackoló gyökérzetével kiterjedt hálózatot képez és magas sűrűséget biztosít a pázsitnak.

KÖNYVEK

Télen is zöld kertek	**Debreczy Zsolt – Csapody Vera**	3 550 Ft	3 550 Ft

Örök tavasz a téli zúzmarás, kopasz kertben? - Nem, eznem túlzás! / Lehet a magyar tájakon télen is zöld kertet építeni? - Igen,mindenki megpróbálhatja! / Élnek hazánkban vagy megtelepíthetők nagy számban olyannövények, melyek szélsőséges időjárásunkat elviselik vagy éppen kedvelik? -Valóban sok ilyen van, e könyv tanúsága szerint csak a legfontosabb fajok számamintegy 800! / Lényeges a különbség a télen is zöld kertek növényei között? -Igen, ezért most ismerkedjünk meg e csoportok jellemző bélyegeivel!

További termékek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Balti szegfű	**Dianthus arenarius 'Little Maiden'**	1 950 Ft	1 950 Ft

A Balti szegfű (Dianthus arenarius 'Little Maiden') egy kompakt, 20-25 cm magasra növő évelő növény, amely jellemzően keskeny, zöld levelekkel rendelkezik, amelyek sűrű, bokros habitust alkotnak. Nyáron a gyönyörű, hófehér virágai nyílnak, amelyek vonzó látványt nyújtanak és kellemes illatot árasztanak, így ideálisak a kertek díszítésére. A 'Little Maiden' fajta kifejezetten jól alkalmazkodik a napos helyekhez, és kedveli a jól vízelvezető, homokos vagy vályogos talajokat. A Balti szegfű remek választás sziklakertekhez, határvonalakhoz és szegélyekhez, ahol színt és textúrát ad a tájnak.
Gondozási útmutató
A Balti szegfű gondozása egyszerű, és a következő lépéseket érdemes figyelembe venni:

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a nyári melegben érdemes rendszeresen öntözni, de kerüljük el a pangó vizet, mivel az károsíthatja a gyökereket.
Talaj: Legjobban a jól vízelvezetett, tápanyagokban gazdag talajban fejlődik, de elviseli a kopárabb, homokos talajokat is.
Metszés: Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy serkentsük az új virágzást. Az őszi visszametszés is javasolt.
Napsütés: A teljes napsütést kedveli, tehát napos helyre ültessük.

Ültetési javaslat
A Balti szegfű ültetésekor válasszunk napos helyet, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. Az ültetési időszak legideálisabb tavasz vagy ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, majd ültetés után bőségesen öntözzük meg a növényt. Ha csoportosan ültetjük, hagyjunk elegendő távolságot a növények között a megfelelő légáramlás miatt.

Bumble Bee sásliliom	**Hemerocallis 'Bumble Bee'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Bumble Bee sásliliom egy erős növekedésű, bokros habitusú évelő növény, amely 60-70 cm magasra és 50-60 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, élénkzöld színűek. Virágai 10-12 cm átmérőjűek, élénk sárga színűek gazdag mahagóni vörös szemölccsel és szegéllyel. A virágok szirmai szélesek, kissé fodrosak, és enyhe illatuk van. Virágzási ideje június és július között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Vegyes virágágyások középpontjában

Társítás: Ezüstlevelű növényekkel, kekfűvel, lavendulával

Modern kertekbe különösen ajánlott

Konténeres nevelésre is alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Színes kompozíciók

Városi kertek

Mediterrán kertek

Napos virágágyások

Happy Returns sásliliom	Hemerocallis 'Happy Returns'	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Happy Returns sásliliom egy tömör, bokros növekedésű évelő növény, amely 40-50 cm magasra és 50-60 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, élénkzöld színűek. Virágai 8-10 cm átmérőjűek, friss sárga színűek, enyhe zöld torkuk van. A virágok szirmai szélesek, enyhén fodrosak, és kellemes illatúak. Legnagyobb előnye a rendkívül hosszú virágzási ideje, amely május végétől szeptemberig tart, és folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként vidám hatású

Előrégi ültetésekbe ideális választás

Társítás: Kék és lila virágú növényekkel, hostákkal

Kisebb kertekbe tökéletes méret

Konténeres nevelésre kiválóan alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Kisebb kertek

Előkertek

Városi kertek

Falusi kertek

Konténeres kertek

Haytor White tollas szegfű	**Dianthus plumarius 'Haytor White'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Haytor White tollas szegfű a klasszikus illatos szegfűk egyik legnemesebb képviselője, amely elegáns megjelenésével, bőséges virágzásával és felejthetetlen illatával hódít. Alacsony, párnás növekedésű, örökzöld évelő növény, amely kifejlett állapotban 20-30 cm magas, és terjedésével akár 30-40 cm széles, sűrű, tömött párnákat alkot.
Megjelenésében egész évben dekoratív: keskeny, fűszerű, kékeszöld vagy szürkészöld levelei hamvasak, és sűrűn borítják a talajt, örökzöldként télen is üde színfoltot nyújtanak. A növény igazi látványossága a késő tavaszi és kora nyári virágzás idején bontakozik ki. Május-június folyamán a lombpárnákból vékony, de erős szárakon nyíló, nagy, 3-4 cm átmérőjű, dupla vagy félig dupla virágok ezrei borítják a növényt. A virágok színe tiszta, hófehér, szirmuk finoman rojtos, csipkés szélű. Illatuk édeskés, fűszeres, jellegzetesen szegfűszegre emlékeztet, ami a kert messze egyik legkellemesebb illatává teszi.
Igényei és gondozása
A Haytor White tollas szegfű a napfény és a jó vízelvezetés megszállottja. Teljesen napos, lehetőleg déli fekvésbe ültessük, ahol a lehető legtöbb fény éri – csak így hozza a legtöbb virágot és a legintenzívebb illatot. A legkritikusabb tényező a talaj: kiváló vízelvezetésű, laza, köves vagy homokos, meszes (magas kalciumtartalmú) talajt igényel. A pangó vizet egyáltalán nem tűri, gyökerei könnyen kirothadnak. Ültetéskor keverjünk a talajba meszes zúzottkövet vagy sóder, hogy biztosítsuk a megfelelő vízelvezetést. Szárazságtűrése kiváló, öntözni csak tartósan aszályos időszakban szükséges. Gondozása egyszerű: a virágzás elmúltával távolítsuk el az elnyílt virágokat, hogy a növény ne gyengüljön a magkötéstől. Virágzás után vágjuk vissza a növényt kb. kétharmadával, hogy megőrizze tömött formáját és sűrűbb növekedésre ösztönözzük – ez gyakran másodvirágzást is eredményezhet késő nyáron. Tápanyagutánpótlást nem igényel, sőt, a túlzott tápanyag ellágyuláshoz és kórokozók megjelenéséhez vezethet. 3-4 évente érdemes tőosztással felfrissíteni, hogy megelőzzük a középen való kiritkulást.
Felhasználás a kertben
A Haytor White tollas szegfű rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Kiválóan mutat sziklakertekben, ahol sziklák repedéseibe, kövek közé ültetve lágy, virágzó párnákat alkot. Évelőágyások előterébe ültetve remek szegélynövény, amely struktúrát és színt ad. Kavicságyásokban, söderágyásokban is megállja a helyét, ahol a kavicsok közül kikandikáló fehér virágok és kékes lombozat különösen mutatós. Illatos virágai miatt kiváló vágott virág is, csokrokba, virágdíszekbe szedhetjük. Jól mutat mediterrán hangulatú kertekben, levendulás ágyásokban. Támfalak felső élére ültetve gyönyörűen omlik alá, lágyítva a kemény vonalakat. Konténerekbe, dézsákba, balkonládákba ültetve is dekoratív.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos és jó vízelvezetésű talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula (Lavandula) különböző fajtái, ahol a lila virágok és a szürkészöld lombozat gyönyörű kontrasztot alkot a fehér virágokkal. Zsályafélékkel (Salvia) ültetve izgalmas kék-lila-fehér színkompozíciót hozhatunk létre. Díszfüvek közül a kékesszürke levelű csenkeszekkel (Festuca glauca) vagy a szálkás árvalányhajjal (Stipa) alkot harmonikus, természetes hatású együttest. Társíthatjuk más szegfűfélékkel (Dianthus), különböző színű változatokkal. Alacsony termetű kakukkfüvekkel (Thymus) és kövirózsákkal (Sempervivum) ültetve változatos textúrájú sziklakerti kompozíciót hozhatunk létre.

Miss jessopp rozmaring	**Rosmarinus officinalis 'Miss jessopp'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Örökzöld félcserje. Virágai végállásúak, ajakosak, erősen kiemelkedő fellevelekkel. Színei a világoskéktől a liláig, sokféle árnyalatban megtalálhatóak. Levelei sötétzöldek, egyenesek, tűformájúak, szélük visszahajlik, fonákjuk szürkésen szőrözött. A növény minden része aromás illatú. Tavasz közepétől nyár elejéig virágzik. Jól társítható egyéb mediterrán térségekből származó örökzöld cserjékkel, félcserjékkel (szuharok, örökzöld tölgyek, gránátalmák, fügék stb.)

Miss jessopp rozmaring (nagy)	**Rosmarinus officinalis 'Miss jessopp'**	3 950 Ft	3 950 Ft
Southern Charm ökörfarkkóró	**Verbascum hybridum 'Southern Charm'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Southern Charm ökörfarkkóró (Verbascum x hybrida 'Southern Charm') – A pasztellszínű, karcsú virágfürtű évelő
Az Southern Charm ökörfarkkóró pasztellszínű virágairól és karcsú, elegáns habitusáról ismert. Ez a növény a nyár első felében nyíló, finom színű virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, hosszú virágzási időszaka és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
Az Southern Charm ökörfarkkóró egy bokros növekedésű, felálló szárú, évelő vagy kétéves növény. Kifejlett magassága 60-120 cm, szélessége 30-60 cm között alakul. A növény habitusa feltörő, karcsú, a virágzó szárak egyenesen felállók. A növény rövid életű évelő, amely 2-3 évig él a kertben, de az önvetés révén hosszú távon is fenntartható.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek a tőnél tőrózsát alkotnak, szürkészöldek, nemezesen szőrözöttek, oválisak vagy tojásdadok. A levélfelület jellegzetesen szőrös tapintású.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 60-120 cm hosszú, végálló fürt, amelyen 5-10 cm-es átmérőjű virágok helyezkednek el. A virágok ötszirmúak, csésze alakúak, 1-2,5 cm átmérőjűek, a szirmok finoman hullámosak. A 'Southern Charm' fajta legjellegzetesebb tulajdonsága a virágok színváltozata: a virágok pasztellszínűek – sárgásfehér, barack, halványrózsaszín és levendula árnyalatokban nyílnak, mindegyik virág közepén sötétebb, bíborlila vagy bíbor színű szem található. A virágzási időszak a késő tavasztól a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően májustól szeptemberig, a legbőségesebb virágzás június-júliusban figyelhető meg. A virágok a méheket, a poszméheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (gyökérdugványozással, tőosztással) egyaránt szaporítható. A növény a kertben önmagát is szaporíthatja, ami biztosítja a hosszú távú jelenlétét a kertben.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az ökörfarkkóró 'Southern Charm' napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés az optimális.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású, közepesen termékeny talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, szegényes, sziklás, kavicsos talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: Az ökörfarkkóró 'Southern Charm' szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első néhány hetében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: Az ökörfarkkóró 'Southern Charm' alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését, mert a túlzott tápanyag a virágzás rovására mehet. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: Az ökörfarkkóró 'Southern Charm' alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzási időszak alatt az elnyílt virágfürtök eltávolítása serkenti az újabb virágzást és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. Az önvetés biztosítása érdekében érdemes néhány virágfürtöt a növényen hagyni a magok beéréséig.

Telelés és fagytűrés: Az ökörfarkkóró 'Southern Charm' kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -25°C és -28°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén (az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény félig örökzöld, a lombozat télen részben megmaradhat.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
Az ökörfarkkóró 'Southern Charm' a pasztellszínű virágzásának, karcsú habitusának, hosszú virágzási időszakának, szárazságtűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben:

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Cottage kertekbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szegélyágyások hátsó részébe – a 60-120 cm-es magasság miatt kiváló háttérnövény.

Vágott virágnak – a hosszú, karcsú virágfürtök tartósak a vázában, és kiválóan alkalmasak csokrokba.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
Az Southern Charm ökörfarkkóró pasztellszínű virágai és szürkészöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ezüstös levelű növényekkel: Bárányfül (Stachys byzantina), üröm (Artemisia) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a pasztellszínű virágokat.

Kék virágú növényekkel: Macskamenta (Nepeta), zsálya (Salvia) – a kék és a pasztell szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak.

Díszfüvekkel: Árvalányhaj (Stipa), tollbuga (Pennisetum) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti az ökörfarkkóró karcsú, felálló formáját.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis) – a sárga és a pasztell szívek vidám, napsütötte hatást keltenek.

Más ökörfarkkóró fajtákkal: Különböző színű Verbascum fajtákkal – a változatos színű virágok egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 5-8 (Magyarországon az Southern Charm ökörfarkkóró teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -25°C és -28°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

St. Ola angol gólyaorr	Geranium St.Ola	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A St. Ola angol gólyaorr (Geranium × cantabrigiense 'St Ola') – fehér-rózsaszín virágú, örökzöld levelű talajtakaró évelő. Tökéletes árnyékos vagy napos kertekbe, alacsony karbantartású!

Ősszel a levelek vöröses árnyalatot öltenek, további díszértéket adva.

5–7 növény/m² ültetési sűrűség ajánlott a gyors talajtakarás érdekében.

A növény jellemzői

Magasság: 20–30 cm, terjedés: 30–50 cm (párnás habitus).

Levelek: Mélyen szeldelt, sötétzöld, fényes felületű, ősszel vöröses árnyalatú.

Virágok: Fehérek, rózsaszín erezettel és porzókkal, tömött fürtökben.

Tenyészhely: félárnyék, jó vízelvezetésű talaj. Szárazságtűrő, de a pangó vizet nem kedveli.

Ültetés és gondozás

Talajigény: Közepesen nedves, humuszban gazdag talaj (meszes vagy semleges pH).

Vízellátás: Közepes vízigényű – a szárazságot jól tűri, de napos helyen rendszeres öntözés javasolt.

Metszés: Tavasszal eltávolíthatók a tél által károsodott levelek.

Télállóság: -15 °C-ig tűri (USDA 5-ös zóna).

Szaporítás: Tőosztással tavasszal.

Felhasználás

Talajtakaróként: Fák alatt, útszegélyeken, lejtők stabilizálására.

Pollinátor-barát: Méhek és pillangók kedvelik virágait.

Dísznövényként: Konténerekbe, sziklakertbe.

Ültetési társítás

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Árnyékos társak: Árnyékliliomok, tűzesők, meténgek			
Summer Wine sásliliom	**Hemerocallis 'Summer Wine'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

ASummer Wine sásliliom egy közepes termetű évelő növény, amely 50-60 cm magasra és 40-50 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, friss zöld színűek. Virágai 10-12 cm átmérőjűek, mély bíborrózsaszínűek, sárga-zöld torkuk van. A virágok szirmai szélesek, enyhén fodrosak, és selymes felületűek. Virágzási ideje június és július között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kecses hatású

Vegyes virágágyásokba ideális választás

Társítás: Fehér virágú növényekkel, ezüstlevelű fajtákkal, füstfákkal

Romantikus kertekbe tökéletes választás

Konténeres nevelésre is alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Romantikus kertek

Hagyományos kertek

Falusi kertek

Városi kertek

Rózsakert társnövényeként

"A" típusú madárodú	10 950 Ft	10 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az "A" típusú madárodú a vonatkozó madárvédelmi ajánlások szerint készült kisebb termetű énekes madarak számára.
Az odú anyaga gyalult fenyődeszka (d>2cm) csavarokkal rögzítve, vékonylazúrral kívülről kétszer átfestve. Teteje, mely hátrafele billenthető az odó tisztításakor zsindellyel fedett.
Belső mérete 10x14x25cm, a berepülő nyílás átmérője 2,8 cm.
Az odú felfogatható léccel, mely mind a hátlapra, mind az oldallapra felfúrható, vagy felakasztható lánccal.
Tartozékok: lánc, csavarok, felületkezelt felfogató léc.
Kihelyezhető: 2-6 méter magasságba, fatörzsre, egyéb oszlopra, vagy épület falára.
Az ilyen típusú odúk lakói: Barátcinege, kék cinege, fenyves cinege. A nagyobb méretű madarak, mint a veréb, széncinege, házi cinege ezen a nyíláson nem jutnak be.
A hazai madárfajok jelentős része odvakban szeret élni. Itt biztonságban, az időjárás viszontagságaitól védve nevelhetik fiókáikat. A természetben erre a célra sokféle üreg megfelel, és minden madár számára van ideális méretű odú. Számunkra ez jó hír, hiszen az odúk méretével bizonyos madárfajoknak célzottan készíthetünk lakhelyet, és telepíthetjük be az udvarunkba.
A legkisebb odúlakó madaraink számára az A típusú odú a legideálisabb. A kicsiny alapterületet gyorsan be tudják lakni a madarak kibélelve azt fűszálakkal, tollakkal, és mindenféle számukra hasznosnak tűnő anyaggal. Mivel ennek az odú típusnak a berepülő nyílása is kicsi, a valamivel nagyobb testű madarak számára kényelmetlen így például a mezei veréb, vagy a házi veréb nem tudja elfoglalni.
Az odút olyan módon kell elhelyezni, hogy a fészkeket rabló kisemlősök (pele, nyest stb.) ne tudják elérni. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy az odút a tavaszi költési időszakot követően szükséges kitisztítani, mert számos parazita él túl a fészekmaradványok között, melyek megnehezítik a következő fészekalja felnövekedését.

fenyves cinege (Periparus ater)
Európa legkisebb cinegéje, (testtömege mindössze 8-10 gramm, átlagos testhossza 11-12cm, szárnyfesztávolsága 17-21cm), 1758-ban Carl von Linné svéd természettudó írta le. Európában és Ázsiában honos, a Kárpát-medencében azonban ritka. Magyarországi állománya az Alpokalján, a Zalai-dombságban és az Északi-középhegységben látható jellemzően lucfenyős területeken. Hazánkban védett 25.000 Ft az eszmei értéke.
Nagyon hasznos madár. Első sorban ízeltlábúakat fogyaszt, étrendjében aknázó molyok és araszolók hernyói, levél és szövődarazsak szerepelnek. Mindezt a téli időszakban magvakkal, bogyókkal egészíti ki.
A természetben leginkább fák odvaiban szeret élni, de sziklarepedésekben, sőt a földön, az avarban is készíthet fészket. Évente kettő alkalommal költ, egy fészekalja 8-10 tojásból áll, melyeket 12-15 nap alatt folyamatos költéssel kelt ki. A fiókákat mindkét szülő táplálja, és ha rendben fejlődnek, úgy 17-21 napon belül repülnek ki.

barátcinege (Poecile palustris)
Európában néhány kisebb területtől eltekintve szinte mindenütt előfordul. Hazánkban középhegységeink erdőiben a leggyakoribbak, érdekes, hogy a Dél-Alföldön szinte alig találkozunk vele. aprócska madár, tömege 10-13 gramm, testhossza 11-12cm, szárnyfesztávolsága 18-20cm.
A többi cinegéhez hasonlóan első sorban ízeltlábúakat fogyaszt. Hernyókat, lószúnyogokat, pókokat, poloskákat, bogarakat szed fel. Mivel nem vonul, a téli időszakban magvakra, bogyókra fanyalodik.
Természetes közegben bükkösök, tölgyesek faodvaiban fészkel. Évente csak egyszer költ, odúját növényi részekkel tölti fel. 7-11 tojást rak, 14-16 napig költ, majd a fiókák 16-20 napos korukra szárnyra kapnak.
Hazánkban, bár egyedszáma nagy, védettséget élvez. Eszmei értéke 25.000 Ft.

kék cinege (Cyanistes caeruleus)
Ugyancsak Linné írta le a fajt. Az ember közelségéhez jól alkalmazkodott faj. Szinte egész Európában találkozhatunk vele, sőt Észak_Afrika mediterrán vidékein, és Ázsia szárazabb területein is előfordul. Leginkább a gyakran erősen hideg időjárással bíró területeket nem kedveli.
Magyarországon állandó fészkelő faj. Télen északi vidékekről érkező példányok is telelnek itt. Középhegységeinkben, és azok környezetében a legsűrűbbek az állományok, és a Dél-Alföldön a legritkábbak.
Testhossza 11-12cm, tömege 9-13gramm, szárnyfesztávolsága 17-20cm.
A faj igen hasznos kis rovarpusztító. Kedvelt táplálékai a lepkehernyók, pókok, poloskalárvák, lószúnyogok, bársonylegyek. Télen is itt tartózkodó madár, ilyenkor kényszerűségből magvakat, bogyókat fogyaszt.
Évente kétszer költ. Egy fészekalja 12 tojásból áll, amelyeken a szülők felváltva kotlanak kettő hétig. A kikelő csupasz és vak fiókák 18-22 napon belül kitollasodnak, és kirepülnek.
Egyedszáma kis mértékben csökken, de még nem kritikusan alacsony. Ennek ellenére védett madár, eszmei értéke 25.000 Ft.

"B" típusú madárodú		10 950 Ft	10 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A "B" típusú madárodú a vonatkozó madárvédelmi ajánlások szerint készült kisebb termetű énekes madarak számára.
Az odú anyaga gyalult fenyődeszka (d>2cm) csavarokkal rögzítve, vékonylazúrral kívülről kétszer átfestve. Teteje, mely hátrafele billenthető az odó tisztításakor zsindellyel fedett.
Belső mérete 10x14x25cm, a berepülő nyílás átmérője 3,5 cm.
Az odú felfogatható léccel, mely mind a hátlapra, mind az oldallapra felfúrható, vagy felakasztható lánccal.
Tartozékok: lánc, csavarok, felületkezelt felfogató léc.
Kihelyezhető: 2-6 méter magasságba, fatörzsre, egyéb oszlopra, vagy épület falára.
Az ilyen típusú odúk lakói: Barátcinege, kék cinege, fenyves cinege. A nagyobb méretű madarak, mint a veréb, széncinege, házi cinege ezen a nyíláson nem jutnak be.
A hazai madárfajok jelentős része odvakban szeret élni. Itt biztonságban, az időjárás viszontagságaitól védve nevelhetik fiókáikat. A természetben erre a célra sokféle üreg megfelel, és minden madár számára van ideális méretű odú. Számunkra ez jó hír, hiszen az odúk méretével bizonyos madárfajoknak célzottan készíthetünk lakhelyet, és telepíthetjük be az udvarunkba.
A kistestű énekesmadarak számára a "B" típusú odú a leggyakrabban használt odú.
Az odút olyan módon kell elhelyezni, hogy a fészkeket rabló kisemlősök (pele, nyest stb.) ne tudják elérni. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy az odút a tavaszi költési időszakot követően szükséges kitisztítani, mert számos parazita él túl a fészekmaradványok között, melyek megnehezítik a következő fészekalja felnövekedését.
széncinege (Parus major)
Széles körben elterjedt, Európa nagy részén, Észak Afrikában, de Közép- és Észak Ázsiában is él. Nem vonuló madár. Könnyen megismerhető madár. Fejtetője fekete, arca fehér, majd nyaki részén ismét fekete a tollai színe. Testének felső, háti része olívazöld, hasi része élénksárga. Szárnyain oldalt egy-egy fehér csík látható. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkozik, télen azonban igen sokféle dolog képezi táplálékát. Olajos magvakat fogyaszt, de szükség esetén telelő denevéreket is felfal. A széncinege a nagyobb testalkatú cinegék közé tartózik, a hím valamivel nagyobb a tojónál, (testtömege mindössze 16-22 gramm, átlagos testhossza 13-14cm, szárnyfesztávolsága 20-22cm), Magyarországi állománya az Alpokalján, a Zalai-dombságban és az Északi-középhegységben látható jellemzően lucfenyős területeken. Hazánkban védett 25.000 Ft az eszmei értéke.
Nyáron tehát első sorban ízeltlábúakat fogyaszt, étrendjében pókok, szöcskék, poloskák, hernyók tartóznak de egyéb rovarokat, hangyákat, százlábúakat, tücsköket, darazsakat, sőt, csigákat is összeszednek. Kutatók kimutatták, hogy cinegék jelenlétében a gyümölcsösöket érő rovarkár felére is csökkenhet, tehát valóban nagyon hasznos madarak. Télen nagyobb magvakat is fogyasztanak, akár bükkfák makkjait, nagy mennyiségű napraforgó magot esznek etetőből, földről.
A természetben leginkább fák odvaiban szeret élni, de sziklarepedésekben, falak réseiben is megtelepszik, továbbá szívesen fészkel mesterséges odúkba is. Évente kettő alkalommal költ, egy fészekalja akár 16-18 tojásból is állhat, de jellemzőbb 5-12 tojásos fészekalj. A tojó kotlik a tojásokon, a hím pedig hordja a táplálékot. A tojások 12-15 nap alatt folyamatos költéssel kelt ki. A fiókákat mindkét szülő táplálja, és ha rendben fejlődnek, úgy 16-22 napon belül repülnek ki.
Speciális védettséget nem élvez, stabil populációkkal rendelkező, jó alkalmazkodó képességű faj. Ennek ellenére idehaza védett, 25.000 Forint eszmei értékkel.

kék cinege (Cyanistes caeruleus)
Ugyancsak Linné írta le a fajt. Az ember közelségéhez jól alkalmazkodott faj. Szinte egész Európában találkozhatunk vele, sőt Észak_Afrika mediterrán vidékein, és Ázsia szárazabb területein is előfordul. Leginkább a gyakran erősen hideg időjárással bíró területeket nem kedveli.
Magyarországon állandó fészkelő faj. Télen északi vidékekről érkező példányok is telelnek itt. Középhegységeinkben, és azok környezetében a legsűrűbbek az állományok, és a Dél-Alföldön a legritkábbak.
Testhossza 11-12cm, tömege 9-13gramm, szárnyfesztávolsága 17-20cm.
A faj igen hasznos kis rovarpusztító. Kedvelt táplálékai a lepkehernyók, pókok, poloskalárvák, lószúnyogok, bársonylegyek. Télen is itt tartózkodó madár, ilyenkor kényszerűségből magvakat, bogyókat fogyaszt.
Évente kétszer költ. Egy fészekalja 12 tojásból áll, amelyeken a szülők felváltva kotlanak kettő hétig. A kikelő csupasz és vak fiókák 18-22 napon belül kitollasodnak, és kirepülnek.
Egyedszáma kis mértékben csökken, de még nem kritikusan alacsony. Ennek ellenére védett madár, eszmei értéke 25.000 Ft.
A hazai madárfajok jelentős része odvakban szeret élni. Itt biztonságban, az időjárás viszontagságaitól védve nevelhetik fiókáikat. A természetben erre a célra sokféle üreg megfelel, és minden madár számára van ideális méretű odú. Számunkra ez jó hír, hiszen az odúk méretével bizonyos madárfajoknak célzottan készíthetünk lakhelyet, és telepíthetjük be az udvarunkba.
A legkisebb odúlakó madaraink számára az A típusú odú a legideálisabb. A kicsiny alapterületet gyorsan be tudják lakni a madarak kibélelve azt fűszálakkal, tollakkal, és mindenféle számukra hasznosnak tűnő anyaggal. Mivel ennek az odú típusnak a berepülő nyílása is kicsi, a valamivel nagyobb testű madarak számára kényelmetlen így például a mezei veréb, vagy a házi veréb nem tudja elfoglalni.
Az odút olyan módon kell elhelyezni, hogy a fészkeket rabló kisemlősök (pele, nyest stb.) ne tudják elérni. Ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy az odút a tavaszi költési időszakot követően szükséges kitisztítani, mert számos parazita él túl a fészekmaradványok között, melyek megnehezítik a következő fészekalja felnövekedését.

mezei veréb (Passer montanus)
Széles körben elterjedt madárfaj. Európában és Ázsiában csak a legészakibb területeken nem találkozunk velük. Lakott területeken is sokat láthatunk. sok esetben a házi verébbel együtt mozog és költ. Kifejezetten kedveli a mesterséges fészkelő helyeket, odúkat, de mezőgazdasági területeken is nagyon jellemző fasorokban, erdősávokban, termesztő felületek melletti cserjésekben.
A hím, és a nőstény egyek között számunkra jó megkülönböztető jelzés nincs. A házi verébtől legkönnyebben a csőre körüli fekete folt alapján különíthetjük el. Nyáron rovarokkal táplálkozik, és fiókái számára is azokat hordja össze. Az őszi, téli időszakban azonban főleg olajos magvakat fogyaszt, több helyen

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

kiemelik, hogy ügyesen szedegeti össze gyomosító növények magvait.
A madár hossza 12,5-14 cm, szárnyfesztávolsága 20-22 cm, testtömege 18-29 gramm. Feje teteje, halántéka vörösesbarna, szemsávja, csőre körüli rész, és a torka fekete. Pofája, és nyaka fehér, hasi része fehéres barnás.
Faodvakban fészkel, gyakran elfoglalja más, kisebb odúlakók helyét. Fészke kerek, melyet oldalbejáróva alakít ki. 5-6 tojása amolyan piszkos fehér alapszínű, amit sűrűn barnás, szürkés foltok borítanak. Évente 2-3 alkalommal költ. A tojások 13-14 nap alatt kelnek ki, és további 16-18 nap múlva a fiókák el is hagyják a fészket. A fiókákat mindkét szülő eteti. Megfigyelték, hogy a szülők, óránként akár 50-60 rovart is vesznek a fészekhez.
2007-ben idehaza az év madara volt. A Magyar Madártani Egyesület a hirtelen, drasztikus egyedszám csökkenés miatt hívta fel a fajra ezzel a figyelmet. Ez első sorban a rovarirtó szerek egyre szélesebb körben, a lakosság általi használatnak is köszönhető. Továbbá annak is, hogy a mezőgazdasági technológiák egyre precízebbé váltak, így a magok egyre kisebb mértékben szóródnak el a betakarításkor, melyek a madarak táplálékát képezhetnék. Széleskörű elterjedése ellenére Magyarországon védett faj, eszmei értéke 25.000 Ft.

házi veréb (Passer domesticus)
Széles körben elterjedt, az emberi jelenléthez jól alkalmazkodott faj. Magyarországon elég gyakori, állománya még stabilnak mondható, de a nyugat európai trendek minden esetre nyugtalanítóak. A széles körű vegyszerhasználat, az intenzív, ipari gazdálkodás, a veszteségmentes betakarítási módszerek miatt állománya drasztikusan csökkent.
Hossza 14 cm körüli, szárnyfesztávolsága 21-26 cm, testtömege 24-38 gramm. A fej első fele, valamint a fejtető közepe barnásszürke, hasi része fehér, oldala felé szürkés, farktollai sötétbarnák, szeme barna, csőre pedig fekete. Tömzsi madár, széles mellkassal, nagy kerek fejjel.
Túlnyomó részben magvakkal táplálkozik, ugyanakkor rovarokat is fogyaszt. Társas lény, rajokat alkotva, sőt más fajok egyedivel közösen él. Csapatosan vonulnak alvóhelyre, sőt fészkeit is csoportokba építi. Tavasszal a tojónak több udvarlója is akad, de a tojó végül elzavarja a csapodár hímeket, a házi veréb állandó párral él. Házaknál, kertekben fészkel évente háromszor költ.
Fészkét mindenféle dologból, rongyokból, szalmából, mohából építi. 5-6 tojást rak, melyek fehér alapon szürke pettyesek. A tojások 13-14 nap alatt kelnek ki, majd további 16-18 nap múlva a fiókák kirepülnek. Számos veréb nem talál párt, és nem épít fészket. Ezek sok esetben társulnak párokhoz és segíti azok fennmaradását.
Amikor nem magvakkal táplálkozik, főként rovarokat, bogarakat, hernyókat fogyaszt (kétszárnyú legyek, levéltetvek, hangyák, növényeket károsító darazsak, egyes fedeles szárnyúak), de amennyiben elérhető kisebb rákokat, gilisztákat, sőt gyíkokat, békákat is elfogyaszt.

Csúszka (Sitta europaea)
Európa és Ázsia mérsékelt klímájú területein széles körben elterjedt. Énekes madár, mely jellegzetes többször ismétlődő dvip hanggal hívja fel magára a figyelmet, de ismertek a cri és a tylű-tylű-tylű, a tjúi, csú, vagy pí hangsorai is. E madárfaj elterjedése folyamatosan növekszik, noha lokálisan kisebb populációi veszélybe kerülhetnek például erdőirtások okán.
Csinos kis madár, rövid farokkal, hosszú erőteljes csőrrel. Feje teteje és a háta szürke, csőrétől a szemet is befoglaló fekete csík húzódik a feje oldalán a halántékáig. Arcán, torkén fehéres folt látható, de hasi része narancssárgás színű. A hím egyedek átlagos testhossza 14 cm, szárnyfesztávolságuk 22.5 és 27 cm között van. Testtömegük 17-18 gramm.
A csuszka fákon él. Táplálékát a fatörzsöm élő rovarok alkotják (pókok, lepkék, mezei poloska-lárvák, bársonylegyek, szúnyogok, fátyolkák). Sokszor keresi fel a madáretetőket, gyakran cinegefélékkel csapatba verődve érkezik. Téli időszakban érdemes tehát etetni őket. Főként olajos magvakat fogyasztanak, sőt mogyorót, makkokat is megesznek. A növényi táplálékokat egész évben raktározzák, de főként ősszel felhalmoznak készleteket. A raktározott táplálékot fák kérgének repedéseibe, kisebb odvakba rejtik.
A csúszkák erdők fáinak odvaiban rendezik be fészküket, de gyakran foglalnak el mesterséges fészkelő odúkat is. Monogám madár, a párok a fészkük környezetében védik a területüket. 6-9 db tojást tojnak, melyek fehér alapon vöröses pöttyökkel tarkítottak. A tojásrakásra időjárástól és táplálékmennyiségtől függően évente 1-2 alkalommal kerül sor. A 6-9 fióka csupaszon, és vakon kel ki, majd 14-18 napos kotlást követően, megy további 20-22 nap etetést követően repülnek ki.
Magyarországon védett faj, 25.000 Ft eszmei értékkel bír.

örvös légykapó (Ficedula albicollis)
Európa középső részén, és Ázsia délnyugati területein honos. Vonuló faj, telelni Afrika Szahara alatti részeire repül. Természetes élőhelyei sokfélék lehetnek, mérsékelt övi erdőktől, ültetvények faállományaiban, szántóföldek mezővédő erdősávjaiban, vidéki kertekben, sőt városi faállományokon is előfordul. Áprilistól októberig tartózkodik Magyarországon.
Kb 13 cm hosszú, szárnyfesztávolsága 22-25 cm, testtömege pedig mindössze 12-16 gramm. Feje két oldala a szem körül, és a teteje fekete, csőre fölött fehér folttal. Torka, nyaki része, hasa fehér, míg háta, szárnyai fekete fehér tarkák.
Számos rovart összeszed. Reptében is sokat elkap, de a földön is pókokat, hernyókat, poloskákat keresgél.
Fák odvaiban fészket készít, de megjelenik mesterséges fészekrakó helyekben is. Az odúkat fűszálakkal béleli ki, egy fészekalja pedig 6-7 égszínkék tojásból áll. melyen 12-14 napon át kotlik a nőstény. A fiókákat további 14 napon át táplálja, majd kirepülnek.
Magyarországon védett, 25.000 Ft eszmei értéke van.

nyaktekercs (Jynx torquilla)
Beszédes nevét onnan kapta, hogy fejét képes akár 180 fokban is elfordítani. Ha fészkében megzavarják, hosszú nyakát kinyújtja, és kígyóéhoz hasonló sziszegő hangot hallat az betolakodó elriasztása céljából.
Európában elterjedt, a meleg mediterrán területek kivételével szinte mindenhol megtalálható. Magyarországon áprilistól szeptember végéig tartózkodik, ligetes erdők, ültetvények, parkok lakója.
Testhossza 16-17 cm szárnyfesztávolsága 25-17. Testtömege pedig meghaladja a 30-40 grammot. Háta szürkés színű, barna, fekete foltokkal, melle ugyancsak szürkés. Szárny és farok tollai vöröses barna alapszínűek fekete harántsávokkal.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Főbb táplálékai a hangyák, de egyéb rovarokkal, és hernyókkal is táplálkozik. Hosszú nyelvét bedugja a fák hasadékaiba, és a rámászó rovarokkal együtt visszahúzza, majd megeszi azokat.
Fák odvaiba rakja 7-12 tojását, melyeken a tojó 12-14 napig ül.
Természetvédelmi értéke 50.000Ft

seregély (Sturnus vulgaris)
Mostanra kozmopolita fajnak nevezhető, hiszen eredetileg Eurázsiában volt honos, de betelepítették Amerikába, sőt Ausztráliába is. Hazánkban is gyakori, a veréb, és a cinege fajok után a leggyakoribb fészkelő madarunk. Rövid távú vonuló, vagyis nem repül egészen Afrika középső részéig, éppen csak leruccan a Földközi tenger mellé. De enyhébb teleken nem is megy el, itt áttelel.
Odvas fák odúiban költ, de előfordul a homok-, löszfalak felületén is ahol gyurgyalagok vájtak maguknak üregeket a falba. A hím választja ki a megfelelő fészkelő helyet, majd elkezdi a fészeképítést, mely tevékenységhez később csatlakozik a tojó. A fészket száraz fűből, falevelekből, némi szőrből, és tollakból építi. 4-5 tojás alkot egy fészekalját, melyen éjszakánként a tojó ül, nap közben pedig felváltva kotlanak a hímmel.
Testhossza 19-23 cm, szárnyfesztávolsága 31-44 cm, testsúlya 58-100 gramm. Tollazata fekete, színváltós, fénye zöldes, lilás lehet, melyben télen fehér pöttyök jelennek meg. A fiatal egyedek szürkésbarnák, és csak az első vedlést követően kezdnek hasonlítani az idősebbekhez.
A seregélyek híres énekes madarak, sőt jól utánoz más, számára érdekes hangokat, pl. mobiltelefonokat. A hímek az udvarlás idején igazi trubadúrok, sokszor egészen bonyolult dallamokkal igyekeznek felkelteni a tojók figyelmét.
A seregélyek csoportban élnek. Különösen érdekes, ahogy a madárraj együtt repül hol gömbölyded formációt alkotva, hol pedig hirtelen elvékonyodva ide-oda rebbenek.
Sokféle körülmény között fészkelnek, városokban épületek falinak réseiben, de fákon is, cserjéken is, és előszeretettek a mesterségesen előkészített odúkban is.
Természetvédelmi szempontból jelentős faj, védett, 25.000 Ft a természetvédelmi értéke.

"C" típusú madárodú		10 950 Ft	10 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A "C" típusú madárodú a vonatkozó madárvédelmi ajánlások szerint készült odú kisebb termetű énekes madarak számára.
Az odú anyaga gyalult fenyődeszka (d>2cm) csavarokkal rögzítve, vékonylazúrral kívülről kétszer átfestve. Teteje, mely hátrafele billenthető az odó tisztításakor zsindellyel fedett.
Belső mérete 14x16x14 cm, a berepülő nyílás négyzetalakú 7,5x7,5 cm.
Az odú felfogatható léccel, mely mind a hátlapra, mind az oldallapra felfúrható, vagy felakasztható lánccal.
Tartozékok: lánc, csavarok, felületkezelt felfogató léc.
Kihelyezhető: 2-6 méter magasságba, fatörzsre, egyéb oszlopra, vagy épület falára.
Ez az odútípus kistestű énekesmadárfajok számára a legalkalmasabb. Ezek a madarak a természetben alapvetően nem odvakban költenek, hanem üregekben, sziklahasadékokban, esetleg bozótosok ágai között. Esetükben fontos, hogy az odú alapfelülete vízszintes legyen, és legalább egy, vagy kettő oldalon legyen oldaltámasz, amihez a behordott fészekanyagot oda tudják tömködni. Ha ilyen nincs, akkor az anyag lehullik, és igen nehézkesen alakul ki a kis fészek.
Jellemző madarak, melyek ebben az odútípusban fészkelnek: a házi rozsdafarkú, a kerti rozsdafarkú, a barázdabillegető és a szürke légykapó.

házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
Gyakori énekesmadarunk, mely enyhébb teleken át is telel idehaza, de jellemző, kissé délebbre vonul. Azonban kora tavasszal rögtön megjelenik, és nagy „zajjal” megkezdi fészeképítési tevékenységét. Megtelepedését tehát ezekkel a „C” típusú odúkkal tudjuk segíteni.
Testhossza 13-14,5 cm hosszú, szárnyfesztávolsága meghaladja a 20 cm-t. Tömege 13-19 gramm. Félénk, hirtelen mozgású madarak. Változatos színekben figyelhetjük meg. Sokszor szürkésbarnák, vagy szürkésfeketék némelyiknek van világosabb szárnyfoltja, némelyiknek nincsen, de az alsó farok tollak rendszerint rozsdásbarna, vörös színűek.
Európa szerte, és Ázsiában is honos, de észak-Afrikában is találkozhatunk vele. 2, legfeljebb 3 alkalommal költ egy évben. Kis száraz fűkupac szerű fészkét a legkülönbözőbb helyekre, építi. Általában magas helyekre, gerendák közé, épületek egyéb zegzugos részeire. De más kisebb madarak fészkét is elfoglalja.
A fészket e tojó építi első sorban száraz fűszálakból, de előfordul, hogy mesterséges anyagokat is használnak, cérna, vagy kötéldarabokat pl. A fészekaljak 4-5 tojást számlálnak, a fiókákat pedig a szülők együttes erővel gondozzák.
Apró rovarokkal táplálkozik, de a késő őszi, és téli időszakban bogyókat, és magvakat is fogyaszt. A rovarokat gyakran reptükben kapja el, de a fák törzsén haladva is vadászik ott mászó rovarokra. Hasznos kis madárka tehát, mely számára a „C” típusú odú ideális.

barázdabillegető (Motacilla alba)

Testhossza 18cm, szárnyfesztávolsága elérheti a 30cm-t is. Tömege 17-25 gramm. Felsőteste rendszerint szürke, nyaka alatt a begye teteje pedig fekete. Szemsávja, feje, nyak oldalsó része és az alsóteste fehér. A fiatal madarak színezete gyakran szürkésebb, barnább.
A barázdabillegető kedveli az alacsonyabb növényekkel borított zöldterületeket, ezért a kertek és a parkok kifejezetten ideális terep számára. A költés időszakában a hím hevesen védi a területét, de jellemzően a barázdabillegetők békésen megférnek egymás mellett. Etetőhelyeket szívesen felkeresnek, és a épített környezetben is rendszeresen fészkelnek.
A hazai populáció rövid távú vonuló, a tél beálltával délebbre repülnek, de enyhébb teleken egyre gyakrabban hazánkban maradnak.
5-6 tojásból áll egy fészekalj, melyeken 12-13 napig kotlik a tojó, majd a fiókák 14-15 napig maradnak a fészekben. A fészek anyaga igen sokféle lehet, nagyon találékony kis madárról van szó. A száraz fűszálak között gyakran vannak mesterséges anyagok, de a belsejét mindig puha pelyhekből, szőrből, szöszökből alakítja ki.
Főleg rovarevő, de csigákkal is táplálkozik. Vízpartok közelében éppen a bőségesebb, vízhez kötődő rovarállomány miatt jellemzőbb a megjelenése, a fiókákat is rovarokkal táplálja.

Szürke légykapó (Muscicapa striata)
Hosszú távú vonuló madarunk, mely Európában és Ázsiában is honos, de télre Afrikába vonul. Áprilistól szeptemberig tartózkodik hazánkban, leginkább fákban gazdag erdei környezetben érzi jól magát.
Magas helyeken szokott lesben állni, onnan kémleli a repülő rovarokat. Első sorban azokkal (legyekkel, bogarakkal, szúnyogokkal, darazsakkal) táplálkozik, melyeket röptükben, a levegőben kap el. Hossza 15 cm, szárnyfesztávolsága 23-25 cm
Üregekbe, idős fák odvaiba, de mesterséges helyeken is elkészíti száraz fűszálakból a fészkét, amit mohával, szőrcsomókkal, tollakkal bélel ki. A fészekalja 3-5 tojásból áll, melyeken 13-15 napig kotlik, majd a költést követően 12-14 napig maradnak a fészekben a fiókák.
Elterjedt faj, és bár a populáció csökken, még nem éri el a kritikus szintet. Ennek ellenére hazánkban védett, eszmei értéke 50.000 Ft.
Megtelepedését a „C” típusú odúkkal tudjuk segíteni, legjellemzőbben erdő közeli dombvidékes tájak településein fordul elő, ahol az ember közelségét gyorsan megszokja. Kedveli a gondosan kihelyezett odúakt. Esős kedvezőtlen időjárásban a fiókák könnyen megfázhatnak, és ilyenkor el is pusztulhatnak, ezért fontos szerepe van esetében az odúkihelyezésnek.
A szürke légykapó egy mozgékony, energikus madár, amely a vizes élőhelyek közelében és virágoskertekben is megtalálható. A szürke légykapó, ahogy a neve is mutatja, főleg legyeket és más rovarokat fogyaszt, és hűvösebb területeken fészkel.

Abbey Deep Rose tengerparti pázsitszegfű	Armeria maritima 'Abbey Deep Rose'	2 250 Ft	2 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Abbey Deep Rose tengerparti pázsitszegfű (Armeria maritima 'Abbey Deep Rose') alacsony, sűrű, félgömb alakú párnát képező örökzöld évelő. Kifejlett magassága 15-20 cm, szélessége 20-30 cm. Levelei keskenyek, tűszerűek, sötétzöldek, örökzöldek, és sűrű tömött gyepet alkotnak a talaj közelében. Virágai aprók, tömött, gömbölyded virágfejekben nyílnak, merev, vékony szárakon. A fajta virágszíne a mély rózsaszíntől a bíbor rózsaszínig terjed, és tavasszal, valamint nyár elején nyílik. Elvirágzás után a virágfejek visszavágásával gyakran újabb virágzásra ösztönözhető. A növény habitusa kompakt, rendezett, így szép kontrasztot ad a kertben.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; forró nyári klímán enyhe délutáni árnyékot is elvisel.

Talaj: Jó vízáteresztő, homokos, kavicsos vagy szegényes talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a szárazságot jól tűri, de az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is megél; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágfejeket rendszeresen távolítsa el, hogy meghosszabbítsa a virágzást és megőrizze a kompakt formát. A régi lombozatot kora tavasszal rövidítheti.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; az örökzöld lombozat télen is díszít, de a téli pangó víz károsíthatja.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, alpesi jellegű kompozíciókba, tengerparti hatású kertekbe és ágyásszegélybe illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, szárazságtűrő, mediterrán és minimalista kertekben, ahol a tömött virágfejek és az örökzöld párna érvényesül.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűszer- és illatos növények: levendula, izsóp, zsálya.

Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.

USDA télállósági zóna: 4-8.

Abiqua Drinking Guard árnyékliliom	**Hosta 'Abiqua Drinking Guard'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Levelei kerekdedek és mélyen domborúak, mint egy pohár alja. A levelek sötétzöld színűek és 15-20 cm hosszúak, ami különleges textúrát és színkontrasztot nyújt a kertben. A növény tavasszal virágzik, és hozza a hosszú száron nyíló lila virágokat. A virágok kellemes illatot árasztanak, ami vonzza a beporzókat. Körülbelül 40-60 cm magasra nő, így közepes magasságú növényként szépen illeszkedik a kertben. (Mint a legtöbb évelő, október közepétől fokozatosan visszahúzódik, ledobja a lombját a tavaszi kihajtásig !)
Gondozás és ültetési útmutató:

Talaj: A Hosta Abiqua Drinking Gourd a legjobban jól vízelvezető, laza talajban fejlődik. A túl nedves ültetőközeg ártalmas lehet a növénynek.

Fény és árnyék: Ez a növény árnyékos vagy félárnyékos helyet kedvel. Ültetssük olyan területre, ahol csak a reggeli vagy délutáni napfény éri, hogy megfelelően fejlődjön.

Öntözés: Rendszeres öntözést igényel, különösen a szárazabb időszakokban. Ügyeljünk arra, hogy a talaj mindig enyhén nedves legyen, de ne álljon a víz a növény körül.

Tápanyag: Tavasszal és nyáron adhatunk neki egy lassú felszívódású műtrágyát, hogy segítsük a növekedését és az egészséges levelek kialakulását.

Téli védelem: A hidegebb időszakokban takarjuk be a növény körüli talajt vastag mulcsréteggel, hogy megvédjük a gyökereket a fagyástól.

Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Adagio virágosnád (japánfű)	**Miscanthus sinensis 'Adagio'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Az Adagio virágosnád, vagy japánfű, (Miscanthus sinensis 'Adagio') egy szép, univerzálisan alkalmazható virágosnád fajta, mivel nem nagyon fejlődik 110-120 cm-nél magasabbra. Alkalmazható nagyobb csoportokban, vegyes virágágyi felületekben, más díszfüvekkel, vagy szoliterként egyaránt. Szinte az egész évben jól mutat. Tavasszal üde zöld csomókban fejlődik, nyáron magas, laza, ívesen hajló leveleivel, majd nyár végén virág bugáival díszít, ősszel kellemes lombszíneződéssel lep meg minket, és a téli kép is nagyon kellemes, ahogy a zúzmara kiül a levelekre, virágzatokra.
Könnyen tartható növény. Kora tavasszal kell visszáni, kb. 12-15 cm magasan. Ettől eltekintve csak az ültetést követően kell öntözni.

Afrikai tollborzfű	**Pennisetum alupecuroides 'White Lancer'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Az Afrikai tollborzfű általánosan alacsony karbantartású, dekoratív növény, amely ideális választás mediterrán vagy modern kerttervekhez. Kiemelkedő választás szoliterként, tömbös ültetésekben vagy kevert peremekben. Textúrája kontrasztot teremt más növényekkel, például őszirózsákkal vagy miscanthusszal. A száraz virágzatok és levelek télen is látványosak, különösen fagyos időbe. Magvai madarak táplálékául szolgálnak. Fényigény: Napos helyet preferál, de félig árnyékos környezetben is fejlődhet. Talaj: Jó vízáteresztő talajt igényel, nem tűri az állóvizet. Homokos vagy agyagos talajokon egyaránt jól nő. Öntözés: Fiatalon vízigényes, de felnőtt korában szárazságtűrő. Metszés: Tavasszal visszavágható a száraz részek eltávolításához, hogy helyet adjon az új hajtásoknak.			
Albus törpe őszirózsa	Aster alpinus 'Albus'	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Albus törpe őszirózsa (Aster alpinus 'Albus') alacsony, sűrű, párnás vagy bokros habitusú, tömött töveket képező évelő. Kifejlett magassága általában 15–20 cm, szélessége 20–40 cm között alakul, kedvező körülmények között azonban ennél valamivel nagyobbra is megnőhet. Levelei lándzsásak vagy keskeny tojásdadok, enyhén szőrözöttek, középzöldek, tőlevélrózsában és a szár alsó részén fejlődnek; a lombozat sűrű, tömött alapot ad a virágoknak. Virágai margarétaszerűek, tiszta fehér nyelves virágokkal és élénk sárga középső koronggal, 3–5 cm átmérőjűek, és laza, dús csoportokban nyílnak a merev szárak végén. A Virágzása májusban és júniusban tart, de kedvező körülmények között nyár elején megismétlődhet. A virágok kellemes, finom illatot árasztanak, és vonzzák a méheket, poszméheket, lepkéket és más beporzó rovarokat.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb formát és a leggazdagabb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább szegényes vagy közepesen termékeny, homokos, meszes vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz, agyagos talajt nem tűri; az ilyen helyeken lassabban fejlődik.

pH: Semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson (6–7,5) érzi jól magát, de a savanyúbb talajt is elviseli.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és rendszeres öntözést általában nem igényel. Az első szezonban a megerősödéshez mérsékelt öntözés javasolt.

Télállóság: Rendkívül fagytűrő, akár –35 és –40 °C közötti hőmérsékletet is elvisel, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 20–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban mérsékelten öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején ritkábban, de mélyen locsolja meg, hogy a gyökerek mélyebbre hatoljanak.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is megél; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a tövek szétesését és a virágzás visszaesését okozhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat rendszeresen távolítsa el, hogy meghosszabbítsa a virágzást és megőrizze a kompakt formát. A régi lombozatot kora tavasszal vagy késő ősszel vágja vissza. A nagyobb töveket 3–4 évente érdemes megosztani a bőséges virágzás érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. Csapadékos, enyhe teleken a téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, alpesi jellegű kompozíciókba, természetközeli és természetes hatású kertekbe illik. Kiváló ágyásszegélybe, évelőágyás előterébe, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat szárazságtűrő, minimalista és mediterrán hatású kertekben, ahol a tömött fehér virágok és az alacsony, párnás habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és csoportos ültetve összefüggő, világos szőnyegszerű felületet hoz létre.
Növénytársítások

Alacsony évelők: harangvirág, varjúháj, kövirózsa, szegfű, phlox – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a törpe őszirózsát.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a tömött virágokat.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz – korai színfoltot hoznak a törpe őszirózsa virágzása előtt.

Fűszer- és illatos növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű – hasonló talaj- és fényigényűek, és nyáron gazdagítják a kompozíciót.

USDA télállósági zóna: 4-8.

Alcazar fáklyaliliom	**Kniphophia 'Alcazar'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Az Alcazar fáklyaliliom nagy növésű, l100-120 cm-t is elérő, és 60-90 cm széles csomót alkotó évelő, jellegzetes élénkpiros és sárga virágfüzéreivel díszít. Az Alcazar kiváló szoliter növény, de az ágyások hátsó részén vagy a szigetágyások közepén, ahol látványos virágai pillangókat vonzanak ugyancsak jól mutat.
Fényigény: napos
Vízigény: átlagos
Talajigény: átlagos, vagy jó vízelvezető laza talaj
Fagytűrés: jó fagytűrő
Virágzás: nyár közepe
Díszítő érték: virágzatával díszít
Felhasználás: vegyes virágágyakba, nagyobb foltokba telepítve, vagy akár ágyások hátterébe ültetve

Almaillatú menta	**Mentha suavolens**	1 950 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az almaillatú menta (Mentha suavolens) – gyorsan terjedő fűszernövény
Az almaillatú menta az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó, Európában és a Földközi-tenger vidékén őshonos, évelő fűszernövény. A faj nevében a „suavolens” (latin: édes illatú) a növény jellegzetes, kellemes, almás illatára utal, amiért „almaillatú menta” néven is ismert. Ez a növény a nyár közepén nyíló, illatos leveleivel és gyors növekedésével az egyik legkedveltebb mentafajta a kertekben. A könnyű gondozhatósága, gyors terjedése és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás, azonban a tarackos gyöktörzse miatt érdemes konténerben vagy gyökérgáttal nevelni.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
Az illatos menta egy gyors növekedésű, tarackos gyöktörzzsel terjedő, évelő növény. Kifejlett magassága 30-100 cm, szélessége 50-100 cm között alakul. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások felállók vagy enyhén felemelkedők. A tarackos gyöktörzs miatt a növény gyorsan terjed, ezért konténerben vagy gyökérgáttal nevelve a legkönnyebben kordában tartható.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei és egyben legnagyobb vonzerőt jelentik. A levelek kerek vagy szív alakúak, erősen ráncosak, szőrözöttek, szélük finoman fogazott. A 'suavolens' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek édeskés, almás illata, amely a közönséges mentáknál kevésbé csípős, inkább gyümölcsös, és a levelek íze is kellemesen édeskés. A levelek frissen és szárítva egyaránt felhasználhatók teának, limonádéhoz, desszertekhez, salátákhoz és gyógyászati célokra.
A virágzat a növény másodlagos díszítőeleme. A virágok a hajtások végén, a nyár közepétől az őszig (júliustól szeptemberig) jelennek meg, apró, csöves, fehér vagy rózsaszín színű, tömött fürtökben. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, száraz terméseket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tarackos gyöktörzzsel, tőosztással, dugványozással) egyaránt szaporítható. A vegetatív szaporítás a leggyakoribb, mivel a tarackos gyöktörzs könnyen szétoszthető, és biztosítja a fajtaazonosságot.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az illatos menta napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legintenzívebb illatú lombozatot napos, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 4-6 óra közvetlen napsütés az optimális.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, de állandóan nyirkos, humuszban gazdag, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a rendszeres nedvességet igényli.

Öntözés: Az illatos menta közepes vagy magas vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, különösen a növekedési időszakban. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első heteiben rendszeresen kell öntözni. A túlöntözést kerülni kell, mert az gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, fűszernövények számára kifejlesztett műtrágya, vagy egy réteg (3-5 cm) érett komposzt a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: Az illatos menta metszése fontos a bőséges levéltermés, a bokros növekedés és a növény kordában tartása szempontjából. A növény csúcsát és a hajtásvégeket rendszeresen érdemes visszacsípni, ami serkenti az új, fiatal hajtások képződését. A virágbimbókat a virágzás előtt érdemes eltávolítani, hogy a levelek ne keseredjenek meg és a növény energiáit a levéltermelésre fordítsa. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését és a túlzott terjedést.

Telelés és fagytűrés: Az illatos menta kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén (az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a tarackos gyöktörzs telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyöktörzsből újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
Az illatos menta a gyümölcsös illatú leveleinek, gyors növekedésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb fűszer- és gyógynövény:

Fűszerkertbe, gyógynövénykertbe – a levelek frissen és szárítva egyaránt felhasználhatók teák, limonádék, desszertek, saláták, gyümölcssaláták és más ételek ízesítésére.

Természetes kertekbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba – a tarackos terjedése miatt konténerben nevelve a legkönnyebben kordában tartható. Gyógyászati célokra – a levelek gyulladáscsökkentő, emésztést elősegítő, nyugtató hatásúak; teaként fogyasztva enyhíthetik a gyomorpanaszokat és a fejfájást. Társítónövényként – illatával elriaszthat bizonyos kártevőket, például a hangyákat és a levéltetveket. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) Az illatos menta illatos levelei és lila virágai számos más növénnyel kombinálhatók: Citromfűvel, kamillával, levendulával – a hasonló termesztési igények miatt és a nyugtató, gyógyító hatású teák készítése miatt kiváló társnövények. Paradicsommal, káposztával, hagymával – a menta illata elriaszthatja a kártevőket, ezért jó társnövény a zöldségeskertekben. Ezüstös levelű növényekkel – az ezüstös vagy szürkés árnyalatok kiemelik a menta élénkzöld színét. USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon az illatos menta teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. A növény lombhullató, a tarackos gyöktörzse a talajban áttelel, és tavasszal újrahajt.)			
Alpha Dark Purple törpe őszirózsa	**Aster dumosus 'Alpha Dark Purple'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Alpha Dark Purple törpe őszirózsa (Aster dumosus 'Alpha Dark Purple') kompakt, sűrű, párnás tövet képező, lombhullató évelő. Kifejlett magassága a termőhelytől függően 20–40 cm, szélessége 20–35 cm között alakul; a tövek alacsony, széles, félgömb alakú párnát formáznak, amelyet virágzáskor szinte teljesen beborítanak a virágok. Levelei keskenyek, lándzsásak, sötétzöldek, és a tövénél sűrű, tömött lombozatot alkotnak.
A virágzat kis méretű, margarétaszerű fészekvirágzat, amelynek nyelves virágai sötét ibolya-lila színűek, a központi csöves virágok pedig élénk sárgák – ez a kontraszt messziről feltűnő. A virágzatok a merev szárak végén, dús csoportokban nyílnak, és a fajta a hagyományos Aster dumosus fajtáknál mintegy két héttel korábban kezd virágozni. Virágzása augusztustól októberig, illetve az első fagyokig tart, és a virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, lepkékenek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; a napos helyen hozza a legtömörebb habitust és a leggazdagabb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, humuszos talajt kedvel; a pangó vizet rosszul tűri.

Vízigény: Közepes; a rendszeres öntözést meghálálja, különösen virágzás idején, de a kifejlett növény a rövidebb szárazabb időszakokat is átvészeli.

Télállóság: Teljesen télálló, az USDA 5a zónától (-29 °C-ig) megbízhatóan áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a száraz, elhalt részeket a talajszint közelében. Az elnyílt virágzatok eltávolítása meghosszabbíthatja a virágzást. A töveket 2-3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat és a levélfoltosság ritkán jelentkezhet. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak szegélyébe, sziklakertbe, kis kertekbe, balkonládába és cserépbe, valamint préri stílusú és cottage-kertekbe illik. Kompakt mérete és késői virágzása miatt különösen értékes a kertben, amikor a legtöbb nyári évelő már elvirágzott. Kiváló vágott virág, és csoportos ültetésben összefüggő, színes felületet hoz létre.
Növénytársítások

Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, krizantém – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a törpe őszirózsa tömör habitusát.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Korán virágzó hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a törpe őszirózsa virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 5a–9 (egyes források a 4–8. zónát is megadják; a magyarországi klímán teljesen télálló).			
Amerikai vörös tölgy (közepes)	**Quercus rubra**	7 450 Ft	7 450 Ft
Amethyst Lips zsálya	**Salvia greggii 'Amethyst Lips'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Amethyst Lips zsálya (Salvia greggii 'Amethyst Lips', más néven Salvia 'Dyspurp') a Salvia greggii fajból származó, kompakt, sűrű, bokros habitusú, örökzöld félcserje. Kifejlett magassága a termőhelytől és a metszéstől függően 50–80 cm, szélessége 45–60 cm között alakul; a tövek a tövüknél elfásodnak, a hajtások vékonyak, sűrűn elágazók, így a növény rendezett, lekerekített formát mutat. Levelei tojásdadok, középzöldek, aromásak, és enyhe teleken részben vagy egészben megmaradnak. Virágzata örvökben álló, fürtös virágzat, amely a hajtások felső részén nyílik. A virágok ajakosak, kétszínűek: a felső ajak borvörös-lila, az alsó ajak fehér, de a szezon során a színarány változó lehet – előfordulhat, hogy a virágok teljesen lilák, teljesen fehérek, vagy fehér-lila keverékűek. A virágzás kora nyártól (júniustól) egészen őszig (szeptember-októberig) tart, és a fajta a hőség legforróbb heteiben is képes virágozni. A virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, lepkékenek és kolibriknek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, homokos, meszes vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Az USDA 7–10. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A növényt kora tavasszal, az utolsó fagyok után metssze vissza: távolítsa el a két évnél idősebb, 1 cm-nél vastagabb vesszőket, meghagyva a fiatalabb hajtásokat. Ez serkenti a sűrű, bokros növekedést és a bőséges virágzást.

Átteleltetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a csigák, a levéltetvek és a kabócák kisebb kárt okozhatnak. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, mediterrán és kavicskertbe, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe is kiváló választás, ahol a kétszínű virágok és a hosszú virágzás érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Rózsák: a zsálya függőleges virágzata szép kontrasztot ad a rózsák mellett, és jól elrejti a rózsák alsó, kopaszabb részeit.

Illatos és fűszeres növények: levendula, rozmaring, kakukkfű – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a zsálya tömör habitusát.

Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, sárga virágú évelők (pl. napszemvirág) – a lila-fehér virágokhoz a sárga szín kontrasztot ad.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 7-10 (egyes források a 6-10. zónát adják meg; hazánkban a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

Anemonefolium pünkösdirózsa	**Paeonia lactiflora 'Anemonefolium'**	5 950 Ft	6 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Anemonefolium a nemes pünkösdirózsa (Paeonia lactiflora) egyik legkülönlegesebb, legritkább virágformájú változata. Nevében az 'Anemonefolium' arra utal, hogy virágai a szellőrózsákra (Anemone) emlékeztetnek: a széles külső szirmok és a középen található számos, keskeny petalód (átalakult porzó) különleges, telt, de mégis légies hatást kelt. Kifejlett magassága 60-80 cm, szélessége 50-70 cm, így közepes termetű évelőként szoliterként, csoportos ültetésben vagy sorban is megállja a helyét.
Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a májustól júniusig nyíló, 10-15 cm átmérőjű, „anemone” típusú virágok. A külső szirmok szélesek, általában halványrózsaszínűek vagy fehéres rózsaszínűek. A virág közepe tömött, számos (gyakran 50-100) keskeny, sziromszerű képződményből (petalód) áll, amelyek a külső szirmoknál világosabbak, néha krémszínűek vagy enyhén zöldes árnyalatúak – ez a belső „tollas” vagy „tűpárnaszerű” rész adja a virág különleges textúráját. A levelek sötétzöldek, szárnyaltak, 3-5 levélkéből állnak, felszínük fényes. Ősszel a lombszín vöröses-bordó árnyalatokba vált. A növény lassan növő, de évtizedekig élhet a megfelelő helyen.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos vagy félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb a virágzás; félárnyékban is szépen fejlődik, de a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, humuszos, mély rétegű, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású (pH 6,5-7,5). A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: fiatalon és tartós szárazság idején rendszeres, mélyre hatoló öntözést igényel. A talajt tartsd egyenletesen nedvesen, de ne túl vizesen.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal, a hajtások megjelenésekor komposzttal vagy lassú oldódású műtrágyával. Virágzás után ismét egy kevés tápanyag segíti a következő évi virágbimbók képződését.

Metszés: rendszeres metszést nem igényel. Ősszel, az első fagyok után a föld feletti száraz részeket a talaj szintjén vágd vissza. Tavasszal az elszáradt, sérült hajtásokat távolítsd el.

Telepítési mélység: nagyon fontos! A pünkösdirózsák érzékenyek a túl mély ültetésre. A rügyek (szemek) a talajfelszíntől számítva legfeljebb 2-3 cm mélyre kerüljenek – a túl mély ültetés a virágzás elmaradásához vezet.

Telelés: teljesen télálló, Magyarország minden régiójában külön védelmet nem igényel. Az első éves fiatal növényeknél télen egy vastag lombtakarás javasolt.

Kertstílus, ahová illik Romantikus kert, angol vidéki kert, házikert, vágott virágos kert, vegyeságyások, előkertek, illatos kertek, gyűjtőkertek.
Változatos növénytársítások

Kék és lila virágú évelők: levendula, macskamenta (Nepeta), perovszkia, császárvirág (Digitalis), harangláb (Aquilegia).

Fehér virágú évelők: gyöngyvirág, párnás őszirózsa, árnyékliliom (Hosta) fehér szegélyű változatai.

Díszhagymák: Allium 'Purple Sensation', Allium giganteum – a pünkösdirózsa virágzása után veszik át a főszerepet.

Késő nyári évelők (a virágzás után is díszítenek): tollbuga (Molinia), japán vértfű (Imperata cylindrica), lángvirág (Phlox).

Tavaszi hagymások a tövébe: krókusz, gyöngyike, törpe nárcisz – ezek a pünkösdirózsa hajtásai előtt virágoznak.

Alacsony talajtakarók: árnyéki meténg (Vinca minor), pachysandra.

USDA besorolása: 3-8 (Magyarország egész területén, 4b-7 zónában kiválóan nevelhető, a leghidegebb tájakon is megbízhatóan télálló).

Angelina kövi varjúháj	Sedum reflexum 'Angelina'	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az 'Angelina' varjúháj kicsi, sűrű talajtakaró növényként, és körülbelül 10-15 cm magasra és 30-45 cm szélesre terjedhet. Az apró, sárga virágai nyár közepén jelennek meg. Ezt a növényt kiváló választássá teszi a talajtakarónak, vagy sziklakertekben és szárazságtűrő környezetekben is jól teljesít.
Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: Az 'Angelina' varjúháj növény kedveli a napos vagy félig árnyékos helyeket. Minél több napfény éri, annál intenzívebb lesz a sárga színe. Ügyelj rá, hogy a növény legalább 6 órányi napfényt kapjon naponta.

Talaj: A Kövi varjúháj 'Angelina' jól fejlődik jó vízelvezetésű talajban. Sziklás vagy homokos talajok a legjobbak számára. Fontos, hogy a talaj ne legyen túlságosan nedves, mert a varjúhájok nem szeretik a túlzott nedvességet.

Öntözés: Ez a növény rendkívül szárazságtűrő.

Trágyázás: Az 'Angelina' varjúhájokat nem szükséges gyakran trágyázni. Tavasszal egy enyhe, általános célú lassan oldódó műtrágyával elvégezheti a trágyázást.

Téli védelem: A Kövi varjúhájok hidegtűrők, de erős fagyok esetén lehet, hogy meg kell védeni őket. Ha a téli hónapokban a hideg, száraz szélnek vannak kitéve, akkor egy vékony réteg mulccsal védheted meg a növényeket.

Annabell cserjés hortenzia (kisebb)	**Hydrangea arborescens 'Annabell'**	3 450 Ft	3 450 Ft
Appleblossom cickafark	**Achillea millefolium 'Appleblossom'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Az Achillea millefolium 'Appleblossom' egy kedvelt évelő növény, amely 60-80 cm magasra nő. A növény erős, egyenes szárakkal rendelkezik, amelyek dús, ezüstös-zöld levelekkel vannak borítva. A virágzatai nyáron, általában június és szeptember között nyílnak, és a virágok szelíd, halvány rózsaszín árnyalatban pompáznak, amelyeket lapos fürtökben helyezkednek el.
A 'Appleblossom' cickafark nemcsak a szépsége miatt népszerű, hanem mert ellenáll a szárazságnak és jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz. Ezen kívül tökéletes választás a méhek és pillangók számára, ami hozzájárul a kert ökológiai sokféleségéhez.
Gondozási Útmutató:

Öntözés: Az Appleblossom cickafark mérsékelt vízszükségletű. A talaj legyen folyamatosan nedves, különösen a fiatal növényeknél, de a túlöntözést el kell kerülni.
Fényigény: Preferálja a napsütéses helyeket, ahol teljes napfényt kap, de elviseli a félárnyékot is.
Tápanyag: Az alacsony tápanyagigény miatt rendszeres tápanyag-utánpótlás nem szükséges, de tavaszi komposzt használata előnyös lehet.
Ápolás: Az elnyílt virágok eltávolítása segít serkenteni a további virágzást. Tavasszal a növényet javasolt visszavágni.

Felhasználási lehetőségek:

Ideális virágágyások és vegyes növénykompozíciók színesítésére.
Sziklakertekbe történő ültetésre, ahol a levél- és virágformák kontrasztos látványt nyújtanak.
Vágott virágként is használható, mivel tartós virágokkal rendelkezik, amelyek sokáig frissek maradnak a vázában.

Aquila kövirózsa	**Sempervivum 'Aquila'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Aquila kövirózsa (Sempervivum 'Aquila') a kövirózsák egyik legfeltűnőbb, ezüstös lombozatú hibrid fajtája, amelyet a levelek világos, ezüstös színéért és a száraz körülmények közötti stabil növekedéséért nemesítettek. Sűrű, szabályos, tömött rozettákat képez, amelyek ezüstös-szürkészöld alapszínűek; a leveleket finom, viaszos bevonat borítja, amely a rozettáknak hűvös, acélos árnyalatot kölcsönöz. Tavasszal és hűvösebb időben a levélvégek rózsás, lilás-bordós színt öltenek, amely a szezon során a napfény és a hőmérséklet-különbségek hatására alakul ki. Levelei húsosak, vastagok, hegyes csúcsúak, és szorosan egymáshoz simulnak. Kifejlett magassága 5–10 cm, szélessége 15–25 cm között alakul; a rozetták átmérője egyes források szerint elérheti a 8–10 cm-t, kedvező körülmények között a 15–25 cm-t is. A növény bőségesen hozza a sarjakat, amelyekkel könnyen szaporítható, és rövid idő alatt sűrű, összefüggő telepet alkot.
A virágzat a rozetta közepéből kiemelkedő száron nyílik; a virágok rózsaszínűek, csillag alakúak, és június és július között nyílnak. A virágzati szárak magassága elérheti a 15–25 cm-t. A virágzás után a virágzó rozetta elhal, de a tövénél új sarjak fejlődnek, így a telep folyamatosan megújul.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a legintenzívebb ezüstös színt és a legtömörebb rozettaformát napos helyen hozza, de a részleges árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár köves, homokos vagy sovány talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 3–5. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta -23 °C és -29 °C közötti fagyokat is elvisel, a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 15–20 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a tömör rozettaforma rovására, ezért a nawozás inkább kerülendő.

Metszés: Metszésre nincs szükség; az elnyílt virágzatokat távolítsa el, hogy a rozetta ne fordítsa minden erejét magképzésre. Kora tavasszal a télen elhalt, elszáradt rozettákat távolítsa el a telep tisztítása érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. A levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, zöldtetőre, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, valamint konténeres és teraszkerti ültetésekbe illik. Sekély cserépben, alpesi tálban is kiválóan mutat, és az ezüstös, rózsás árnyalatú rozetták finom színfoltot adnak a többi kövirózsa és pozsgás között.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa-fajták, varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kövirózsa tömör rozettáit.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kövirózsa virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 3-5 (a magyarországi klímán teljesen télálló).

Arany törpe pampafű	**Cortaderia seloana 'Gold Mini'**	4 950 Ft	5 350 Ft

Az Arany törpe pamapfű 'Gold Mini' egy tömör, bokros növekedésű, örökzöld díszfű. Fő jellemzője a zöld és sárga színű, sávos levele, amely egész évben színes pontot ad a kertnek . A növény magassága a virágzattal együtt általában 1 métert nem haladja meg, szélessége is hasonló mértékű. Késő nyáron vagy ősszel nyílik, és a lombozat felett magasodó, felálló szárakon hordozza elefántcsontszínű vagy aranyasszínű, selymes, tollas virágzatát.
Gondozási útmutató

Fényigény: A teljes napsütés a legideálisabb a számára, de félig árnyékos helyen is megél.

Talajigény: A jól vízelvezető talajt kedveli. Szinte bármilyen talajtípusban megtalálja a számára megfelelő feltételeket, legyen az agyag, homok vagy mészkő.

Vízigény: Miután jól meggyökeresedett, jól tűri a szárazságot. Közepes öntözési igényű.

Metszés: A tavasszal ajánlott visszametszeni, amikor a régi és elszáradt leveleket eltávolítjuk, hogy helyet adjon az új hajtásoknak.

Télállóság: Meglehetősen jó fagytűrő, akár -15°C-ot is kibír. Fiatal növényeit és a konténerben nevelteket érdemis téli hideg ellen védeni.

Ültetési javaslat
Ez a pampafű rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben. Alacsony termete miát kiválóan alkalmazható szegély- és sövényültetésre. Díszes megjelenése miatt szoliter növényként is kiemelkedő hatású, akár egy gyepben vagy nyílt területen. Konténeres nevelésre is kiválóan alkalmas, így terasz vagy erkély díszítésére is felhasználható.

Aranyfoltos japán babérsom (nagy)	**Aucuba japonica 'Picturata'pettyegetett babérsom**	17 600 Ft	17 600 Ft
Aranylevelű borsos varjúháj	**Sedum acre 'Aurea'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az előző faj aranysárga lombú változata, mely kihajtáskor szinte világít a többi növény között. Igen szép!
Az aranylevelű borsos varjúháj (Sedum acre 'Aurea') egy kedvelt pozsgás növény, amely a kőrisfélék családjába tartozik. Kicsi, sűrű, aranysárga levelei különleges színfoltot adnak a kertnek, különösen nyáron, amikor virágba borul. A növény kis sárga virágai tavasszal jelennek meg, vonzó látványt nyújtva a méhek és más beporzók számára.
Ez a fajtára jellemző, alacsony növekedés ideálissá teszi sziklakerti ültetésekhez, de remekül mutat edényekben és balkonládákban is. Az aranylevelű borsos varjúháj jól alkalmazkodik a különböző környezeti feltételekhez, és különösen a napfényes helyeken érzi magát a legjobban.
Gondozási útmutató:

Helyválasztás: Napos helyet igényel, de a félárnyékot is jól tolerálja.
Talaj: Jól vízelvezetésű, száraz talajban fejlődik a legjobban.
Öntözés: Szárazságtűrő növény, ritkán igényel öntözést, főleg a nyári hónapokban.
Metszés: Nem igényel rendszeres metszést, de a túlburjánzó részeket időnként érdemes visszavágni.
Tápanyag: Általában nem igényel külön tápanyagot, de a növekedés serkentésére évente egyszer érdemes szerves trágyát adni.

Aranylombú terülő boróka (kicsi)	**Juniperus x media 'Gold Star'**	2 450 Ft	2 450 Ft
Aranysárga menyecskeszem	**Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ültesse kertjébe az Aranysárga menyecskeszem Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind' csodáját! Telt aranysárga virágokkal, könnyen gondozható és méhek kedvence. Tökéletes választás napos kertekbe. Konténeres, egész évben ültethető példányokat postázunk!
Főbb jellemzők
Virágok: Telt vagy féltelt, 5 cm átmérőjű aranysárga fészekvirágok Levelek: Szárnyasan szeldelt, sötétzöld levelek Növekedés: Bokros, felálló habitus
Télállóság: Teljesen télálló (fagytűrő)
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap (napi 6+ óra) – félárnyékban kevesebbet virágzik

Talaj: Laza, jó vízáteresztő, tápanyagban szegény talaj (optimális)

Öntözés: Közepes vízigényű – szárazságtűrő, de fiatalon öntözendő

Metszés: Virágzás után visszavágás új hajtások ösztönzésére

Ültetési tanácsok:

Társítás: Echinacea, Salvia vagy Lavandula fajtákkal kontrasztért

Használat: Évelőágyások, mézelő kertek, vágott virág

Ültetés: 30-40 cm tőtávolsággal, 6-8 db/m² sűrűségben

Kiemelt előnyök
Hosszú virágzás – akár 4 hónapig Mézelő növény – méhek és pillangók kedvence Alacsony karbantartás – betegség- és kártevőmentes
Ez a 'Sonnenkind' valódi színfoltja lesz nyári kertjének – rendelje meg most!

Asco Alga 0,2 l		2 950 Ft	2 950 Ft
Asco Alga 1L	**Biostimuláns tengeri alga az intenzív növekedésért**	6 900 Ft	6 900 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Tanúsítványok:
Az Asco Alga a CerTrust által tanúsított EU engedéllyel rendelkezik, és szerepel az Ecocert bio minősítő cég listáján, mint bio termék.
Tárolás:
A termék 5-30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva és hűtve tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.
Származás:
Az Asco Alga Franciaország északnyugati partjánál kerül betakarításra, ahol a tengervíz rendkívül tiszta, mivel nincs ipari aktivitás a környéken. Fontos, hogy a tenger vize tiszta legyen, mert az algák koncentrálják magukba a tengerből felvehető anyagokat.
Gyártási folyamat:
Az Asco Alga gyártása során nem kerülnek vegyszerek a termékbe. Az algákat tisztítás, majd kíméletes szárítás után nagy nyomással préselik, így nyerve ki belőlük számos hasznos komponenst. Ez a préselési mód képes a sejteket is felnyitni, biztosítva, hogy a bennük található hasznos molekulák is bekerüljenek a kész termékbe.
Kijuttatási útmutató:
A terméket 1-2%-os koncentrációban kell feloldani, vagyis 10L permetléhez 2dl Asco Alga szükséges. A kezelést 2-3 hetente ajánlott megismételni. Kijuttatás során kerülni kell a magas hőmérsékletet (25°C felett) és magas UV sugárzást, mivel ezek fokozzák a perzselés veszélyét. Ideális kijuttatási időszak a késő délután vagy kora reggel.
Dózis:
2 dl Asco Algát 10 liter vízben kell feloldani, és 2%-os koncentrációban ajánlott kijuttatni. Nagyobb dózis nem ajánlott, mert perzselhet. Az Asco Alga száraz, hűvös helyen a szavatosságát 3 évig megőrzi. A termék nagyon sűrű, gyakorlatilag alga krém, de kiválóan oldódik. Az Asco Alga használata nagyobb növekedést és termést eredményez, különösen a gyümölcsök méretének növelésére lehet ideális. Javasolt a kis gyümölcsök megjelenését követően, 2-4 hetente alkalmazni a terméket.
Tárolási információ felbontás után:
Az Asco Alga felbontás után 6 hónapig felhasználható, ha azonnal jól visszazárjuk, és közvetlen napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tároljuk. A felbontás utáni hűtés elengedhetetlen.

További információ a termékről:
A forgalmazó két tengeri alga biostimulánst is kínál a termelők részére. Ahogy a növény fejlődik, a növekedéséhez szükséges növényi hormonok aránya változik. Gyökeresedés és kezdeti növekedés során az auxinra van szükség, így a Kelpak-ot érdemes választani. A minőségi alga termékek számos előnnyel járnak a növény számára, beleértve az aszály, hőstressz, vágási sérülés, tápanyaghiány, megtermékenyülés, színesedés, beltartalom és tárolhatóság javítását.
A tengeri algák rendkívül nehéz körülmények között fejlődnek, mivel az apály-dagály miatt hol vízben, hol a tengerparton találhatóak, hideg és meleg áramlatok váltakoznak körülöttük, és folyamatosan érintkeznek tengeri állatokkal. Az ilyen körülmények között a megfelelő környezet hatására nagyon gyorsan kell növekedniük. Az algák akár 100-szor gyorsabban növekednek, mint a mi szántóföldi növényeink, naponta akár 1 métert is nőhetnek. Az algákban közel 100 féle hasznos bioaktív alkotóelem található, amelyek hozzájárulnak a növény robbanásszerű növekedéséhez.
Kiegészítő termékek alkalmazása:
Első lépés: Tricho Immun kijuttatása Alkalmazd először a Tricho Immun terméket. Ennek szüksége van néhány órára, hogy bejusson a növénybe, és néhány hétre, hogy teljesen elterjedjen és megkezdje a növény belső védelmét és erősítését.
Első lépés kiegészítése: Asco Alga hozzáadása A Tricho Immun alkalmazása mellett az Asco Alga terméket is kijuttathatod, mivel kiválóan kiegészíti a Tricho Immun hatását.
Második lépés: SoftGuard és DanuVital Bio kijuttatása egy héttel később Egy hét elteltével permetezzük ki a SoftGuard terméket együtt a DanuVital Bio-val. Fontos, hogy ez csak a Tricho Immun és az Asco Alga alkalmazása után történjen, hogy elkerüljük a káros kölcsönhatásokat.
Ismétlődő kezelések: SoftGuard kombinációk 2-3 hetente A kezelési ciklusokat 2-3 hetente ismételhetjük, váltogatva a SoftGuard + Asco Alga és a SoftGuard + DanuVital Bio kombinációk között.
Fagy előtti védelem algákkal:
Növeljük növényeink nedv koncentrációját egy másik "növény" sűrítményével. Erre a legjobbak az algás kezelések. Ahogy az emberek is használják az algákat bőrük fiatalságának megőrzésére, erősítésére, valamint táplálék kiegészítőként (spirulina), ugyanúgy alkalmazhatjuk az alga termékeket növényeinken is.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Minőségi alga termékek hatásai:

Tápanyagok azonnali felvétele: A benne lévő tápanyagok – főként mezo- és mikroelemek – azonnal felvehetők a növény számára, csökkentve a tápanyaghiány kialakulását.
Abiotikus stressz csökkentése: Az alga termékekben található betain csökkenti az abiotikus stressz hatásait, mint például a fagy okozta károk.
Energiaforrás: A prémium alga termékekben található lipidek és poliszacharidok energiát adnak a növények számára.

Két minőségi alga termék:

Kelpak: A gyökeresedést és virágzást fokozza.
Asco Alga: Az intenzív növekedést segíti elő.

5000 éves biostimuláns:
Az ókori egyiptomiak már 5000 éve használtak algákat a sivatagi talaj termékenységének javítására. Bár akkor még nem ismerték pontosan az alga hatását, tudták, hogy használatával növényeik többet teremnek.
Az alga kutatása az 1950-es években gyorsult fel, és az alábbi pozitív hatásokat fedezték fel:

Növényi növekedési hormonok: Az algák magas arányban tartalmaznak növényi növekedési hormonokat.
Aminosavak és fehérjék: Az alga termékekben magas az aminosavak és fehérjék mennyisége, amelyek könnyen felhasználható tápanyagforrást jelentenek a növények számára.
Mikroelemek és vitaminok: Az algákban található mikroelemek és vitaminok segítik a növények növekedését.
Biostimuláns vegyületek: A mannitol, abszcizin sav és betain fokozzák az abiotikus stressz ellenállóságot és a tápanyag felvételt.

Tudta, hogy az algák több CO2-őt alakítanak át oxigénné, mint a fák? A tengerek adják a föld közel 70%-át az oxigénnek.
Szőlő kezeléshez:
Kombinált "fegyver":
Metszést követően a lehető leghamarabb és/vagy lombos állapotban kezdjük a szőlőt kezelni a gombás megbetegedések megelőzése érdekében a következő recepttel: 50 g Tricho Immun + 2 dl Asco Alga egy 10-15 literes háti permetezőbe. A Tricho Immunnak sebfelület vagy zöld lombfelület kell a szövetekbe jutáshoz, az Asco Alga szervesanyag tartalma pedig segíti a lombon maradást és a sztómákon való bejutást. A Tricho Immun 100 g-os kiszerelésben kapható, így javasolt a kezelést még egyszer megismételni virágzás előtt.
Tárolási információk:
A terméket 5-30 Celsius fok közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban legalább 36 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után mihamarabb kijuttatandó, de szorosan visszazárva és hűtve tárolva 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.
Dózis:
2 dl Asco Algát 10 liter vízben kell feloldani, és 2%-os koncentrációban ajánlott kijuttatni. Nagyobb dózis nem ajánlott, mert perzselhet. Az Asco Alga száraz, hűvös helyen a szavatosságát 3 évig megőrzi. A termék nagyon sűrű, gyakorlatilag alga krém, de kiválóan oldódik. Az Asco Alga használata nagyobb növekedést és termést eredményez, különösen a gyümölcsök méretének növelésére lehet ideális. Javasolt a kis gyümölcsök megjelenését követően, 2-4 hetente alkalmazni a terméket.
Fagy előtti védelem algákkal:
Növeljük növényeink nedv koncentrációját egy másik "növény" sűrítményével. Erre a legjobbak az algás kezelések. Ahogy az emberek is használják az algákat bőrük fiatalságának megőrzésére és erősítésére, valamint táplálékkiegészítőként (mint a spirulina), ugyanúgy alkalmazhatjuk az alga termékeket növényeinken is.

Ashvi őszirózsa	Aster ageratoides 'Ashvi'	2 750 Ft	2 950 Ft

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Ashvi őszirózsa (Aster ageratoides 'Ashvi') Kelet-Ázsiából származó, erőteljes növekedésű, rizómás évelő. Kifejlett magassága 50–80 cm, szélessége 40–60 cm között alakul, de kedvező helyen ennél nagyobb felületet is beboríthat. Habitása sűrű, bokros, felálló szárakkal, amelyek a virágzás idején a virágok súlya alatt enyhén szétterülnek. Levelei lándzsásak, durva felületűek, sötétzöldek, finoman fogazott szélűek. Virágai aprók, margarétaszerűek, tiszta fehér nyelves virágokkal és élénk sárga központi koronggal, amelyek tömött, dús fürtökben nyílnak a hajtások végén. Virágzása augusztustól októberig tart, és a virágok vonzzák a méheket, lepkéket és más beporzó rovarokat. A növény kiváló talajtakaró képességgel rendelkezik, és rizómái révén fokozatosan terjed, így nagyobb felületeket is képes beborítani.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; a teljes árnyékot is elviseli, de a legtöbb virágot napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri, de a szárazabb időszakokat jól viseli.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, -25 °C és -35 °C közötti hőmérsékletet is elvisel, a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos helyre, jó vízáteresztő talajba. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen, mivel a fajta hajlamos a terjedésre.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és a bokor szétesését okozhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat kora tavasszal, a talajszint közelében vágja vissza. A virágzás után a visszavágás megakadályozza a nem kívánt magszórást és a túlzott terjedést. A nagyobb töveket 3-4 évente érdemes megosztani a bőséges virágzás érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes, a lisztharmatra azonban érzékeny lehet. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket. Az őzek és a nyulak általában elkerülik.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyba, cottage- és informális kertekbe, természetközeli és préri stílusú ültetésekbe, valamint vadvirágos rétekre illik. Kiváló talajtakaróként, mivel sűrű lombozata és bőséges virágzása szőnyegszerű felületet hoz létre. Jól mutat árnyékosabb zugokban is, ahol más évelők nehezebben virágoznak. Kiváló vágott virág, és őszi színfoltként különösen értékes a kertben.
Növénytársítások

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Őszi virágzású évelők: kúpvirág, varfű, sédbúza, naprózsa – hasonló virágzási idővel gazdagítják a kertet. Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak az őszirózsa virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 4–8 (a legtöbb forrás a 4-es zónát jelöli meg alsó határként, -34 °C-ig).			
Avida Blue kárpáti harangvirág	**Campanula carpatica 'Avida Blue'**	1 950 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kárpáti harangvirág 'Avida Blue' (Campanula carpatica 'Avida Blue') – Az élénkkék, bő virágú évelő
A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' a harangvirágfélék (Campanulaceae) családjába tartozó, a Kárpátok hegyvidékeiről származó, évelő lágyszárú növény nemesített változata. A faj a természetben sziklás réteken, hegyi legelőkön fordul elő, ahol a szegényes, meszes talajokhoz és a napos, szeles körülményekhez alkalmazkodott. Az 'Avida Blue' fajta a 'Florentes' sorozat tagja, amelyet a kivételesen kompakt habitus és a bőséges, hosszan tartó virágzás jellemez. Ez a növény a nyár első felétől az őszig nyíló, élénk színű virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a sziklakertekben és konténerekben. A könnyű gondozhatósága, a hosszú virágzási időszaka és a sokoldalú felhasználhatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 15-25 cm, szélessége 20-30 cm között alakul, ami sűrű, párnaszerű vagy szőnyegszerű bokrot eredményez. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások a talajon elfekvők vagy felemelkedők.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek szív alakúak, 4-5 cm hosszúak, sötétzöld színűek, szélük finoman fogazott, a levélnyél hosszú. A tőlevelek nagyobbak, a szárlevelek kisebbek, a levélfelület sima, fényes.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, laza fürt, amelyen a csésze alakú virágok helyezkednek el. A virágok nagyok, 3,5-4 cm átmérőjűek, élénkkék vagy ibolyáskék színűek, a szirmok finoman fogazottak. Az 'Avida Blue' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok intenzív, tiszta kék színe és a rendkívül bőséges virágzás, amely a növényt egész nyáron át díszíti. A virágzási időszak a nyár elejétől a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően júniustól augusztusig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár szeptemberig is meghosszabbítható. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tősosztással) egyaránt szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legbőségesebb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A melegebb éghajlaton a délutáni órákban enyhe árnyékolás előnyös a virágzás meghosszabbítása érdekében.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, meszes, közepesen termékeny, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' közepes vízigényű; a rendszeres, mérsékelt öntözést kedveli, de a rövid szárazságot is elviseli. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. A vegetációs időszakban (tavasztól nyár közepéig) 2-4 hetente adjunk neki virágzó növények számára kifejlesztett folyékony műtrágyát a bőséges virágzás serkentése érdekében. A túlzott nitrogéntrágyázás kerülendő, mert az a lombozat rovására megy.

Metszés és ápolás: A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A növény 3-4 évente történő tősosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését és a virágzás gyengülését.

Telelés és fagytűrés: A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' kifejezetten kiváló télállóságú; az USDA 4-9-es zónákban nevelhető, akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény részben örökzöld, a lombozat télen részben megmaradhat, de a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' az élénk színű virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (15-25 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Talajtakarónak napos vagy félárnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kárpáti harangvirág 'Avida Blue' élénkkék virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a kék virágokat.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis) – a kék és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Fehér virágú növényekkel: Fehér harangvirág fajtákkal – a kék és a fehér szívek elegáns, tiszta hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Árvalányhaj (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a harangvirág tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a kárpáti harangvirág 'Avida Blue' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Meta leírás

Avida White kárpáti harangvirág	**Campanula carpatica 'Avida White'**	1 950 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Avida White kárpáti harangvirág (Campanula carpatica 'Avida White') – A tiszta fehér, bő virágú évelő
A kárpáti harangvirág 'Avida White' a harangvirágfélék családjába tartozó, a Kárpátok hegyvidékeiről származó, évelő lágyszárú növény nemesített változata. A faj a természetben sziklás réteken, hegyi legelőkön fordul elő, ahol a szegényes, meszes talajokhoz és a napos, szeles körülményekhez alkalmazkodott. Az 'Avida White' fajta a 'Florentes' sorozat tagja, amelyet a kivételesen kompakt habitus és a bőséges, hosszan tartó virágzás jellemez. Ez a növény a nyár első felétől az őszig nyíló, tiszta fehér virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a sziklakertekben és konténerekben. A könnyű gondozhatósága, a hosszú virágzási időszaka és a sokoldalú felhasználhatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A kárpáti harangvirág 'Avida White' egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 15-25 cm, szélessége 20-30 cm között alakul, ami sűrű, párnaszerű vagy szőnyegszerű bokrot eredményez. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások a talajon elfekvők vagy felemelkedők.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek szív alakúak, 4-5 cm hosszúak, sötétzöld színűek, szélük finoman fogazott, a levélnyél hosszú. A tőlevelek nagyobbak, a szárlevelek kisebbek, a levélfelület sima, fényes.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, laza fürt, amelyen a csésze alakú virágok helyezkednek el. A virágok nagyok, 3,5-4 cm átmérőjűek, tiszta fehér színűek, a szirmok finoman fogazottak. Az 'Avida White' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok tiszta, elegáns fehér színe és a rendkívül bőséges virágzás, amely a növényt egész nyáron át díszíti. A virágzási időszak a nyár elejétől a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően júniustól augusztusig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár szeptemberig is meghosszabbítható. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tőosztással) egyaránt szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kárpáti harangvirág 'Avida White' napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legbőségesebb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A melegebb éghajlaton a délutáni órákban enyhe árnyékolás előnyös a virágzás meghosszabbítása érdekében.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, meszes, közepesen termékeny, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A kárpáti harangvirág 'Avida White' közepes vízigényű; a rendszeres, mérsékelt öntözést kedveli, de a rövid szárazságot is elviseli. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok szárazságtűrőbbek, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. A vegetációs időszakban (tavasztól nyár közepéig) 2-4 hetente adjunk neki virágzó növények számára kifejlesztett folyékony műtrágyát a bőséges virágzás serkentése érdekében. A túlzott nitrogéntrágyázás kerülendő, mert az a lombozat rovására megy.

Metszés és ápolás: A kárpáti harangvirág 'Avida White' alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését és a virágzás gyengülését.

Telelés és fagytűrés: A kárpáti harangvirág 'Avida White' kifejezetten kiváló télállóságú; akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény részben örökzöld, a lombozat télen részben megmaradhat, de a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A kárpáti harangvirág 'Avida White' a tiszta fehér virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (15-25 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Talajtakarónak napos vagy félárnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kárpáti harangvirág 'Avida White' tiszta fehér virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Kék virágú növényekkel: Kék harangvirág fajtákkal, macskamentával – a fehér és a kék szívek elegáns, friss kontrasztot alkotnak.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem – a fehér és a sárga szívek vidám, napsütötte hatást keltenek.

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm, kék csenkesz – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a fehér virágokat.

Díszfüvekkel: Árvalányhaj – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a harangvirág tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 3-8 (Magyarországon a kárpáti harangvirág 'Avida White' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Babygold menyecskeszem	**Coreopsis lanceolata 'Babygold'**	1 950 Ft	2 350 Ft

A Babygold menyecskeszem (Coreopsis lanceolata 'Babygold') egy népszerű és gyönyörű évelő növény, amely vidám, élénk sárga virágaival varázsolja el a kerteket. A növény 30-45 cm magasra nő, és sűrű, bokros növekedése miatt ideális választás a virágágyásokban és szegélyekben. A levelek keskenyek, világos zöld színűek, amelyek szép kontrasztot alkotnak a világos sárga virágokkal.
A virágzás időszaka áprilistól augusztusig tart, ezzel hosszú ideig frissességet biztosít a kertnek. A 'Babygold' fajta virágai bájos, fészkes formájúak, amelyek vonzzák a méheket, pillangókat és más beporzó rovarokat, ezáltal segítve a biodiverzitás fenntartását a kertben.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Menyecskeszem napfénykedvelő növény, amely legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a bőséges virágzás érdekében.
Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legelőnyösebb számára. A növény jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz.
Öntözés: Rendszeresen öntözzük a növényt a fiatal példányok esetében, különösen a forró időszakokban. Az idősebb növények jól bírják a szárazságot.
Trágyázás: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágya használata javasolt a virágzás serkentésére.
Téliesítés: A Menyecskeszem fagyálló, de az ősz folyamán ajánlott visszavágni a virágzó szárakat a friss hajtások elősegítése érdekében tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A Menyecskeszem kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, ahol színt és textúrát ad a kompozíciónak.
Sziklakerti ültetvényekben is tökéletesen megállja a helyét, ahol a virágok szép kontrasztot alkothatnak a kövekkel.
Szegélyezésre, kerítések és utak mentén is fantasztikusan mutat, mivel a virágok hosszú ideig virágoznak.

A Menyecskeszem (Coreopsis lanceolata 'Babygold') nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is kiemelkedik, így ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni a kertjét.

Babylone laposbarack	**Persica vulgaris Babylone (R)**	5 300 Ft	5 300 Ft

A Babylone egy fehér húsú védett laposbarack fajta, amelyet középszezonban szüretelnek. A PSB (Spanyolország) termesztési programjából származik. Virágzása nagyon bőséges. Gyümölcsmérete a nagyobbak közé tartozik és formája egyenletesen lapos. Íze nagyon édes, aromás ízű. Gyümölcsszíne tetszetős, a felület legnagyobb részén sötétpiros.
Konténeres növényeket küldünk!

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Ballerina hamvas gólyaorr	Geranium cinereum 'Ballerina'	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Ballerina hamvas gólyaorr (Geranium cinereum 'Ballerina') a hamvas gólyaorr egyik legismertebb, alacsony termetű fajtája, amelyet Alan Bloom nemesített Angliában. Sűrű, párnás, talajon elterülő tövet képez, amelynek hajtásai rövid száron emelkednek a lombozat fölé. Kifejlett magassága 10–15 cm, szélessége 20–40 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, és idővel szép, összefüggő foltot alkotnak. Levelei kerekdedek, mélyen karéjosak, hamvaszöld-szürkészöld színűek, finoman szeldeltek, és enyhe, kellemes illatot árasztanak; a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad.
A virágzat a hajtások végén nyílik, a virágok csésze alakúak, halvány rózsaszín-lila színűek, sötétlila vagy bíbor erezettel, és a virágok közepe sötétebb árnyalatú. A virágok átmérője mintegy 3 cm. Virágzása kora tavasztól (május elejétől) nyár elejéig (júliusig) tart, majd a nyár folyamán szórványosan újabb virágok jelenhetnek meg. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek, poszméheknek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a forró délutáni napsütéstől védett helyen is szépen fejlődik.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár meszes, homokos vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; a kifejlett növény rövidebb szárazságot is elvisel, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Az USDA 4–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást és serkenti az új bimbók képződését. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, ami friss lombozatot és egy esetleges másodvirágzást eredményez. A régi, elhalt leveleket kora tavasszal távolítsa el.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a csigák, a levéltetvek és a kabócák kisebb kárt okozhatnak. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel, és ritkán lisztharmat vagy levélfoltosság jelentkezhet.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, ágyásszegélybe, mediterrán hangulatú kertekbe, természetközeli és vadvirágos rétekre, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is kiváló választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő, lágy rózsaszín színfoltot ad a kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Növénytársítások			
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Alacsony évelők: kövirózsa, varjúháj, szegfű, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a gólyaorr tömör habitusát.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a gólyaorr virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4–8.			
Balmy Pink méhbalzsam	**Monarda didyma 'Balmy Pink'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Balmy Pink méhbalzsam (Monarda didyma 'Balmy Pink') – A kompakt, lisztharmat-ellenálló évelő
A Balmy Pink méhbalzsam az árvacsalánfélék családjába tartozó, Észak-Amerika keleti részén őshonos, évelő lágyszárú növény nemesített változata. A faj a természetben nedves erdőkben, bozótosokban és patakpartokon fordul elő, ahol a nedves, humuszos talajokhoz alkalmazkodott. A 'Balmy Pink' fajta a Balmy sorozat tagja, amelyet a kivételesen kompakt habitus, a korai virágzás és a kiemelkedő lisztharmat-ellenállóság jellemez. Ez a növény a nyár közepétől az őszig nyíló, feltűnő rózsaszín virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a konténerekben és a kis kertekben. A könnyű gondozhatósága, a magas kártevő-ellenállósága és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Balmy Pink méhbalzsam egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 25-30 cm, szélessége 20-25 cm között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. Növekedési erélye közepes, a hajtások egyenesen felállók, a növény nem omlik szét.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei, és egyben az illat forrásai. A levelek lándzsásak, 5-10 cm hosszúak, sötétzöld színűek, a levél széle finoman fogazott, a levélfelület enyhén szőrözött. Olajmirigyeket tartalmaznak, amelyek a jellegzetes, kellemes mentás-bazsalikomos, enyhén citromos illatot adják. A levelek megdörzsölve erős, fűszeres illatot árasztanak.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, sűrű, gömbölyded fejecske, amelyet feltűnő, lilás árnyalatú murvalevelek vesznek körül. A virágok aprók, csövesek, kétajkúak, a felső ajak sisakszerű, az alsó ajak háromkaréjú. A 'Balmy Pink' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok élénk, bozontos rózsaszín színe, amely a kertben feltűnő, vidám hatást kelt. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően júliustól szeptemberig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár októberig is meghosszabbítható. A virágok a méheket, a pillangókat és a kolibriket vonzzák, és a növény a beporzók valóságos mágneseként működik.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, barnás színű toktermést fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tőosztással, hajtásdugványozással) egyaránt szaporítható. A tőosztás 2-3 évente javasolt a növény vitalitásának fenntartása érdekében.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Balmy Pink méhbalzsam napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó, humuszban gazdag, tápanyagdús talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, mert a kiszáradást nem kedveli.

Öntözés: A Balmy Pink méhbalzsam közepes vagy magas vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, különösen a virágzási időszakban. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén (március-április) adjunk neki egy réteg (3-5 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva, vagy egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágyát. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők, mert az a virágzás rovására megy.

Metszés és ápolás: A Balmy Pink méhbalzsam alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 5-10 cm-es magasságúra, hogy elősegítsük a telelést és a következő évi erőteljes újrahajtást. A növény 2-3 évente történő tőosztása tavasszal javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését.

Telelés és fagytűrés: A Balmy Pink méhbalzsam kifejezetten kiváló télállóságú; akár -28,9°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lágyszárú, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt. Fontos, hogy a téli talaj ne legyen pangó vizes, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Balmy Pink méhbalzsam a feltűnő rózsaszín virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (25-30 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Természetes hatású kertekbe, prérikertbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Városi kertekbe, udvarokba – jól tűri a városi környezetet.

Tömeges telepítésbe – a sűrű, bokros növekedés és a hosszú virágzás miatt kiváló választás nagyobb felületekre.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Balmy Pink méhbalzsam rózsaszín virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, nedves, humuszos talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a rózsaszín virágokat.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis), kúpvirág (Rudbeckia) – a rózsaszín és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Lila és kék virágú növényekkel: Izsópfű (Agastache), kasvirág (Echinacea) – a hasonló prérihangulatú növényekkel együtt harmonikus, színpompás együttest alkotnak.

Díszfüvekkel: Tollbuga (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a méhbalzsam tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a Balmy Pink méhbalzsam teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -28,9°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Balmy Purple Red ajakos méhbalzsam	**Monarda dydima 'Balmy Purple Red'**	2 450 Ft	2 950 Ft

A Balmy Purple Red ajakos méhbalzsam (Monarda dídima 'Balmy Purple Red') egy mutatós, nálunk kevésbé ismert évelő. Az alakos méhbalzsamok Amerikából származnak, és ott folytatnak komoly nemesítési munkát, melynek eredményeként kompakt, élénk színváltozatú virágzattal, és a lisztharmat ellen ellenálló lombozattal rendelkező növényeket igyekeznek nemesíteni. A Balmy Purple nevű fajtával igazán jó munkát végeztek. Igazi csemege lehet kertbarátok számára. Kiválóan mutat vegyes kiültetésekben, de homogén foltokba telepítve is gyönyörű, egyből felhívja magára a figyelmet.
20-30 cm magasra nő, legjobban jó tápanyag ellátottságú talajon érzi magát, és mérsékelten szárazságtűrő, erős napot is elviseli, de a délután nem árt, ha árnyék vetül rá. A nehéz kötött talajokat is tűri, de jobban működik lazább termőközegekben. A virágokat elnyílást követően érdemes eltávolítani, és kissé visszacsípni a növényt, így újra virágzásra serkenthetjük.
3-4 évente fel lehet szedni a töveket, és szétosztani azokat, így a környéken élőket is elláthatjuk extra virágokkal J
Társítható a pompás ligetszépével, gólyaorrokkal, tűzeső fajtákkal, sásliliomokkal, vagy alacsony díszfüvekkel is, esetleg kasvirág fajtákkal.

Balmy Purple Red bíboros méhbalzsam	**Monarda didyma 'Balmy Purple Red'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Balmy Purple Red bíboros méhbalzsam (Monarda didyma 'Balmy Purple Red', más néven 'Balbalmurp') a bíboros méhbalzsam törpe, kompakt fajtája, amely sűrű, bokros, alacsony tövet képez. Kifejlett magassága 25–30 cm, szélessége 20–30 cm között alakul; a tövek a tövüknél sűrű csomót alkotnak, a hajtások felállók, és virágzáskor a fészekvirágzatok sűrű csoportokban borítják be a bokrot. Levelei lándzsásak, sötétzöldek, aromásak, megdörzsölve jellegzetes, mentára és bazsalikomra emlékeztető illatot árasztanak.
A virágzat gömbölyded, tömött fészekvirágzat, amelyet mutatós, vöröseslila murvalevelek öveznek. A fészekvirágzatot nyelves virágok (a látványos „szirmok”) és csöves virágok (a központi, tűszerű rész) alkotják; a virágok élénk vöröseslila-bíborvörös színűek, és a fészek átmérője mintegy 5 cm. Virágzása késő tavasztól nyár elejéig tart, a fő virágzási időszak mintegy 8 hét, majd a nyár folyamán szórványosan újabb virágok jelenhetnek meg. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek, poszméheknek és lepkékenek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a forró nyári klímán a délutáni árnyékot is meghálálja.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, nyirkos, közepesen termékeny talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, de a nehéz, agyagos talajt is elviseli.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-magas; a talajt folyamatosan enyhén nyirkosan kell tartani, a nyári száraz időszakokban rendszeres öntözést igényel. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Télállóság: Az USDA 4–9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen, mert a fajta kompakt, de sűrű tövet képez.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a talaj folyamatos enyhe nedvesen tartása ideális; száraz időszakokban hetente alaposan locsolja meg. Kerülje a lombozat felülről történő öntözését, mert ez elősegíti a gombás betegségek kialakulását.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, ami serkenti az új hajtásokat és egy esetleges másodvirágzást; kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt a régi, elhalt szárakat ismét vágja vissza. A töveket 3–4 évente érdemes megosztani a vitalitás és a tömör habitus megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: A lombozat a lisztharmattal szemben kiemelkedően ellenálló, de a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság tovább csökkenti a gombás betegségek kockázatát. A csigák tavasszal kisebb kárt okozhatnak. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, beporzóbarát kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a tömött, vöröseslila virágzatok és a rendezett habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Növénytársítások			
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a méhbalzsam tömör virágzatát.			
Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a méhbalzsam virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4-9.			
Balmy Rose bíboros méhbalzsam	**Monarda didyma 'Balmy Rose'**	2 450 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Balmy Rose bíboros méhbalzsam (Monarda didyma 'Balmy Rose') a bíboros méhbalzsam törpe, kompakt fajtája, amely sűrű, bokros, alacsony tövet képez. Kifejlett magassága 23–30 cm, szélessége 20–40 cm között alakul; a tövek a tövüknél sűrű csomót alkotnak, a hajtások felállók, és virágzáskor a fészekvirágzatok sűrű csoportokban borítják be a bokrot. Levelei lándzsásak, sötétzöldek, aromásak, megdörzsölve jellegzetes, mentára és bazsalikomra emlékeztető illatot árasztanak.
A virágzat gömbölyded, tömött fészekvirágzat, amelyet mutatós, rózsás árnyalatú murvalevelek öveznek. A fészekvirágzatot nyelves virágok (a látványos „szirmok") és csöves virágok (a központi, tűszerű rész) alkotják; a virágok rózsaszín-bíborrózsaszín színűek, és a fészek átmérője mintegy 5 cm. Virágzása késő tavasztól nyár elejéig tart, a fő virágzási időszak mintegy 8 hét, majd a nyár folyamán szórványosan újabb virágok jelenhetnek meg. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek, poszméheknek és lepkékenek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a forró nyári klímán a délutáni árnyékot is meghálálja.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, nyirkos, közepesen termékeny talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, de a nehéz, agyagos talajt is elviseli.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-magas; a talajt folyamatosan enyhén nyirkosan kell tartani, a nyári száraz időszakokban rendszeres öntözést igényel. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Télállóság: Az USDA 4–9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen, mert a fajta kompakt, de sűrű tövet képez.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a talaj folyamatos enyhe nedvesen tartása ideális; száraz időszakokban hetente alaposan locsolja meg. Kerülje a lombozat felülről történő öntözését, mert ez elősegíti a gombás betegségek kialakulását.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, ami serkenti az új hajtásokat és egy esetleges másodvirágzást; kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt a régi, elhalt szárakat ismét vágja vissza. A töveket 3–4 évente érdemes megosztani a vitalitás és a tömör habitus megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: A lombozat a lisztharmattal szemben feltűnően ellenálló, de a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság tovább csökkenti a gombás betegségek kockázatát. A csigák tavasszal kisebb kárt okozhatnak. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, beporzóbarát kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a tömött, rózsaszín virágzatok és a rendezett habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben. Konténerben a „spiller-thriller-filler"

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
kombinációkban filler (kitöltő) szerepet tölt be. Növénytársítások Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a méhbalzsam tömör virágzatát. Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót. Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a méhbalzsam virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 4–9.			
Balmy rózsaszín méhbalzsam	**Monarda dydima 'Balmy Rose'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Balmy rózsaszín méhbalzsam (Monarda didyma 'Balmy Rose') – A kompakt, lisztharmat-ellenálló évelő

A Balmy rózsaszín méhbalzsam az árvacsalánfélék családjába tartozó, Észak-Amerika keleti részén őshonos, évelő lágyszárú növény nemesített változata. A faj a természetben nedves erdőkben, bozótosokban és patakpartokon fordul elő, ahol a nedves, humuszos talajokhoz alkalmazkodott. A 'Balmy Rose' fajta a Balmy sorozat tagja, amelyet a kivételesen kompakt habitus, a korai virágzás és a kiemelkedő lisztharmat-ellenállóság jellemez. Ez a növény a nyár első felétől az őszig nyíló, feltűnő rózsaszín virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a konténerekben és a kis kertekben. A könnyű gondozhatósága, a magas kártevő-ellenállósága és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Balmy Rózsaszín méhbalzsam egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 25-30 cm, szélessége 20-25 cm között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. Növekedési erélye közepes, a hajtások egyenesen felállók, a növény nem omlik szét.

A levelek a növény alapvető díszítő elemei, és egyben az illat forrásai. A levelek tojásdadok vagy lándzsásak, 5-10 cm hosszúak, sötétzöld színűek, a levél széle finoman fogazott. A levélfelület enyhén szőrözött, és olajmirigyeket tartalmaz, amelyek a jellegzetes, kellemes mentás-bazsalikomos illatot adják. A levelek megdörzsölve erős, fűszeres illatot árasztanak.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 2-3 cm átmérőjű, sűrű, gömbölyded fejecske, amelyet feltűnő murvalevelek vesznek körül. A virágok aprók, csövesek, kétajkúak, a felső ajak sisakszerű, az alsó ajak háromkaréjú. A 'Balmy Rose' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok élénk, bozontos rózsaszín színe, amely a kertben feltűnő, vidám hatást kelt. A virágzási időszak a késő tavasztól a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően májustól júliusig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával (deadheading) a virágzás meghosszabbítható. A virágok a méheket, a pillangókat és a kolibriket vonzzák, és a növény a beporzók valóságos mágneseként működik. A növény nem képez magot, így nem terjed önvetéssel.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A 'Balmy Rose' fajta steril, nem képez életképes magokat, így a kertben nem terjed önvetéssel. A növény vegetatív úton (tőosztással, hajtásdugványozással) szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Balmy Rózsaszín méhbalzsam napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény a legjobban a jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó, humuszban gazdag, tápanyagdús, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, mert a kiszáradást nem kedveli.

Öntözés: A Balmy Rózsaszín méhbalzsam közepes vagy magas vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, különösen a virágzási időszakban. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. A vegetációs időszakban (tavasztól nyár közepéig) 4-6 hetente adjunk neki kiegyensúlyozott, virágzó növények számára kifejlesztett folyékony műtrágyát. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők, mert az a virágzás rovására megy.

Metszés és ápolás: A Balmy Rózsaszín méhbalzsam alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 5-10 cm-es magasságúra, hogy elősegítsük a telelést és a következő évi erőteljes újrahajtást. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt.

Telelés és fagytűrés: A Balmy Rózsaszín méhbalzsam kifejezetten kiváló télállóságú; akár -28,9°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lágyszárú, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt. Fontos, hogy a téli talaj ne legyen pangó vizes, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A Balmy Rózsaszín méhbalzsam a feltűnő rózsaszín virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (25-30 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Természetes hatású kertekbe, prérikertbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Városi kertekbe, udvarokba – jól tűri a városi környezetet.

Tömeges telepítésbe – a sűrű, bokros növekedés és a hosszú virágzás miatt kiváló választás nagyobb felületekre.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Balmy Rózsaszín méhbalzsam rózsaszín virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, nedves, humuszos talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a rózsaszín virágokat.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis), kúpvirág (Rudbeckia) – a rózsaszín és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Fehér virágú növényekkel: Fehér évelőkkel – a rózsaszín és a fehér szívek elegáns, tiszta hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollbuga (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a méhbalzsam tömöttebb, bokros formáját.

Iriszekkel, nőszirommal, teknősbékafűvel (Chelone) – a hasonló termőhelyi igényű növényekkel együtt harmonikus, színpompás együttest alkotnak.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a Balmy Rózsaszín méhbalzsam teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -28,9°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Bergsteentijm mirigyes pereszlény	**Calamintha nepeta 'Bergsteentijm'**	2 750 Ft	2 750 Ft

A mirigyes pereszlény rendkívül könnyen gondozható, ha néhány alapvető igényét figyelembe veszi.

Fény- és talajigény: Napos fekvés a legideálisabb a gazdag virágzásért

. A talaj legyen jó vízelvezetésű, mert a pangó vizet egyáltalán nem kedveli

Vízigény: Szárazságtűrő, meggyökeresedés után minimális öntözést igényel

Metszés: Elvirágzás után visszavágással sűrűbbé tehető és megelőzhető a magvetés

Felhasználás: Kiváló talajtakaró, szegélynövény, illatos méhlegelő, de ültethető sziklakertekbe és cserépbe is

. Leveleiből készült tea gyomorerősítő és puffadáscsökkentő hatású.

Bíbor levelű labradori ibolya	**Viola labradorica 'Purpurea'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Bíborlevelű labradori ibolya (Viola labradorica 'Purpurea') – A bíborlevelű, talajtakaró ibolya
A bíborlevelű labradori ibolya az ibolyafélék (Violaceae) családjába tartozó, Észak-Amerika északkeleti részéről és Grönlandról származó, alacsony termetű, évelő növény. A 'Purpurea' fajtajelzés a levelek jellegzetes bíboros színére utal. Napjainkban a szakirodalom és a kertészeti gyakorlat gyakran Viola riviniana Purpurea Group néven említi, mivel a bíborlevelű labradori ibolya néven forgalmazott növények többsége valójában a közönséges erdei ibolya bíbor levelű változata. Ez a növény egész évben mutatós, bíbor színű lombozatával és tavaszi virágaival az egyik legkedveltebb talajtakaró a félárnyékos és árnyékos kertekben. A könnyű gondozhatósága, gyors terjedése és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A bíborlevelű labradori ibolya egy alacsony termetű, futószáras, örökzöld évelő növény. Kifejlett magassága 8-15 cm között alakul, szélessége 20-30 cm, ami sűrű, párnaszerű vagy szőnyegszerű gyepet eredményez. A növény futószárakkal és önvetéssel egyaránt terjed, és gyorsan, természetes hatású talajtakarót képez.
A levelek a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A levelek szív alakúak, 1-3 cm hosszúak, szélük lekerekítetten fogazott. A 'Purpurea' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek bíboros, bronzos vagy sötétbordó színe, amely a növényt egész évben dekoratívvá teszi. A színintenzitás függ a fényviszonyoktól: napos helyen a legsötétebb, legintenzívebb a bíbor szín; félárnyékban a levelek zöldesebb árnyalatúak lehetnek. A lombozat télen is megmarad.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a levélzettől kissé megemelkedve, rövid száron nyílnak. A virágok aprók, 1-2 cm átmérőjűek, szabálytalan alakúak, a jellegzetes ibolyaformával, az alsó szirom alatt egy mély, nektárt gyűjtő sarkantyúval. A 'Purpurea' fajta virágainak színe világos ibolyáskék, porcelánkék vagy halványlila, a közepükön fehér folttal. A virágzási időszak kora tavasztól késő tavaszig tart: Magyarországon jellemzően áprilistól júniusig, a legbőségesebb virágzás májusban figyelhető meg. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, háromrekeszű toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (futószarakkal, tőosztással) egyaránt szaporítható. A növény a kertben önmagát is szaporíthatja, ami természetes hatású, gyors terjedést eredményez.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A bíborlevelű labradori ibolya félárnyékos fekvést kedveli, de napos helyen is termeszthető, ahol a levelek színe intenzívebbé válik. A napi 3-4 óra közvetlen napsütés vagy a szórt fény az optimális. Teljes árnyékban a lombozat színe kevésbé intenzív, zöldesebb lehet, és a virágzás is gyengébb lehet.

Talaj: A bíborlevelű labradori ibolya a legjobban a humuszban gazdag, jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a hosszan tartó szárazságot is kerülni kell.

Öntözés: A bíborlevelű labradori ibolya mérsékelt vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, különösen a fiatal növényeknél és a virágzási időszakban. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. A begyökeresedett példányok a rövid szárazságot is elviselik, de a tartós szárazság a levelek hervadásához és a virágzás gyengüléséhez vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: A bíborlevelű labradori ibolya alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A bíborlevelű labradori ibolya alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A növény ápolása a következőkre korlátozódik:

Tisztító metszés: Tavasszal távolítsuk el az elhalt, fagykárosodott vagy sérült leveleket. Ez serkenti az új, egészséges levelek növekedését, és a növényt rendezett, dekoratív megjelenésűvé teszi.

Visszavágás: A virágzási időszak végén (június után) a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 5-8 cm-es magasságúra. Ez serkenti az újabb lombozat növekedését és az esetleges másodvirágzást.

Tőosztás: A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését, a virágzás gyengülését és a túlzott terjedést.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Telelés és fagytűrés: A bíborlevelű labradori ibolya kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -25°C és -30°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad, de a hidegebb időszakokban a levelek színe enyhén bronzos vagy lilás árnyalatot kaphat, ami normális jelenség.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A bíborlevelű labradori ibolya a bíbor színű, örökzöld lombozatának, alacsony termetének, gyors terjedésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb talajtakaró évelő:

Talajtakaróként fák és cserjék alá – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Sziklakertekbe, kőkertekbe, szegélyágyások előterébe – a kompakt méret és a feltűnő szín miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Évelőágyások szegélyezésére – a bíbor lombozat és a halványkék virágok szépen keretezik a magasabb évelőket.

Természetes hatású kertekbe, erdei kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, és kiválóan illik az árnyékos, erdei környezethez.

Sírkertekbe – az örökzöld lombozat és a finom virágok miatt gyakran választott sírkerti növény.

Társítónövényként – más árnyéki növényekkel (páfrányok, hosták) kombinálva gazdag, textúrákban változatos hatást keltenek.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A bíborlevelű labradori ibolya bíbor színű lombozata és halványkék virágai számos más, hasonló termőhelyi igényű (félárnyékos, humuszos, enyhén nedves talajú) növénnyel kombinálhatók:

Páfrányokkal: Erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) – a páfrányok finoman szeldelt, világoszöld lombozata kiváló kontrasztot alkot a bíbor levelű ibolyával.

Hostákkal (Hosta) – a hosták nagy, dekoratív, zöld vagy kékes-szürke levelei szépen kiegészítik az ibolya sötét, bíbor színét.

Árnyéki füvekkel: Erdei sédbúza (Deschampsia cespitosa) – a díszfű lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti az ibolya tömöttebb, szőnyegszerű formáját.

Sárga virágú növényekkel: Erdei boglárka (Ranunculus ficaria) – a sárga és a bíbor szívek élénk kontrasztot alkotnak.

Fehér virágú növényekkel: Fehér erdei ibolya (Viola riviniana 'Alba') – a fehér és a bíbor szívek elegáns, tiszta hatást keltenek.

USDA besorolása: 2-8 (Magyarországon a bíborlevelű labradori ibolya teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -25°C és -30°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Bíborlevelű bugatölcsér	**Penstemon digitalis Husker's Red**	1 950 Ft	2 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel a Penstemon digitalis 'Husker Red' - Bíborlevelű Bugatölcsér különlegességét! Sötétbíbor levelek és fehér virágok tökéletes kontrasztja. Télálló, szárazságtűrő és méhek kedvence. Konténeres példányaink egész évben ültethetők!
Főbb jellemzők
Levelek: Mély bíborvörös színű, lándzsás alakú levelek Virágok: Fehér, harang alakú virágok rózsaszín árnyalattal Növekedés: Felálló, tömött habitus
Télállóság: -30°C-ig ellenálló (3-8. tűrési zóna)
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap (napi 6+ óra) – árnyékban gyengébben virágzik

Talaj: Jól átázó, laza talaj (pH 5.5-7.5)

Öntözés: Közepes vízigényű – szárazságtűrő érett korban

Metszés: Tavasszal visszavágás az új hajtások ösztönzésére

Ültetési tanácsok:

Társítás: Kék virágú évelőkkel (pl. Nepeta) vagy aranylevelű félcserjékkel

Használat: Évelőágyás, vadkert, mézelő kert

Ültetés: 40-50 cm távolságra, 3-5 db/m²

Kiemelt előnyök
Látványos levél- és virágszín – egész évben díszít Mézelő növény – méhek és lepkék kedvence Szárazságtűrő – kevés öntözést igényel
Ez a Penstemon 'Husker Red' tökéletes választás azoknak, akik látványos színkontrasztot és könnyen gondozható növényt keresnek. Rendeljen most, és élvezze nyáron a fehér virágok és bíborlevelek gyönyörű kombinációját!

Bíborszín virágú kökörcsin	**Pulsatilla vulgaris 'Pulsar Red Shades'**	2 350 Ft	2 750 Ft

A Pulsatilla vulgaris 'Pulsar Red Shades' valódi gyöngyszem a tavaszi kertekben, bordó virágfejeivel, amelyek már a tavasz elején megjelennek, hirdetve a meleg időszak közeledtét. A virágok gyönyörű, tollas levelek között bontakoznak ki, amelyek különleges textúrát adnak a növénynek. Alacsony növekedésű, 20-30 cm magasságra nő, és 30-40 cm szélességet is elérhet, ami tökéletes a szegélyezéshez és a sziklakertek díszítéséhez.
Gondozási útmutató: A tavaszi kökörcsin a napos vagy félárnyékos helyeket kedveli, jól áteresztő, szárazabb talajban érzi magát a legjobban. Fontos, hogy ne legyen túlöntözve, mivel érzékeny a pangó vízre. Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy serkentsük az új virágzást. Tavasz végén a levelek visszavágása segít a növény egészséges növekedésében és ápolásában.
Ajánlott kertstílus: A 'Pulsar Red Shades' ideális választás sziklakertbe, gyógynövénykertekbe vagy angolkertbe, ahol jól mutat más korai virágzó évelőkkel, például tavaszi hóvirágokkal vagy ibolyákkal.

Bíborszínű lizinka	**Lysimachia atropurpurea**	1 950 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel a BíborszínűLizinka - Lysimachia atropurpurea különlegességét! Sötétbíbor virágfüzérekkel és elegáns leveleivel, tökéletes évelőágyásokba. Könnyen gondozható, télálló növény. Konténeres példányaink egész évben ültethetők!
Főbb jellemzők
Virágok: Hosszú, sötétbíbor virágfüzérekkel, melyek kontrasztot alkotnak világosabb növényekkel Levelek: Lándzsás alakú, sötétzöld levelek elegáns csoportosulásban Növekedés: Függőleges habitus, tömött csomókban fejlődik Télállóság: -25°C-ig ellenálló (5-8. tűrési zóna)
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap vagy félárnyék (napi 4-6 óra napfény)

Talaj: Nedves, jó átázó, humuszban gazdag talaj (pH 5.5-7.0)

Öntözés: Közepes-nagy vízigényű - nedves talajt kedvel

Metszés: Tavasszal visszavágás az új hajtások ösztönzésére

Ültetési tanácsok:

Társítás: Fehér virágú évelőkkel (pl. Gypsophila) vagy ezüstlevelű félcserjékkel

Használat: Évelőágyások, természetes kertek, vízparti ültetések

Ültetés: 30-40 cm távolságra, 5-7 db/m² sűrűségben

Kiemelt előnyök
Látványos virágfüzérekkel - különleges színkontraszt Hosszú virágzási idő - akár 3 hónapig Nedves talajt kedvelő - vízparti területekre ideális Télálló - téli védelem nélkül is túlél

Téli védelem: Északi régiókban mulcolás ajánlott

Dísznövényként: Kiválóan mutat vágott virágként is

Rovarbarát: Méhek és pillangók kedvence

Válassza ezt a különleges fajtát, és varázsolja át kertjét színes paradicsommá!

Big Time Happy sásliliom	Hemerocallis 'Big Time Happy'	3 250 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Big Time Happy sásliliom (Hemerocallis 'Big Time Happy') a sásliliomok egyik legmegbízhatóbb, folyamatosan virágzó fajtája, amelyet Darrel Apps és Betty Blew nemesített, és 1993-ban mutattak be. Kompakt, sűrű, bokros tövet képez, amelynek keskeny, ívelt, fűszerű levelei a tövénél sűrű, tömött lombozatot alkotnak, és ősszel visszahúzódnak. Kifejlett magassága 40–50 cm, szélessége 45–60 cm között alakul; a virágzati szárakkal együtt a magasság elérheti az 50–60 cm-t is. Levelei keskenyek, szalagszerűek, élénkzöldek, és a növény habitusa rendezett, szépen ívelt.
A virágzat a merev, felálló szárak végén nyílik; a virágok tölcsér alakúak, citromsárga-kanárisárga színűek, zöld torokkal és finoman fodrozott szélekkel. A virágok átmérője mintegy 10–12 cm, és kellemes, finom illatot árasztanak. Virágzása június végétől júliusig tart, majd a nyár folyamán újabb virágzási hullámok következnek, amelyek egészen a fagyokig (októberig–novemberig) eltarthatnak – ez a fajta a kevés valóban folyamatosan virágzó sásliliom egyike. Az egyes virágok rövid életűek, de a szárakon sok bimbó fejlődik, amelyek egymás után nyílnak, így a növény hosszú heteken át virágba borult marad. A virágok vonzzák a lepkéket, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak. Fontos: a növény lenyelve mérgező, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól érdemes távol tartani.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legbőségesebb virágzást, de a délutáni árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos, vályogos vagy agyagos talajt egyaránt elvisel; a talaj típusára és kémhatására nem különösebben érzékeny. A pangó vizet rosszul tűri, de a szárazabb időszakokat is átvészeli.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a rendszeres öntözést meghálálja, különösen virágzás idején, de a kifejlett növény a rövidebb szárazságot is elviseli. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Az USDA 3-9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán teljesen télálló, különösebb védelem nélkül is.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen, mert a fajta sűrű, bokros tövet képez.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a virágzati szárakat a tövüknél vágja vissza. Kora tavasszal a télen elhalt vagy sérült lombozatot távolítsa el, de ügyeljen arra, hogy a növény tövét ne sértse meg. A töveket 3–4 évente érdemes megosztani a vitalitás és a bőséges virágzás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat, a levélfoltosság és a rozsda ritkán jelentkezhet. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, tömeges ültetésbe, talajtakarónak, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertek, városi és udvari kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete és hosszú virágzása miatt kis kertekbe is kiváló választás, ahol a folyamatosan

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
nyíló sárga virágok érvényesülnek. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben. Növénytársítások Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a sásliliom tömör habitusát. Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót. Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a sásliliom virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 3-9.			
Black Adder izsópfű	Agastache 'Black Adder'	3 250 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Black Adder izsópfű (Agastache 'Black Adder') az Agastache rugosa és az Agastache foeniculum keresztezéséből származó, felálló, sűrű, bokros tövet képező, lombhullató évelő. Kifejlett magassága 60–100 cm, szélessége 40–60 cm között alakul; a virágzati szárakkal együtt a magasság elérheti a 100–120 cm-t is. A tövek rendezett, oszlopos formát mutatnak, a szárak merevek, és nem igényelnek támasztékot. Levelei tojásdadok, fűrészes szélűek, középzöldek, enyhe bíbor árnyalattal, és megdörzsölve jellegzetes, ánizsra emlékeztető illatot árasztanak.
A virágzat sűrű, füzérszerű fürt, amely a szárak felső részén nyílik. A virágok ajakosak, füstös ibolyakék-ibolyáslila színűek, a fajtára jellemző, hogy a virágfüzérek a 'Blue Fortune' fajtánál sötétebb árnyalatúak. Virágzása júliustól szeptemberig tart, és a virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, poszméheknek és lepkékenek.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár homokos, sovány vagy közepesen termékeny talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 5-9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A szárakat kora tavaszig hagyja meg, mert télen díszítőértékkel bírnak és védik a tövet; tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében. A töveket 2-3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, kavics- és sziklakertbe, mediterrán hangulatú kertekbe, cottage kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Felálló habitusa miatt kiváló függőleges akcentusként működik a kertben, és a virágzás idején messziről feltűnő, füstös ibolyakék színfoltot ad. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején vonzza a beporzókat.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Évelők: kasvirág (Echinacea purpurea), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), cickafark (Achillea), menyecskeszem (Coreopsis verticillata) – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák az izsópfű tömör virágfürtjeit.

Illatos és fűszeres növények: levendula, kakukkfű, macskamenta (Nepeta) – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak az izsópfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 5-9 (a legtöbb forrás a 6-9 zónát adja meg alsó határként; a magyarországi klímán a 6-7. zónában védett fekvésben megbízhatóan áttelel).

Black Forest Cake tűzeső	**Heuchera 'Black Forest Cake'**	3 750 Ft	3 950 Ft

Heuchera 'Black Forest Cake' - sötétlila-bordó levelű, fehér virágú varázslánynövény. Tökéletes árnyékos kertekbe és konténerekbe!
A növény jellemzői

Magasság: 20-25 cm (leveles rész), 30 cm (virágzással)

Levelek: Mélyen redőzött, fényes felületű, sötétlila-bordó színű, télen is díszes

Virágok: Apró, harang alakú, fehér színű, karcsú fürtvirágzatokban

Tenyészhely: Félárnyék vagy árnyék, nedves, de jó vízelvezetésű talaj

Ültetés és gondozás

Talajigény: Humuszban gazdag, laza talaj (pH 6,0-7,0 ideális)

Vízellátás: Közepes vízigényű – a szárazságot rosszul tűri

Metszés: Tavasszal eltávolíthatók a tél által károsodott levelek

Télállóság: -25 °C-ig tűri (USDA 4-es zóna)

Szaporítás: Tőosztással tavasszal

Black Head tollborzfű	**Penisetum alopecuroides 'Black Head'**	3 950 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Black Head tollborzfű egy tömör, bokros növekedésű évelő fűféle, amely 60-80 cm magasra és 50-70 cm szélesre nő meg. Levelei keskenyek, ívesek, élénkzöld színűek. Legfőbb díszét a júliustól októberig megjelenő, mélybarna, majdnem fekete színű, tollas virágzatok képezik. Ezek a virágzatok kontrasztot alkotnak a világoszöld lombozattal, ami különösen látványossá teszi a növényt. A kalászok hosszú ideig megmaradnak, így őszi és téli kertben is dekoratívak.
Gondozási útmutató

Fényigény: Teljes napsütés az ideális számára

Talajigény: Jól vízelvezető, laza talajt kedvel

Vízigény: Mérsékelt vízigényű, jól tűri a szárazságot

Metszés: Tavasszal visszametszendő

Télállóság: Jó télállóságú, de nedves talajon téli védelem ajánlott

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Modern kertekben különösen ajánlott

Sziklakertbe ideális választás

Konténeres nevelésre kiváló

Társítás: Fehér virágú növényekkel, ezüstlevelű fajtákkal

Színes kontrasztok kialakítására tökéletes

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Sziklakertek

Szárazságtűrő kertek

Sztájkertek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténeres kertek			
Black Taffeta tűzeső	Heuchera Black Taffeta	3 350 Ft	3 750 Ft
A Black Taffeta tűzeső egy igazán különleges évelő növény, A levélzetének majdnem fekete színe elegáns és drámai megjelenést kölcsönöz a kerteknek. A levelek fényes felületűek, és különböző formákban és méretekben nőnek, így érdekes textúrát adnak a kompozícióknak. Ültetési javaslat: A Heuchera Black Taffeta legjobban árnyékos vagy részben árnyékos helyeken fejlődik. Ültessük 30-45 cm távolságra egymástól, hogy elegendő helyet biztosítsunk a fejlődéshez. A talaj legyen jól vízelvezető, ám tápanyagokban gazdag, hiszen a növény kedveli a tápanyagban gazdag közeget. Rendszeres öntözést igényel, különösen a forró nyári hónapokban, de kerüljük el a túlöntözést, amely gyökérrothadást okozhat. A Black Taffeta tökéletesen kombinálható más évelő növényekkel, különösen világos színű virágokkal vagy más sötét lombozatú növényekkel, így lenyűgöző összhatásokat hozhatunk létre az ágyásokban és a sziklakertben. Kombinlhatjuk más lomszínű tűzesővel.			
Blackjak 0.2 L		4 400 Ft	4 400 Ft
Blackjak 1 L		8 200 Ft	8 200 Ft
Blackjak 1L	Leonardit alapú humusznövelő talajkondícionáló biostimuláns	8 200 Ft	8 990 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Tarolasa
5-30 Celsius kozott eredeti csomagolasban legalabb 36 honapig megorzi a szavatossagat. Felbontas utan mihamarabb kijuttatando, de szorosan visszazarva huvos, fagymentes helyen tarolva 6 honapig minoseggromlas nelkul felhasznalhato.

Részletes leírás
A Blackjak-ben lévő humuszt a növényünk gyökeréhez juttatva ott képes jelentősen megnövelni a víz és tápanyag felvehetőséget és javítani a talajminőséget. A kijuttatott Balckjak képes a környezetében ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének még akkor is, ha az egyébként szervesanyaggal, tápanyaggal rosszul ellátott, vagy rossz pH-val rendelkezik! Így használata rosszabb talajoknál szinte kötelező!

Mire is jó?
A Blackjakkel lombot és talajt is kezelhet 1-2 dl/10 liter víz dózisban. A készítmény fekete színű, ami lombról néhány nap alatt eltűnik, de óvatosan kell kezelni járda, fehér fal mellett, mert bizony okozhat elszíneződést. A terméket használat előtt fel kell rázni, mert a palack falára, aljára ülepszik. Pont emiatt az öntözőkannát vagy permetezőt is jó többször még kiöblíteni, hogy egy csepp termék se vesszen kárba.

Mire jó a Blackjak?
A Blackjakkel lombot és talajt lehet kezelni 1-2 dl/10 liter víz arányban. A termék fekete színű, amely a lombról néhány nap alatt eltűnik, azonban óvatosan kell kezelni járdák és fehér falak közelében, mert elszíneződést okozhat. Az előzetes felhasználás előtt alaposan fel kell rázni a terméket, mivel az ülepedhet a palack falára és aljára. Emiatt érdemes az öntözőkannát vagy permetezőt is többször kiöblíteni, hogy az összes termék felhasználásra kerüljön.
Mi tartalmazza a Blackjak?
A Blackjak legalább 28% szervesanyagot tartalmaz, melynek legalább 20%-a természetes humuszképző anyagokat (Humin, fulvosavak, ulmik savak és huminok) tartalmaz. A Blackjak pH-ja egyedülállóan az optimális 4-5 között helyezkedik el a piacon, ami sokkal hatékonyabbá teszi, mint a többi nátrium-/kálium-hidroxidos (lúgos) kivonószer.

A Blackjak erősen fekete színű és nagyon jól oldódik a vízben, azonban a flakont minden használat előtt alaposan fel kell rázni, valamint többször ki kell

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

öblíteni, mivel szuszpenziót képez (szilárd részecskék lebegnek a folyadékban).
Hogyan segít a Blackjak a növényeknek és a talajnak?
A Blackjak humusza, amelyet a talajba juttatnak, jelentősen növeli a víz és tápanyag felvételeképességet és javítja a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének körülötte, még akkor is, ha a talaj egyébként rossz pH-val rendelkezik, vagy alacsony szervesanyaggal és tápanyaggal van ellátva.

A Blackjak biostimulánsként a lombon alkalmazva számos előnnyel jár:

A benne lévő kismolekulájú fulvosavak könnyen bejutnak a levélbe, és ha más anyaggal kombinálva adjuk hozzá, például lombtrágyával vagy felszívódó növényvédő szerrel, akkor azok bejutását gyorsítja.
A Blackjak lombon történő alkalmazása fokozza a növény tápanyagfelvételét, ami növeli a tápelemek koncentrációját a növényben, és szívó hatást vált ki a talajban lévő vízre. Ennek eredményeként beindul egy tápanyag- és vízpumpa a talajból a növénybe, ami nagyobb növénytömeget eredményez.
A vízpumpa hatása intenzívebb párologtatást eredményez, ami hűti a növényt, így a növény tovább fotoszintetizál és növeli a biomasszát.

Ami a Leonarditet illeti:
A legjobb minőségű szervesanyag a talajban a humusz, amely szivacsként köti meg a tápanyagokat és a vizet, valamint életteret és táplálékot biztosít a talaj hasznos baktériumainak és gombáinak. Leonard professzorról elnevezett Leonardit anyagok több tízmillió év alatt alakulnak ki, és csak nagyon kevés helyen bányászhatóak jó minőségben. A Danuba humusztartalmú termékei mind Leonardit alapúak.

Blackjak és a tápelemek

Padova Egyetem meŕeśe szerint a Blackjak az öśszes taṕelem felvefeleť keṕes fokozni.

Blackjak 20 L	**Leonardit alapú humusznövelő talajkondícionáló biostimuláns**	116 000 Ft	122 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Blackjak - Leonardit alapú humusz a termékeny talajért és erős növényekért
A Blackjak egy forradalmian új, 100%-ban organikus humuszkészítmény, amely kizárólag kiváló minőségű Leonarditból készül. Célja, hogy természetes módon, vegyszermentesen segítse a növények fejlődését és a talajok regenerálódását. Az EU-ban piacvezető humusz termékként a Blackjak az optimális tápanyag-gazdálkodás alapja.
Mi teszi egyedülállóvá a Blackjak-ot? A legtöbb humusz termékkel ellentétben a Blackjak előállítása során nem használnak lúgos anyagokat (pl. nátrium- vagy kálium-hidroxidot) a humusz oldására. Ehelyett egy speciális, gyémánt keménységű késekkel felszerelt aprítóhenger segítségével mikron méretűre (kb. 4 mikron) őrlik a Leonarditot, így megőrizve annak természetes szerkezetét és bioaktív tulajdonságait. Ennek köszönhetően a Blackjak pH-ja 4-5 közötti, optimálisan savas tartományban van, ami biztosítja a humuszsavak maximális hatékonyságát és a tápanyagok jobb felvehetőségét.
Mire jó a Blackjak?

Talajjavítás: A Leonarditból származó humusz (humin-, fulvo- és ulminsavak) szivacsként működik a talajban: megköti a vizet és a tápanyagokat, javítja a talaj szerkezetét, és ideális életteret biztosít a hasznos talajlakó mikroorganizmusok számára.

Tápanyag-utánpótlás serkentése: A növény gyökeréhez juttatva jelentősen megnöveli a víz és a tápanyagok felvételének hatékonyságát, még gyengébb minőségű, szervesanyag-szegény talajokon is.

Lombtrágyaként (Biostimuláns): A Blackjakban található kismolekulájú fulvinsavak könnyedén behatolnak a leveleken keresztül a növény szöveteibe. Ez fokozza a növény anyagcseréjét, és „vízpumpa” hatást keltve növeli a talajból történő vízfelvételt, ami intenzívebb növekedést és jobb szárazságtűrést eredményez. Más lombtrágyákkal vagy növényvédő szerekkel kombinálva segíti azok gyorsabb bejutását is.

A Blackjak-ben lévő humuszt a növényünk gyökeréhez juttatva ott képes jelentősen megnövelni a víz és tápanyag felvehetőséget és javítani a talajminőséget. A kijuttatott Blackjak képes a környezetében ideális talajállapotot biztosítani a kultúrnövény gyökerének még akkor is, ha az egyébként szervesanyaggal, tápanyaggal rosszul ellátott, vagy rossz pH-val rendelkezik! Így használata rosszabb talajoknál szinte kötelező!

Felhasználási javaslat:

Lombkezelés és talajkezelés: Általános dózis: 1-2 dl / 10 liter víz. A kezelést 2-3 hetente érdemes megismételni.

Leromlott talajok javítása: Magasabb dózisban, akár 1 liter / 10 m² területen is kijuttatható.

Felhasználási tippek: A termék szuszpenzió, ezért használat előtt ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI! A palackot és a permetezőedényt többször öblítse ki, hogy a leülepedett részecskék is kijussanak. Lombra permetezve átmenetileg apró fekete pöttyök lehetnek a leveleken, amelyek néhány nap alatt eltűnnek. Kerülje a fehér falak, járdák befröcskölését, mert a készítmény erős fekete színe elszínezheti azokat.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 5-30°C között legalább 36 hónapig megőrzi minőségét. Felbontás után szorosan lezárva, hűvös, fagymentes helyen 6 hónapon belül használja fel.
Kiszerelések: 0,2 L, 1 L, 5 L, 20 L

Blackjak 5 L		31 500 Ft	31 500 Ft
Blaukönigin ligeti zsálya	Salvia nemorosa 'Blaukönigin'	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Blaukönigin ligeti zsálya (Salvia nemorosa 'Blaukönigin') kompakt, sűrű, bokros habitusú évelő. Kifejlett magassága általában 40–60 cm, szélessége 30–45 cm között alakul, a termőhelytől és a metszéstől függően azonban ennél valamivel alacsonyabb vagy magasabb is lehet. Levelei sötétzöldek, lándzsásak, ráncos felszínűek, a száron átellenesen helyezkednek el, és a növény alsó részén sűrű, tömött lombozatot alkotnak. Virágai aprók, ajak alakúak, élénk kék-ibolyakék színűek, és sűrű, karcsú fürtökben nyílnak a merev szárak végén; a virágzatokat vöröses-bíbor murvalevelek díszítik, amelyek a virágzás után is megmaradnak. Virágzása késő tavasztól (május végétől) egészen nyár közepéig tart, és az elvirágzott virágzatok visszavágásával gyakran másodvirágzásra ösztönözhető a nyár végén vagy ősszel. A virágok kellemes, fűszeres illatot árasztanak, és vonzzák a méheket, poszméheket és lepkéket.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb formát és a leggazdagabb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, és a túlöntözést rosszabbul viseli, mint a szárazabb időszakokat. Az első szezonban a megerősödéshez mérsékelt öntözés javasolt.

Télállóság: Teljesen télálló, a legtöbb forrás szerint –30 és –34 °C közötti fagyokat is elvisel, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban mérsékelten öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején ritkábban, de mélyen locsolja meg. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és megdőlését okozhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást, vagy másodvirágzást serkentsen a nyár végén. A régi, elhalt szárakat kora tavasszal vágja vissza a talajszint közelében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. Csapadékos, enyhe teleken a téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyba, cottage- és informális kertekbe, sziklakertbe, kavicskertbe, préri stílusú ültetésekbe és napos, szárazságtűrő kompozíciókba illik. Kiváló vágott virág, és csoportos ültetve összefüggő, kék színhatást hoz létre. Jól mutat rózsák között, valamint városi és vidéki kertekben egyaránt.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.			
Évelők: naprózsa, kúpvirág, varfű, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.			
Rózsák: a ligeti zsálya függőleges virágzata szép kontrasztot ad a rózsák mellett, és jól elrejti a rózsák alsó, kopaszabb részeit.			
Illatos növények: levendula, kakukkfű, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a ligeti zsálya virágzása előtt.			
USDA télállósági zóna: 4-9 (a legtöbb forrás a 4-es zónát jelöli meg alsó határként, -34 °C-ig).			
Blue Barlow harangláb	**Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow'**	2 250 Ft	2 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow' a haranglábfélék egyik legkedveltebb és legmegbízhatóbb változata. A Barlow sorozat tagjaként a 'Nora Barlow'-hoz és a 'Black Barlow'-hoz hasonlóan sarkantyú nélküli, telt, pompomszerű virágokat fejleszt, amelyek színe azonban a kék-lila spektrumban mozog. Késő tavasztól kora nyárig nyíló virágaival igazi ékköve a falusias és természetközeli kerteknek. Különleges, dália-szerű virágai miatt a vágott virágként is kiválóan használható.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Blue Barlow' habitusa bokros, felálló szárú, tövekből növő évelő. Levelei szürkészöldek, finoman szeldeltek, páfrányra emlékeztetnek, és díszes lombozatot alkotnak. Május-júniusban nyíló virágai a növény legfőbb díszei: a megszokott haranglábtól eltérően sarkantyúk nélküli, telt, gömbölyded fejek, amelyeket sok keskeny, kanál alakú szirom alkot. A virágok színe rendkívül egyedi: mély ibolyáskék, néha szinte lila árnyalattal.

Magasság: A virágzó szárak magassága eléri a 60-90 cm-t.

Szélesség: Terjedése 40-60 cm között alakul, szépen bokrosodó töveket alkot.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban. A világos, szűrt árnyékot is meghálálja.

Talaj: A tápanyagban gazdag, nedves, de jó vízelvezetésű talajokat kedveli. A pangó vizet nem tolerálja! Mészben gazdag talajon is jól fejlődik.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a berácsozódásig. Idősebb korában közepes vízigényű, a hosszan tartó aszályos időszakokban hálás a locsolásért.

Télállóság (USDA-zóna): A növény rendkívül télálló, USDA 3-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén megbízhatóan áttelel, bár évelőként hajlamos lehet rövid életű lenni, ezért 3-4 évente érdemes utánpótlásról gondoskodni.

Gondozás: Az elnyílt virágzatokat érdemes visszavágni, hogy megakadályozzuk a magokra törekvést és meghosszabbítsuk a virágzási időt. A 'Blue Barlow' hajlamos magától magról kelni, de a magoncok könnyen kereszteződhetnek más haranglábfajtákkal, így nem lesznek teljesen egyformák.

Ellenállóság: Levéltetvek, aknázólegyek és levéldarazsak ritkán megtámadhatják. Szarvasok és nyulak számára ellenálló.

Figyelmeztetés: A növény minden része enyhén mérgező, fogyasztása nem ajánlott.

Kertstílus és növénytársítások:
Különleges virágszíne és formája miatt sokféleképpen felhasználható:

Romantikus, falusias kertek: A Barlow sorozat tagjaként tökéletes választás romantikus, természetközeli kertekbe.

Évelőágyások közepe: Magassága miatt az ágyások közepébe ültetve remekül érvényesül.

Vágott virág: Kiválóan alkalmas vágott virágnak, vázában is sokáig eláll, különleges csokrokat lehet belőle készíteni.

Rózsák aláültetése: Kiválóan használható magasabb rózsák vagy cserjék aláültetésére.

Konténeres növény: Teraszon, erkélyen cserépben is tartható.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Erdős kertek, ligetes részek: Félárnyékban, fák alatt is szépen fejlődik.

Ajánlott növénytársítások:

Ezüstös lombozatú növények: A 'Blue Barlow' mélykék virágai lenyűgözően kiemelkednek az ezüstös levélzet előtt. Társítsuk ezüstös nyuszifüllel vagy gyapjas tisztesfűvel (Stachys byzantina) .

Sárga virágú évelők: A kék és sárga klasszikus, élénk színkontrasztot alkot. Ültessünk mellé sárga cickafarkot (Achillea 'Moonshine') , sárga kasvirágot (Rudbeckia fulgida) vagy sárga pimpót (Potentilla fruticosa) .

Fehér virágúak: Az elegáns, letisztult kombináció érdekében ültessünk mellé fehér haranglábat (Aquilegia 'Nivea') , fehér fátyolvirágot (Gypsophila paniculata) vagy fehér pünkösdi rózsát (Paeonia lactiflora) .

Rózsaszín virágú évelők: A kék és rózsaszín lágy, romantikus párosítás, például rózsaszín haranglábbal (Aquilegia 'Nora Barlow') vagy réti kakukkszeggel (Lychnis flos-cuculi) .

Díszhagymák (Allium): A lila gömbfejű díszhagymák, mint az 'Globemaster' vagy a 'Purple Sensation' , virágzási ideje egybeesik, és színben is harmonizálnak.

Páfrányok: Félárnyékos helyen társítsuk struccpáfránnyal (Matteuccia struthiopteris) különböző textúrák játékához.

Blue Cadet árnyékliliom	**Hosta 'Blue Cadet'**	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Blue Cadet' árnyékliliom egy alacsony növekedésű, de rendkívül tömör habitusú hostafajta, amely maximum 25-30 cm magasra és 40-50 cm szélesre nő. Fő értéke a kékeszöld, mélyen erezett, szív alakú levél, amely dús csomókat alkot. Levelei kissé érdes felületűek és jól mutatnak a naposabb helyekkel szemben is. Június-július hónapokban nyílnak a világoslila színű, tölcsér alakú virágok, amelyek a levélzet felett enyhén magasodnak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos helyen a legszebb kék színárnyalatért

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Időzítés: Tavasszal (április-május) vagy ősszel (szeptember)

Távolság: 40-50 cm-es távolsággal

Használat: Elülső sorok, határok, kőkertek, konténerek, cserepek

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel a levelek elszáradása után vágjuk vissza

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Csigák ellen védekezni kell, egyébként problémamentes

Ajánlott kerttípusok

Törpe hostáskert

Konténeres és cserépes kertészet

Elülső sorok növényágyásokban

Japán stílusú kert

Árnyékos kőkertek és ösvényszegélyek

Blue Jeans leyland-ciprus (nagyobb)		4 950 Ft	4 950 Ft
Blue Queen ligeti zsálya	Salvia nemorosa 'Blue Queen'	1 950 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Blue Queen Ligeti zsálya (Salvia nemorosa 'Blue Queen') – Az intenzív kék, bő virágú évelő
A Blue Queen ligeti zsálya az árvacsalánfélék családjába tartozó, Európában és Ázsiában őshonos, évelő lágyszárú növény nemesített változata. A faj a természetben száraz réteken, erdőszéleken és sziklás lejtőkön fordul elő, ahol a szegényes, jó vízelvezetésű talajokhoz és a napos körülményekhez alkalmazkodott. A 'Blue Queen' fajta a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb zsályafajták egyike, amely a kertészeti gyakorlatban 'Blaukönigin' néven is ismert. Ez a növény a nyár első felétől az őszig nyíló, intenzív kék virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, a hosszú virágzási időszaka, a kiváló télállósága és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A ligeti zsálya 'Blue Queen' egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 30-60 cm, szélessége 30-50 cm között alakul, ami sűrű, bokros habitust eredményez. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások egyenesen felállók, és a gyökérzettől terjed.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek lándzsásak vagy hosszúkásak, 5-12 cm hosszúak, sötétzöld vagy szürkészöld színűek, szélük ép vagy finoman fogazott, a levélfelület ráncos és enyhén szőrözött. A levelek megdörzsölve kellemes, aromás illatot árasztanak. A lombozat a talajszinten sűrű, tömött rozettát alkot.
A növény legnagyobb díszét a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 30-60 cm hosszú, sűrű, végálló fürt, amelyen a virágok örvökben helyezkednek el. A virágok aprók, 1-2 cm hosszúak, kétajkúak, a felső ajak sisakszerű, az alsó ajak háromkaréjú. A 'Blue Queen' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok intenzív, mély ibolyáskék vagy kék színe, amely a kertben feltűnő, élénk hatást kelt, valamint a rendkívül bőséges és hosszan tartó virágzás. A virágzás előtt és után is dekoratívak a bíborlila csészelevelek. A virágzási időszak a késő tavasztól a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően júniustól szeptemberig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár az első fagyokig is meghosszabbítható. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tőosztással, félfás dugványozással) egyaránt szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A ligeti zsálya 'Blue Queen' napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 6 óra közvetlen napsütés az optimális. Félárnyékban is fejlődik, de a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A ligeti zsálya 'Blue Queen' szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a hosszabb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A ligeti zsálya 'Blue Queen' alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 5-10 cm-es magasságúra, hogy elősegítsük a telelést és a következő évi erőteljes újrahajtást. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt.

Telelés és fagytűrés: A ligeti zsálya 'Blue Queen' kifejezetten kiváló télállóságú; akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elvisel. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A ligeti zsálya 'Blue Queen' az intenzív kék virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások középső részébe, virágos ágyások háttérnövényeként – a 30-60 cm-es magasság miatt kiváló középtér- vagy háttérnövény.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Vágott virágnak – a hosszú, kék virágfürtök tartósak a vázában, és kiválóan alkalmasak csokrokba, frissen és szárítva is. Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is. Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára. Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát. Tömeges telepítésbe – a sűrű, bokros növekedés és a hosszú virágzás miatt kiváló választás nagyobb felületekre. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A ligeti zsálya 'Blue Queen' intenzív kék virágai és szürkészöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók: Ezüstös levelű növényekkel: Üröm, kék csenkesz – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a kék virágokat. Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem, kúpvirág – a kék és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak. Fehér virágú növényekkel: Fehér zsálya fajtákkal – a kék és a fehér szívek elegáns, tiszta hatást keltenek. Díszfüvekkel: Árvalányhaj, tollbuga – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a zsálya tömöttebb, bokros formáját. Más zsálya fajtákkal: Különböző színű zsályafajtákkal – a változatos színű virágok egymás mellett gazdag, színpompás hatást keltenek. USDA besorolása: 3-9 (Magyarországon a ligeti zsálya 'Blue Queen' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Bókoló rekettye	Genista lydia	3 750 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Bókoló rekettye (Genista lydia) – Az aranysárga virágú, igénytelen talajtakaró
A bókoló rekettye a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó, Délkelet-Európából és Kis-Ázsiából származó, alacsony termetű, lombhullató cserje. A faj a száraz, sziklás lejtőkön, meszes talajokon őshonos, ahol a szegényes, napos körülményekhez alkalmazkodott. A bókoló rekettye a tavasz végén nyíló, ragyogó sárga virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb alacsony cserje a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, kiváló szárazságtűrése és a talajerózió megakadályozásában játszott szerepe miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A bókoló rekettye egy alacsony termetű, elfekvő vagy enyhén felálló szárú, lombhullató cserje. Kifejlett magassága 30-60 cm, szélessége 60-120 cm között alakul, ami sűrű, párnaszerű vagy szőnyegszerű bokrot eredményez. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások ívesen hajlanak, és a talajon elterülve vagy lelógva nőnek. A hajtások vékonyak, zöldek, a szár bordázott.
A levelek kicsik, lándzsásak vagy szálasak, 1-2 cm hosszúak, szürkészöld vagy élénkzöld színűek. A levelek váltakozó állásúak, a növény sűrű, de finom lombozatát alkotják, amely a virágzás idején szinte teljesen eltűnik a virágözön alatt.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, a levélhónaljakban kialakuló, laza fürtökben helyezkednek el. A virágok kicsik, 1-1,5 cm hosszúak, a pillangós virágokra jellemző formájúak, élénk aranysárga vagy citromsárga színűek. A bókoló rekettye legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok bősége: a virágok olyan sűrűn nyílnak, hogy szinte teljesen eltakarják a lombozatot, és a lelógó hajtásokon egész virágfürtöket alkotnak. A virágzási időszak a késő tavasztól a nyár elejéig tart: Magyarországon jellemzően májustól júliusig, a legbőségesebb virágzás júniusban figyelhető meg. A virágok a méheket, a poszméheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, hüvelyes terméseket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (dugványozással, tőosztással) egyaránt szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A bókoló rekettye napos, meleg fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés az optimális. Félárnyékban a virágzás gyengébb, a növény felnyurgulhat és lazább habitust vesz fel.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős, savanyú talajokat nem tűri. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését.

Öntözés: A bókoló rekettye kifejezetten szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a hosszabb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első néhány hetében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés és a pangó víz a leggyakoribb gondozási hiba.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy, és a növény felnyurgulhat. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A bókoló rekettye alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás után (július-augusztus) érdemes a növényt enyhén visszavágni, hogy serkentsük az új hajtások képződését és a sűrű, bokros formát. A túlzott visszavágást kerüljük, mert a növény a régi, fás részekből nehezen hajt ki. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal javasolt.

Telelés és fagytűrés: A bókoló rekettye kifejezetten jó télállóságú; az USDA 5-9-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén (USDA 5-7-es zóna) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A bókoló rekettye az aranysárga virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának, szárazságtűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb alacsony cserje:

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (30-60 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Napos lejtőkre, rézsűkre – a talajtakaró képessége és a gyökérzete miatt kiválóan alkalmas talajerózió megakadályozására.

Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a látványos virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Mediterrán hangulatú kertekbe – a növény a mediterrán hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A bókoló rekettye aranysárga virágai és zöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), bárányfül (Stachys byzantina) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik az aranysárga virágokat.

Levendulával (Lavandula), rozmaringgal (Rosmarinus) – a hasonló szárazságtűrés és a mediterrán hangulat miatt kiváló társnövények.

Lila virágú évelőkkel: Macskamenta (Nepeta), zsálya (Salvia) – a sárga és a lila szívek kontrasztos, vibráló hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Árvalányhaj (Stipa), kék csenkesz (Festuca glauca) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a rekettye tömöttebb, bokros formáját.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a bókoló rekettye teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)
7a-9b USDA-zóna

Bordó levelű orvosi zsálya	**Salvia officinalis 'Purpurascens'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Önállóan, vagy a többi szép zsálya fajtával, illetve más évelőkkel együtt ültetve is gyönyörű!

Borsikafű	**Satureja hortensis**	1 450 Ft	1 950 Ft

A Satureja hortensis, ismertebb nevén borsikafű, egy gyógynövény, amelyet kertekben és fűszerkertekben termesztenek. Ez a növény gazdag aromával rendelkezik, és számos kulináris és gyógyászati célra használják. évelő vagy évelőnek termesztett növény, amely körülbelül 30-60 cm magasra nő. Levelei kicsik, keskenyek és sötétzöldek. Virágai kicsik, fehérek vagy rózsaszínűek, a szárak tetején nyílnak. Az egész növény intenzív illatú, a száraz levelek pedig erősen aromásak. A borsikafű szereti a napos helyeket. A teljes napsütés elősegíti a növény egészséges növekedését és a levelek intenzív illatának kifejlődését. A jó vízelvezetésű, enyhén savas vagy semleges talajt kedveli. Ültetéskor tartsunk a növények között legalább 20-30 cm távolságot. A borsikafű mérsékelt vízigényű növény, de rendszeres öntözést igényel a száraz időszakokban. A talajt tartsa enyhén nedvesen, de kerülje a túlzott öntözést, mert a pangó víz károsíthatja a gyökereit. Tavasszal és nyáron trágyázza meg a növényt. Használjon általános célú műtrágyát vagy komposztot, hogy biztosítsa a megfelelő tápanyagokat a növekedéshez. Évente egyszer, általában kora tavasszal vagy az első hajtások megjelenése előtt metszhetjük vissza. Vágja vissza a hervadó vagy túlterjedt hajtásokat, hogy elősegítse a kompaktabb növekedést és megőrizze a növény formáját. Általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A Satureja hortensis leveleit és hajtásait frissen vagy szárítva is használhatjuk. A friss leveleket szedhetjük az év bármely szakaszában, de a legintenzívebb íz és aroma a virágzás idején található meg. A leveleket és hajtásokat szedés előtt alaposan öblítse le, majd szárítsa meg egy jól szellőző helyen vagy szárítóban. A száradt leveleket tárolja légmentesen zárható edényben, hogy megőrizze az aromájukat és frissességüket.

Borsmenta	**Mentha x piperita**	2 250 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Mentha x piperita, vagy közismert nevén borsmenta, egy gyógynövény, amelyet gyakran termesztenek kertekben és konyhakertekben. Az erős illata és frissítő íze miatt népszerűsége a világ számos részén elterjedt. A borsmenta évelő növény, amely 30-90 cm magasra nő. Levelei sötétzöldek és kissé fogazottak. Virágai kis lila vagy rózsaszín csöves virágok, amelyek csomókban helyezkednek el a szár tetején. Az egész növény erős mentaillattal rendelkezik A borsmenta kedveli a napos vagy félárnyékos helyeket. Szereti a napfényes helyeket, de részleges árnyékban is szépen fejlődik. Előnyben részesíti a jó vízelvezetésű talajokat. Kiválóan teljesít a laza, tápanyagban gazdag földben. A savas vagy lúgos talajtól el kell kerülni. Ültetéskor tartson a növények között 30-45 cm távolságot. A borsmenta szereti a nedves talajt, de ne álljon vízben hosszú ideig. Rendszeresen öntözze a növényt, különösen a száraz időszakokban. Tavasszal és nyáron trágyázza meg a borsmentát. Használjon lassú felszabadulású műtrágyát vagy komposztot. A növények gyorsan nőnek és terjednek, így fontos rendszeresen ellenőrizni és eltávolítani a gyomnövényeket a környezetükből. A borsmenta metszése elősegíti az egészséges növekedést és megakadályozza a túlburjánzást. Vágja vissza a növényt az évszak végén, vagy amikor túl nagyra nő! A borsmenta általában ellenálló a betegségekkel és a kártevőkkel szemben. A leveleit és szárát frissen vagy szárítva lehet használni. Az erős mentaillatú leveleket gyakran felhasználják teák, limonádék, sütemények és egyéb ételek ízesítésére. A betakarításhoz válassza le a leveleket, amikor a növény elég nagy és egészséges. Vágja le a szárakat, és távolítsa el a leveleket. A leveleket szárítsa meg egy jól szellőző helyen, majd tárolja légmentesen zárható edényben.			
Borsos varjúháj	Sedum acre	1 750 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A borsos varjúháj (Sedum acre) alacsony, sűrű, szőnyegszerűen elterülő örökzöld pozsgás évelő. Kifejlett magassága 5–10 cm, szélessége 30–45 cm, de kúszó hajtásai révén nagyobb felületet is beboríthat. Levelei aprók, húsosak, hengeres vagy tojásdad alakúak, élénkzöldek, néha vöröses árnyalattal; télen is részben megmaradnak. Virágai aprók, csillag alakúak, élénk sárgák, laza bugákban nyílnak nyár elején. A virágzás vonzza a méheket és a lepkéket. A növény habitusa lapos, terjedő, talajtakaró jellegű. Fontos tudni, hogy a növény lenyelése mérsékelten mérgező lehet, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól érdemes távol tartani.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; enyhe árnyékot is elvisel, de napos helyen tömörebb és szebben virágzik.

Talaj: Jó vízáteresztő, száraz, homokos, kavicsos vagy szegényes talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a szárazságot kiválóan tűri, az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is megél; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágzatot távolítsa el, hogy megőrizze a kompakt formát. A túl hosszúra nőtt hajtásokat tavasszal rövidítheti.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; az örökzöld lombozat télen is díszít.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, tetőkertbe és ágyásszegélybe illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, mediterrán, minimalista és szárazságtűrő kertekben.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa, más varjúhájfajok – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a varjúháj előtt.

Fűszer- és illatos növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.			
USDA télállósági zóna: 3-9.			
Borzas kúpvirág	**Rudbeckia hirta**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Borzas kúpvirág (Rudbeckia hirta) – A napsárga, hosszan virágzó évelő
A borzas kúpvirág az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó, Észak-Amerika keleti és középső részéről származó, rövid életű évelő vagy kétéves növény. A fajt 1714-ben vezették be a kertészeti kultúrába, és azóta az egyik legkedveltebb, igénytelen dísznövénnyé vált a világ kerteiben. A magyar név („borzas kúpvirág”) a növény szárának és leveleinek jellegzetes, érdes-szőrös tapintására, valamint a virág közepén kiemelkedő, kúp alakú vacokra utal. Ez a növény a nyár közepétől az őszig nyíló, élénk napsárga virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, a hosszú virágzási időszaka és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A borzas kúpvirág egy feltörő szárú, bokros habitusú, rövid életű évelő növény. Kifejlett magassága 30-100 cm között alakul. A szár egyenes, felálló, erőteljes, a hajtások végén hosszú száron nyílnak a virágok. A növény szára és levelei jellegzetesen szőrözöttek, érdes tapintásúak.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A tőlevelek nagyok, nyújtott tojásdad alakúak, hosszú nyelűek; a szárlevelek keskenyebbek, lándzsásak, ülők vagy szárölelők. A levél széle ép vagy finoman fogazott, a levélfelület szőrös, érdes tapintású.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 10-12 cm átmérőjű, magányos, fészekvirágzat (capitulum), amely a fészkes virágzatúakra (Asteraceae) jellemző kétféle virágtípusból épül fel. A virágfej peremén helyezkednek el a feltűnő, élénksárga, fényes felületű, 3-5 cm hosszú, lándzsás vagy nyelves alakú, steril, liguláris virágok, amelyek a beporzó rovarok vizuális csalogatásáért felelősek. A virágfej középső részén található a tojásdad vagy félgömb alakban kiemelkedő, feketésbarna vagy bíborszínű, pikkelyes felületű vacok (receptaculum), amelyen számos, 3-4 mm hosszú, cső alakú, kétivarú, termékeny csöves virág ül. A csöves virágok öt sziromlevele pártát (corolla) alkot, amelynek csúcsa ötkaréjú, és ezek a virágok felelősek a megporzásért és a magképzésért. A vacok pikkelyes szerkezete védi a fejlődő magkezdeményeket. A virágzás során a liguláris virágok a beporzók vonzását, míg a csöves virágok a szaporodást biztosítják. A virágzási időszak a nyár közepétől a késő őszig tart: Magyarországon jellemzően júliustól októberig, a legbőségesebb virágzás augusztusban figyelhető meg. Az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával (deadheading) a virágzás meghosszabbítható, és a növény újabb virágokat hoz. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a csöves virágokból apró, négyszögletes, egymagvú kaszatterméseket (achenium) fejleszt. A növény magról szaporítható; a magokat tavasszal, a fagyok elmúltával lehet a szabadba vetni, vagy beltérben, meleg helyen palántákat nevelni. A növény a kertben önmagát is szaporíthatja, de a fajták szín- és magasságbeli tulajdonságai nem feltétlenül öröklődnek. A borzas kúpvirág rövid életű évelő, a második évtől díszértéke erősen csökken, ezért a kertészeti gyakorlatban gyakran egynyáriként kezelik.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A borzas kúpvirág napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepes tápanyagtartalmú, semleges kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri. A szárazságot jól tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.

Öntözés: A borzas kúpvirág szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első heteiben rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágya. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők, mert az a virágzás rovására megy.

Metszés és ápolás: A borzas kúpvirág alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, meghosszabbítja a virágzási időszakot, és megakadályozza a nem kívánt önvetést. A virágzási időszak végén a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra.

Telelés és fagytűrés: A borzas kúpvirág kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény rövid életű, ezért az önvetés biztosítja a folytonosságot a kertben.ártevők és

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A borzas kúpvirág a napsárga virágzásának, hosszú virágzási időszakának, igénytelenségének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Évelőágyásokba, virágos ágyások háttérnövényeként – a 30-100 cm-es magasság miatt kiváló középtér- vagy háttérnövény. Vadvirágos kertekbe, természetes hatású kertekbe, prérikertbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat. Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt fajták kiválóan nevelhetők konténerben is. Vágott virágnak – a hosszú, erős száron nyíló virágok tartósak a vázában. Közterületi virágágyásokba – nagyobb színfoltok képzésére önállóan vagy vegyeságyakba. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A borzas kúpvirág napsárga virágai számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók: Levendulával – a levendula illatos, lilás virágai és ezüstös lombozata kiváló kontrasztot alkot a sárga virágokkal, és erősíti a mediterrán hangulatot. Zsályával és macskamentával – a kék és lila virágok harmonikus, friss párost alkotnak a sárga kúpvirággal. Kasvirággal és napvirággal – a hasonló prérihangulatú növényekkel együtt harmonikus, színpompás együttest alkotnak. Díszfüvekkel: Tollbugával, árvalányhajjal – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a kúpvirág tömöttebb, bokros formáját. Rozmaringgal – a rozmaring illatos, örökzöld lombozata és a kúpvirág sárga virágai kiváló társítást alkotnak. USDA besorolása: 3-9 (Magyarországon a borzas kúpvirág teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Bouquet Perfect bazsarózsa	**Paeonia lactiflora 'Bouquet Perfect'**	5 950 Ft	6 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Bouquet Perfect bazsarózsa egy erős növekedésű, felálló habitusú évelő növény, amely 80-90 cm magasra nő. Fő értéke a nagy, többszörösen teljes, gömb alakú virág, amely krémfehér színből halványrózsaszínbe megy át, finom színátmenettel. A virágok május-június hónapokban nyílnak, átmérőjük elérheti a 15-17 cm-t. A sötétzöld, fényes levelek tökéletes kontrasztot alkotnak az impozáns virágokkal. A virágok közepesen erős, kellemes illatúak és kiválóak vágott virágként, akár 7-10 napig is frissen maradnak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon vagy enyhén árnyas helyen

Talaj: Mély, jó vízáteresztő, humuszban gazdag, semleges pH-jú talaj

Távolság: 70-90 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Vágott virág termesztés, évelőágyások, romantikus kertek, szoliter ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Virágzás után elvirágzott részek eltávolítása, ősszel a szárak visszavágása

Télvédelem: Teljesen télálló, érett növények különösebb védelem nélkül

Öntözés: Mély gyökérzetével szárazságtűrő, de virágzás előtt rendszeres öntözés szükséges

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal és foszfortartalmú műtrágyával

Általános: A rügyek max. 3-5 cm mélyre ültetendők, tavasszal védelem a késői fagyok ellen

Ajánlott kerttípusok

Vágott virág kertje

Romantikus kertek

Évelőágyások

Formális kertek

Hagyományos bazsarózsás

Szőlőültetvények melletti beültetések

Breeder's Mix kasvirág	Echinacea purpurea 'Breeder's Mix'	3 350 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Breeder’s Mix kasvirág (Echinacea purpurea 'Breeder’s Mix') a bíbor kasvirág egy különleges, vegyes vetőmagkeverékből származó változata, amelyet a nagy virágok és a változatos színek érdekében válogattak össze. Erőteljes, felálló, sűrű bokrot képező évelő, amelynek merev, önmagukat megtartó szárai nem igényelnek támasztékot, és szélben, esőben is megőrzik a bokor rendezett formáját. Kifejlett magassága 80–120 cm, szélessége 50–75 cm között alakul, a tövek a lombozat alján sűrű, tömött rózsát alkotnak. Levelei sötétzöldek, durva textúrájúak, lándzsásak, a száron a felső részek felé egyre keskenyebbek.
A virágzat fészekvirágzat, amelyet nyelves virágok (a látványos „szirmok”) és a központi, kúpos felületet alkotó csöves virágok építenek fel. A keverék legfőbb különlegessége a színek és formák változatossága: a nyelves virágok a rózsaszín, lila, fehér, narancssárga és sárga árnyalataiban nyílnak, egyes példányokon fodros vagy csöves (quilled) szirmok is megjelenhetnek, a központi csöves virágok pedig általában bronzos-narancs vagy sötétebb árnyalatúak. A virágzatok átmérője elérheti a 8-10 cm-t. Virágzása júniustól egészen a fagyokig (októberig-novemberig) tart, és az elnyílt virágzatok rendszeres eltávolításával a virágzás tovább serkenthető. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek, poszméheknek és lepkékenek, a megmaradó magfejek pedig télen táplálékot nyújtanak a madaraknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális, de a félárnyékot is elviseli; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A nehéz, agyagos és tartósan nedves talajt kerülni kell, mert a pangó víz gyökérrothadást okozhat; a túl tápdús talaj a szárak megnyúlását és a bokor szétesését eredményezheti.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél; a talaj kémhatására nem különösebben érzékeny.

Vízigény: Közepes-alacsony; az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt, később a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 3-9. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében, de kerülje a túl tápdús talajt. A növények közötti távolság 40-60 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a lombozat felülről történő öntözését, mert ez elősegíti a gombás betegségek kialakulását.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A magfejeket hagyhatja télen a madaraknak, de kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a száraz részeket a talajszint közelében. A töveket 3-4 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat és a levélfoltosság ritkán jelentkezhet, különösen párás, meleg időben. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, vadvirágos rétekre, beporzóbarát kertekbe,

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Változatos színei és formái miatt kiváló színfolt a zöld levelű évelők között, és jól mutat az ágyás középső vagy hátsó részén. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színpompát ad a kertben. Növénytársítások Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kasvirág tömör virágzatát. Évelők: cickafark, varfű, sédbúza, lángszínű liatris – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót. Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a kasvirág virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 3-9.			
Burgundy Bunny törpe tollborzfű	**Pennisetum alopecuroides 'Burgundy Bunny'**	3 950 Ft	3 990 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' (Pennisetum alopecuroides 'Burgundy Bunny') – A színváltó, kompakt díszfű

A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' a perjefélék (Poaceae) családjába tartozó, kelet-ázsiai eredetű évelő díszfű nemesített változata. A faj a természetben nedves réteken, folyópartokon fordul elő, ahol a napos, jó vízelvezetésű talajokhoz alkalmazkodott. A 'Burgundy Bunny' fajta a 'Hameln' fajta sportjaként jött létre, és a kertészeti gyakorlatban a 'Little Bunny' fajtához hasonló kompakt méretével, de annál látványosabb őszi színével tűnik ki. Ez a növény a nyári zöld lombozatával, a vöröses színű hajtáscsúcsokkal és a lenyűgöző bordó őszi színével az egyik legkedveltebb díszfű a kisebb kertekben és konténerekben. A könnyű gondozhatósága, a kiváló szárazságtűrése és a sokoldalú felhasználhatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' egy kompakt, bokros növekedésű, évelő díszfű. Kifejlett magassága 30-40 cm, szélessége 20-30 cm között alakul, ami sűrű, párnaszerű vagy szőnyegszerű habitust eredményez. A növény meleg évszakos fű, amely tavasszal későn indul fejlődésnek, de a nyár közepére eléri végleges méretét. Élettartama kedvező körülmények között 10 év is lehet.

A lombszálak a növény legfőbb díszítő elemei, és egyben a legnagyobb vonzerőt jelentik. A lombszálak keskenyek, szálasak, fényes zöld színűek, a hajtások sűrűn, bokrosan állnak. A 'Burgundy Bunny' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a lombszálak színváltozása az év során: a nyár folyamán a lombszálak csúcsai feltűnő bordó vagy vöröses színűekké válnak, majd ősszel az egész lombozat mély bordóvörösre vagy vörösbarnára színeződik, ami a fagyokig megmarad. Ez az őszi színpompa a fajta egyik legértékesebb díszítő tulajdonsága.

A növény másik nagy díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 5-10 cm hosszú, palackkefe-szerű, sűrű, hengeres vagy tojásdad bugák, amelyek a késő nyári hónapokban (július-augusztusban) jelennek meg. A virágzat krémszínű vagy ezüstösfehér színű, finom, selymes szőrű, és a lombozat fölé emelkedik. A virágfürtök a tél folyamán is a növényen maradnak, szerkezeti elemeket adva a téli kertnek. A virágok a szél által porozódnak, és a magok a szél segítségével terjednek.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, száraz terméseket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tőosztással) egyaránt szaporítható. A fajtatulajdonságok megtartása érdekében a vegetatív szaporítás javasolt, mivel a magról nevelt növények változatos tulajdonságokat mutathatnak. A növényt a tőosztás során tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt érdemes szétválasztani.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' napos fekvést igényel a legszebb, legdúsabb lombozat és a bőséges virágzás eléréséhez. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a lombozat színe kevésbé intenzív, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, vályogos és agyagos talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében semleges vagy enyhén savanyú talajban érzi magát a legjobban. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után jól tűri, és a városi környezetet is elviseli.

Öntözés: A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözést és a pangó vizet kerülni kell.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, díszfüvek számára kifejlesztett műtrágya. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők, mert az a lombozat rovására megy, és a növény felnyurgulhat.

Metszés és ápolás: A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' metszése fontos a növény egészsége és rendezett megjelenése szempontjából. A metszést kora tavasszal (február-március), az új hajtások megjelenése előtt kell elvégezni. Vágjuk vissza a régi, elszáradt szárakat a talajszinttől számított 5-10 cm-es magasságúra. A virágfürtök télikert esztétikai értékük miatt csak tavasszal vágandók vissza. A növény 3-4 évente történő tősztása tavasszal javasolt.

Telelés és fagytűrés: A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' kifejezetten kiváló télállóságú. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató (meleg évszakos fű), a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt. Fontos, hogy a téli talaj ne legyen pangó vizes.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' a színváltó lombozatának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfű a kertekben és parkokban:

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe – a kompakt méret és a szárazságtűrés miatt kiváló választás.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (30-40 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is; a kitöltő (filler) szerepében különösen ajánlott.

Tömeges telepítésbe, talajtakarónak – a sűrű, bokros növekedés hatékonyan takarja a talajt.

Téli érdeklődésű kertekbe – a virágfürtök és a száraz lombozat télen is szerkezeti elemeket adnak a kertnek.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' bordó őszi színe és zöld nyári lombozata számos más növénnyel kombinálhatók:

Sárga virágú növényekkel: Őszi kikericcsel (Sedum), kúpvirággal (Rudbeckia) – a bordó és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek.

Lila virágú növényekkel: Levendulával (Lavandula), zsályával (Salvia) – a bordó és a lila szívek harmonikus, friss párost alkotnak.

Más díszfüvekkel: Árvalányhajjal (Stipa), tollbugával (Pennisetum) – a különböző textúrájú és habitusú füvek egymás mellett változatos, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a törpe tollborzfű 'Burgundy Bunny' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Cambridge angol gólyaorr	**Geranium × cantabrigiense 'Cambridge'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Cambridge angol gólyaorr (Geranium × cantabrigiense 'Cambridge') a Cambridge-i Botanikus Kertben létrehozott, szülőfajaihoz képest erőteljesebb, virágdúsabb hibrid, amely alacsony, sűrű, párnás tövet képez, és gyöktörzseivel határozottan terjed, így rövid időn belül összefüggő talajtakaró foltot alkot. Kifejlett magassága a lombozattal 15–40 cm, szélessége 40–65 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, a virágzati szárakkal együtt is alig haladják meg a 25–30 cm-t. Levelei kerekdedek, karéjosak, világoszöldek, és megérintve jellegzetes, citromra emlékeztető aromás illatot árasztanak; a lombozat ősszel sárgás-rézvörös árnyalatot ölt, és enyhe teleken részben meg is marad.
A virágzat a lombozat fölé emelkedő rövid szárakon nyílik; a virágok ötszirmúak, csészealj alakúak, lilás rózsaszín-rózsáslila színűek, finom erezettel, a porzók élénk rózsaszínűek. A virágok átmérője mintegy 2,5 cm. Virágzása tavasztól (május–június) nyár közepéig tart, majd a nyár folyamán szórványosan újabb virágok jelenhetnek meg. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek, poszméheknek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; napos helyen hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de az árnyékot is jól tűri.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, meszes, homokos vagy vályogos talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; megerősödve kiválóan szárazságtűrő, a rendszeres öntözést csak az első szezonban és hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 5–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán teljesen télálló, különösebb védelem nélkül is.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen, mert a fajta gyöktörzseivel terjed, és hamar összefüggő felületet borít.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást és serkenti az új bimbók képződését. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, ami friss lombozatot és egy esetleges másodvirágzást eredményez. A régi, elhalt leveleket kora tavasszal távolítsa el.

Áttéleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a csigák, a levéltetvek és a kabócák kisebb kárt okozhatnak. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel, és ritkán lisztharmat vagy levélfoltosság jelentkezhet.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább talajtakaróként, sziklakertbe, ágyásszegélybe, rézsűre, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiválóan alkalmas gyomelnyomó talajtakarónak, és dézsába, cserépbe is jó választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején lágy rózsaszín színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: levendula, kakukkfű, zsálya – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a gólyaorr tömör habitusát.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a gólyaorr virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 5–8.			
Carioca laposbarack	**Persica vulgaris 'Carioca' (R)**	5 300 Ft	5 300 Ft
A Carioca egy fehér húsú védett laposbarack fajta, amelyet középszezonban szüretelnek. A PSB (Spanyolország) termesztési programjából származik. Középidejű virágzása nagyon bőséges. Gyümölcsmérete a nagyobbak közé tartozik és formája kerekded, egyenletesen lapos. Íze kifejezetten aromás. Gyümölcsszíne tetszetős, a felület legnagyobb részén sötétpiros. Konténeres növényeket küldünk!			
Cassian kínai tollborzfű	**Pennisetum alopecuroides 'Cassian'**	2 750 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Cassian kínai tollborzfű (Pennisetum alopecuroides 'Cassian') kompakt, sűrű, bokros tövet képező, lombhullató évelő díszfű. Kifejlett magassága a lombozattal általában 40-60 cm, virágzáskor a virágzatokkal együtt elérheti a 60-90 cm-t; szélessége 30-75 cm között alakul. Levelei keskenyek, szalagszerűek, fényesek, élénkzöldek, és a tövénél sűrű, tömött csomót alkotnak; ősszel narancsvörös, rézvörös és aranysárga árnyalatokat vesznek fel, ami a fajta egyik legfőbb díszítőértéke. Virágai aprók, sűrű, hengeres, tollborzra emlékeztető bugákba tömörülnek, amelyek halvány rózsás-fehér színűek, némi bézs árnyalattal; a virágzatok a nyár közepétől (július-augusztus) egészen őszig nyílnak, és télen is megmaradnak a növényen. A virágfejek szélben lengedezve könnyed, elegáns látványt nyújtanak, és kiválóan alkalmasak vágott, illetve szárított virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a könnyű félárnyékot is elviseli, de árnyékos helyen a tövek megnyúlhatnak és kevesebbet virágozhatnak.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos, vályogos vagy meszes talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, és a rendszeres öntözést csak hosszan tartó aszály idején igényli. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, az USDA 4-9. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb teleken a fiatal tövek tövénél vastag mulcs alkalmazása javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy homokot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 40-60 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású díszfű-trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: A száraz lombozatot és a régi virágszárakat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, kb. 10 cm-re. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz levelek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: A növény télálló, de a fiatal tövek és a zord, csapadékos telek esetében a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. Ritkán a rozsda vagy a levélfoltosság jelentkezhet; a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább évelőágyba, sziklakertbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe is kiváló választás, ahol a lágy rózsás virágfejek és az őszi narancsvörös lombszín érvényesül. Kiváló vágott és szárított virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét. Jól mutat nagy levelű évelők mellett, amelyekkel szép textúrakontrasztot alkot.
Növénytársítások

Késő nyári és őszi évelők: varfű, kúpvirág, őszirózsa, naprózsa – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a tollborzfüvet.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-9.

Cassis cickafark	**Achillea millefolium 'Cassis'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Cassis cickafark a közönséges cickafark (Achillea millefolium) egyik legszebb, sötét virágú nemesített változata. Ez a megbízható, igénytelen évelő kiváló választás napos, szárazabb fekvésű kertekbe, ahol hosszú virágzási időszakával és különleges színével hívja fel magára a figyelmet.
Külső megjelenés
A Cassis cickafark bokros, tőből sarjadzó növény, amely kifejlett magassága 50-70 cm, szélessége 30-50 cm között alakul. A növény felálló, elágazó szárai merevek, és jól tartják a virágokat.
A legnagyobb dísze a virágzat: lapos vagy enyhén domború ernyőkbe tömörülő apró fejecskék, amelyeknek színe a sötét cseresznyepirostól a mély bíborvörösig terjed. A virágok közepe világosabb, gyakran fehéres, ami különleges kontrasztot ad. A virágzás júniusban kezdődik és szeptemberig, akár az első fagyokig tart. Az elnyílt virágok idővel világosabb rózsaszínes-barnás árnyalatot kapnak, de még hervadva is dekoratívak.
A levelek finoman szeldeltek, páfrányra vagy kaporra emlékeztetően áttetszőek, szürkészöld vagy ezüstzöld színűek. A lombozat a virágzás után is díszít, és kellemes, jellegzetes illatú – a cickafark leveleit évszázadok óta használják gyógyászati célokra és fűszerként.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos, meleg fekvésű helyet igényel. Félárnyékban a virágzás gyengébb, a növény szárai megnyúlnak, a virágszín is kevésbé intenzív.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban közepesen gazdag, meszes vagy semleges kémhatású talajt kedvel. A pangó vizet egyáltalán nem tűri. A száraz, homokos, köves talajokban is jól érzi magát, a túlzottan gazdag talajban viszont a lombozat kárára megy a virágzás.

Öntözés: kimondottan szárazságtűrő. A fiatal növényeket a begyökeresedésig rendszeresen öntözni kell, de az idősebb példányok a hosszabb aszályos időszakokat is gond nélkül átvészelik.

Tápanyag-utánpótlás: nem tápanyagigényes. A túlzott trágyázás a virágzás rovására mehet (túl sok lombot, kevés virágot hoz). Szegényebb talajokon tavasszal egy kevés komposzt elegendő.

Metszés: az elnyílt virágzatok visszametszésével (a virágzás után röviddel) serkenthető a második virágzás. Ősszel a növényt a talaj szintjén vissza lehet vágni. Továbbá a kellően gyakori vágás szükséges ahhoz, hogy a növény ne terjeszkedjen túlzottan.

Terjedés: A cickafark hajlamos a gyökérsarjakkal való terjedésre. Nagyobb felületeken ez előnyös talajtakarási szempontból, de kisebb kertekben érdemes a terjedését korlátozni (pl. gyökérzáróval vagy rendszeres osztással).

Telelés: kiemelkedően télálló. USDA besorolása 2-től 9-ig (vagy 10-ig) terjed, ami azt jelenti, hogy Magyarország egész területén, a leghidegebb tájakon is gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel.

Kártevők, betegségek: rendkívül ellenálló. A szarvasok, nyulak és a meztelen csigák is elkerülik. Ritkán lisztharmat jelenhet meg rajta (főleg ha túl sűrűn ültetik, vagy nem megfelelő a szellőzése).

Kertstílus, ahová illik
A Cassis cickafark rendkívül sokoldalú, a természetes és vadvirágos kertek nélkülözhetetlen eleme:

Vadvirágos kertekbe, természetes hatású kertekbe: a mezei virágok hangulatát idézi, és kiválóan illik a fésűsperje-félék, szarkalábak, lángvirágok társaságába.

Sziklakertekbe, mediterrán kertekbe: szárazságtűrése és alacsony igényei miatt ideális.

Napos évelőágyásokba: a virágok sötét cseresznyepirosa kiváló kontrasztot ad a kék és lila virágú évelőknek.

Vágott virágnak: virágai tartósak a vázában, vágott virágoknak is kiváló.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szárított csokrokba: az elszáradt virágzatok is mutatósak, száraz csokrok készítésére is alkalmas.

Változatos növénytársítások
A Cassis cickafark sötét, bogyós színe gyönyörűen érvényesül más növények társaságában:

Kék és lila virágú évelők: levendula, macskamenta, perovszkia, császárvirág – a hideg kék-lila tónusok és a meleg cseresznyepiros tökéletes kontrasztot alkotnak.

Ezüstös levelű növények: üröm, sziklaőr, kék csenkesz – a szürkés-ezüstös lombozat kiemeli a virágok intenzív színét.

Sárga virágú évelők: kúpvirág, napvirág, aranyvessző – a komplementer színek vibráló, vidám hangulatot teremtenek.

Díszfüvek: tollbuga, japán vértfű, kék csenkesz – a füvek laza, levegős habitusa jól kiegészíti a cickafark függőleges virágszárait.

Alacsony talajtakarók: varjúhájfélék, kakukkfű – a növény tövében takarhatják a talajt.

Őszi évelők: őszirózsa, kőtörőfű – a cickafark virágzása után veszik át a főszerepet.

USDA besorolása: 2-9 (Magyarország egész területén, a 2-es zónától a 9-es zónáig mindenhol biztonságosan nevelhető; a leghidegebb északkeleti tájakon is tökéletesen télálló).

Chayenne Spirit színes kasvirág	**Echinacea purpurea 'Chayenne Spirit'**	3 950 Ft	4 350 Ft

Egy egész nyáron át díszítő, kedvelt évelő növény. A A 'Chayenne Spirit' színes kasvirág egy színkeverék, mely változatos színekben pompázik, előre nem tudható a virágok pontos színe. Ezért javasoljuk több tő vegyes ültetését is. Talajjal szemben nem igényes, sőt a gyengébb minőségű talajokban szebben virágzik. Napos területre ültessük, rövidebb szárazságot is elvisel, ezért hétvégi házak kertjébe is ideális. Magas száron virágzó, júliustól szeptemberig nyílik. Napos évelőágyásba vagy szoliterként is ültethetjük Középmagas, felálló szárú, erőteljes növekedésű évelő. Tavasszal az elszáradt növényeket vágjuk vissza, ezután ismét kihajt. Sok színben létezik, a virágok megjelenése fajtánként eltérő. Tekintse meg évelő kínálatunkban a többi kasvirágot is!

Cherry Cola tűzeső	**Heuchera hybrida 'Cherry Cola'**	3 350 Ft	3 750 Ft

A Heuchera hybrida 'Cherry Cola' gyönyörű dísznövény, amely kiváló választás. Ez a hibrid növény a Heuchera nemzetség tagja, amely ismert a levelek változatos színeiről és textúráiról. A 'Cherry Cola' a nevét a lombozatáról kapja, amely mélyvörös, meleg csokoládébarna és bordó árnyalatokban pompázik. A levelek szív alakúak és enyhén hullámosak, ami tovább növeli a növény díszítő értékét. A 'Cherry Cola' közepes méretű, kompakt bokrot képez, ami ideális a kerti ágyások, sziklakertek vagy konténerek számára. Ez a növény nyáron apró, tűzpiros virágokat hoz, amelyek szép kontrasztot alkotnak a sötétvörös levelekkel. A virágok több hónapon át nyílnak, és vonzzák a méheket és pillangókat a kertbe. A 'Cherry Cola' virágai emellett vágott virágként is megállják a helyüket. A Heuchera hybrida 'Cherry Cola' igényei miatt könnyen gondozható növény. Szereti a részleges árnyékot, de jól bírja a naposabb helyeket is, különösen, ha a talaj kissé nedves, jól vízelvezető és tápanyagban gazdag. A rendszeres öntözést és a szárazság elkerülését érdemes szem előtt tartani. Télen, hidegebb éghajlati viszonyok között a növény általában visszahúzza a föld alatti részeit, de tavasszal újra kihajt. A 'Cherry Cola' remekül kombinálható más dísznövényekkel, például Hostákkal, Salviákkal vagy más Tűzesővel. Szép kontrasztot alkot az élénkzöld növényekkel vagy a sárga virágokkal.

Chocolate bordólevelű sédkender	**Eupatorium rugosum 'Chocolate'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Chocolate bordólevelű sédkender (Eupatorium rugosum 'Chocolate', újabb besorolás szerint Ageratina altissima 'Chocolate') Észak-Amerika erdei élőhelyeiről származó, felálló, bokros tövet képező évelő. Kifejlett magassága 80–120 cm, kedvező termőhelyen akár 150 cm is lehet; szélessége 50–80 cm között alakul. A tövek rendezett, oszlopos formát mutatnak, a szárak merevek, bordós-lila árnyalatúak, és nem igényelnek támasztékot. Levelei tojásdadok, fogazott szélűek, sötétbarna-bordós (csokoládé) színűek, és a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad; napos helyen a levélszín a legintenzívebb, de erős napsütésben és szárazságban a levelek megéghetnek.
A virágzat lapos tetejű, ernyőszerű fészekvirágzat, amely apró, fehér csöves virágokból áll, és a hajtások végén nyílik. Virágzása augusztustól októberig tart, és a fehér virágfürtök erős kontrasztot adnak a sötét lombozathoz. A virágok bőséges nektárt kínálnak a lepkékenek és más beporzóknak. A növény minden része mérgező, ezért fogyasztásra nem alkalmas, és a kisgyermekektől, háziállatoktól érdemes távol tartani.
Igényei

Fény: Félárnyékos vagy napos fekvés az ideális; a napos helyen a lombozat színe a legszebb, de a talajnak ilyenkor folyamatosan nedvesnek kell maradnia.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, közepesen nedves vagy nedves, enyhén lúgos–semleges kémhatású talajt kedvel. A pangó vizet rosszul tűri, de a tartósan száraz talajon a lombozat elveszíti színét.

Vízigény: Közepes–magas; rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári hőségben és száraz időszakokban.

Télállóság: Az USDA 4–8. zónában megbízhatóan áttelel; a föld feletti részek télen elszáradnak, tavasszal a tövéről újra hajt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse félárnyékos vagy napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 50–60 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani; száraz időszakokban hetente alaposan locsolja meg.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, hogy megakadályozza a nem kívánt magszórást. Kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt a régi szárakat a talajszint közelében vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, vegyes ágyásba, természetközeli és erdei kertbe, cottage- és informális kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Sötét lombozata miatt kiváló színfolt a zöld levelű évelők között, és jól mutat az ágyás középső vagy hátsó részén. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején vonzza a beporzókat.
Növénytársítások

Őszi virágzású évelők: őszirózsa, japán szellőrózsa, aranyvessző – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: díszfüvek, sédbúza, csenkesz – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a sédkender tömör virágzatát.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a sédkender virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-8.

Citromfű	**Melissa officinalis**	1 950 Ft	1 950 Ft

A Citromfű általában 30-60 cm közötti magasságot ér el. Levelei ellentétes elrendeződésűek, tojásdad alakúak, sűrűn fogazottak és rendkívül aromásak. Kisebb, fehér vagy halványrózsaszín virágai csoportokban állnak. Erősen citrom illatú.
A citromfű leveleit frissen vagy szárítva felhasználhatjuk salátákhoz, levesekhez, húsételekhez, halhoz és italokhoz is, például citromfű teához vagy limonádéhoz. Egyedi, frissítő citrom ízét adja az ételeknek és italoknak. A citromfű hosszú ideje ismert gyógyító tulajdonságairól. A növényből készült teával enyhíthetjük a stresszt, csökkenthetjük az alvásproblémákat, és segíthetünk emésztési problémák esetén. Az illóolajat is használják aromaterápiában.
Gondozási útmutató:
1. Fény és hőmérséklet:

A citromfűnek napos vagy félárnyékos helyre van szüksége.
Az ideális hőmérséklet 18-24°C között van, de a növény jól tűri az enyhe hideget is.

2. Talaj:

A jó vízelvezetéssel rendelkező, könnyű, homokos talaj a legmegfelelőbb.
Érdemes szerves anyaggal gazdagítani, például komposzttal.

3. Öntözés:

A citromfű szárazságtűrő, így mérsékelt öntözés elegendő.
Csak akkor öntözzünk, amikor a talaj felső része kissé kiszáradt.

4. Metszés:

Tavasszal vagy nyár elején vágjuk vissza a növényt, hogy serkentsük az új hajtások növekedését és a növény sűrűbb növényzetét.

5. Trágyázás:

Tavasszal és nyáron trágyázzuk meg a citromfüvet egy kiegyensúlyozott, univerzális trágyával.

Color Guard nagyvirágú pálmaliliom	**Yucca filamentosa 'Color Guard'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Magyarországon a pálmaliliomok széles körben ismert évelő dísznövények. A leginkább elterjedt fajta a nagyvirágú pálmaliliom, vagyis a Yucca filamentosa. Most ennek egy aranytarka színes levelű fajtáját láthatja. Erre a fajra a legmostohább körülmények között is számíthatunk. Örökzöld leveleivel, magasra nyúló virágzatával díszít olyankor, amikor a legtöbb hazai évelőfaj szenved a melegtől. Ajánljuk tehát mediterrán kertekbe bőrlevelű örökzöld cserjék, fák közelébe. Sziklakertekbe, kőkertekbe más pálmaliliomokkal. Szoliterként modern kertekbe. Ha nincs jobb ötletünk, akkor akár dézsába is tehetjük, teraszok, vendéglátó helyek díszítésére is alkalmas. Levelei nem olyan merevek, mint az alapfajé, így nem szúr annyira. USDA zóna: 5a

Compressum kínai tollborzfű	**Pennisetum alopecuroides 'Compressum'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Compressum kínai tollborzfű (Pennisetum alopecuroides 'Compressum') Kelet-Ázsiából származó, sűrű, kompakt, szökőkút alakú tövet képező, lombhullató évelő díszfű. Kifejlett magassága a bugavirágzatokkal együtt általában 40-80 cm, szélessége 40-60 cm között alakul; a tövek a tövüknél sűrű, tömött csomót képeznek, a levelek pedig elegánsan, ívesen lehajlanak. Levelei keskenyek, szalagszerűek, fényesek, középzöldek, és a tövénél sűrű, tömött lombozatot alkotnak; ősszel sárgásbarnára, majd bézsre színeződnek. Virágzata sűrű, hengeres, buga, amely augusztustól októberig nyílik; a bugák halvány sárgásbarna-bézs színűek, némi rózsás árnyalattal. A bugavirágzatok télen is díszítőértékűek maradnak, és kiválóan alkalmasak vágott, illetve szárított virágnak. A növény habitusa kompakt, rendezett, így kiválóan alkalmas kisebb kertekbe és konténeres termesztésre is.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a könnyű félárnyékot is elviseli, de a legbőségesebb virágzást és a legszebb habitust napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves, homokos, vályogos vagy meszes talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, az USDA 5-9. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb teleken a fiatal tövek tövénél vastag mulcs alkalmazása javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy homokot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 40-60 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású díszfű-trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: A száraz lombozatot és a régi virágszárakat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, kb. 10 cm-re. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz részek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: A növény télálló, de a fiatal tövek és a zord, csapadékos telek esetében a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. Ritkán a rozsda vagy a levélfoltosság jelentkezhet; a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább évelőágyba, sziklakertbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe is kiváló választás, ahol a lágy, bézs színű bugavirágzatok és az elegáns, ívelt lombozat érvényesül. Kiváló vágott és szárított virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét. Jól mutat nagy levelű évelők mellett, amelyekkel szép textúrakontrasztot alkot.
Növénytársítások

Késő nyári és őszi évelők: varfű, kúpvirág, őszirózsa, cickafark, naprózsa – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a tollborzfüvet.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 5-9.

Crystal Blue afrikai szerelemvirág	**Agapanthus africanus 'Crystal Blue'**	4 450 Ft	4 950 Ft

A 'Crystal Blue' agapantusz, más néven afrikai szerelemvirág, Dél-Afrikából származó, rendkívül dekoratív évelő növény, amely a mediterrán kertek egyik meghatározó dísze. A fajta nevét a virágok tiszta, halványkék színéről kapta, amely a nyár közepétől késő őszig varázsol üde színfoltot a kertbe.
Évelő, bokros növekedésű, tőlevélrózsás növény, amely kifejlett állapotban 40-60 cm magas és 30-40 cm széles. Levelei keskenyek, 30-50 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, dús, sűrű lombtömeget alkotnak. A levelek örökzöldek, bár hidegebb teleken részben visszafagyhatnak.
A növény igazi dísze a nyári virágzat. Júliustól egészen szeptemberig, a nyár közepétől késő őszig emelkednek ki a lomb közül a vaskos, 40-50 cm hosszú virágszárak, melyek csúcsán 10-15 cm átmérőjű, ernyős virágzatok nyílnak. Az ernyőket számos – akár 30-50 darab – csillag alakú, halványkék, világoskék színű virág alkotja. A virágok hosszan tartóak, vágott virágként is kiválóak, csokrokban akár egy hétig is eltarthatók.
Igényei és gondozása
A 'Crystal Blue' agapantusz napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza; félárnyékban virágzása mérsékeltebb lehet. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, homokos-vályogos kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, a gumós gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak.
Hazánkban a fagyérzékenysége miatt a legbiztonságosabb konténerben, dézsában tartani, és télen fagymentes, világos helyen (5-10 °C) teleltetni. Védett, déli fekvésű, házfal melletti kertekbe azonban ki is ültethető, ilyenkor téli takarást igényel: a tövét vastagon takarjuk be lombbal, komposzttal, a leveleit pedig fenyőágakkal vagy jutával védjük.
Gondozása egyszerű. A virágzás után az elnyílt virágszárakat vágjuk vissza. A rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja, de a túlöntözéstől óvakodjunk. Tavasszal és nyár elején tápanyag-utánpótlásról gondoskodjunk kálium- és foszforban gazdag műtrágyával. 3-4 évente tavasszal tőosztással szaporíthatjuk és frissíthetjük fel.
Felhasználás a kertben
A 'Crystal Blue' agapantusz kiválóan alkalmas konténeres, dézsás tartásra, ahol teraszok, erkélyek, bejáratok dísze lehet. Mediterrán hangulatú kertekben, déli fekvésű ágyásokban, házfalak tövében csoportosan ültetve mutat a legjobban. Vegyes évelőágyások középső sorába ültetve magasságával és színével struktúrát ad a kompozíciónak. Vágott virágnak is kiváló, elegáns csokrok alapanyaga lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos, jó vízelvezetésű talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula (Lavandula) és a zsálya (Salvia) lila virágai, amelyek színben is harmonizálnak a halványkék agapantusszal. Sárga virágú növényekkel, például napvirággal (Helianthemum) vagy cserjés ligetszépével (Oenothera fruticosa) élénk, kontrasztos kompozíciót hozhatunk létre. Díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a kínai ezüstfű (Miscanthus), ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk. Sötét levelű növényekkel, például bíborvörös levelű díszcsalánnal (Lamium) vagy sötét bazsarózsával, a halványkék virágok még jobban érvényesülnek.

USDA 8a

Csavart szittyó vagy Spirális békaszittyó	**Juncus effosus 'Spiralis'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Levélspiráljai különlegesek és díszítőek. A hajlékony, spirális levelek látványa különlegessé teszi a növényt, és egyedi hangulatot teremt a kertben vagy a vízi környezetekben. A szittyó könnyen fenntartható növény. Nem igényel különösebb gondoskodást, és ellenáll a szárazságnak és a hőnek is. Vízparti és mocsári környezetekben is jól megél. A szittyót vízpartokra vagy tavak mellé ültetve szép és funkcionális díszítő elemként is használható.
Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: A szittyó jól növekszik teljes napsütésben vagy enyhe árnyékban. Ügyeljen arra, hogy naponta legalább néhány óra napfény érje a növényt.

Vízigény: A szittyó igényli a rendszeres vízellátást. Figyeljünk, hogy talaj mindig enyhén nedves maradjon, különösen a forró nyári hónapokban. Ha vízpart vagy mocsár szélén fejlődik a legszebben.

Talaj: A szittyó jól növekszik laza és jó vízelvezetésű talajban. Ha szárazabb környezetben ültetjük, fontos a talajt nedvesen tartása.

Metszés: Időnként vágjuk vissza a növényt, hogy megőrizd annak kompakt formáját, és megszüntesd az elhalt leveleket.

Az alacsony hőmérsékletek elleni védelemként takarjuk mulccsal növényt.

Csomóslevelű varjúháj	Sedum forsterianum 'Oracle'	1 750 Ft	1 950 Ft

A csomóslevelű varjúháj általában 10-15 centiméter magasra nő, ami ideálissá teszi a sziklakertek, kavicságyások vagy konténerek számára. A Sedum forsterianum 'Oracle' kedveli a teljes napsütést vagy enyhe félárnyékot. A növény a napsugarak hatására a legszebb, élénk színeit mutatja. Kiváló választás sziklakertekbe, vagy tetőkertekbe is.
Gondozási útmutató:

Fény és elhelyezés: Helyezzük a növényt olyan területre, ahol legalább 6-8 óra napsütés éri naponta. A teljes napfény segíti a levélzet színének kialakulását és a növény egészséges fejlődését.

Öntözés: A csomóslevelű varjúhájok szárazságtűrő növények, ezért csak mérsékelt öntözést igényelnek. Egyedül az ültetés utáni évben igényel némi odafigyelést.

Talaj: A növény szereti a jó vízelvezetésű talajt. Legjobb a homokos, kavicsos talaj vagy kerti talajkeverék a megfelelő vízelvezetés érdekében.

Tápoldat: Nem igényel gyakori trágyázást, de évente egyszer adhatsunk neki egy általános célú kaktusztrágyát a növény vegetációs időszakában, a tavasztól nyár végéig.

Metszés: A Sedum forsterianum 'Oracle' általában nem igényel metszést. Ha azonban az elhalt részeket vagy sérült leveleket eltávolítsuk el.

Csőrös pálmaliliom	Yucca rostrata	3 950 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Yucca rostrata egy gyönyörű, szabályos gömbös üstökű, keskeny, ezüstszürke levelű jukka, mely 1-4,5 méter magasra is megnőhet. Eredeti élőhelyén Észak-Mexikóban és Texasban a félsivatagi táj legmagasabb növényei. A legszebb félsivatagi jukka! Védett helyre ültessük.
A Yucca rostrata, közismertebb nevén Csőrös pálmaliliom, egy szoborszerű, egzotikus megjelenésű dísznövény, amely gyakran választott dísze a modern és mediterrán kerteknek egyaránt. Mindenekelőtt karcsú, fa-szerű törzse és feszes, szálkás, kékeszöld leveleikből álló koronája teszi kiemelkedő szépségűvé. Az idők során lassan törzset fejleszt, ami akár 3-4 méter magasra is nőhet, látványos, gömbszerű levélkoronát alkotva.
Tavasszal vagy nyár elején hosszú virágszárakat hoz, amelyeken számtalan fehér vagy krémes virág bontakozik ki, tovább emelve a növény látványosságát. Rendkívüli szárazságtűrése miatt, jól alkalmazható napos, sziklás kertekben.
Ültetési tanácsok:

Hely kiválasztása: Ültessük napos, lehetőleg szélvédett helyre, ahol a talaj kiváló vízelvezető képességgel bír. Kiválóan alkalmas sziklakertekbe és kaktuszok mellé.

Talajelőkészítés: A legideálisabb számára a homokos, kavicsos, száraz talaj. Ültetés előtt érdemes a talajba homokot és apró kavicsot keverni a vízelvezetés javítására.

Ültetés: A gyökérlabda teteje egy szintben legyen a talajjal. Hagyjunk körülötte elegendő teret a növekedéshez, legalább 1-1,5 méteres távolságot.

Gondozási tanácsok:

Öntözés: Az első évben rendszeres öntözést igényel, különösen a gyökeresedés során, ezután azonban rendkívül szárazságtűrő.

Tápanyagok: Tavasszal juttassunk ki lassú lebomlású műtrágyát, hogy támogassuk a növekedést és elősegítsük a virágzást.

Téli gondozás: Habár jól bírja a hideget, fiatal növények esetén ajánlott a tövét mulccsal védeni a téli fagyok ellen.

7b-10b USDA-zóna

Csöves méhbalzsam	**Monarda fistulosa 'Purple'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A csöves méhbalzsam egy feltűnően szép, mézelő és gyógynövényként is értékes évelő növény. Lila-rózsaszín virágai és aromás levelei miatt kedveltek a kertészek és a méhek egyaránt.

Külső jellemzők:

Virágok: Lila-rózsaszín csöves virágok, melyek tömött fejecskékbe rendeződnek (júliustól szeptemberig virágzik).

Levelek: Lándzsa alakúak, szürkészöldek, erős fűszeres illattal (menta-bergamot hasonló).

Magasság: 70–100 cm magasra nő, egyenes, bokros habitussal.

Egyéb: Magvai madarak táplálékául szolgálnak ősszel.

Felhasználás és előnyök:

Mézelő növény: Méhek, lepkék és kolibrik kedvelt forrása.

Gyógynövény: Leveléből készült tea fertőtlenítő és megfázás elleni hatású.

Dísznövény: Virágai kiválóak vágott virágként vagy szárazvirág-alkotásokhoz.

Ökológiai szerep: Rezisztens a szarvasok és nyulak károsításaival szemben.

Ültetés és gondozás:

Fényigény: Napos vagy félig árnyékos helyet igényel.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza talajt preferál (mészkerülő, de alkalmazkodóképes).

Öntözés: Közepes vízigényű, de szárazságtűrő felnőtt korában.

Metszés: Tavasszal visszavágható, virágzás után érdemes csökkenteni a magok elszóródását.

Szaporítás: Osztható tavasszal vagy ősszel.

Fontos megjegyzések:

Terjedés: Gyökérzete terjedhet, érdemes korlátozni területét, ha kis kertben ülteti.

Betegségek: Érzékeny lehet lisztharmatra párás környezetben – ültesse légáteresztő helyre.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Társítás: Ültesse zsályával, rozmaringgal vagy egyéb mediterrán növényekkel.			
Dark Towers bugatölcsér	**Penstemon 'Dark Towers'**	2 550 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Dark Towers bugatölcsér (Penstemon 'Dark Towers') a Penstemon digitalis 'Husker Red' és a Penstemon 'Prairie Splendor' keresztezéséből származó, erőteljes, felálló, sűrű bokrot képező évelő. Kifejlett magassága a lombozattal 75–100 cm, szélessége 40–60 cm között alakul; a tövek rendezett, oszlopos formát mutatnak, a virágzati szárakkal együtt pedig elérik a 90–100 cm-t is. Levelei lándzsásak vagy keskenyen tojásdadok, fényesek, bronzos-bordó vagy sötétlila színűek, a szárakon keskeny, sötétlila levéllemezekké alakulnak, és a szín a nyár folyamán is jól megmarad.
A virágzat laza, 20–30 cm hosszú fürt, amely a szárak végén nyílik. A virágok kéttagúak, cső alakúak, finoman rózsaszín vagy fehéres-rózsaszín árnyalatúak, gyakran sötétebb tónussal a torokban. Virágzása júniusban kezdődik és augusztusig tart, az elnyílt virágfürtök rendszeres eltávolításával a virágzás meghosszabbítható. A virágok nektárt és pollent kínálnak a dongóknak, méheknek és lepkékenek, a szárak vágott virágként is megállják a helyüket.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a félárnyékot is elviseli, de a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, átlagos, szerves anyagban gazdag talajt kedvel; a pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény jól tűri a szárazságot, a nyári hőséget és a párás időt, a rendszeres öntözést csak az első szezonban és hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 3–8. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél laza téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A virágzás után a szárakat a felére rövidítheti, hogy serkentse az új hajtásokat és egy esetleges másodvirágzást; kora tavasszal, a fagyok elmúltával a régi szárakat az új hajtások fölött vágja vissza.

Áttelelтetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél laza takarás (pl. levél, fenyőág) segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel; ritkán levélfoltosság, rozsda és lisztharmat is jelentkezhet. A csigák és a meztelen csigák kisebb kárt okozhatnak. Az őzek általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, természetközeli és erdei kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Sötét lombozata miatt kiváló színfolt a zöld levelű évelők között, és jól mutat az ágyás hátterében vagy középső részén. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején vonzza a beporzókat.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a bugatölcsér tömör virágfürtjeit. Évelők: macskamenta, kasvirág, varjúháj, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót. Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a bugatölcsér virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 3–8.			
Darwin borbolya	**Berberis darwinii**	3 250 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Darwin-boróka a borbolyafélék (Berberidaceae) családjába tartozó, Dél-Amerika déli részéről (Chile, Argentína) származó örökzöld cserje. A fajt Charles Darwin fedezte fel 1835-ben, a Beagle hajó útja során, és róla nevezték el. A növényt 1849-ben vezették be a kertészeti kultúrába, és azóta az egyik legkedveltebb örökzöld cserjévé vált a mérsékelt éghajlatú kertekben. A Darwin-boróka sűrű, tövises habitusával, ragyogó virágaival és dekoratív bogyóival egész évben látványos eleme a kertnek. A könnyű gondozhatósága, a sótűrése és a városi környezethez való alkalmazkodóképessége miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Darwin-boróka egy sűrű, sűrűn elágazó, örökzöld cserje. Kifejlett magassága 2,5-4 méter, szélessége hasonlóan 2,5-4 méter között alakul, de különösen kedvező körülmények között ennél nagyobb is lehet. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások ívesen hajlanak, ami a cserjének elegáns, szökőkútszerű megjelenést kölcsönöz. A fiatal ágakat vörösesbarna, sűrű szőrzet borítja.
A levelek a növény egyik legszembetűnőbb jellemzői. A levelek kicsik, 1-3 cm hosszúak, visszás-tojásdadok, bőrszerűek, fényes sötétzöld színűek, és a magyal leveleihez hasonlóan szúrós fogakkal rendelkeznek a szélükön. A levelek csoportosan (2-5 darabban) nőnek a rövid hajtásokon, minden levélcsoport tövénél egy ötágú, szúrós tövis található. A lombozat egész évben dekoratív.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén kialakuló, bókoló, 2-7 cm hosszú fürtökben helyezkednek el, 10-20 virággal. A virágok kicsik, 5-7 mm átmérőjűek, csésze alakúak, élénk narancssárga vagy aranysárga színűek, gyakran vöröses árnyalattal a külső szirmokon. A virágzási időszak a kora tavasztól a késő tavaszig tart: Magyarországon jellemzően márciustól májusig, de kedvező körülmények között őszi másodvirágzás is előfordulhat. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
A virágzást követően a növény apró, 6-7 mm átmérőjű, gömbölyded, liláskék vagy sötétlila bogyókat fejleszt, amelyeket viaszos, kékes bevonat borít. A termések ősszel érnek be, és sokáig a növényen maradnak, téli díszként szolgálva, valamint a madarak számára fontos táplálékforrást jelentenek. Fontos tudni: a bogyók emberi fogyasztásra nem ajánlottak; a magvak és más részek mérgezőek lehetnek.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A Darwin-boróka napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legbőségesebb virágzást és a legsűrűbb lombozatot napos helyen hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a habitus lazábbá válhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; homokos, agyagos, vályogos és meszes talajokon egyaránt megél. A pH tekintetében savanyútól a lúgosig sokoldalúan toleráns. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, de a nedvességet megtartó talajban érzi magát. A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után jól tűri.

Öntözés: A növény közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett példányokat a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett növények szárazságtűrőbbek, de a legszebb növekedést a rendszeres, mérsékelt öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A Darwin-boróka közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag lassan oldódó, díszcserjék számára kifejlesztett műtrágya. A talajt érdemes komposzttal mulcsozni a nedvességmegőrzés és a tápanyag-utánpótlás érdekében.

Metszés és ápolás: A Darwin-boróka metszése fontos a sűrű habitus és a bőséges virágzás fenntartása érdekében, különösen sövényként történő nevelés esetén. A metszést a virágzás után, késő tavasszal vagy kora nyáron kell elvégezni, hogy a következő évi virágbimbók képződése ne sérüljön. A következő metszési műveleteket végezzük:

Tisztító metszés: Távolítsuk el az elhalt, sérült, keresztező vagy egymást súrlódó ágakat.

Formázó metszés: A növény formájának megtartása érdekében vágjuk vissza a túl hosszú hajtásokat.

Sövénymetszés: Sövényként ültetve a növényt a virágzás után nyírjuk vissza a kívánt magasságra és formára.

Telelés és fagytűrés: A Darwin-boróka mérsékelten télálló; az USDA 7-9-es zónákban nevelhető. Magyarország enyhébb, védett fekvésű kertekben (USDA 7-es zóna) takarással áttelelhet, de az ország nagy részén (USDA 6-os zóna) fagykárosodás előfordulhat, ezért védett, szélvédett helyre érdemes ültetni. A téli, száraz, hideg szelektől védeni kell.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A Darwin-boróka a látványos virágzásának, dekoratív bogyóinak, örökzöld lombozatának, tövises, sűrű habitusának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserje:

Sövényként – a sűrű, tövises növekedés miatt kiváló, áthatolhatatlan védősövény.

Szoliter növényként – a szökőkútszerű habitus és a látványos virágzat miatt kiváló magányos díszelem.

Vegyes ágyásokba, cserjesávokba, erdőszéli kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok és bogyók vonzzák a madarakat és a beporzó rovarokat.

Tengerparti kertekbe – jól tűri a sós permetet és a szeles körülményeket.

Városi kertekbe – jól tűri a városi környezetet.

Vadaskertekbe, természetes kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, bogyói a madarak számára táplálékot nyújtanak.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A Darwin-boróka narancssárga virágai és sötétzöld lombozata számos más növénnyel kombinálhatók:

Lila virágú növényekkel: Levendula (Lavandula) – a lila és a narancs szívek kontrasztos, vibráló hatást keltenek.

Fehér virágú növényekkel: Fehér virágú cserjékkel és évelőkkel – a fehér és a narancs szívek elegáns, tiszta hatást keltenek.

Sárga virágú növényekkel: Aranycserje (Forsythia) – a sárga és a narancs szívek meleg, napsütötte hatást keltenek.

Örökzöldekkel: Tűlevelűekkel, babérmeggyel – a sötétzöld háttér kiemeli a virágok és bogyók színét.

Rózsákkal – a tövises boróka kiváló háttér lehet a rózsák számára.

USDA besorolása: 7-9 (Magyarországon a Darwin-boróka mérsékelten télálló; az USDA 7-es, 8-as és 9-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) védett, szélvédett helyen, takarással nevelhető. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -10°C és -15°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok és a téli, száraz szelek károsíthatják.

7a-9b USDA-zóna

Deres fényperje	**Koeleria glauca**	2 350 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Megjelenés és jellemzők

Levelek: Keskeny, lándzsás, kékeszöld vagy szürkészöld színű, örökzöld vagy félig örökzöld. Levélzetük sűrűn borítja a talajt, így kiváló talajtakaró.

Virágzat: Nyár elejétől (június-július) szeptemberig hozza ezüstfehér, később aranybarnára érő bugáit, amelyek a levelek fölé emelkednek.

Növekedés: Kompakt, párnaalkotó habitusú, lassú növekedésű. Évente 20-30 cm szélességben terjed.

Ültetési javaslatok

Hely: Teljes napsütés – árnyékos helyen gyengén fejlődik.

Talaj: Laza, jó vízelvezetésű, homokos vagy meszes talaj. Kerülje a tápanyagdús, nedves talajokat, mert gyökérrothadást okozhat.

Távolság: Ültessen 20-30 cm távolságban más növényektől a terjedéshez.

Társítás: Kombinálja kék deres csenkeszekkel (Festuca glauca), piros cickafarkkal (Achillea) vagy tollborzfűvel (Pennisetum) a kontrasztért.

Gondozás

Öntözés: Kis vízigényű – csak fiatal növényeket öntözzön rendszeresen. Fejlett korban elég a csapadék.

Metszés: Tavasszal vágja vissza az elhalt leveleket és virágzatokat.

Trágyázás: Nem szükséges intenzív trágyázás. Tavasszal alkalmazzon enyhe, nitrogénszegény műtrágyát.

Teleltetés: Fagyálló (USDA 5-8 zóna), de erős télben érdemes mulcsozni szalmával.

Felhasználás és előnyök

Díszítés: Sziklakert, medencekeretek, ösvényszegély, konténerbe ültetés.

Ökológiai érték: Vonzza a rovarokat, és stabilizálja a talajt lejtős területeken.

Karbantartás: Alacsony igényű, ideális elfoglalt kertészeknek .

Desert Eve Yellow közönséges cickafark	**Achillea millefolium 'Desert Eve Yellow'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Desert Eve Yellow közönséges cickafark (Achillea millefolium 'Desert Eve Yellow') a Syngenta Desert Eve sorozatának tagja, amelyet a hagyományos cickafarknál lényegesen kompaktabb, tömörebb habitus és a korai, hosszú virágzás érdekében nemesítettek. Sűrű, bokros tövet képez, amelynek felálló szárai merevek, így a virágzatok jól tartottak, és a növény rendezett marad. Kifejlett magassága 30–45 cm, szélessége 35–45 cm között alakul; egyes források 35–45 cm-es magasságot és szélességet, mások 14–18 hüvelyk (kb. 35–45 cm) magasságot és 18–24 hüvelyk (kb. 45–60 cm) szélességet adnak meg. Levelei finoman szeldeltek, páfrányra emlékeztető textúrájúak, ezüstös-zöldek, és dörzsölésre jellegzetes, fűszeres-aromás illatot árasztanak.
A virágzat lapos tetejű, ernyőszerű fészekvirágzat, amely apró, csöves és nyelves virágokból áll, és a hajtások végén nyílik. A virágok élénk citromsárga–arany sárga színűek, a virágzatok átmérője mintegy 6 cm. Virágzása júniusban kezdődik, és egészen szeptemberig, kora őszig tart, ami a fajták többségénél hosszabb virágzási időt jelent. A virágok bőséges nektárt és pollen kínálnak a méheknek, lepkékenek és kolibriknek, a magfejek pedig télen táplálékot nyújtanak a madaraknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, árnyékban a szárak megnyúlnak és megdőlnek.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, sovány, homokos vagy kavicsos talajt kedvel. A gazdag, tápdús talaj és a bőséges öntözés a szárak megnyúlását és a tövek szétesését okozza; a pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél, nem különösebben válogatós.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 4-9. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében; a virágzás után a szárakat a talajszint közelében, a tőlevélrózsáig vágja vissza, ami újabb virágzási hullámot serkenthet. Kora tavasszal a régi, elhalt lombozatot távolítsa el. A töveket 2-3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat, a rozsda és a szárrothadás ritkán jelentkezhet, különösen párás, meleg időben. Az őzek és a nyulak általában elkerülik.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, kavics- és sziklakertbe, préri stílusú ültetésekbe, természetközeli és vadvirágos rétekre, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a lapos tetejű, citromsárga virágzatok és a

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
rendezett habitus érvényesül. Kiváló vágott és szárított virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben. Növénytársítások Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya (különösen a Salvia nemorosa fajták), kakukkfű – hasonló igényűek, és illatukkal, valamint kék-lila színükkel kontrasztot adnak a sárga virágokhoz. Évelők: kasvirág, kúpvirág, fekete szemű Susan, sédbúza, varjúháj – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót. Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a cickafark tömör virágzatát. Rózsák: a cickafark alacsony, laza habitusa jól kiegészíti a rózsák tövét, és elrejti azok alsó, kopaszabb részeit. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 4–9.			
Devon Green árnyékliliom	**Hosta 'Devon Green'**	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Devon Green' árnyékliliom egy közepes termetű, tömör és dús növekedésű hostafajta, amely akár 40 cm magasra és 60-80 cm szélesre is megnő. Fő értéke a fényes, sötétzöld színű, erősen érdes felületű levél, amely szabályos szív alakú és sűrű csomókat alkot. Július-augusztus hónapokban nyílnak a lila színű, harang alakú virágok, melyek a sötétzöld levélzet felett élénk kontrasztot teremtenek.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Távolság: 50-70 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Árnyékos gyomirtó takaró, növényágyások alapja, erdei kertek, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel, a levelek elszáradása után vágjuk vissza

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Csigák és meztelen csigák ellen védekezni kell

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek és erdei beültetések

Hagyományos árnyékos ágyások

Patakparti és nedvesebb helyek

Modern árnyékos kompozíciók

Konténeres ültetés árnyékos teraszokra

Dinamit selyemmirtusz (nagyobb)	**Lagerstroemia indica 'Dynamite'**	9 900 Ft	11 000 Ft
Dragon's Blood kaukázusi Varjúháj	**Sedum spurium 'Dragon's Blood'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Sedum spurium 'Dragon's Blood' egy figyelemfelkeltő és könnyen gondozható évelő növény, amely ideális választás a kertekbe. A növény sűrű, húsos levelei mélyvörös vagy bordós színben pompáznak, amelyek ősszel még élénkebb árnyalatot vesznek fel, ezzel szemet gyönyörködtető látványt nyújtva. A 'Dragon's Blood' tavasztól nyárig élénk piros vagy rózsaszín virágokat hoz, amelyek vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.
Ez a fajta alacsonyan növekvő és terjedő habitusú, így kiválóan alkalmas talajtakaróként vagy szegélyezéshez. A sűrű lombozat segít meggátolni a gyomok növekedését is.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Sedum spurium 'Dragon's Blood' napfénykedvelő növény, amelynek legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a legjobb színfelvétel érdekében.
Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy kavicsos talaj az ideális számára. A növény jól bírja a szárazabb körülményeket is.
Öntözés: A 'Dragon's Blood' szárazságtűrő, de a fiatal növényeket körülbelül az ültetést követő első évben ajánlott rendszeresen öntözni.
Trágyázás: Általánosságban nem igényel trágyázást, de tavasszal egy alacsony nitrogéntartalmú műtrágya segíthet a növekedés serkentésében.
Téliesítés: Fagyálló, de érdemes a leveleket a téli hónapok előtt levágni, hogy megóvjuk a növényt a szélsőséges időjárástól.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmas sziklakertbe, ahol a kövekkel és más dísznövényekkel együtt szép kompozíciókat alkothat.
Virágágyásokban is jól mutat, ahol más alacsony növényekkel kombinálva élénk színt ad a tájnak.
Talajtakaróként is funkcionál, mivel sűrű lombozata segít meggátolni a gyomok növekedését.

A Sedum spurium 'Dragon's Blood' nemcsak szemet gyönyörködtető megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is kiemelkedik, így ideális választás minden kertész számára, aki szeretné színesebbé tenni a kertjét.

Drummer Boy árnyékliliom	Hosta 'Drummer Boy'	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Drummer Boy' árnyékliliom egy nagyméretű, robusztus növekedésű hostafajta, amely akár 70-80 cm magasra és 100-120 cm szélesre is megnő. Fő értéke a hatalmas, szív alakú, szürkéskék színű levél, amely erősen érdes felületű és mélyen erezett. A levelek akár 25-30 cm hosszúak is lehetnek, ami igazi látványossággá teszi ezt a növényt. Július-augusztus hónapokban nyílnak a fehér, illatos, tölcsér alakú virágok, melyek a magas, egyenes szárakon a levélzet felett kiemelkedve különleges kontrasztot alkotnak a kék levelekkel.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talajl

Távolság: 100-120 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter növényként, nagy árnyékos területek takarására, erdei kertek fő eleme

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel, a levelek elszáradása után vágjuk vissza a földszintre

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: A csigák és meztelen csigák ellen védekezni kell

Ajánlott kerttípusok

Nagy árnyékos kertek

Erdei beültetések és parkok

Japán stílusú kertek

Tó- és patakparti kertek

Nagyméretű konténeres ültetések

Drummer Boy Hosta (árnyékliliom) - 6 db-os csomag	Hosta 'Drummer Boy'	14 070 Ft	20 100 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Árnyékos és félárnyékos helyen érzi magát a legjobban

Szép, kékeszöld, egyszínű levelei dekoratív díszei a kertnek

Talajban nem igényes, de a tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű talajt kedveli

Évelő, Magyarországon kiválóan teleltethető a szabadban

Nyár közepén halványlila virágokat hoz

Kiváló talajtakaró és szegélynövény, de csoportosan ültetve is lenyűgöző látvány

Az akció készlet erejéig tart!

Égőszerelem	Lychnis chalcedonica	1 950 Ft	1 950 Ft

Az Égőszerelem (Lychnis chalcedonica 'Red') egy díszes évelő növény, amely lenyűgöző, élénk piros virágokkal borítja be a kerteket nyár folyamán. A növény 70-90 cm magasra nő, és erős, egyenes szárakkal rendelkezik, amelyek a napfényben szépen ragyognak. A virágok csoportosan nyílnak, és a méhek, valamint a pillangók kedvelt táplálékforrásai.
Ez a növény napos helyeken fejlődik a legjobban, és jól tűri a szárazságot is, miután megerősödött. A talaj legyen gazdag, jó vízelvezetésű, ugyanakkor tápanyagban gazdag is. Az Égőszerelem tökéletes hátteret ad más virágoknak a kertben, és sziklakerti növényként is remekül alkalmazható.
Gondozási Útmutató:

Öntözés: Az Égőszerelem öntözése mérsékelt, a talaj száradását követően. Különösen fontos a vízellátás virágzás idején.
Fényigény: Napos helyet igényel, legalább napi 6-8 óra közvetlen napfényt.
Tápanyag: Két évente ajánlott komposzt vagy növényi táp hozzáadása a talajhoz.
Ápolás: Az elnyílt virágokat érdemes leszedni, hogy serkentsük az új virágok fejlődését.

Felhasználási lehetőségek:

Kerti ágyások és virágágyás létrehozására
Vágott virágok elkészítésére, hiszen tartóssága miatt hosszú ideig friss marad
Sziklakertbe és vegyes növényalkalmazásokba, ahol kiemelkedő színfoltot ad

Egyedi madáretető		4 450 Ft	4 450 Ft

Anyaga: vékonylazúrral kétszer mázolt fenyőléc, rozsdamentes rács, tű, és lánc
Tartozékok: lánc, tű
Az etető rácsos része alkalmas ömlesztett magok, gyümölcs, vagy kenyérdarabok elhelyezésére, míg az etető tetjén lévő kihúzható tűre szalonnabőrt, gyümölcsöket, faggyúgolyót, és egyéb darabos eledelt lehet feltűzni, vagy felakasztani.

Egyiptomi menta	Mentha rotundifolia	2 250 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Egyiptomi menta, más néven kereklevelű menta, egy gyógynövény, a hagyományos mentafajok közé tartozik, és számos kulináris és gyógyászati felhasználási lehetőséget kínál. Jellegzetessége a levelek alakja, amelyek kerekdedek és kissé meghajlóak. A növény általában 30-60 cm magasra nő, hajtásai gyökeret is képezhetnek, ami azt eredményezi, hogy a kereklevelű menta gyorsan terjedő növényként viselkedik. Ez a növény szereti a nedves, jó vízelvezetésű talajt, a napos vagy félárnyékos helyeket. A kereklevelű menta viszonylag ellenálló és könnyen gondozható, de szüksége van rendszeres öntözésre a száraz időszakokban. Az Egyiptomi menta rendkívül sokoldalúan felhasználható a konyhában. A levelek frissen vagy szárítva egyaránt használhatók. Az intenzív mentás aroma és frissesség miatt kiválóan alkalmazható saláták, szószok, levesek, italok és desszertek ízesítésére. A menta tea is népszerű ital, melyet a kereklevelű mentából is elkészíthetünk. A levelek akár fagylalt vagy koktél díszítésére is felhasználhatók, hogy extra frissességet és ízt adjanak az ételeknek és italoknak. Gyógyászati szempontból az Egyiptomi menta hosszú történelemmel rendelkezik. Az illóolajokban gazdag levelek enyhíthetik az emésztési problémákat, mint például a puffadás, hasmenés vagy gyomorrontás. A menta tea nyugtató hatású lehet és segíthet enyhíteni a fejfájást vagy a stresszt. A friss mentalevelek hűsítő hatásúak lehetnek a bőrre, és akár házi kozmetikai termékek, például arclemosók vagy tonikok készítésére is használhatók. Összességében a kereklevelű menta egy sokoldalú növény, amely széles körben felhasználható a konyhában és a gyógyászatban. A kertben való termesztése viszonylag egyszerű, és kellemes illata és íze hozzájárulhat az ételek és italakok ízletes és frissítővé tételéhez. A kereklevelű menta gyorsan növekszik és terjed, ezért érdemes korlátozott területre ültetni, vagy rendszeresen ellenőrizni a növekedését. Az Egyiptomi menta gondozása során fontos, hogy rendszeresen nyírjuk vissza a növényt, hogy serkentsük az új hajtások növekedését, és megőrizzük kompakt alakját. Ezzel együtt a virágzatot is érdemes időben eltávolítani, hogy megakadályozzuk a túlzott terjedést és az energiavesztést. A növény általában téláló, és visszatérő évelőként viselkedik, ami azt jelenti, hogy évről évre újra megjelenik a kertben. Azonban hidegebb éghajlati viszonyok között érdemes téli takarást biztosítani a növénynek, például szalma vagy falevelek rétegével, hogy megvédje a fagy okozta károktól. menta egy könnyen termeszthető és sokoldalú növény, amely izgalmas ízvilágot hoz a kertbe és a konyhába. Legyen szó frissítő italokról, ízletes ételekről vagy gyógyászati felhasználásról, ez a mentafajta bőségesen megfelel az elvárásoknak. Tehát ültessünk egy Egyiptomi menta növényt a kertbe, és élvezzük a frissességét és az aromáját, amely a kulináris élményeket gazdagítja és az egészségünket támogatja.

Elijah Blue derescsenkesz	**Festuca glauca 'Elijah Blue'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Festuca glauca 'Elijah Blue' a díszfüvek egyik legismertebb és legkedveltebb képviselője, amelyet lenyűgöző, jégkék lombozatáért ültetnek. Ez a kompakt, örökzöld vagy félörökzöld díszfű igazi színfoltja a kertnek a tavaszi kihajtástól egészen a tél beálltáig. Nem véletlenül tartják az egyik legjobb kék levelű csenkeszfajtának, mivel színe a nyári hőségben is tartósan megmarad.
Külső megjelenés és kifejlett méret: Az 'Elijah Blue' tökéletesen szabályos, sűrű párnát vagy dombot formázó növésű. Levelei vékonyak, tűszerűek, és jellegzetes, intenzív ezüstös-kék színűek. Ez a hideg színhatás a leveleket borító viaszrétegnek köszönhetően alakul ki, és napos helyen a legragyogóbb. Kora nyáron (június-július) a lombszintnél magasabbra emelkedő, vékony szálakon megjelennek világosbarna virágzatai, amelyek finom kontrasztot alkotnak a kék lombozattal.

Magasság: A lombozat magassága eléri a 20-25 cm-t.

Szélesség: Terjedése hasonló méretű, általában 20-30 cm között alakul.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Teljes napsütést igényel. Napos helyen a legszebb és legintenzívebb a lombozat kék színe. Félárnyékban hajlamos kizöldülni és felkopaszodni.

Talaj: A legfontosabb számára a kiváló vízelvezetés. A száraz, laza szerkezetű, akár homokos vagy köves talajokat kedveli. A pangó vizet, a nehéz, agyagos talajt egyáltalán nem tolerálja, ilyen helyen kirothad.

Öntözés: Ültetés után és a beállásig rendszeres öntözést igényel. Idősebb korában kifejezetten szárazságtűrő. A túlöntözést kerülni kell, mert az a gyökerek rothadásához vezethet.

Télállóság (USDA-zóna): A növény rendkívül télálló, USDA 4-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén megbízhatóan télálló, különösebb védelem nem szükséges számára.

Metszés és osztás:

Tavaszi tisztítás: Kora tavasszal (február-március) érdemes a növényt visszavágni kb. 5-10 cm-re a talajtól. Ezzel eltávolítjuk az előző évi megkopott, száraz leveleket, és helyet adunk az új, friss, élénk színű hajtásoknak.

Virágzat eltávolítása: Ha nem szeretnénk a magokkal való szaporodást, vagy a tömör, tiszta lombszőnyeg a cél, a virágzatokat nyugodtan levághatjuk.

Osztás: A növény 3-4 évente történő tavaszi osztása javasolt. Idősebb korban ugyanis a tövek közepe kiritkulhat, elöregedhet. Ilyenkor érdemes kiásni, éles késsel feldarabolni, és az egészséges, külső részeket visszaültetni.

Ellenállóság: Szarvasok és nyulak számára ellenálló. Betegségekre nem fogékony, amennyiben a megfelelő (száraz, jó vízelvezetésű) körülményeket biztosítjuk számára.

Kertstílus és növénytársítások:
Kompakt mérete és feltűnő színe miatt rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Sziklakert: A sziklakertek nélkülözhetetlen ékköve, a kövek között, sziklarepedésekből kifutva mutat a legjobban.

Szegélynövény: Ágyások, utak szegélyezésére alacsony, színes sövényként, akár formális kertekbe is.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Talajtakaró: Tömegével ültetve nagyobb felületeket is beboríthat, ezüstkék szőnyeget alkotva.

Konténeres növény: Erkélyen, teraszon cserépben is tartható, ahol közelről élvezhetjük különleges színét.

Mediterrán és modern kertek: Kék színe és letisztult formája kiválóan illik a modern, minimalista kertekbe és a mediterrán hangulatú ültetésekbe.

Ajánlott növénytársítások:

Lila és rózsaszín virágúak: A kék lombozat fantasztikusan kiemeli a lila és rózsaszín virágokat. Társítsuk levendulával (Lavandula), macskamentával (Nepeta), tarka levelű zsályával (Salvia) vagy tűzbogyóval (Pyracantha).

Sárga és narancs virágúak: Klasszikus színkontraszt. Ültessük mellé, napvirágot (Helianthemum) vagy körömvirágot (Calendula).

Bordó lombozatú növények: A kék és bordó drámai kombinációt alkot. Társítsuk bordó levelű borbolyával (Berberis) vagy vérvörös díszfüvekkel.

Más díszfüvek: Különböző textúrájú és színű díszfüvekkel (pl. tollborzfű (Pennisetum), kínai ezüstfű (Miscanthus)) izgalmas, strukturális ágyást hozhatunk létre.

Fehér virágú és levelű növények: Elegáns, világító kombinációt alkot a fehérrel, például fehér kőtörőfűvel (Saxifraga).

Pozsgás növények: Szárazságkedvelő társításként ültessük varjúhájjal (Sedum) vagy kövirózsával (Sempervivum).

USDA zóna: 4b-9a

Enyves zsálya	**Salvia glutinosa**	1 950 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Enyves zsálya (Salvia glutinosa) – A ragadós, halványsárga virágú erdei zsálya
Az enyves zsálya az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó, Közép- és Kelet-Európában, valamint Nyugat-Ázsiában őshonos, évelő lágyszárú növény. A „glutinosa” fajnév a latin „enyves, ragadós” jelentésű szóból ered, ami a növény egészét borító mirigyszőrökre utal. Ez a zsálya a nyár közepén nyíló, feltűnően nagy virágaival és igénytelenségével válik a félárnyékos, erdei kertek egyik kedvelt évelőjévé. A könnyű gondozhatósága, kiváló télállósága és a méhek vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
Az enyves zsálya egy 40-100 cm magasra növő, felálló szárú, bokrosodó évelő növény. Szára négyszögletes, serteszőrös, az egész növényt ragadós, enyves váladékot termelő mirigyszőrök borítják.
A levelek hosszú nyelűek, tojásdadok, a levélváll dárdaszerű, csúcsa kihegyezett, széle fűrészes. A levél felső oldala és a fonák érhálózata finoman szőrös.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtás végén fejlődő, 15-25 cm hosszú, bugás örvök sorozatából áll, egy-egy örvöt általában 5-6 virág alkot. A virágok feltűnően nagyok, hosszuk 3,5-4 cm, kétajkúak. Színük halványsárga, finoman vörösesbarnán pontozott. A felső ajak boltozatosan görbült, az alsó ajak középső lebenye feltűnően nagy és lefelé hajlik. A virágzási időszak júliustól szeptemberig tart. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, barna magvakat fejleszt. A növény magról és vegetatív úton (tőosztással) egyaránt szaporítható.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: Az enyves zsálya félárnyékos vagy árnyékos fekvést igényel. A legszebb, legdúsabb virágzást félárnyékos, szellős fekvésben hozza. Napos helyen csak akkor fejlődik jól, ha a talaj kellően nyirkos.

Talaj: Az enyves zsálya laza szerkezetű, nyirkos, humuszban gazdag, meszes talajt igényel. A pangó vizet nem tolerálja, de a talaj folyamatos nedvességét igényli. A száraz, homokos, tápanyagszegény talajokat nem tűri. Ültetéskor érdemes a talajt komposzttal vagy érett szerves trágyával dúsítani a tápanyagtartalom és a víztartó képesség növelése érdekében.

Öntözés: Az enyves zsálya közepes vagy magas vízigényű; a rendszeres, bőséges öntözést kedveli. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 2-3 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövid szárazságot is elviselik, de a legszebb lombozatot és a bőséges virágzást nedves talajban hozzák.

Tápanyag-utánpótlás: Az enyves zsálya közepes vagy magas tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy réteg (3-5 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva (mulcsozva). A második, kisebb adag a virágzás előtt (június eleje) adható.

Metszés és ápolás: Az enyves zsálya alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt visszavághatjuk a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal (március-április) vagy kora ősszel (szeptember) javasolt.

Telelés és fagytűrés: Az enyves zsálya kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -30°C és -35°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
Az enyves zsálya a feltűnő, halványsárga virágzásának, kiváló télállóságának és a félárnyékos, nyirkos környezet iránti igényének köszönhetően az egyik legkedveltebb erdei évelő:

Erdőszéli ágyásokba, ligeterdős kertekbe – a természetes élőhelyéhez hasonló környezetben ideálisan érzi magát.

Természetes hatású kertekbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Félárnyékos évelőágyásokba – a félárnyékos, nyirkos, humuszos talajú ágyásokban kiválóan fejlődik.

Gyógy- és fűszerkertekbe – a zsályákhoz hasonlóan gyógyhatású növény, de fogyasztása előtt szakemberrel konzultáljunk.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) Az enyves zsálya halványsárga virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (félárnyékos, nyirkos, humuszos talajú) növénnyel kombinálhatók: Lila és kék virágú növényekkel: Erdei macskamenta (Nepeta), ligeti zsálya (Salvia nemorosa) – a sárga és a lila-kék szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak. Fehér virágú növényekkel: Erdei gyöngyvirág (Convallaria majalis), réti legyezőfű (Filipendula ulmaria) – a sárga és a fehér szívek elegáns, tiszta hatást keltenek. Páfrányokkal: Erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) – a páfrányok finoman szeldelt, világoszöld lombozata kiválóan kiegészíti a zsálya tömöttebb leveleit. Árnyéki díszfüvekkel: Erdei sédbúza (Deschampsia cespitosa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a zsálya formáját. Más zsálya fajtákkal: Erdei zsálya (Salvia nemorosa) fajtákkal – a különböző színű és habitusú zsályák egymás mellett változatos, gazdag hatást keltenek. USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon az enyves zsálya teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C és -35°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Erdei tündérfürt	**Aruncus dioicus**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az erdei tündérfürt nevét a hatalmas, tollszerű virágzatairól kapta, amelyek a nyár elején igazi látványossággá teszik a kert árnyékos zugait. Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában őshonos, a mérsékelt övi erdők lakója.
Külső megjelenés
Az erdei tündérfürt erőteljes, rizómás évelő, amely nagy, terebélyes, 1,2-2 méter magas, bokros telepeket képez. A növény mérete és dús lombozata miatt a kert egyik domináns elemévé válhat. A levelek nagyok, akár 50 cm hosszúak is lehetnek, összetettek, kétszeresen szárnyaltak, 5-15 cm hosszú levélkékkel. A levél színe sötétzöld, fonákja világosabb, őszi lombja sárgás-narancsos színűre színeződik.
A növény legnagyobb dísze a virágzat. A virágok aprók, de hatalmas számban, 20-40 cm hosszú, tollbojtszerű, felálló vagy enyhén bókoló fürtökbe tömörülnek. A virágzat a növény csúcsán, a lombozat fölé magasodva nyílik. A virágok színe krémfehér vagy halványsárga.
A növény kétlaki (dioecious), ami azt jelenti, hogy a hím- és nőivarú virágok külön egyedeken fejlődnek. A hímivarú példányok virágzata dúsabb, felállóbb és látványosabb, mivel a porzók száma több (a virágonként 20-30 porzószál is lehet). A nőivarú példányok virágzata visszafogottabb, bókoló, és a virágokon 3 termő található.
Virágzás
Az erdei tündérfürt június-július hónapokban virágzik. A virágok a beporzó rovarok (méhek, pillangók, legyek) számára értékes nektár- és pollenforrást jelentenek.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy árnyékos, hűvös helyet kedvel. A déli, erős napon a levelei megéghetnek és a növény satnyul. A reggeli vagy késő délutáni, szórt fényt tolerálja a legjobban.

Talaj: Mély rétegű, tápanyagban gazdag, humuszos, nyirkos, jó vízáteresztő képességű talajt igényel. A pangó vizet nem tűri, de a talaj soha nem száradhat ki teljesen. A pH tekintetében nem válogatós: a semleges vagy enyhén savanyú talajok a legjobbak.

Öntözés: Kimondottan vízigényes. A növény nem tűri a tartós aszályt; a levelek ilyenkor megperzselődnek, a növekedése leáll. A legszebb példányok a rendszeres, mélyreható öntözést kapják.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatni a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést. Az elvirágzott, elszáradt szárakat késő ősszel vagy kora tavasszal a talaj szintjén lehet visszavágni. Ez serkenti az új, erős hajtások képződését, és a növény dúsabb, bokrosabb lesz.

Támasztás: A növény magassága és a virágok súlya miatt szükség lehet támrendszerre (pl. karó, növénytartó gyűrű), hogy megakadályozzuk a szárak megdőlését, különösen a hímivarú, dús virágzatú példányoknál.

Terjedés: A növény rizómái révén idővel szélesedő telepeket képezhet, de nem invazív módon. A kertben érdemes a terjedését figyelemmel kísérni.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény a föld feletti része ősszel elfagy, de a rizóma mélyen a talajban áttelel, és tavasszal újrahajt. Külön védelmet nem igényel.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló. A leveleket időnként hernyók károsíthatják, a pangó vizes talajban a gyökérrothadás előfordulhat.

Felhasználás a kertben
Az erdei tündérfürt a méretének és habitusának köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szoliterként (magányos évelőként) – egy kifejlett példány a kert dísze lehet, különösen egy fa alatt vagy a ház északi oldalán

Csoportos ültetésre – több tövet egymás mellé ültetve egy hatalmas, áttört, virágzó függöny hatását kelti

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Erdős, természetes hatású kertekbe, erdőszegélybe – eredeti élőhelyét idézi			
Árnyékágyásokba – ahol a napfény hiánya miatt más növények nem érzik jól magukat			
Vízparti (patak, tó) kertekbe, nedves talajú ágyásokba – természetes élőhelyének nedvességigényét tükrözi			
Vadvirágos, illatos kertekbe – virágai vonzzák a beporzó rovarokat			
Vágott virágnak, szárított csokrokba – a virágzatok hosszú ideig frissek maradnak a vázában			
Változatos növénytársítások Az erdei tündérfürt nagyszerűen kombinálható más, hasonló igényű növényekkel:			
Páfrányokkal – a páfrányok finom, szeldelt levelei tökéletesen kiegészítik a tündérfürt tömeges, dús lombozatát			
Árnyékliliomokkal (Hosta) – a különböző színű és méretű Hosta fajták a tündérfürt alatti talajtakaróként szolgálhatnak			
Tüdőfűvel (Pulmonaria) – tarka levelű, kora tavaszi virágzása színt visz a kompozícióba			
Harangvirágokkal (Campanula) – az erőteljesebb, magasabb fajták virágai a tündérfürt mellett nyílnak			
Rododendronokkal, havasszépekkel (Kalmia) – a tündérfürt lombhullató növényként a savanyú talajt kedvelő, örökzöld cserjék társaságában is jól érzi magát			
Díszfüvekkel – a laza, mozgó habitusú fűfélék oldják a tündérfürt tömöttebb formáját			
Tavaszi hagymásokkal (krókuszok, nárciszok, gyöngyike) – a hagymások a tündérfürt lombfakadása előtt, kora tavasszal még elegendő fényhez jutnak a tövében			
USDA besorolása: 3-9 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is biztonságosan nevelhető).			
Erica Robin kerti ligetszépe	**Oenothera fruticosa 'Erica Robin'**	3 450 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Erica Robin kerti ligetszépe (Oenothera fruticosa 'Erica Robin', más néven Oenothera tetragona 'Erica Robin') a ligetszépe nemzetség észak-amerikai származású, felálló, bokros, enyhén terjedő habitusú, lombhullató évelője. Kifejlett magassága 40–60 cm, szélessége 20–40 cm között alakul; a tövek alacsony, széles párnát formáznak, a szárak felállók, merevek, és nem igényelnek támasztékot. Levelei keskenyek, lándzsásak, enyhén fogazott szélűek, és a fajtára jellemző, hogy tavasszal halvány narancsszínben fakadnak, nyáron zöldre, ősszel pedig sötétvörösre váltanak – ez a lombszín-változás önmagában is figyelemreméltó díszítőérték.
A virágzat a hajtások végén nyílik, a virágok tölcsér vagy csésze alakúak, élénk sárga-arany sárga színűek, és piros vagy narancsvörös bimbókból nyílnak. A virágok átmérője mintegy 5 cm, és a fajta rendkívül virágdús: a virágzás június elejétől egészen szeptemberig tart, folyamatosan újabb virágokat hozva. Az egyes virágok rövid életűek, de a tömeghatás miatt a növény hosszú heteken át virágba borultnak tűnik. A virágok enyhe, kellemes illatot árasztanak, és bőséges nektárt kínálnak a méheknek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár sovány, homokos, meszes vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell; a meszes talajt kifejezetten meghálálja.

pH: Semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson érzi jól magát.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Az USDA 6–10. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán (6–7. zóna) védett, napos fekvésben különösebb védelem nélkül is áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és a bokor szétesését okozhatja.

Metszés: Az elnyílt virágokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, ami serkenti az új hajtásokat és egy esetleges másodvirágzást. A töveket 2–3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, kavics- és sziklakertbe, mediterrán hangulatú kertekbe, természetközeli és vadvirágos rétekre, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, bokros habitusa miatt talajtakaróként is használható, és dézsába, cserépbe is kiváló választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő, meleg sárga színfoltot ad a kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Növénytársítások			
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a ligetszépe tömör habitusát.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Évelők: cickafark, varjúháj, sédbúza, kasvirág – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a ligetszépe virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 6–10 (a magyarországi klímán, a 6–7. zónában védett fekvésben megbízhatóan áttelel).			
Erromena árnyékliliom	**Hosta 'Erromena'**	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az 'Erromena' árnyékliliom egy közepes-nagy termetű, tömör habitusú hostafajta, amely akár 50-60 cm magasra és 70-90 cm szélesre is nő. Fő jellemzője a sötétzöld, szív alakú, fényes felületű levél, amely sűrű csomókat alkot. Különlegessége a magas, 80-100 cm-es virágszárakon nyíló tiszta fehér virágok, amelyek július-augusztus hónapokban tömör fürtöket alkotnak. A fehér virágok és sötétzöld levelek kontrasztja különösen dekoratív.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Távolság: 60-80 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter növényként, háttérnövényként, árnyékos talajtakaró, erdei kertek

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel, a levelek elszáradása után vágjuk vissza a földszintre

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: A csigák és meztelen csigák ellen védekezni kell

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek és erdei beültetések

Hagyományos árnyékos kertek

Virágzáskor hangsúlyos helyek

Tó- és patakparti kertek

Konténeres ültetés árnyékos teraszokra

Every Dayliy Rose sásliliom	**Hemerocallis 'Every Dayliy Rose'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az 'Every Daylily Rose' egy tömör, törpe habitusú sásliliom, amely maximum 30-40 cm magasra és szélesre nő. Ez a kis termet és rendkívül hosszú virágzási ideje (június-augusztus) teszi ideálissá kisebb kertek, edényesültetések vagy a növényágyások első sorai számára. Lágy rózsaszínű, sárga torkú, kagyló formájú virágai bájos hangulatot kölcsönöznek a kertnek.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon vagy részleges árnyékban

Talaj: Bármilyen jó vízáteresztő kerti talaj; nagyon alkalmazkodóképes

Időzítés: Kora tavasztól késő őszig, de ideális a tavaszi ültetés

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal

Használat: Növényágyások élén, határok kialakítására, konténerekbe

Gondozási útmutató

Metszés: A levirágzott szárakat érdemes eltávolítani. Leveleit késő ősszel vagy kora tavasszal vágjuk vissza a földszintre.

Télvédelem: Teljesen télálló, kiváló fagytűrő képességgel rendelkezik.

Öntözés: Ültetés után szükséges. Kifejlett növényként szárazságtűrő, de hosszú száraz időszakban öntözzük.

Táplálkozás: Tavasszal egy kevés többkomponensű műtrágya vagy komposzt javítja a virágzás minőségét.

Általános: Rendkívül egyszerűen tartható, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos. Évente nem szükséges osztani, csak ha a tő túl nagyra nőtt.

Ajánlott kerttípusok

Törpenövényes kertek

Zágrádok és városi kertek

Konténeres kertészet

Hagyományos virágágyások

Nyári színfolyamokat utánzó beültetések

Ezüstös hajnalka	**Convolvulus cneorum**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Ezüstös hajnalka, más néven Cserjés szulák, a mediterrán tájak egyik legszebb örökzöld cserjéje, amely elegáns megjelenésével és bőséges virágzásával hódítja meg a kerteket. Alacsony, terpedt növekedésű, félgömb alakú cserje, amely kifejlett korára 40-60 cm magas és 60-100 cm széles bokrot alkot.
Megjelenésében a legszembetűnőbb a lombozat különleges ezüstös színe: a hosszúkás, lándzsás alakú leveleket sűrűn borító finom, selymes szőrzet napfényben gyönyörűen csillog, és egész évben dekoratívvá teszi a növényt. Késő tavasztól, májustól egészen szeptemberig ontja bimbóit. A számos, vékony szálakon megjelenő, kezdetben rózsaszínű bimbók fokozatosan nyílnak ki nagy, tölcsér alakú, tiszta fehér virágokká, melyek torokban sárgás színeződéssel díszlenek. A virágok a teljes növényt beborítják, gyönyörű kontrasztot alkotva az ezüstös lombozattal.
Igényei és gondozása
Az Ezüstös hajnalka a napfény megszállottja. Teljesen napos, lehetőleg szélvédett fekvésbe ültessük, ahol dúsan virágzik és szép tömött marad. A félárnyékot megtűri, de ott virágzása jóval szerényebb lesz. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, laza, akár meszes vagy homokos talajokat kedveli. A pangó vizet egyáltalán nem tűri, ezért ültetéskor gondoskodjunk a megfelelő vízelvezetésről. Szárazságtűrése kiváló, a kiültetett példányok a hosszabb aszályos időszakok kivételével nem igényelnek öntözést. Gondozása rendkívül egyszerű, csupán az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával ösztönözhetjük a folyamatos bimbóképződést. Mivel lassú növekedésű és természetesen szép formájú, metszésre általában nincs szükség, de kora tavasszal alakíthatjuk, ha szükséges. Fagyérzékenyebb, ezért a keményebb teleken takarás vagy védett fekvés javasolt számára.
Felhasználás a kertben
Ez a növény a mediterrán, délies hangulatú kertek megkerülhetetlen alapdarabja. Kiválóan mutat sziklakertekben, ahol a kövek között vagy sziklafalak tövében igazán otthonosan érzi magát. Alacsony sövényként vagy szegélynövényként is alkalmazható napos teraszok, utak mentén. Dekoratív ezüstös lombja miatt kiváló kontrasztnövény, amely kiemeli a szomszédos zöld levelű vagy színes virágú évelők szépségét. Kiválóan alkalmas dézsás ültetésre is, ahol teraszok, balkonok dísze lehet; ilyenkor gondoskodjunk a cserép téli védelméről.
Növénytársítási ötletek
Az ezüstös lombozat és a fehér virágok szinte bármilyen más növénnyel harmonikus együttest alkotnak. Különösen jól illik hozzá más mediterrán hangulatú növények társasága, mint a különböző levendula- és rozmaringfajták, a kakukkfű vagy a zsálya. Sziklakertekben szépen mutat a kövirózsák, varjúhájfélék és a kékesszürke levelű díszfüvek, például a csenkeszek mellett. Virágágyásokban kiváló partner lehet számára a selyemkóró, a kasvirág, a sárga levelű díszfüvek.

Fehér fátyolvirág	Gypsophila cerastioides 'White'	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A fehér fátyolvirág (Gypsophila cerastioides 'White') a Himalája vidékéről származó, alacsony, szőnyegszerűen elterülő, részben örökzöld évelő. Kifejlett magassága mindössze 5–15 cm, szélessége 15–30 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén sűrű, párnás szőnyeget képeznek, és virágzáskor szinte teljesen beborítják a lombozatot. Levelei kerekdedek, kanál alakúak, szürkészöldek, finoman szőrözöttek. A lombozat enyhe teleken részben megmarad. A virágzat laza, fürtös virágzat, amely a lombozat fölé emelkedik. A virágok aprók, csillag alakúak, fehér színűek, a szirmok belső oldalán finom rózsaszín erezettel. Virágzása májusban kezdődik és júniusig-júliusig tart. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású, inkább száraz, tápanyagszegény talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson érzi jól magát.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 4–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta –18 °C és –23 °C közötti fagyokat is elvisel, a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 15–20 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbíthatja a virágzást. A virágzás után a növényt enyhén visszavághatja, hogy megőrizze tömör, párnás formáját. Kora tavasszal a télen elhalt részeket távolítsa el.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Fontos: a növény mérgező, ezért fogyasztásra nem alkalmas, és a kisgyermekektől, háziállatoktól érdemes távol tartani.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, ágyásszegélybe, kőfalak peremére, rézsűre, mediterrán hangulatú kertekbe, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás. A virágzás idején finom fehér szőnyeget képez a kertben.
Növénytársítások

Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág, gólyaorr – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a fátyolvirág tömör habitusát. Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a fátyolvirág virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 4–8.			
Fehér varjúháj	**Sedum album**	1 750 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Fehér varjúháj (Sedum album) alacsony, sűrű, szőnyegszerűen elterülő örökzöld pozsgás évelő. Kifejlett magassága 5–15 cm, szélessége 20–30 cm, de kúszó hajtásai révén nagyobb felületet is beboríthat. Levelei aprók, hengeresek vagy tojásdadok, húsosak, zöldek, néha vöröses árnyalattal; télen is részben megmaradnak. Virágai aprók, csillag alakúak, fehérek vagy halvány rózsaszínűek, laza bugákban nyílnak nyár elején. A virágzás vonzza a méheket és a lepkéket. A növény habitusa lapos, terjedő, talajtakaró jellegű.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; enyhe árnyékot is elvisel, de napos helyen tömörebb és szebben virágzik.

Talaj: Jó vízáteresztő, száraz, homokos, kavicsos vagy szegényes talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a szárazságot kiválóan tűri, az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is megél; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágzatot távolítsa el, hogy megőrizze a kompakt formát. A túl hosszúra nőtt hajtásokat tavasszal rövidítheti.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; az örökzöld lombozat télen is díszít.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, tetőkertbe és ágyásszegélybe illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, mediterrán, minimalista és szárazságtűrő kertekben.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa, más varjúhájfajok – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a varjúháj előtt.

Fűszer- és illatos növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.			
USDA télállósági zóna: 3-9.			
Fehér virágú kökörcsin	**Pulsatilla vulgaris 'Alba'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Fehér virágú kökörcsin (Pulsatilla vulgaris 'Alba') alacsony, sűrű, párnás bokrot képező évelő. Kifejlett magassága 20–30 cm, szélessége 20–30 cm. Levelei mélyen szeldeltek, finoman selymesen szőrözöttek, ezüstös-zöld színűek, és a virágzás után is dekoratívak maradnak. Virágai harang alakúak, bókolók, hófehér színűek, kora tavasszal, március–áprilisban nyílnak, gyakran még a lombozat teljes kifejlődése előtt. A virágokat ezüstös, bolyhos magtokok követik, amelyek nyáron is szépen díszítenek. A növény habitusa lekerekített, kissé szétterülő.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; enyhe délutáni árnyékot is elvisel.

Talaj: Jó vízáteresztő, meszes vagy semleges, inkább száraz, homokos vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a szárazságot jól tűri, de az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágokat távolítsa el, hogy a növény ne magozzon el, és megőrizze kompakt formáját. A lombozatot kora tavasszal vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek részben elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, alpesi jellegű kompozíciókba és száraz falra illik. Kiváló ágyásszegélybe, évelőágyás előterébe, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, szárazságtűrő és minimalista kertekben.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz.

Fűszer- és illatos növények: levendula, izsóp, zsálya.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.			
USDA télállósági zóna: 4-8.			
Filou Rose kúszó fátyolvirág	**Gypsophila repens 'Filou Rose'**	2 750 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Filou Rose kúszó fátyolvirág (Gypsophila repens 'Filou Rose') a kúszó fátyolvirág egyik legkompaktabb, legvirágdúsabb fajtája, amelyet a német Jelitto cég nemesített. Sűrű, párnás, talajon elterülő tövet képez, amelynek hajtásai rövid száron emelkednek a lombozat fölé. Kifejlett magassága 10–15 cm, szélessége 20–40 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, és virágzáskor szinte teljesen beborítják a lombozatot. Levelei keskenyek, lándzsásak, szürkészöldek-hamvaszöldek, részben örökzöldek, és a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad.
A virágzat laza, fürtös virágzat, amely a hajtások felső részén nyílik. A virágok aprók, csillag alakúak, halvány rózsaszínűek, és a fürtök mentén olyan sűrűn helyezkednek el, hogy a növény virágzáskor rózsaszín virágfelhő benyomását kelti. Virágzása májusban kezdődik, és egészen szeptemberig tart, ami a fátyolvirágok között kiemelkedően hosszú virágzási idő. Az elnyílt virágok visszavágásával másodvirágzás is serkenthető. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású, inkább száraz, tápanyagszegény talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson érzi jól magát.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Az USDA 3–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán teljesen télálló, különösebb védelem nélkül is.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 20–25 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást és másodvirágzást serkenthet. A virágzás után a növényt enyhén visszavághatja, hogy megőrizze tömör, párnás formáját. A töveket 2–3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt. Fontos: a növény nedve érzékeny egyéneknél bőr- és szemirritációt okozhat, ezért kerti munka során érdemes kesztyűt viselni.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, ágyásszegélybe, kőfalak peremére, rézsűre, mediterrán hangulatú kertekbe, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cseréppe is jó választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején lágy rózsaszín színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág, gólyaorr – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.			
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a fátyolvirág tömör habitusát.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a fátyolvirág virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 3-8.			
Fire Dance fürtös fáklyaliliom	**Kniphofia hirsuta 'Fire Dance'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Fire Dance fürtös fáklyaliliom (Kniphofia hirsuta 'Fire Dance') Dél-Afrikából származó, alacsony, sűrű, bokrosodó tövet képező évelő. Kifejlett magassága virágszárakkal együtt 40-60 cm, szélessége 30-40 cm. Levelei keskenyek, szalagszerűek, kékeszöldek, finoman szőrözöttek, és a talaj közelében sűrű, tömött lombozatot alkotnak. A virágzat fáklyaszerű, tömör, kúpos fürt, amelynek alsó része sárga, felső része pedig korallvörös színben játszik. A virágok csőszerűek, fokozatosan nyílnak, így a virágzat hosszú időn át díszít. Nyár közepétől (július) egészen októberig virágzik, és a virágok vonzzák a méheket, lepkéket és a kolibriket. Az elvirágzott virágszárak eltávolításával további virágzásra ösztönözhető.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; félárnyékban is megél, de a virágzás ilyenkor gyengébb.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza, homokos vagy vályogos, tápanyagban gazdag talajt kedvel. A pangó vizet és a téli átnedvesedést kifejezetten rosszul tűri.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; az első évben rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot is jól tűri. A talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni.

Télállóság: Fagytűrő, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel, de a téli pangó víz károsíthatja.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A tövet ne ültesse mélyre, a korona legfeljebb 7 cm mélyen legyen a talajfelszín alatt.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágszárakat a tövüknél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást. A régi, elhalt leveleket kora tavasszal távolítsa el. Télen a leveleket érdemes összekötni, hogy a víz ne folyjon a tövére.

Átteleltetés: Különleges védelemre általában nincs szükség, de csapadékos, enyhe teleken a tövénél a pangó víz gyökérrothadást okozhat. Ilyenkor a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Gyakorlatilag betegségmentes. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak. Az őzek és a nyulak ritkán károsítják.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyba, sziklakertbe, kavicskertbe és modern, strukturált ágyásokba illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, mediterrán és szárazságtűrő kertekben, ahol a fáklyaszerű virágzat függőleges akcentust ad a kompozíciónak. Kiváló vágott virág.
Növénytársítások

Napos, szárazságtűrő évelők: cickafark, naprózsa, kúpvirág, sásliliom – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Kék és lila virágú társak: zsálya, macskamenta, ördögszem, veronika – színkontrasztot alkotnak a korallvörös virágokkal.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.

Illatos növények: levendula, izsóp, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-9.

Fischbeck örökzöld tatárvirág	**Iberis sempervirens 'Fischbeck'**	2 250 Ft	2 600 Ft

A Fischbeck örökzöld tatárvirág (Iberis sempervirens 'Fischbeck') sűrű, kompakt, nagyjából 25 cm magas párnát képez. Nem csak a virágágyásban mutat jól, hanem akár sziklakertekben, támfalakon és virágcserépben is kiváló megoldást jelent. Fontos azonban, hogy ezt a gyönyörű növényt napos helyre ültessük! Nagyon szép színezetű, az áprilistól júniusig tartó virágzási időszakban a tiszta fehér virágok és a sötétzöld lombozata különleges színjátékot teremt.
Napimádó, és szárazságot jól tűrő növény, mely a legtöbb tavaszi sziklakerti virággal jól társítható.

Flamingó keleti tollborzfű	**Penisetum orientale 'Flamingo'**	2 700 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Flamingó keleti tollborzfű egy tömör, csomókban növő évelő fűféle, amely 40-60 cm magasra és 60-90 cm szélesre nő meg. Levelei keskenyek, zöldek vagy szürkészöldek, ívesen hajlanak. Legfőbb díszét a júniustól októberig megjelenő, rózsaszínes-fehér vagy halványlila színű, tollas virágzatok képezik. Ezek a virágzatok akár 10-15 cm hosszúak is lehetnek, és puha, selymes megjelenésűek. A növény mozgásra érzékeny, a szél enyhe fodrozást idéz elő benne, ami különösen látványos naplementekor.
Gondozási útmutató

Fényigény: Teljes napsütés az ideális számára

Talajigény: Jól vízelvezető, laza talajt kedvel, nem túl igényes a talaj minőségére

Vízigény: Mérsékelt vízigényű, jól tűri a szárazságot

Metszés: Tavasszal visszametszendő, hogy friss hajtások nőhessenek

Télállóság: Jó télállóságú, de nedves talajon téli védelem ajánlott

Szaporítás: Tőosztással tavasszal

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Peremültetésben nagyon dekoratív

Sziklakertbe ideális választás

Konténeres nevelésre kiváló

Társítás: Örökzöldekkel, rozmaringgal, lavendulával jól harmonizál

Mozgó kerti elemként különösen ajánlott

Ajánlott kerttípusok

Mediterrán kertek

Sziklakertek

Szárazságtűrő kertek

Modern kertek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténeres kertek			
Flamingo kínai virágosnád	**Miscanthus sinensis Flamingo**	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Flamingo kínai virágosnád (Miscanthus sinensis 'Flamingo') felálló, laza, elegánsan szétterülő habitusú, lombhullató díszfű. Kifejlett magassága a virágzatokkal együtt általában 1,2–1,8 méter, szélessége 0,9–1,5 méter között alakul. Levelei keskenyek, szalagszerűek, középzöldek, feltűnő fehér középérrel; ősszel narancsos-vöröses, majd barnás árnyalatot vesznek fel. Virágzata laza, tollas buga, amely késő nyáron, augusztustól októberig nyílik; a virágok eleinte élénk rózsaszínek, majd fokozatosan ezüstös-rózsaszínné, végül ezüstössé válnak. A virágzatok télen is díszítőértékűek maradnak, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak. A növény habitusa a tövénél sűrű, felfelé lazább, így szép függőleges akcentust ad a kertben.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a félárnyékot is elviseli, de a legszebb lombszínt és a legbőségesebb virágzást napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves, homokos vagy vályogos, tápanyagban gazdag talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, a legtöbb forrás szerint –35 °C-ig elviseli a fagyokat, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, védett helyre, jó vízáteresztő talajba. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság legalább 1 méter legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású díszfű-trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: A száraz lombozatot kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, kb. 10–20 cm-re. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz levelek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. Ritkán a rozsda vagy a levélfoltosság jelentkezhet; a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább szoliterként, évelőágyba, cottage- és informális kertekbe, japán stílusú kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint vízparti kompozíciókba illik. Kiváló függőleges akcentusként működik, és laza, elegáns habitusa miatt jól mutat a kert hátterében. Cserépben és konténerben is nevelhető. Kiváló vágott virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét.
Növénytársítások

Késő nyári és őszi évelők: varfű, kúpvirág, őszirózsa, naprózsa – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a kínai virágosnádat.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4-9 (a legtöbb forrás a 4-es zónát jelöli meg alsó határként, -35 °C-ig).			
Flower Child őszi zsálya	**Salvia greggii 'Flower Child'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Flower Child őszi zsálya (Salvia greggii 'Flower Child') a Salvia greggii fajból származó, kompakt, sűrű, bokros habitusú, örökzöld félcserje. Kifejlett magassága a termőhelytől és a metszéstől függően 30–60 cm, szélessége 30–50 cm között alakul; a tövek a tövüknél elfásodnak, a hajtások vékonyak, sűrűn elágazók, így a növény rendezett, lekerekített formát mutat. Levelei aprók, sötétzöldek, enyhén fényesek, és megdörzsölve kellemes, fűszeres illatot árasztanak. A lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad, és enyhe teleken részben vagy egészben megmaradhat.
A virágzat a hajtások felső részén, örvökben nyílik. A virágok ajakosak, élénk, tiszta rózsaszínűek, sötétebb száron ülnek, és nagy mennyiségben jelennek meg, így a növény szinte folyamatosan virágba borul. A virágzás kora nyáron, akár június elejétől kezdődik, és egészen az első őszi fagyokig tart. Az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás tovább serkenthető. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és más beporzóknak, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos, védett fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, homokos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: A talaj kémhatására nem különösebben érzékeny.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény megerősödve jól tűri a szárazságot és a meleget, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Télállósága közepes, rövid fagyokat -8 °C és -12 °C között is elvisel, de a hosszan tartó, csapadékos hideg teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt. Hazánkban a 6–7. éghajlati zónában védett, napos fekvésben és fiatal korban takarással tartható hosszú távon.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Mivel félcserje, a hajtásai alul fásodnak. Tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt a bokrot a talajtól számított 10–15 cm-re vágja vissza; ez dús, tömött megújulást és rengeteg új virághajtást eredményez. Nyár közepén, ha a virágzás alábbhagy, a hajtásvégek enyhe visszavágásával újabb őszi virágzási hullám serkenthető. Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el a folyamatos virágzás érdekében.

Átteleltetés: A növény télállósága közepes, ezért a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy lombtakarás segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a csigák, a levéltetvek és a kabócák kisebb kárt okozhatnak. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, mediterrán hangulatú és kavicskertbe, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és dézsába is kiváló választás, ahol a rózsaszín virágok és a hosszú

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

virágzás érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Illatos és fűszeres növények: levendula, kakukkfű, rozmaring – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a zsálya tömör habitusát.

Évelők: cickafark, kasvirág, varjúháj – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.

Rózsák: a zsálya alacsony, rendezett habitusa jól kiegészíti a rózsák tövét, és elrejti azok alsó, kopaszabb részeit.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 6a-9 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

Fodormenta	**Mentha spicata**	2 250 Ft	2 250 Ft

A fodormenta (Mentha spicata), egy népszerű kerti növény, amelyet gyakran termesztenek frissítő aromája és kulináris felhasználhatósága miatt. A fodormenta gazdag zöld levelekkel és dús növekedéssel és örvendeztet minket. A fodormenta levelei hosszúkásak és élesen fogazottak. Színe általában friss, sötétzöld, és a levelek finom szőrzetet is tartalmazhatnak. A fodormenta intenzív mentaillattal rendelkezik, amely frissességet és tisztaságot sugároz. Az íze kellemesen mentolos és kissé édeskés, ami sokféle ételben és italban felhasználható. Általában 30-60 centiméter magasra nő, de ideális körülmények között akár 90 centiméteres magasságot is elérhet. Nyáron a fodormenta apró, lila vagy rózsaszín virágokat hoz, ezek a virágok vonzóak lehetnek a méhek és a pillangók számára, ami elősegíti a kert biológiai sokféleségét. A fodormenta gondozása egyszerű, és ideális esetben a következő körülményeket biztosítsuk számára: szereti a napos vagy félárnyékos helyeket, de tűri az árnyékosabb környezetet is. Jól alkalmazkodik a változó hőmérsékletekhez. Az enyhén savas vagy semleges pH-tartomány, jó vízelvezetésű, tápanyagokban gazdag talaj ideális a fodormenta számára. Rendszeresen öntözést igényel, de fontos, hogy a talaj ne legyen túl vizes vagy túlságosan száraz. A talaj felső rétegét hagyjuk kiszáradni az öntözések között. Mivel hajlamos terjedni, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a terjedését és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tenni. Ha a fodormenta túl nagy területet hódít meg, gyökérdugványokat képez és szétszóródik a kertben, érdemes konténerbe vagy mélyre hatoló gyökérzárással rendelkező ágyásba ültetni. Ezzel megakadályozhatjuk a terjedését más növények területére. A fodormentát könnyen szaporíthatjuk tőosztással vagy dugványozással. Az elhalt virágok rendszeres leszedése serkenti a növény újratelepülését és friss hajtások kialakulását. Friss vagy szárított formában kiválóan használható számos ételben és italban. Adjunk hozzá friss fodormentát salátákhoz, desszertekhez, italokhoz vagy akár frissítő limonádékhoz. Teája kellemesen frissítő és nyugtató hatású lehet. Forrázzunk le néhány friss fodormentalevelet forró vízzel, hagyjuk állni néhány percig, majd szűrjük le és ízlés szerint édesítsük. Intenzív illata és mentolos jellege miatt ideális az aromaterápiás felhasználásra. A mentolos illata serkentő hatással lehet a szellemi éberségre és a koncentrációra.

Fooled Me sásliliom	**Hemerocallis 'Fooled Me'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Fooled Me sásliliom egy közepes termetű évelő növény, amely 50-60 cm magasra és 40-50 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, friss zöld színűek. Virágai 10-12 cm átmérőjűek, élénk sárga alapszínűek, melyeket rózsaszínű karikák és mintázatok díszítenek. A virágok szirmai szélesek, enyhén fodrosak, és sárga torkuk van. Virágzási ideje június és július között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként vidám hatású

Vegyes virágágyásokba élénk színfolt

Társítás: Kék vagy lila virágú növényekkel, zöld levelű fajtákkal

Modern kertekbe frissítő választás

Konténeres nevelésre is alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Vidám színes kompozíciók

Városi kertek

Falusi kertek

Gyermekbarát kertek

Forever Purple tűzeső	Heuchera Forever Purple	3 750 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Heuchera 'Forever Purple' - mély bíbor-lila levelű, rózsaszín virágú varázslánynövény. Tökéletes árnyékos kertekbe és konténerekbe!
A növény jellemzői

Magasság: 20-25 cm (leveles rész), 30 cm (virágzással)

Levelek: Mélyen redőzött, fényes felületű, sötét bíbor-lila színű, egész évben díszes

Virágok: Apró, harang alakú, halvány rózsaszín színű, karcsú fürtvirágzatokban

Tenyészhely: Félárnyék vagy árnyék, nedves, de jó vízelvezetésű talaj

Ültetés és gondozás

Talajigény: Humuszban gazdag, laza talaj (pH 6,0-7,0 ideális)

Vízellátás: Közepes vízigényű - a szárazságot rosszul tűri

Metszés: Tavasszal eltávolíthatók a tél által károsodott levelek

Télállóság: -23 °C-ig tűri (USDA 6-os zóna)

Szaporítás: Tőosztással tavasszal

Felhasználás

Dísznövényként: Árnyékos kertek, erdei környezet, konténerek

Levélkontrasztként: Árnyékliliomokkal, elétérő színű tűzesőkkel összeültetve

Freefolk Rosy évelő díszgyertya	**Gaura lindheimeri 'Freefolk Rosy'**	2 450 Ft	2 750 Ft

A Gaura 'Freefolk Rosy' kimondottan szép, évelő növény, amely virágzásával és finom megjelenésével káprázatja el a kertészeket és a kertkedvelőket.

A Gaura 'Freefolk Rosy' hosszú, vékony szárakkal rendelkezik, amelyek a szél hatására lágyan hullámzanak, apró virágai repkedő pillangókra emlékeztetnek. A rózsaszín virágok bőségesen borítják a növényt, és körülbelül 60-90 cm magasságban nyílnak. A virágok hosszan kitartanak a nyár folyamán az ősz beköszöntéig. A növény levelei szépek és szálkásak, zöldes színnel, ami tovább fokozza a növény dekoratív vonzerejét, még akkor is, amikor nem virágzik.
A Freefolk Rosy évelő díszgyertya szereti a napos vagy félárnyékos helyzetet. Minél több napfényt kap, annál jobban virágzik. A Gaura előnyben részesíti a jó vízelvezetésű, laza talajt. Fontos, hogy ne legyen túl vizes a talaj, különösen a téli hónapokban, mivel a túlzott nedvesség károsíthatja a gyökereket. A rendszeres, de mérsékelt öntözés megfelelő, különösen a forró nyári időszakban. Mérsékelten fagyálló, és általában jól bírja a hidegebb téli hónapokat. Ha kemény téli időjárás várható, ajánlott a növényt betakarni vagy szalmával védeni. Az elnyílt virágok rendszeres visszavágása serkenti az új virágzást és segít megőrizni a növény szépségét. A virágzás után egyszerűen vágja vissza a szárakat. A Gaura általában nem igényel túl sok trágyát, de a virágzás serkentése érdekében tavasszal és nyáron lehet alkalmazni egy univerzális, lassú felszívódású műtrágyát.
Konténeres növényeink egész évben ültethetőek, kivéve amikor a talaj fagyott.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Füzéres gyepliliom	Liriope spicata	1 950 Ft	2 250 Ft

A Füzéres gyepliliom Kelet-Ázsiában, Kínában, Japánban és Vietnámban őshonos, rendkívül strapabíró, örökzöld talajtakaró évelő növény. A spárgafélék családjába tartozó évelő kiválóan alkalmas árnyékos és félárnyékos kertek talajtakarására, mert futóhajtásaival gyorsan és sűrűn beborítja a rendelkezésre álló felületet.
A növény 20-40 cm magas, indás, gyorsan terjedő habitusú évelő. Hosszú, kúszó futóhajtásai révén idővel összefüggő, sűrű szőnyeget alkot, ami kiválóan elnyomja a gyomokat. Levelei keskenyek, szalagszerűek, 20-40 cm hosszúak, 0,5-1 cm szélesek, sötétzöld színűek, ívesen lehajlanak, és dús, pázsitszerű lombtömeget képeznek. A levelek örökzöldek, télen is díszítenek, bár hidegebb teleken részben visszafagyhatnak.
A növény igazi dísze a nyár végi, kora őszi virágzás. Augusztus-szeptember folyamán a lombtömeg fölé magasodó, 20-30 cm hosszú, fürtös virágzatok jelennek meg. Az apró, 4-6 mm átmérőjű, harang vagy gömb alakú virágok sűrűn helyezkednek el a virágzati tengelyen, színük jellemzően lila, de létezik fehér virágú változat is. A virágok illata finom, enyhén édeskés. A virágokat követően apró, gömbölyded, fényes fekete bogyók fejlődnek, melyek ősszel tovább díszítik a növényt.
Igényei és gondozása
A Füzéres gyepliliom rendkívül alkalmazkodóképes és hálás növény, amely a legtöbb kerti körülmény között jól érzi magát. Napos, félárnyékos, sőt akár mélyebb árnyékos fekvésben is szépen fejlődik, bár az árnyékos helyen virágzása mérsékeltebb lehet. Talaj tekintetében nem igényes, a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű, humuszban gazdag kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot a kiültetett példányok már jól elviselik. Gondozása minimális. Tavasszal, a rügyfakadás előtt érdemes a növényt visszavágni: a régi, megkopott leveleket nyírjuk le a talajszint közelében, hogy friss, üde lombozatot nevelhessen. Ha a növény túlzottan elterjedt volna, a gyökérzóna ásóval történő körbevágásával tartható kordában. Tápanyag-utánpótlást általában nem igényel, de tavasszal komposzttal meghálálja. Télállósága kiváló, hazánkban gond nélkül teleltethető.
Felhasználás a kertben
A Füzéres gyepliliom rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Kiválóan alkalmas talajtakarónak fák alá, cserjék tövébe, ahol a gyökérnyomás miatt más növények nehezen fejlődnének. Sűrű, örökzöld szőnyege hatékonyan elnyomja a gyomokat, miközben egész évben díszít. Rézsűkön, lejtőkön is jól megtelepszik, segítve a talaj rögzítését. Szegélynövényként is mutatós utak, teraszok, virágágyások mentén. Konténerekbe, dézsákba, balkonládákba ültetve a teraszok, erkélyek dísze lehet. Jól tűri a városi környezetet, a légszennyezést, így városi kertekbe is ideális választás.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes hasonló igényű, árnyékos vagy félárnyékos helyet kedvelő növényeket választani. Kiváló partnerei lehetnek a páfrányok, amelyek eltérő lombszerkezetükkel izgalmas textúrabeli kontrasztot teremtenek. Hunyorokkal (Helleborus) és tüdőfüvekkel (Pulmonaria) ültetve a téli és kora tavaszi hónapokban is van díszítőértéke az ágyásnak. Árnyéki díszfüvekkel, például a Carex fajokkal kombinálva változatos textúrájú, örökzöld kompozíciókat hozhatunk létre. A Füzéres gyepliliom lila virágai szépen mutatnak sárga levelű növények, például az aranylevelű árnyékliliom (Hosta) társaságában. A japán pachysandra (Pachysandra terminalis) mellett is jól érzi magát, közösen alkotva sűrű, gyommentes talajtakarót.

Gall örökzöld liliomfa (kicsi)	Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'	3 950 Ft	3 950 Ft
Gambit Rose évelő díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'	2 450 Ft	2 750 Ft

A mostanában egyre divatosabb évelő díszgyertya fajták közül egy kifejezetten látványos darab, melynek virágai teljesen rózsaszínek, a növény lombozata, de még a szárak is sötétzöldből bíborba hajlanak. Jól társítható lila, fehér virágú egyéb évelőkkel, díszfüvekkel. Minimális gondozást igényel, ami a szezon végi visszavágásra, és a tő téli takarására majd tavaszi kitakarására szorítkozik.

Gaudi Pink díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Gaudi Pink'	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Gaudi Pink Díszgyertya (Gaura lindheimeri 'Gaudi Pink') – Az élénk rózsaszín, légies virágú évelő
A Gaudi Pink díszgyertya a ligetszépefélék családjába tartozó, Észak-Amerika déli részéről, Texas és Louisiana prérijéről származó, évelő lágyszárú növény. A 'Gaudi Pink' fajta a Gaudi sorozat tagja, amelyet a virágok élénk, tiszta rózsaszín színe és a sűrű, bokros habitus jellemez. Ez a növény a késő tavasztól az őszig nyíló, élénk színű virágaival és légies, pillangószerű megjelenésével az egyik legkedveltebb évelő a modern, természetes hatású kertekben. A könnyű gondozhatósága, a rendkívül hosszú virágzási időszaka és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A Gaudi Pink díszgyertya egy közepes növekedésű, bokros habitusú, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 40-60 cm, szélessége 40-50 cm között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. A növény töve fásodó, a hajtások egyenesen felállók, vékonyak, drótszerűek.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek keskenyek, lándzsásak, élénkzöld színűek, gyakran vöröses foltokkal, és a száron váltakozva helyezkednek el. A lombozat egész szezonban dekoratív.
A növény legnagyobb díszét a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, hosszú, karcsú, laza fürt, amelyen a virágok egymás után nyílnak. A virágok 1,5-2,5 cm átmérőjűek, négy szirommal, élénk rózsaszín színűek, amely a kertben feltűnő, vidám hatást kelt. A 'Gaudi Pink' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok élénk, tiszta rózsaszín színe és a rendkívül bőséges, folyamatos virágzás, amely a növényt egész nyáron át díszíti. A virágzási időszak a késő tavasztól a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően kora nyártól közép-őszig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár az első fagyokig is kitarthat. A virágok a legkisebb szellőre is kecsesen mozognak, mintha apró rózsaszín pillangók táncolnának a növény felett. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (dugványozással) egyaránt szaporítható. A díszgyertya rövid élettartamú évelő, ezért érdemes 2-3 évente megújítani a telepítést.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A díszgyertya 'Gaudi Pink' napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást teljes napsütésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; a téli nedvesség különösen veszélyes lehet.

Öntözés: A díszgyertya 'Gaudi Pink' szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A díszgyertya 'Gaudi Pink' metszése fontos a bőséges virágzás és a növény rendezett megjelenése érdekében. Kora tavasszal erőteljes visszavágás javasolt, hogy serkentsük az egészséges, formás növekedést. A virágzási időszak alatt érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani, ami serkenti az újabb virágbimbók képződését és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A metszés elmaradása esetén a növény széteshet és kevésbé virágzik.

Telelés és fagytűrés: A díszgyertya 'Gaudi Pink' mérsékelten télálló. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is, de a tartós fagyok és a téli nedvesség károsíthatják. Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a fiatal példányok tövét télen mulccsal takarni. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A díszgyertya 'Gaudi Pink' az élénk rózsaszín virágzásának, közepes méretének, hosszú virágzási időszakának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a közepes méret miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Tömeges telepítésbe, természetes hatású kertekbe, prérikertbe, kavicskertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát, és a légies virágok természetes hatást keltenek.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Vágott virágnak – a hosszú, karcsú virágszárak tartósak a vázában, és kiválóan alkalmasak csokrokba.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A díszgyertya 'Gaudi Pink' élénk rózsaszín virágai és finom, légies lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Levendulával – a levendula lila virágai és ezüstös lombozata kiváló kontrasztot alkot a rózsaszín virágokkal, és erősíti a mediterrán hangulatot.

Zsályával és macskamentával – a kék és lila virágok harmonikus, friss párost alkotnak a rózsaszín díszgyertyával.

Kasvirággal és kúpvirággal – a sárga és bíbor virágok színpompás, kontrasztos hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollbugával, árvalányhajjal – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a díszgyertya légies, pillangószerű virágait.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a díszgyertya 'Gaudi Pink' mérsékelten télálló; az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban a jó vízelvezetésű talajban és szélvédett helyen takarással áttelelhet. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Gaudi Red díszgyertya	**Gaura lindheimeri 'Gaudi Red'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Gaudi Red díszgyertya (Gaura lindheimeri 'Gaudi Red', újabb besorolás szerint Oenothera lindheimeri 'Gaudi Red') Észak-Amerikából származó, kompakt, felálló, sűrű bokrot képező évelő. Kifejlett magassága 30–50 cm, szélessége 30–40 cm között alakul; a tövek rendezett, laza szerkezetű csomót képeznek, a virágzati szárak vékonyak, pirosas árnyalatúak, és a virágok súlya alatt enyhén ívesen hajlanak. Levelei keskenyek, lándzsásak, sötétzöldek, bordó vagy vöröses árnyalattal, és a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad.
A virágzat laza, fürtös virágzat, amely a szárak felső részén nyílik. A virágok élénk rózsavörös-bíborvörös színűek, aprók, finoman erezettek, és a fürtök mentén sűrűn helyezkednek el, így a növény virágzáskor messziről feltűnő színfoltot ad. Virágzása nyár elejétől (júniustól) kora őszig (októberig) tart, és az elnyílt virágfürtök rendszeres eltávolításával a virágzás tovább serkenthető. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos, meleg fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár homokos, meszes vagy kavicsos, közepesen termékeny talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; a kifejlett növény jól tűri a szárazságot és a hőséget, a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Télállósága közepes, rövid fagyokat –7 °C és –12 °C között is elvisel. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására, és a szárak megnyúlását, megdőlését okozhatja.

Metszés: Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás derekán, nyár közepén a növényt kétharmadával visszavághatja, ami tömörebb, bokrosabb növekedést és egy második virágzási hullámot eredményez. Kora tavasszal a régi, elhalt szárakat a talajszint közelében vágja vissza.

Átteleltetés: A növény télállósága közepes, ezért a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, kavics- és sziklakertbe, rózsakertbe, mediterrán hangulatú kertekbe, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és dézsába is kiváló választás, ahol a rózsavörös virágok és a hosszú virágzás érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Növénytársítások

Rózsák: a díszgyertya laza, légies habitusa jól kiegészíti a rózsák tövét, és elrejti azok alsó, kopaszabb részeit.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a díszgyertya tömör virágzatát.

Évelők: varjúháj, kasvirág, cickafark, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 5-9 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

German Winter kakukkfű	Thymus vulgaris 'German Winter'	1 950 Ft	1 950 Ft

A kerti kakukkfű jellegzetes illatot árasztó levelekkel rendelkezik, amelyeket számos kulináris és gyógyászati célra használnak. A 'German Winter' fajta még hidegebb éghajlati körülmények között is kitűnően teljesít, így hűvösebb időjárásban is élvezhetjük a friss fűszerezést. A növény sűrű növekedése és apró, lila virágai miatt kiválóan illeszkedik a sziklakertekbe, edényekbe vagy akár szegélyként is használható. A kakukkfűt sokféle étel ízesítésére használják, például húsételek, zöldségek, levesek és szószok fűszerezésére.Kiváló sziklakert vagy szegélynövény.
Gondozási útmutató:

Fény és Hely: A kerti kakukkfű napos helyet kedvel, tehát ültessük olyan helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri.

Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező talaj a legmegfelelőbb. A közönséges kerti talajokat könnyen elviseli, de ültetéskor érdemes keverni hozzá némi kavicsot vagy homokot a vízelvezetés javítása érdekében.

Öntözés: Amikor a növény fiatal, rendszeresen öntözzük meg, hogy a gyökerek megfelelően meggyökerezzenek. Az érett növények már ellenállóbbak a szárazságra, de hosszabb száraz időszakokban még ők is igényelhetnek öntözést.

Metszés: Az elnyílt virágokat és a túlnövő hajtásokat rendszeresen metszhetjük vissza. A tavaszi visszametszés segít megőrizni a kompakt növekedést és serkenti az új hajtásokat.

Táplálás: Általában nem igényel rendszeres tápanyagellátást. Az elnyílt virágok eltávolítása és a talaj időnkénti frissítése elegendő a jó növekedéshez.

A Thymus vulgaris 'German Winter' a konyhában és a kertben egyaránt hasznos növény, mely gazdagítja ételeink ízét és egyúttal szép díszítőelem is lehet a kertünkben.

Gold Breeze kínai virágosnád	Miscanthus chinensis 'Gold Breeze'	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Gold Breeze kínai virágosnád egy felálló, tömör növekedésű évelő fűféle, amely 120-150 cm magasra és 80-120 cm szélesre nő meg. Levelei sárászöldek, aranyos csíkoltsággal, melyek őszi hűvösebben aranybarnára színeződnek. Legfőbb díszét a szeptembertől novemberig megjelenő, ezüstös-rózsaszínű, tollas virágzatok képezik. Ezek a virágzatok a lombozat felett magasodnak, és télen is megmaradnak, így egész évben látványossá teszik a kertet.
Gondozási útmutató

Fényigény: Teljes napsütés az ideális számára

Talajigény: Jól vízelvezető, közepesen termékeny talajt kedvel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Késő télen vagy kora tavasszal visszametszendő

Télállóság: Kiváló télállóságú, magyarországi teleket gond nélkül átvészel

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával vagy komposzttal

Ültetési javaslat

Szoliter növényként lenyűgöző hatású

Több évű ágyások háttérnövényeként

Nagyobb kertek szerkezeti elemeként

Vízparti ültetésekben

Téli kerti dekorációként

Társítás: Őszi rozsnokkal, aggófűvel, nyúlfarkfűvel

Ajánlott kerttípusok

Modern kertek

Természetes hangulatú kertek

Nagyobb kertterületek

Tájkertészeti ültetvények

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Városi zöldterületek			
Gold Samurai árnyékliliom	**Hosta 'Gold Samurai'**	3 990 Ft	4 450 Ft

A 'Gold Samurai' árnyékliliom egy közepes termetű, feltűnő megjelenésű hostafajta, amely akár 40-50 cm magasra és 60-80 cm szélesre is megnő. Fő értéke a széles, lándzsa alakú levél, amelynek élénk arany sárga közepe és szabályos, sötétzöld pereme van. A levél színe az év során változik: a tavaszi hajtások krémfehér és zöld csíkozásúak, majd nyáron az arany sárga középrész dominál. Július-augusztus hónapban nyílnak a halványlila színű, harang alakú virágok, amelyek a kontrasztos levélzet felett különleges hangulatot teremtenek.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos helyen (a túl erős nap a leveleket égetheti)

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Távolság: 50-70 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter növényként, árnyékos növényágyások középső sorában, konténeres ültetésben

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel, a levelek elszáradása után vágjuk vissza a földszintre

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: A csigák és meztelen csigák ellen védekezni kell

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek és erdei beültetések

Japán stílusú kertek

Gyűjteményes hostáskertek

Modern árnyékos kompozíciók

Konténeres ültetés árnyékos teraszokra

Gold Standard árnyékliliom	**Hosta 'Gold Standard'**	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Gold Standard' árnyékliliom egy közepes-nagy termetű, tömör habitusú nagylevelű évelő, amely akár 50-60 cm magasra és 80-100 cm szélesre is megnő. Fő értéke a széles, szív alakú, élénk aranysárga levél, amelyet szabályos sötétzöld perem övez. A levél színe az év során változik: tavasszal krémfehér és zöld, nyáron aranyozott, ősszel pedig citromsárgára változik. Július-augusztus hónapokban nyílnak a világoslila színű, tölcsér alakú virágok, melyek a levélzet felett magasodva kellemes kontrasztot alkotnak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos helyen (túl sok napon a levél éghet, túl sok árnyékban pedig zöldebb lesz)

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Távolság: 70-90 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliter növényként, árnyékos talajtakaró, növényágyások középső-harmadik sorában

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel, a levelek elszáradása után vágjuk vissza a földszintre

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: A csigák és meztelen csigák szeretik, védekezni kell ellenük

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek és erdei beültetések

Japán stílusú kertek

Patak- és tóparti kertek

Modern árnyékos kompozíciók

Konténeres ültetés árnyékos teraszokra

Golden Tiara árnyékliliom	Hosta 'Golden Tiara'	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Golden Tiara' árnyékliliom egy alacsony, de rendkívül tömör habitusú hostafajta, amely maximum 25-30 cm magasra és 40-50 cm szélesre nő. Fő értéke a szív alakú, élénkzöld közepű és széles aranysárga peremű levél, amely dús csomókat alkot. Levelei fényes felületűek és az év során a szegély színe intenzívebbé válik. Június-július hónapokban nyílnak a lila színű, tölcsér alakú virágok, amelyek a levélzet felett enyhe magasságban hozzák a kontrasztot.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos helyen (túl erős napon a levélszegély éghet)

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal

Használat: Elülső sorok, határok, szegélyültetések, kőkertek, konténerek

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel a levelek elszáradása után vágjuk vissza

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Csigák ellen védekezni kell, egyébként rendkívül problémamentes

Ajánlott kerttípusok

Törpe hostáskert

Szegély- és határültetések

Konténeres kertészet

Elülső sorok növényágyásokban

Japán stílusú kert

Árnyékos kőkertek

Goldkind kanadai aranyvessző	**Solidago canadensis 'Goldkind'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Goldkind kanadai aranyvessző (Solidago canadensis 'Goldkind') a vadon élő kanadai aranyvesszőhöz képest szabályosabb, tömörebb növekedésű, nemesített kerti fajta. Kifejlett magassága általában 60–90 cm, szélessége 40–60 cm között alakul, de termőhelytől függően 50–120 cm közötti értékeket is elérhet. Habitása felálló, sűrű, bokros, merev szárakkal, amelyek jól tartják a virágzatot. Levelei keskenyek, lándzsásak, középzöldek, finoman fűrészes szélűek, a szárak mentén váltakozva helyezkednek el. Virágzata a hajtások végén kúposan bugás, sok apró, élénksárga fészekvirágból áll, amelyek könnyed, légies megjelenést kölcsönöznek a növénynek. Virágzása augusztustól szeptemberig tart, és a virágok bőséges pollen- és nektárforrást kínálnak a méheknek.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb formát és a leggazdagabb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, homokos vagy vályogos, akár szegényes vagy közepesen termékeny talajon is megél. A pangó vizet nem kedveli.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, és általában nincs szüksége kiegészítő öntözésre.

Télállóság: Teljesen fagytűrő, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. A szegényesebb talajt is elviseli, de a pangó víz elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő vízáteresztésről.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy megakadályozza a magszórást és a nem kívánt terjedést. A régi, elhalt szárakat kora tavasszal vágja vissza a talajszintig.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Általában kártevőmentes, de a lisztharmatra érzékeny lehet. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a fajta rendkívül sokoldalú. Kiváló évelőágyakba, vegyes ágyásokba, cottage- és informális kertekbe, vadvirágos rétekre, valamint préri stílusú ültetésekbe. Kompakt mérete miatt városi kertekbe és kisebb kertekbe is jól illik, ahol a geometrikus formája és tiszta virágszíne érvényesül. Vágott virágként is kiváló, mivel a virágzatok sokáig frissek maradnak a vázában. Nagyobb csoportokban ültetve összefüggő, késő nyári színhatást hoz létre.
Növénytársítások

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Késő nyári évelők: kúpvirág, őszirózsa, naprózsa, sédbúza – hasonló virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymás növények: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak az aranyvessző virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-8.

Golyós eukaliptusz	**Eucalyptus globosus ssp. bicostata**	14 900 Ft	14 900 Ft

A golyós eukaliptus (Eucalyptus globulus ssp. bicostata) Ausztrália déli részéről származó növény, mely megfelelő termőhelyi körülmények között gyorsan fejlődő örökzöld fává nő. A többi eukaliptuszhoz hasonlóan érdekes törzsével, örökzöld lombozatával hívja fel magára a figyelmet. Hazai viszonyok között városi hőszigetben elhelyezkedő társasházi belső kertekbe javasolható, ill . ügyesebb kezű kertészek gondos formázgatással alacsonyan kis faként is tarthtják, igazi érdekesség lehet.
Meleg, védett helyekkel nem rendelkező kertek esetén csak a télikertben való teleltetés jön szóba.
8b USDA-zóna

Green Twister kasvirág	**Echinacea purpurea 'Green Twister'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Green Twister kasvirág (Echinacea purpurea 'Green Twister') – A kétszínű, citromsárga-rózsaszín virágú évelő
A kasvirág Green Twister Észak-Amerika keleti és középső részéből (az Egyesült Államok préri vidékeiről) származó, Echinacea purpurea faj nemesített, különleges színváltozata. A faj nevében a „purpurea” (latin: bíbor) a vadon élő faj virágainak színére utal, míg a 'Green Twister' fajtajelzés a szirmok különleges színátmenetére a zöldessárgától a rózsaszínig, majd a lila-bíborig utal. Ez az évelő növény a nyár közepétől késő őszig tartó időszakban különleges, kétszínű virágaival vonzza a tekintetet, emellett kiváló szárazságtűrése, betegségellenállósága és hosszú virágzási ideje miatt az egyik legkedveltebb préri évelő a napos, jó vízelvezetésű helyekre. A közönséges magyar név („kasvirág”) mellett ismert még „bíbor kúpvirág”, „napkalap” vagy „echinacea” néven is.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A kasvirág Green Twister egy közepes növekedési erélyű, bokros, feltörő szárú, lombhullató évelő növény. Kifejlett magassága 60-80 cm között alakul, szélessége 40-60 cm. A hajtások egyenesen felállók, merevek, szőrözöttek, elágazóak, a virágzati ágak a szárak felső részén helyezkednek el.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei a virágzás előtti időszakban. A tőlevelek (rozettalevelek) a legnagyobbak, 10-20 cm hosszúak, 5-10 cm szélesek, alakjuk lándzsás vagy tojásdad, a levél széle ép vagy finoman fogazott, a levélnyél hosszú (5-15 cm). A szárlevelek kisebbek (5-12 cm hosszúak), váltakozó állásúak, a szár alsó részén a levelek nyelesek, a felső részen fokozatosan ülővé (nyél nélkülivé) válnak, a levél széle ép. A levél színe sötétzöld, felülete érdes, szőrözött, fonáka világosabb, a levélerek kiemelkedők. A levélzet sűrű, bokros megjelenést biztosít.
A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 7-10 cm átmérőjű, nagy, fészekvirágzat (fejecske), amelyet a középen található dudoros, tüskés, kúp alakú termőtáj (diszkusz) és a körülötte elhelyezkedő, bókoló, lehajló szirmok (liguláris virágok) alkotnak. A termőtáj 2-4 cm széles, dudoros, tüskés felületű, a tüskék (apró fészekpikkelyek) hegyesek, merevek, kezdetben zöldesbronz színűek, majd sötétbarnává vagy szürkésbarnává érnek. A 'Green Twister' fajta legkiemelkedőbb és legismertebb jellemzője a szirmok színátmenete: a szirmok a tövüknél (a termőtájhoz kapcsolódva) citromsárga vagy zöldessárga színűek, a szirmok közepe felé haladva átváltanak élénk málnarózsába, fukszia rózsaszínbe, majd a szirmok csúcsán gyakran halványabb rózsaszín-lila árnyalatot mutatnak. Ez a színátmenet növényenként és virágonként is változó lehet; a sárga és a rózsaszín aránya függ a fényviszonyoktól, a talaj tápanyagellátásától és az életkortól. A szirmok keskenyek, lándzsásak, 3-5 cm hosszúak, 0,5-1 cm szélesek, bókolók, lehajlók (a vad fajnál a szirmok a termőtáj alá vagy vízszintesen hajlanak). A virágzási időszak a késő tavasztól a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően júniustól szeptemberig, sőt, az elnyílt virágok eltávolításával (deadheading) a virágzás akár októberig is elhúzódhat. A virágok a méheket, a poszméheket, a pillangókat (különösen a tarkalepkéket és a gyászlepkéket), a zengőlegyeket és más beporzó rovarokat vonzzák. A magok a pintyfélékhez hasonló énekesmadarak számára is táplálékul szolgálnak.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, kemény, kaszatterméseket fejleszt, amelyek a tüskés termőtájon (kúp alakú fejecske) belül helyezkednek el. A magok (acheniumok) 4-5 mm hosszúak, barnák vagy szürkésbarnák, a magok a tüskés pikkelyek között maradnak egész télen, ami a madarak számára táplálékot biztosít. A magok jól csíráznak, de a fajtajellemzők (a sárga-rózsaszín színátmenet) nem minden esetben öröklődnek magról szaporításkor; a fajtastabilitás érdekében a szaporítás vegetatív úton (tőosztással) javasolt.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kasvirág Green Twister napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legbőségesebb virágzást és a legélénkebb színátmenetet napos, meleg, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 6 óra közvetlen napsütés az optimális. Félárnyékban a növény magasabbra nőhet, a virágzás kevésbé bőséges, a szirmok színátmenete kevésbé intenzív (a rózsaszín és a sárga fakóbb lesz), és a növény hajlamosabb megdőlni. Teljes árnyékban a növény nem virágzik, vagy virágzása erősen gyengül.

Talaj: A kasvirág Green Twister nem igényes a talajra, de a legjobban a jó vízáteresztő képességű, közepesen tápdús, laza szerkezetű, vályogos vagy homokos vályog, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású (pH 6,5-7,5) talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a meszes talajokat is. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; ezekben a talajtípusokban a gyökérrothadás kialakulásának veszélye jelentősen megnő. Ültetéskor javasolt a talajt komposzttal, érett szerves trágyával vagy homokkal keverni a szerkezet javítása érdekében.

Öntözés: A kasvirág Green Twister közepes vízigényű, de a kifejlett példányok jól tolerálják a rövidebb száraz időszakokat. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett (1 évnél idősebb) példányok szárazságtűrőbbek; a természetes csapadék a mérsékelt égövön (pl. Magyarország) általában elegendő számukra, kivéve a hosszan tartó, forró, csapadékmentes időszakokat (2-3 hét), amikor heti 1 alapos öntözés javasolt. A túlöntözés kerülendő, mert a növény fogékonyabbá válik a lisztharmatra és a gyökérrothadásra. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (heti 2-3 alkalommal) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső 3-5 cm-es rétegét kiszáradni két öntözés között.

Tápanyag-utánpótlás: A kasvirág Green Twister közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy adag (a csomagoláson javasolt adag fele-mennyisége) lassan oldódó, kijelölt évelők számára kifejlesztett műtrágya (pl. NPK 5-10-5 vagy 5-10-10). A második, kisebb adag a virágzás előtt (június eleje) adható. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de keveset virágzik, a szárak puhányok lesznek, és a növény hajlamosabb megdőlni). Ősszel (szeptembertől) ne trágyázzunk. A szerves trágyák (érett komposzt, istállótrágya) közül csak az alaposan érett, jól lebomlott anyagokat használjunk, és azokat is csak kis mennyiségben, tavasszal, talajtakarásként kijuttatva (ne a tő közelébe bedolgozva).

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Metszés és ápolás: A kasvirág Green Twister alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de az alábbi ápolási műveletek javíthatják a növény megjelenését és élettartamát:

Elvirágzott virágok eltávolítása: Az elnyílt, elhervadt virágokat a virágzási időszak alatt érdemes eltávolítani (visszavágni az első levélpárig). Ez serkenti az újabb virágbimbók képződését, meghosszabbítja a virágzási időszakot, és megakadályozza a túlzott magképzést és az önvetést. Késő nyáron, augusztustól érdemes néhány virágot a növényen hagyni a madarak téli táplálékának biztosítása érdekében.

Visszavágás a virágzás után: A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt visszavághatjuk a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. Ez segíti a növény telelését, megakadályozza a lisztharmat áttelelését, és tavasszal a növény gyorsabban, erőteljesebben hajt. A visszavágást akár kora tavaszra (március elejére) is halaszthatjuk, ha a téli időszakban is szeretnénk a termőtájak (kúp alakú fejecskék) téldíszként való megjelenését.

Tőosztás: A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal (március-április) vagy kora ősszel (szeptember) javasolt. Ez megakadályozza a növény elöregedését, a virágzás gyengülését és a középrész kipusztulását. A tőosztást végezhetjük úgy, hogy a tövet kiássuk, éles ásóval vagy konyhakéssel 2-4 részre osztjuk, és az osztásokat azonnal visszaültetjük. A tőosztással a növény vegetatív úton is szaporítható, ami garantálja a fajta (Green Twister) jellemzőinek megtartását.

Telelés és fagytűrés: A kasvirág Green Twister kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok akár -35°C és -40°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén (az USDA 3-4-es zónáitól kezdve) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt. A fiatal, ősszel ültetett növények számára az első tél előtt egy vékony lombtakaró (3-5 cm) nyújthat extra védelmet, de ez nem kötelező. A konténerben nevelt növényeket is teleltethetjük a szabadban, ha a cserép nagy (legalább 25-30 cm átmérőjű) és a talaj jó vízelvezetésű; extrém hideg teleken a cserép szigetelhető buborékfóliával, jutával, vagy a cserép földlabdáját fagy ellen takarni (pl. vastag lombtakaróval, szalma- vagy fenyőkéreggel).

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A kasvirág Green Twister a különleges, kétszínű virágzásának, hosszú virágzási időszakának (júniustól szeptemberig), kiváló télállóságának, szárazságtűrésének és betegségellenállóságának köszönhetően az egyik legkedveltebb préri évelő. Alkalmazási területei:

Évelőágyásokba, napos szegélyekbe, vegyeságyásokba – a közepes magasság (60-80 cm) miatt ideális középtérnövény, a sárga-rózsaszín virágok élénkítik a sötétebb hátteret.

Vadvirágos kertekbe, természetes hatású kertekbe, préri kertekbe – a növény a préri hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a pillangók, méhek és más beporzók számára.

Vágott virágnak – a kasvirág kiváló vágott virág, tartós (akár 7-10 napig is eláll a vázában), a 'Green Twister' különleges színátmenete különösen mutatós csokrokban.

Száraz virágkötészeti alapanyagnak – a termőtájak (tüskés kúpok) a magképzés után is dekoratívak, szárítva is felhasználhatók.

Konténerekben, nagyobb dézsákban – nevelhető konténerben is (legalább 10-15 literes cserépben), de a rendszeres tápanyag-utánpótlásról és a nagyobb cserép használatáról gondoskodni kell.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kasvirág Green Twister különleges, citromsárga-málnarózsaszín színátmenetes virágai, sötétzöld lombozata és dudoros, tüskés termőtájai számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, közepesen tápdús talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia atriplicifolia), kék szúrósgyöngy (Eryngium), mézvirág (Phacelia) – a sárga-rózsaszín és a lila-kék szívek kiváló kontrasztot alkotnak, erősítik a természetes, préri hangulatot.

Sárga virágú évelők: Aranyvessző (Solidago), kúpvirág (Rudbeckia fulgida), napvirág (Heliopsis), napraforgó (Helianthus) – a különböző sárga árnyalatok (citromsárga, aranysárga) a 'Green Twister' sárga szirmtövével és a rózsaszín részekkel harmonikus, napsütötte összképet adnak.

Fehér virágú növények: Fehér kasvirág (Echinacea purpurea 'White Swan', 'White Lustre'), gyöngyvirág (Convallaria), törpe harangvirág (Campanula) – a fehér szín kiemeli a 'Green Twister' rózsaszín és sárga árnyalatait.

Ezüstös levelű növények: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca), perovszkia (Perovskia), bárányfül (Stachys byzantina) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern, szárazságtűrő hatást keltenek, és kiemelik a kasvirág élénk színeit.

Díszfüvek: Tollbuga (Pennisetum alopecuroides), kínai ezüstpázsit (Miscanthus sinensis), tollborzfű (Calamagrostis), árvalányhaj (Stipa tenuissima) – a díszfüvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a kasvirág merevebb, felálló, szár szerkezetét, és a természetes, préri hatást erősíti.

Más kasvirág fajták: Fehér (Echinacea purpurea 'White Swan'), bíbor (Echinacea purpurea 'Magnus'), narancs (Echinacea 'Hot Papaya', 'Sombrero Adobe Orange'), sárga (Echinacea 'Sunset') fajtákkal – a különböző színű kasvirág fajták egymás mellé ültetve szivárványszerű hatást keltenek.

USDA besorolása: 3-8 (Magyarországon a kasvirág Green Twister teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -35°C és -40°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy. A konténerben nevelt növények is áttelelnek a szabadban, ha a cserép nagy (legalább 10-15 literes) és a talaj jó vízelvezetésű, illetve a cserép földlabdája nem fagy át teljesen.)

Guacamole árnyékliliom	**Hosta hybrida 'Guacamole'**	2 450 Ft	2 450 Ft

A Guacamole árnyékliliom lenyűgöző kerti növény, amely a hosták családjába tartozik. Ez a növény hatalmas, díszes levelekkel és izgalmas színkombinációval büszkélkedik. A 'Guacamole' változat különösen vonzó a széles, domború leveleivel, amelyek intenzív zöld színnel rendelkeznek. A levelek közepén egy sárga vagy krémszínű folt helyezkedik el, amely a növény nevét adja, hiszen ez a színkombináció emlékeztet a zamatos avokádókrémre. Közepes méretűre nő, általában 40-50 centiméter magasra és 60-75 centiméter szélesre terjed. A 'Guacamole' hosta nyáron virágzik, amikor magas száron megjelennek a kis, lila vagy fehér virágok. Bár a virágok mérete nem domináns a hosta jellemzői között, mégis hozzájárulnak a növény összhatásához. Rendkívül télálló növény, amely jól fejlődik a félárnyékos vagy árnyékos kertekben. A nedvesebb talajokat részesíti előnyben, de jó vízelvezetésű talajban is meghálálja a gondoskodást. Kerülni kell a pangó vizet, mert ez befolyásolhatja a gyökérrendszerét és egészségét. A 'Guacamole' hosta kiválóan kombinálható más árnyékliliomokkal a kertben. Az egyedi színkombinációja lehetővé teszi, hogy fókuszba helyezzük. Ez a növény kiváló választás lehet árnyékos kerti ágyásokhoz, szegélyekhez, vagy akár konténerkertészkedéshez is. A Guacamole árnyékliliom könnyen gondozható és idővel lassan terjeszkedik. A levelek rendszeres öntözést és nedves talajt igényelnek, de fontos ügyelni arra, hogy a víz ne pangjon a gyökerek körül. Tavasszal érdemes elvégezni a növény ritkítását vagy a túlzsúfolt levelek eltávolítását, hogy megőrizzük a növény szépségét és egészségét. A Guacamole árnyékliliom a kertben nemcsak látványos megjelenést nyújt, hanem árnyékos területeken is hozzájárul a talaj megtartásához és a gyomnövények visszaszorításához. Ezáltal segít fenntartani a kert tisztaságát és rendezett megjelenését.
Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Guatemala Gold kasvirág	**Echinacea purpurea 'Guatemala Gold'**	3 350 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Guatemala Gold kasvirág (Echinacea × 'Guatemala Gold') a Danziger nemesítőház Guatemala-sorozatának tagja, amelyet kifejezetten a kompakt méret és a hosszú virágzás érdekében szelektáltak. Törpe, sűrű, felálló habitusú évelő, amelynek erős, önmagukat megtartó szárai nem igényelnek támasztékot. Kifejlett magassága mindössze 23–30 cm, szélessége 15–23 cm, a levelek alacsony, tömött tőlevélrózsát alkotnak, a virágok pedig közvetlenül a lombozat felett nyílnak. Levelei sötétzöldek, durva textúrájúak. A virágok nagyok, aranysárga–élénksárga szirmúak, amelyek a modern kasvirágokra jellemző módon visszahajlanak, és narancsos-bronz, tüskés központi kúpot ölelnek körül. A virágzás késő tavasztól egészen a fagyokig tart, és a fajta már az első évben, hideghatás nélkül virágzik. A magfejek télen is megmaradnak, és táplálékot nyújtanak a pintyeknek és más énekesmadaraknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális, legalább napi 6 óra közvetlen napsütéssel; a félárnyékot is elviseli, de a virágzás ilyenkor gyengébb.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább szegényes vagy közepesen termékeny talajt kedvel. A nehéz, agyagos és tartósan nedves talajt kerülni kell, mert a pangó víz gyökérrothadást okozhat.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt, később a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, az USDA 4–9. zónában megbízhatóan áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében, de kerülje a túl tápdús talajt. A növények közötti távolság 20–25 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elvirágzott virágokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A magfejeket hagyhatja télen a madaraknak, de kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a száraz részeket a talajszint közelében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat és a levélfoltosság ritkán jelentkezhet, különösen száraz, meleg időben. Az őzek és a nyulak általában elkerülik.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, sziklakertbe, préri stílusú ültetésekbe, pollinátorkertekbe és konténeres, teraszkerti kompozíciókba illik. Törpe mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a nagy, aranysárga virágok és a kompakt habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a téli kertben is struktúrát ad a megmaradó magfejekkel.
Növénytársítások

Préri-évelők: fekete szemű Susan, lángszínű liatris, sédbúza, kasvirág-fajok – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűfélék: kínai virágosnád, kék csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.			
Illatos és fűszeres növények: macskamenta, zsálya, ánizsillatú méhbalzsam, cickafark – szárazságtűrők, és vonzzák a beporzókat.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a kasvirág virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4–9.			
Guatemala Papaya kasvirág	**Echinacea purpurea 'Guatemala Papaya'**	3 350 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Guatemala Papaya kasvirág (Echinacea × 'Guatemala Papaya') a Danziger nemesítőház Guatemala-sorozatának tagja, amelyet a kompakt méret és a rendkívül hosszú virágzás érdekében szelektáltak. Törpe, sűrű, felálló habitusú évelő, amelynek erős, merev szárai a virágzatokat a lombozathoz közel tartják, így nem igényel támasztékot, és szélben sem dől meg. Kifejlett magassága 20–30 cm, szélessége 18–25 cm között alakul, a tövek alacsony, tömött tőlevélrózsát alkotnak. Levelei sötétzöldek, durva textúrájúak.
A virágzat fészekvirágzat (capitulum), amely a fészkesvirágzatúak családjára jellemző összetett virágzat. A fészek peremén helyezkednek el a nyelves virágok (ray florets) – ezek alkotják a látványos „szirmokat”. A Guatemala Papaya esetében a nyelves virágok élénk narancssárga-papajaszínűek, rózsás árnyalattal, és a modern kasvirágokra jellemző módon erősen hátrahajlók (reflexed). A fészek központi részét a csöves virágok (disc florets) tömege alkotja, amelyek sötétebb, bronzos-narancs színűek, és a fészek felületét kúpos, tüskés megjelenésűvé teszik; ezt a kasvirágoknál a csöves virágok tövénél elhelyezkedő murvalevelek (paleák) okozzák. A virágzás kora nyáron (a 22–24. héten) kezdődik, és egészen a fagyokig tart, a fajta már az első évben, hideghatás nélkül virágzik. A fészekvirágzatok elnyílás után is megmaradó magfejei télen táplálékot nyújtanak a pintyeknek és más énekesmadaraknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális, legalább napi 6 óra közvetlen napsütéssel; a félárnyékot is elviseli, de a virágzás ilyenkor gyengébb.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább szegényes vagy közepesen termékeny talajt kedvel. A nehéz, agyagos és tartósan nedves talajt kerülni kell, mert a pangó víz gyökérrothadást okozhat.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt, később a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, az USDA 4–9. zónában megbízhatóan áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében, de kerülje a túl tápdús talajt. A növények közötti távolság 20–25 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen, mélyen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt fészekvirágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A magfejeket hagyhatja télen a madaraknak, de kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a száraz részeket a talajszint közelében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat és a levélfoltosság ritkán jelentkezhet, különösen száraz, meleg időben. Az őzek és a nyulak általában elkerülik.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, sziklakertbe, préri stílusú ültetésekbe, pollinátorkertekbe és konténeres, teraszkerti kompozíciókba illik. Törpe mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a nagy, tüzes narancssárga fészekvirágzatok és a kompakt habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a téli kertben is struktúrát ad a megmaradó magfejekkel.
Növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Préri-évelők: fekete szemű Susan, lángszínű liatris, sédbúza, kasvirág-fajok – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: kínai virágosnád, kék csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Illatos és fűszeres növények: macskamenta, zsálya, ánizsillatú méhbalzsam, cickafark – szárazságtűrők, és vonzzák a beporzókat.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a kasvirág virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-9.

Gyöngypáfrány	**Onoclea sensibilis**	5 950 Ft	7 280 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Gyöngypáfrány egy közepes termetű, összetett levelű évelő páfrány, amely 30-60 cm magasra és 30-90 cm szélesre nő. Levelei steril és termő levelekből állnak. A steril levelek világoszöldek, szárnyasan összetettek, ovális alakúak, melyek ősszel aranysárgára színeződnek.
Gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy teljes árnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Nedves, jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt igényel

Vízigény: Magas vízigényű, állandóan nedves talajt preferál

Metszés: Nem igényel metszést, a száraz levelek tavasszal eltávolíthatók

Télállóság: Kiváló télállóságú, -40°C-ig is ellenáll

Szaporítás: Osztással vagy spórák útján

Ültetési javaslat

Árnyékos kertek aljnövényzeteként

Patakpartok és mocsaras területek mentén

Nedves talajú erdei részeken

Társítás: Hostákkal, gólyahírrel, japán kövérkével, más páfrányokkal

Talajtakaróként nagyobb területeken

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek

Erdei kertek

Nedves területek

Természetes kertek

Japán kert stílusú kertek

Gyöngyvirág	**Convallaria majalis**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Gyöngyvirág (Convallaria majalis) – Az illatos, tavaszi talajtakaró

A gyöngyvirág a spárgafélék családjába tartozó, Európában és Ázsia mérsékelt éghajlatú tájain őshonos, évelő lágyszárú növény. A növény a szeretet, a szerelem és a szűziesség szimbólumaként ismert, magyar népies nevei között a "májusi virág" és a "kakukkvirág" is szerepel. A gyöngyvirágot elsősorban a finom, illatos virágaiért és a talajtakaró képességéért ültetik a kertekbe, árnyékos, erdei hangulatú helyekre.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A gyöngyvirág egy alacsony termetű, tarackos gyöktörzzsel terjedő, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 15-25 cm, szélessége 20-40 cm között alakul, ami sűrű, szőnyegszerű állományt eredményez. A talajban futó, vékony, elágazó rizómákból fejlődnek a hajtások, amelyek csúcsán hártyás allevelek és két hosszú nyelű, élénkzöld lomblevél található. A levelek lemeze 10-20 cm hosszú, elliptikus, hegyes csúcsú.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágszár 15-25 cm magasra emelkedik a levelek fölé, és egyoldalú, bókoló fürtben 5-12 darab fehér, harang alakú, illatos virágot hordoz. A virágok a gyöngyökre emlékeztetnek, innen ered a növény magyar neve is. A virágzási időszak a tavasz végén van: Magyarországon jellemzően májustól júniusig. A virágok intenzív, édes illatukkal vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, vörös bogyókat fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (rizómákkal) egyaránt szaporítható. A vegetatív szaporítás a leggyakoribb, mivel a rizómák könnyen szétoszthatók, és a növény gyorsan terjed.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A gyöngyvirág félárnyékos vagy árnyékos fekvést igényel. A tűző napot kerülni kell, mert a levelek megéghetnek és a növény hamar kipusztulhat.

Talaj: A növény a legjobban a nyirkos, humuszban gazdag, jó vízáteresztő képességű, semleges vagy enyhén meszes talajban érzi magát. A szárazságot nem tolerálja, de a pangó vizet is kerülni kell.

Öntözés: A gyöngyvirág közepes vagy magas vízigényű; a talajt folyamatosan enyhén nedvesen kell tartani, különösen a virágzási időszakban. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén (március-április) adjunk neki egy réteg (2-3 cm) érett komposztot a talaj felszínére kijuttatva.

Metszés és ápolás: A gyöngyvirág alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzás után a növényt érdemes hagyni, hogy a levelek elszáradjanak; ezek biztosítják a rizómák tápanyagellátását a következő évre. A növény 3-4 évente történő tősosztása (rizómák szétválasztása) tavasszal vagy kora ősszel javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését és a túlzott terjedést.

Telelés és fagytűrés: A gyöngyvirág kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lágyszárú, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a rizómák telelnek át a talajban. Tavasszal a növény a rizómákból újrahajt.

Fontos tudnivaló a mérgezőségről: A gyöngyvirág minden része rendkívül mérgező. A növény szívglikozidokat és szaponinokat tartalmaz, amelyek rendszertelen és lassú pulzust, hasi fájdalmat, hányingert és hasmenést okozhatnak, közepes mennyiségben fogyasztva akár halálhoz is vezethetnek. A gondozás során mindig viseljünk védőkesztyűt, és a növényt gyermekek és háziállatok közelében fokozott körültekintéssel ültessük. A mérgezés tüneteinek jelentkezése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A gyöngyvirág az illatos virágzásának, a sűrű, szőnyegszerű növekedésének, a kiváló télállóságának és az árnyéktűrésének köszönhetően az egyik legkedveltebb talajtakaró növény a félárnyékos és árnyékos kertekben:

Talajtakaróként fák és cserjék alá – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Erdei kertekbe, természetes hatású kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok illata és szépsége miatt különösen értékes.

Szegélyágyásokba, árnyékos virágágyásokba – a kompakt méret és a dekoratív lombozat miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Vágott virágnak – az illatos, harang alakú virágok tartósak a vázában, és kiválóan alkalmasak csokrokba. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A gyöngyvirág fehér virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (félárnyékos, nyirkos, humuszos talajú) növénnyel kombinálhatók: Páfrányokkal – a páfrányok finoman szeldelt lombozata kiváló kontrasztot alkot a gyöngyvirág tömöttebb leveleivel. Hostákkal – a hosták nagy, dekoratív levelei szépen kiegészítik a gyöngyvirág sötétzöld szőnyegét. Hagymás növényekkel: Krókusz, hóvirág – a hagymások kora tavasszal nyílnak, mielőtt a gyöngyvirág teljesen kiterjedne. Árnyéki évelőkkel: Télirozsda, tűzgyöngyvirág – a hasonló termőhelyi igényű növényekkel együtt harmonikus, árnyékos együttest alkotnak. USDA besorolása: 3-8 (Magyarországon a gyöngyvirág teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Halcyon árnyékliliom	**Hosta 'Halcyon'**	3 990 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az árnyékliliomk terepe a kertek kevéssé napsütötte részen, fák, épületek árnyékában van. Jól viselik a hosszabb száraz időszakokat is, és ha szoktatva vannak félárnyékban is szépen fejlődnek. Egyes fajták virágai illatosak.A Hosta 'Halcyon' egy korábbi fajta, melynek fő díszítő értke a kékes levélszíne, de nem elhanyagolható a nyár elején nyíló halványlila virága sem. Más árnyékliliom fajtákkal, árnyéki talajtakarókkal gyönyörűen mutat.
A 'Halcyon' árnyékliliom egy közepes termetű, tömör habitusú leveles évelő, amely akár 40-50 cm magasra és 70-90 cm szélesre is megnő. Fő értéke a vastag, szürkéskék színű, erősen érdes felületű levél, amely szív alakú és ékessé teszi a növényt. Július-augusztus hónapokban nyílnak a világoslila színű, tölcsér alakú virágok, melyek a levélzet felett magasodva egy lágy kontrasztot alkotnak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos hely

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talaj

Távolság: 50-60 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Árnyékos gyomvisszatartó, talajtakaró, növényágyások, erdei kertek, patakpartok

Gondozási útmutató

Metszés: Ősszel, a levelek elszáradása után vágjuk vissza

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: A csigák és meztelen csigák szeretik, védekezni kell ellenük

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek és erdei beültetések

Japán stílusú kertek

Patak- és tóparti kertek

Modern árnyékos kompozíciók

Konténeres ültetés árnyékos teraszokra

Hameln tollborzfű	**Pennisetum alopecuroides 'Hameln'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hameln tollborzfű (Pennisetum alopecuroides 'Hameln') egy mostanra szélesebb körben ismert és kedvelt tollborzfű fajta. líves leveleivel, és az alapfajtól eltérő sötétebb virágzatával, valamint őszi lombszínével tűnik ki. Javasolható más díszfüvekkel, vagy őszi virágzású évelőkkel telepítve, valamint örökzöld cserjék elé ültetve is. Kisebb kertekben azonabn szoliterként is megállja a helyét. Tartása egyszerű:
Átlagos tápértékű, jó vízelvezető talajt kedvel, kötöttebb agyagos talajokban nehézségei vannak.
Napos fekvésre telepítsük ott lesz a legszebb, legsűrűbb, és az őszi lombszíne is ott lesz a legélénkebb.
60-80 cm magasra fejlődik. Érdemes télen is fent hagyni a lombozatot, hiszen varázslatosan mutat deres, fagyos reggeleken.
Tavasszal kell alacsonyan 5-7 cm magasságban visszavágni a csomót. 5-6 évente fel lehet szedni, és tőosztani, különben kissé elöregszik a tő.

Hamvaskék kúszó virginiai boróka (kisebb)	**Juniperus 'Grey Owl'**	2 500 Ft	2 500 Ft
Havasi szegfű	**Dianthus alpinus**	1 950 Ft	2 250 Ft

A Havasi szegfű, ahogy neve is mutatja, a magashegységek sziklás világából érkezett, és az alpesi kertek, sziklakertek egyik legigényesebb, mégis legszebb ékszere. Törpe termetű, párnás növekedésű évelő növény, amely kifejlett állapotban is csupán 5-15 cm magas, de idővel szépen terjeszkedve akár 20-30 cm széles, sűrű, tömött párnákat alkothat.
Megjelenésében visszafogottan elegáns: keskeny, lándzsás, fűszerű levelei sötétzöldek, enyhén fényesek, és a talajt borító sűrű gyepet alkotnak. A növény igazi látványossága a nyár eleji virágzás idején bontakozik ki. Június-július folyamán a lombpárnákból rövid szárakon feltűnően nagy, 2-3 cm átmérőjű virágok nyílnak. Az élénk rózsaszíntől a mély bíborvörösig, néha fehér árnyalatban is megjelenő szirmok széle jellegzetesen fogazott, középpontjukban gyakran sötétebb gyűrűvel vagy pettyes mintázattal, ami még különlegesebbé teszi a virágokat.
Igényei és gondozása
A Havasi szegfű a napfény és a jó vízelvezetés megszállottja. Teljesen napos, lehetőleg déli fekvésbe ültessük, ahol a lehető legtöbb fény éri. A legkritikusabb tényező a talaj: kiváló vízelvezetésű, laza, köves vagy homokos, meszes (magas kalciumtartalmú) talajt igényel. A pangó vizet egyáltalán nem tűri, gyökerei könnyen kirothadnak. Ültetéskor keverjünk a talajba meszes zúzottkövet vagy sóder, hogy biztosítsuk a megfelelő vízelvezetést. Szárazságtűrése jó, öntözni csak tartósan aszályos időszakban szükséges. Gondozása minimális: a virágzás elmúltával távolítsuk el az elnyílt virágokat, hogy a növény ne gyengüljön a magkötéstől. Tápanyagutánpótlást nem igényel, sőt, a túlzott tápanyag (különösen a nitrogén) ellágyuláshoz és kórokozók megjelenéséhez vezethet. Metszeni nem kell, de ha a párna középen kiritkulna, néhány évente frissíthetjük a növényt tavaszi tőosztással.
Felhasználás a kertben
A Havasi szegfű a sziklakert megkérdőjelezhetetlen királynője. Kiválóan mutat sziklák repedéseiben, ahol gyökerei a kövek közé kapaszkodhatnak. Ideális alpesi kertekbe, ahol törpe fenyők, alpesi harangvirágok társaságában hiteles hegyvidéki hangulatot teremt. Szárazon rakott kőfalak réseibe ültetve idővel gyönyörű, virágzó függőleges kerteket alkothatunk vele. Kavicságyásokban, sóderágyásokban is megállja a helyét, ahol a kavicsok közül kikandikáló színes virágok különösen mutatósak. Alacsony termete miatt évelőágyások előterébe, szegélynövényként is ültethetjük, de ügyeljünk rá, hogy szomszédai ne árnyékolják és ne nőjék túl.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos és jó vízelvezetésű talajt kedvelő alpesi növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a különböző alacsony harangvirágok, mint a kárpáti harangvirág (Campanula carpatica) vagy a csomós harangvirág (Campanula glomerata). Pozsgások közül a kövirózsák (Sempervivum) és a varjúhájfélék (Sedum) társaságában is remekül érzi magát. Törpe termetű füvekkel, például a kékesszürke levelű csenkeszekkel (Festuca glauca) ültetve gyönyörű textúrabeli kontrasztot hozhatunk létre. Sziklakertekben szépen mutat a kőtörőfüvek (Saxifraga) és a habszegfű (Armeria) társaságában.

Heavy Metal vesszős köles	**Panicum virgatum 'Heavy Metal'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Heavy Metal vesszős köles (Panicum virgatum 'Heavy Metal') ÉszakAmerika prérijeiről származó, felálló, oszlopos, sűrű tövet képező, lombhullató évelő díszfű. Kifejlett magassága a bugavirágzatokkal együtt általában 100–150 cm, szélessége 50–80 cm között alakul; a tövek merev, egyenes szárakkal, szigorúan oszlopos habitussal nőnek, így heves esőzés vagy szél után sem dőlnek meg. Levelei keskenyek, szalagszerűek, fémesacélkék-szürkéskék színűek, és a nyár folyamán végig megőrzik feltűnő színüket; ősszel aranysárga, narancsvörös árnyalatokat vesznek fel. Virágzata laza, felhőszerű, rózsaszínesbarna buga, amely júliustól szeptemberig nyílik, és a bugák télen is a növényen maradnak, téli díszt nyújtva. A növény habitusa rendezett, merev, így kiválóan alkalmas függőleges akcentus képzésére és konténeres termesztésre is.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legintenzívebb acélkék lombszínt és a legmerevebb szárakat, árnyékban elveszíti jellegzetes színét és tartását.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos, vályogos vagy meszes talajt kedvel; a pangó vizet rosszul tűri, a túl tápdús talaj a szárak megnyúlását és megdőlését okozhatja.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, de mérsékelt öntözés mellett dúsabb és szebb lesz. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, az USDA 4–9. zónában megbízhatóan áttelel, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül is biztonságosan tartható.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy homokot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 60–80 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: A régi lombozatot és az elvirágzott szárakat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, kb. 10–15 cm-re. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz részek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a gombás betegségek ritkán jelentkeznek. Az őzek és a nyulak is elkerülik.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább szoliterként, préri stílusú ültetésekbe, évelőágyba, kavicskertbe, modern és minimalista kompozíciókba, valamint természetközeli kertekbe illik. Kiváló függőleges akcentusként működik, és merev, oszlopos habitusa miatt jól mutat a kert hátterében vagy fókuszpontként. Konténerben és teraszon is nevelhető. Kiváló vágott és szárított virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Préri évelők: kasvirág, cickafark, méhbalzsam, varfű, kúpvirág – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a vesszős kölest.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Rózsák: a vesszős köles függőleges, acélkék lombozata szép kontrasztot ad a rózsák mellett.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4-9 (egyes források az 5-9. zónát adják meg alsó határként).			
Highland Lord sásliliom	**Hemerocallis 'Highland Lord'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Highland Lord sásliliom egy erőteljes növekedésű évelő növény, amely 60-75 cm magasra és 50-60 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, élénkzöld színűek, melyek szép háttérként szolgálnak a sötét virágoknak. Virágai gazdag bársonyos sötétvörös színűek, 12-14 cm átmérőjűek. A virágok szirmai szélesek, enyhén fodrosak, és sárga torkuk finom kontrasztot alkot a sötétvörös színnel. Virágzási ideje június és július között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként lenyűgöző hatású

Vegyes virágágyások kiemelkedő eleme

Társítás: Fehér vagy világossárga virágú növényekkel, ezüstlevelű fajtákkal

Előkelő kerti kompozíciókba tökéletes választás

Konténeres nevelésre is kiválóan alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Formális kertek

Nemes kerti kompozíciók

Városi kertek

Hagyományos kertek

Rózsakert társnövényeként

Himalájai bogyóspuszpáng	Sarcococca hookeriana	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A Sarcococca hookeriana (Himalájai bogyóspuszpáng), a Himalajából származó, talajtakaró, örökzöld cserje. Fehér virágai tél végén, kora tavasszal nyílnak, melyek a látvány mellett, az illatukkal (kifejezetten erős és aromás) ejtik rabul az embert. Nagyobb növények alatt, vagy bármely tartósan félárnyékos helyek legszebb talajtakarói közé tartóznak. Nyírásuk sem szükséges, mert nőnek 50 cm-nél magasabbra. 7a-10a USDA-zóna			
Hispida kristályvirág vagy délvirág	Delosperma hispida	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kristályvirág hispida (Delosperma hispida) – A bíborlila virágú, sörtés levelű pozsgás talajtakaró sziklakertbe.
Dél-Afrikából (főként a Dél-afrikai Köztársaság keleti és déli hegyvidéki régióiból) származó, pozsgás levelű, talajtakaró évelő növény. Ez a pozsgás növény a késő tavasztól a késő nyárig tartó időszakban bíborlila virágokkal borítja be a talajt, alacsony termete, gyors terjedése és a lombozat különleges textúrája miatt az egyik legkedveltebb sziklakerti pozsgás a száraz, jó vízelvezetésű helyekre. A közönséges magyar név („kristályvirág” vagy „délvirág”) mellett ismert még „jégvirág” néven is.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A kristályvirág hispida egy alacsony termetű, elfekvő, indás növekedésű, pozsgás (zsíros levelű), örökzöld lágyszárú évelő növény. Kifejlett magassága 5-10 cm között alakul, míg szélessége a kedvező körülmények között elérheti a 30-50 cm-t. A hajtások kezdetben felállók, majd hamarosan elfekvők, erősen elágazóak, és a talajjal érintkezve hajlamosak a csomókban történő legyökerezésre, ami elősegíti a növény gyors, szőnyegszerű, sűrű terjedését.
A levelek a növény egyik legkülönlegesebb jellemzői. Aprók, 1-2 cm hosszúak, alakjuk hengeres vagy tojásdad-hengeres (félhengeres keresztmetszetű), húsosak, pozsgásak, ami a szárazságtűrés egyik adaptációja. A levelek átellenes állásúak, ülők (nyél nélküliek), a levél széle ép, csúcsuk tompa vagy lekerekített. A levél színe szürkészöld vagy kékeszöld, ami a száraz, napos élőhelyekre jellemző adaptáció (a szürkés színezet csökkenti a sugárzás és a párolgás mértékét). A levelek és a fiatal hajtások felületét sűrű, fehér vagy áttetsző, sörteszerű szőrök (trikómák) borítják, amelyek a növényt tapintásra érdes, szúrós érzetet adnak, innen ered a fajnév (hispida). Ez a szőrözöttség további védelmet nyújt a túlzott párologtatás, a növényevők és a erős napsugárzás ellen. A lombozat sűrű, a hajtásokat szorosan borító, szőnyegszerű takarást alkot, amely télen is megmarad (örökzöld), bár a hidegebb időszakokban a levelek színe enyhén bronzos vagy lilás árnyalatot kaphat.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágok a hajtások végén, egyesével vagy kettesével-hármasával jelennek meg, ülők vagy nagyon rövid kocsányúak. A virágok mérete 2-3 cm átmérőjű, fészekvirágzattípusúak (a százszorszéphez hasonlóak), számos (30-50 db) keskeny, lándzsás, fényes szirommal (liguláris virágokkal). A Delosperma hispida virágának színe élénk bíborlila, lila vagy rózsáslila, a szirmok töve gyakran fehér, a virág közepe fehér vagy sárgásfehér, apró csöves virágokból áll. A virágok a teljes napfényben nyílnak ki a legteljesebben; borús időben vagy este a virágok zárva maradnak. A virágzási időszak a késő tavasztól a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően májustól augusztusig, a legbőségesebb virágzás június-júliusban figyelhető meg. A virágzás rendkívül bőséges; a növény virágai annyira sűrűn nyílnak, hogy a lombozat szinte teljesen eltűnik a virágözön alatt. A virágok a méheket, a poszméheket, a pillangókat és más rövid szívókájú beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és magszaporítás
A virágzást követően a növény apró, toktermeséket fejleszt, amelyek a pozsgásokra jellemző módon felnyílnak, és a kis, barna magokat a környezetbe szórják. A magok jól csíráznak, a növény a kertben önmagát is szaporíthatja.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kristályvirág hispida kifejezetten napfényigényes növény. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött, szőnyegszerű növekedéshez, a bőséges virágzáshoz, a szép, kompakt lombozat kialakulásához és a levelek szép szürkészöld színének megtartásához. Félárnyékban a növény kevésbé virágzik, a virágok ritkábban nyílnak, a hajtások megnyúlnak (etiolálódnak), a lombozat lazább, sötétebb zöld lesz (elveszíti a szürkés árnyalatot), és a növény hajlamosabb a gombás betegségekre. Teljes árnyékban a növény nem virágzik, és fokozatosan elgyengül.

Talaj: A kristályvirág hispida nem igényes a talajra, de a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású (pH 6,5-7,5) talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a meszes, sziklás, köves, száraz talajokat, sőt, a tápanyagszegény környezet serkenti a kompakt növekedést és a bőséges virágzást. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős, savanyú kémhatású (pH 6,0 alatti) talajokat nem tűri; ezekben a talajtípusokban a gyökérrothadás (Phytophthora, Pythium) kialakulásának veszélye jelentősen megnő. Ültetéskor javasolt a talajt apró kaviccsal, durva homokkal, perlit vagy habkő hozzáadásával keverni a vízelvezetés javítása érdekében. Kifejezetten kerülendő a fa kéreg mulcs használata, amely túlzott nedvességet tarthat vissza.

Öntözés: A kristályvirág hispida kimondottan szárazságtűrő, pozsgás leveleiben vizet raktároz, ami lehetővé teszi a hosszabb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első 4-6 hetében mélyrehatóan, de nem gyakran (hetente 1 alkalommal) kell öntözni, hogy a gyökerek mélyre hatoljanak. Az idősebb, begyökeresedett (1 évnél idősebb) példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra a mérsékelt égövön (pl. Magyarország). A túlöntözés a leggyakoribb gondozási hiba: öntözéskor minden esetben hagyjuk a talaj felső 2-3 cm-es rétegét teljesen kiszáradni két öntözés között. A nedves, pangó vizes téli körülmények a növény pusztulásához vezethetnek.

Tápanyag-utánpótlás: A kristályvirág hispida kifejezetten alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt, tápanyagdús virágföld vagy istállótrágya talajba keverését, mert a túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogéntartalom, a lombozat kárára válik: a növény elveszíti kompakt, szőnyegszerű formáját, a hajtások megnyúlnak, a virágzás elmarad vagy gyenge lesz, a növény a lombfejlesztésre koncentrál (a levelek elveszítik szép szürkészöld színüket és sötétzölddé válnak), és fogékonyabbá válik a gombás betegségekre. Évente egyszer, kora tavasszal (március-április) adható egy nagyon kevés (a csomagoláson javasolt adag negyede-harmada) lassan oldódó, alacsony nitrogéntartalmú (pl. NPK 4-12-8 vagy 5-10-10) műtrágya, vagy kaktuszok és pozsgások számára kifejlesztett speciális trágya.

Metszés és ápolás: A kristályvirág hispida alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzás utáni enyhe visszavágás (augusztus-szeptember) javíthatja a növény habitusát. A metszés során a hajtásokat a hosszuk harmadára-negyedére (kb. 3-5 cm-es hosszúságúra) lehet visszavágni. Ez az eljárás serkenti az új, fiatal hajtások képződését, a növény sűrűbb, kompaktabb, szőnyegszerű formát vesz fel, és megakadályozza a középrész felkopaszodását,

amely az idősebb, nem metszett példányoknál idővel kialakulhat. A nagyon idős, elöregedő, csupasz középrészű, 3-4 évesnél idősebb növényeket tavasszal (március-április) erőteljesen, akár 2-3 cm-es magasságúra visszavághatjuk, hogy fiatal, új hajtásokat serkentsünk; ez a fiatalító metszés meghosszabbítja a növény élettartamát.

Telelés és fagytűrés: A kristályvirág hispida kifejezetten jó télállóságú a pozsgások között. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország nagy részén (az USDA 5-ös, 6-os zónáiban) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban, feltéve, hogy a talaj jó vízelvezetésű és a növény nem áll pangó vízben. A lombozat télen is megmarad (örökzöld), bár a hidegebb időszakokban a levelek széle enyhén bronzos, lilás vagy vöröses árnyalatot kaphat, ami normális jelenség és nem károsodás. A fiatal, ősszel ültetett növények számára az első tél előtt egy vékony lombtakaró vagy fenyőágyazat nyújthat extra védelmet, de ez nem kötelező. A téli időszakban nem a fagy, hanem a pangó víz és a talaj felázása jelenti a fő kockázatot; ezért a jó vízelvezetésű talaj kiemelten fontos a sikeres teleltetéshez. A nehéz, agyagos, belvizes talajokon a téli felázás következtében a növény kipusztulhat. A konténerben nevelt növényeket is teleltethetjük a szabadban, ha a cserép nagy (legalább 20-30 cm átmérőjű) és a talaj jó vízelvezetésű; extrém hideg teleken a cserép szigetelhető buborékfóliával vagy jutával.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A kristályvirág hispida a bíborlila virágzásának, a lombozat különleges szürkészöld színének és sörtés textúrájának, kompakt méretének, kiváló télállóságának, szárazságtűrésének és talajtakaró képességének köszönhetően az egyik legkedveltebb sziklakerti pozsgás. Alkalmazási területei:

Talajtakaró napos, száraz, gyengébb minőségű talajú részeken – ott is megél, ahol más növények nem boldogulnak; a sűrű, szőnyegszerű növekedésével hatékonyan szuppresszálja a gyomokat.

Sziklakertekben, kőkertekben, kavicsos kertekben (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát; a bíborlila virágok a szürke kövek között különösen mutatósak.

Szárazkőfalak repedéseiben, kövezett utak fugáiban, sziklaágyásokban (crevice garden) – a növény lecsüngő hajtásai vízesésszerű, bíborlila virágtömeget alkotnak.

Szegélyágyások előterében, virágos ágyások szegélyeként – alacsony termete miatt kiváló előtérnövény, a bíborlila virágok és a szürkészöld lombozat élénkítik a sötétebb hátteret.

Napos lejtőkön, rézsűk rögzítésére, talajerózió megakadályozására – gyorsan terjedő, legyökerező hajtásai hatékonyan megtartják a talajt.

Zöldtetőkön, tetőkertekben – alacsony termete, sekély gyökérzete, szárazságtűrése és kiváló télállósága miatt ideális zöldtető növény.

Konténerekben, dézsákban, balkonládákban, erkélyládákban, sírkertekben – kiválóan nevelhető cserepes növényként is, ahol a bíborlila virágok elegáns, figyelemfelkeltő hatást keltenek.

Függőkosarakban, magasított ágyások szélében – lecsüngő hajtásai miatt rendkívül látványos.

Vadvirágos kertekben, természetes hatású kertekben, pillangókertekben – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat, növelve a kert biodiverzitását.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kristályvirág hispida bíborlila virágai és szürkészöld, sörtés levelű lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló termőhelyi igényű (napos, száraz, jó vízelvezetésű talajú) növényekkel. Az alábbi társítások különösen ajánlottak:

Sárga virágú pozsgások és évelők: Sárga varjúháj (Sedum rupestre 'Angelina'), sárga kristályvirág (Delosperma nubigenum), takarékláng (Portulaca grandiflora) – a bíborlila és a sárga színek kiváló, vibráló kontrasztot alkotnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fehér virágú növények: Fehér kristályvirág (Delosperma congestum 'White Nugget'), fehér varjúháj (Sedum album), törpe harangvirág (Campanula) – a bíborlila és a fehér színek elegáns, tiszta, nagy kontrasztot adó hatást keltenek.

Rózsaszín virágú növények: Rózsaszín kristályvirág (Delosperma cooperi), törpe nőszirom (Iris pumila), kakukkfű (Thymus) – a hasonló tónusú, de eltérő árnyalatú szívek harmonikus, mélységet adó, gazdag összképet eredményeznek.

Ezüstös levelű növények: Kövirózsa (Sempervivum), kék csenkesz (Festuca glauca), szürke varjúháj (Sedum pruinatum), üröm (Artemisia) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern, mediterrán hatást keltenek, és kiemelik a bíborlila virágokat. A Delosperma hispida saját szürkészöld lombozata különösen jól harmonizál ezekkel a növényekkel.

Díszfüvek: Törpe árvalányhaj (Stipa tenuissima), kék csenkesz (Festuca glauca) – a füvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a kristályvirág tömöttebb, szőnyegszerű formáját.

Kora tavaszi hagymás növények: Krókusz (Crocus), törpe tulipán (Tulipa), hóvirág (Galanthus), sáfrány – a kora tavaszi hagymások elnyílása után a kristályvirág átveszi a virágzást, így a virágzási időszak folyamatos, tavasztól nyárig.

USDA besorolása: 5-8 (Magyarországon a kristályvirág hispida teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös (hidegebb északi és keleti régiók, pl. Zemplén, Észak-Alföld), 6-os (középső és nyugati régiók, pl. Dunántúl, Budapest agglomeráció) és 7-es (enyhébb déli régiók) zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban, feltéve, hogy a talaj jó vízelvezetésű. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy. A konténerben nevelt növényeket is teleltethetjük a szabadban, ha a cserép jó vízelvezetésű és nem áll pangó vízben az alátétben.)

homoki hajperje	Leymus arenarius	1 950 Ft	1 950 Ft

A homoki hajperje (Leymus arenarius) egy nagyon hasznos díszfű féle. Kék szárakon kék leveleket hoz, maga a virágzati szár is kék, sőt a virág kalásza is éretlen állapotban az. Majd ahogy érnek a magok, lassan a szárral egyetemben kivilágosodnak, és fehéres sárgás színt vesznek fel, talán ilyenkor a legszebb ez a növény.
Igen jó szárazságtűrő, kifejezetten napos fekvést kíván, egyéb helyzetben kiritkul, és a átszövik a gyomok.
Laza, jó vízáteresztő, de legalább átlagos minőségű kerti talajt kíván. Kötött agyagos talajok nem jók számára.
Más sziklakerti díszfüvekkel, és szárazságtűrő virágos évelőkkel (levendula, cipruska, árvalányhaj,rozmaring, ligetszépe, mexikói lobélia, vesszős köles, sőt pálmaliliomokkal is.) ill. szárazságot tűrő örökzöld lombú cserjékkel (nemes babér, széles levelű ezüstfa, illatcserje, babérmeggy stb.) társítható jól.

Ice Cream Yellow kristályvirág, délvirág	Delosperma cooperi 'Ice Cream Yellow'	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Ice Cream Yellow kristályvirág (Delosperma cooperi 'Ice Cream Yellow') a német Florensis nemesítésű Ice Cream sorozat tagja, amelyet a hosszú virágzás és a kedvező télállóság érdekében állítottak elő. Alacsony, sűrű, szőnyegszerűen elterülő tövet képez, amelynek hajtásai a talaj felszínén kúsznak, és sűrű, összefüggő telepet alkotnak. Kifejlett magassága 5–15 cm, szélessége 20–70 cm között alakul – a termőhelytől és a korábbi metszéstől függően a szélesség a szűkebb, 20–30 cm-es és a tágabb, 50–70 cm-es tartományban egyaránt előfordulhat. Levelei húsosak, hengeresek vagy keskeny lándzsásak, élénk fűzöldek, és a lombozat enyhe teleken részben vagy egészben megmarad.
A virágzat a hajtások végén nyílik; a virágok margarétaszerűek, élénk sárga színűek, közepükön finomabb, krémes-fehér árnyalatú koronggal. A virágok átmérője mintegy 3–5 cm, és csak napos időben nyílnak ki teljesen, borult időben vagy éjszakára bezáródnak. Virágzása május és szeptember között tart, de egyes termesztési tapasztalatok szerint akár júliustól októberig is kitolódhat. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a lepkékenek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a forró, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást. Árnyékban a virágok zárva maradnak, és a növény habitusa megnyúlik.

Talaj: Jó vízáteresztő, sovány, homokos vagy köves talajt kedvel; a semleges–enyhén lúgos kémhatást preferálja. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: A fajta a nemzetségen belül viszonylag jó télállóságot mutat – egyes források USDA 6b (kb. –21 °C) besorolást adnak meg, mások a teljesen télálló jelzőt használják. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a téli nedvesség elleni takarás (lomb, fenyőág) javasolt, mert a pangó víz a fő kockázati tényező.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a hajtásokat enyhén visszavághatja, hogy megőrizze a tömör, szőnyegszerű formát. Kora tavasszal a télen elhalt vagy sérült részeket távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télállósága a fajtán belül kedvező, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás segíthet a nedvesség elleni védelemben. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, szőnyegszerű habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás; konténerben a lecsüngő. A virágzás idején messziről feltűnő élénksárga színfoltot ad a kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Növénytársítások			
Pozsgások: kövirózsa (Sempervivum), varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.			
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kristályvirág tömör habitusát.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kristályvirág virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 6-9 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).			
Ice Dance japán sás	Carex morrowii 'Ice Dance'	2 450 Ft	2 450 Ft
Az Ice Dance nevű sás egy igazán egészséges, fehértarka levelű, közepes termetű sás féle, mely 30-35 cm magasra nő, sűrű, dús csomókban fejlődve fedi le a talajfelszínt megfelelő termőhelyi körülmények között teljesen kiszorítva a gyomokat. Bőrszerű levelei peremén fehér, krémfehér csíkosak, virágai inkább sárga színűek. Félárnyékos, napos helyre telepítendő, jól tűri a szárazságot, de meghálálja ha kap vizet. Laza szerkezetű, hó vízáteresztő képességű talajba telepítsük. Nagyon mutatós növénye az árnyékosabb, párás levegőjű kerteknek, telepíthetjük kis kerti tavak környezetébe, de divatos, és gyakran használják díszkavicsos felületekben a minimál stílusú modern kertekben is. Gondozása egyszerű, a tavaszra elhasználódó leveleket el kell távolítani, ha csak egy-egy csomót szeretnénk megtartani, akkor érdemes tőosztással ritkítani a túlnövő töveket. Felhasználhatjuk szegélynövényként vagy egynyári és évelő növényekkel közösen ültetve. Kitűnő választás nagyobb dézsák és konténerek beültetéséhez is.			
Ireland sáfrányfű	Crocosmia x 'Ireland'	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Crocosmia x 'Ireland', magyarul Ireland sáfrányfű, egy elbűvölő, lágyszárú évelő növény. Legjellegzetesebb tulajdonsága a mély narancsvörös színű, trombita alakú virágja, amelyek sűrű csokrokban nyílnak a karcsú, íves szárakon. A virágok a levelek fölött magasodnak, és a nyár közepétől a kora őszig színesítik a kertet. A növény üde, sötétzöld, szálas levelei is igen dekoratívak, tőrózsát alkotva. Megfelelő helyen akár 60-70 centiméter magasra és 40-50 centiméter szélesre is megnő.

Gondozási útmutató

Fényigény: A napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. Minél több napfényt kap, annál bővebben fog virágozni.

Talajigény: A jól vízelvezető, tápanyagban gazdag és közepesen nedves talaj az ideális számára. A nagyon száraz, köves talajokon gyengébben fejlődik.

Vízigény: Közepes vízigényű. A szárazabb, meleg időszakokban rendszeres öntözést igényel, de a pangó vizet egyáltalán nem tűri.

Metszés: A virágzás után a száraz virágzatot vágjuk le. A leveleket csak akkor távolítsuk el, ha teljesen megsárgultak, ugyanis a zöld levél segíti a hagymát a tápanyag felhalmozásában.

Télállóság: Meglehetősen jó télállóságú. Magyarországon az átlagos teleket jól kibírja, de egy enyhe téli takarás (pl. mulcsolás) segítheti az áttelelést.

Trágyázás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén, egy lassan oldódó, komplex műtrágyával történő etetés elősegítheti a gazdag virágzást.

Ültetési javaslat

Az Ireland sáfrányfű rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben. Szoliter növényként is nagyon hatásos egy gyepben vagy egy kisebb kerti ágyásban. Többedmagával ültetve azonban igazán csodás látványt nyújt; ilyenkor célszerű 8-10 centiméteres tőtávolságra ültetni a hagymákat. Kiválóan alkalmazható vegyes virágágyásokba, ahol magasságával és formájával kontrasztot alkot más növényekkel. Vágott virágként is kitűnő, hosszú ideig friss marad csokrokban.

Ajánlott kerttípusok

Az Ireland sáfrányfű jól illeszkedik az alábbi kerttípusokba:

Mediterrán kertek

Falusi kertek

Színes nyári ágyások

Beporzóbarát kertek

Issai lilabogyó (nagyobb)	**Callicarpa dichotoma 'Issai'**	14 900 Ft	16 200 Ft
Izotoma vagy terülő harangszirom	**Isotoma 'Gemini Blue'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az izotóma 'Gemini Blue' (Isotoma axillaris 'Gemini Blue'), más néven terülő harangszirom, alacsony, sűrű, párnás bokrot képező növény, amely 25–30 cm magasra és 25–30 cm szélesre nő. Levelei finoman szeldeltek, páfrányra emlékeztető textúrájúak, sötétzöldek, és a talaj közelében sűrű, tömött lombozatot alkotnak. Virágai aprók, ötágú csillag alakúak, púderkék-világoskék színűek, laza, levegős fürtökben nyílnak hosszú, vékony szárakon. Késő tavasztól kora őszig virágzik, és a virágok kellemes, finom illatot árasztanak, amely vonzza a méheket és a lepkéket. A növény habitusa lekerekített, enyhén szétterülő, így szép kontrasztot ad a kertben.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; a reggeli és délelőtti napfényt kedveli, a forró délutáni napsütéstől védett helyen érzi jól magát.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves, tápanyagban gazdag talajt kedvel. A nehéz agyagtalajt és a pangó vizet kerülni kell.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a rendszeres, mérsékelt öntözést igényli, különösen az első évben és száraz időszakokban. A talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni.

Télállóság: Melegigényes; rövid fagyokat elvisel, de hosszan tartó, kemény fagyokban károsodhat. Hazánkban gyakran egynyári növényként termesztik, vagy védett helyen, takarással teleltetik át.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos vagy félárnyékos, védett helyre, jó vízáteresztő, komposzttal dúsított talajba. Cserépbe és függőkosárba is kiválóan alkalmas.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a talaj felszínének enyhe nedvesen tartása ideális; kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást és serkentse az új hajtásokat. A növényt a szezon közepén enyhe visszavágással formázhatja, ami sűrűbb, bokrosabb növekedést eredményez.

Átteleltetés: Hazánkban a növényt takarással vagy védett helyen, konténerben teleltetheti át. A föld feletti részek fagyokban elhalhatnak, de tavasszal a tövéről újra hajt.

Betegségek és kártevők: A jó szellőzés és a megfelelő öntözés segít megelőzni a gombás betegségeket, például a botrítiszt. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, ágyásszegélybe és modern, strukturált ágyásokba illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és függőkosárba is. Jól mutat természetes, mediterrán és minimalista kertekben, ahol a finom textúrájú lombozat és a levegős virágzat érvényesül.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág – hasonló igényűek, és kiegészítik az izotóma finom textúráját.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak az izotóma előtt.

Virágzó évelők: kúpvirág, zsálya, harangvirág – nyáron gazdagítják a kertet.

Konténeres társak: fukszia, balkonpetúnia, verbéna – függőkosárban és cserépben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 9-11 (mérsékelt éghajlaton egynyári növényként termesztik).

Japán aranykrizantém	**Ajania pacifica**	2 750 Ft	2 750 Ft

Az Japán aranykrizantém egy látványos, alacsony termetű évelő növény, amely elsősorban leveleinek színével és virágzatával vonzza a figyelmet. Kazettás, ezüstösen szőrözött levelei kiváló háttérként szolgálnak a sárga virágoknak, melyek késő ősszel nyílnak. A növény könnyen gondozható, ellenálló és jó szárazságtűrő tulajdonságokkal rendelkezik, így akár konténerben vagy virágágyban is ültethető.
Gondozási útmutató: Az Ajania pacifica napos vagy félig árnyékos helyen fejlődik legjobban. A talaj legyen jó vízáteresztő, mérsékelten tápanyagban gazdag. Rendszeresen öntözzük, de ügyeljünk, hogy ne álljon meg a víz a gyökerek körül. A tavaszi és nyári időszakban tápoldatot alkalmazzunk a virágzás fokozására. Télen mérsékelten öntözzük, és lehetőség szerint menedéket adhatunk a fagyok ellen.
Az Ajania pacifica kiváló választás szegélyek, edények vagy alpesi kertek növényéül. Ültetéskor hagyjunk 15-20 cm távolságot növények között, hogy elegendő növekedési tér nyíljon. Tavasszal vagy kora nyáron helyezzük el, és alaposan öntözzük be. A rendszeres metszéssel elősegítjük az egészséges növekedést és a bőséges virágzást.

Copy
Regenerate

Japán kövérke	**Pachysandra terminalis**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Japán kövérke (Pachysandra terminalis) - örökzöld talajtakaró árnyékos helyekre. Könnyen gondozható, gyorsan terjedő növény, amely egész évben zöld marad! Üdezöld lombozatú, örökzöld, talajtakaró törpecserje. Fehér virágai áprilisban apró füzérekben nyílnak. Fényes sötétzöld, 5-10 cm-es levelei bőrszerűek, a hajtás végén csoportosulnak. A Pachysandra terminalis (Japán kövérke) igen látványos növény, és kiváló talajtakaró!
Külső jellemzők

Levelek: Sötétzöld, fényes, fogazott szélű, 5-10 cm hosszú levelek

Virágzás: Március-április között, apró fehér virágok

Növekedés: Lassan terjedő, gyökérindákkal szaporodó

Helyigény és gondozás

Talaj: Humuszban gazdag, nedves, de jó vízátvezetésű talaj

Fényigény: Teljes árnyékot vagy félárnyékot kedveli

Öntözés: Közepes vízigényű, fiatalon nedvesebb talajt igényel

Metszés: Ritkán szükséges, csak ha túlburjánzik

Felhasználási lehetőségek

Talajtakaróként árnyékos területeken

Lejtők megerősítésére

Fák alatti területek beültetésére

Parkok és nagyobb kerületek fedésére

Társítási javaslatok

Hostával (Hosta)

Indás infüvekkel

Harangvirággal (Campanula)

Konténeres növény előnyei

Egész évben ültethető

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fagytűrő			
Alacsony karbantartású			
5a-9b USDA-zóna			
Japán kövérke (nagy)	Pachysandra terminalis	3 750 Ft	3 750 Ft
Japán naspolya	Eriobotrya japonica	4 750 Ft	4 750 Ft
Japán som, vagy keleti som (nagy)	Cornus officinalis	9 400 Ft	9 400 Ft
Japán tarka levelű fűz (kicsi)	Salix integra 'Hakuro Nishiki'	3 950 Ft	3 950 Ft
Japán vérborbolya (nagyobb)	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	4 950 Ft	4 950 Ft
Japán vérfű vagy Vörös alangfű	Imperata cylindrica 'Red Baron'	3 990 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Japán vérfű vagy Vörös alangfű (Imperata cylindrica 'Red Baron') lenyűgöző díszfű, amely a kertekben és tájépítészetben egyaránt népszerű. A növény különlegessége a vörös színű levélzet, amely a nyári hónapokban élénken csillog. Ez a díszfű az egész növénykertben vagy akár egyedi díszítőelemként is szépen mutat.
A Japán vérfű vagy Vörös alangfűáltalában 30-40 centiméter magasra nő, de a virágzási időszakban néha kissé magasabb lehet. A levelek hosszúak és keskenyek, és a nyári hónapokban élénk vörös színt öltenek, ami lenyűgöző kontrasztot képez a kert zöld színével. A Vérpiros japán fű virágai nem túl feltűnőek, és gyakran rejtőzködnek a levélzetben. Egy-egy példány számára általában elegendő 30-45 centiméteres tér, de a növények közötti távolságot is tartsuk be a kertrendezés során.
Gondozási útmutató:

Fényigény: Az Imperata cylindrica 'Red Baron' növényeknek napos vagy félárnyékos helyre van szükségük. A teljes napsütés segíti a vörös szín kifejlődését, de ne hagyjuk túlzottan melegedni.

Talaj: A növények jól növekednek jó vízelvezetésű talajban. Előnyben részesítik a laza, homokos talajt. Érdemes trágyázni és komposzttal gazdagítani a talajt a növény egészségének megőrzése érdekében.

Öntözés: Az Imperata cylindrica 'Red Baron' rendszeres öntözést igényel. Tartsuk a talajt nedvesen, de ne álljon vízben. Különösen a forró nyári napokon fontos a megfelelő öntözés.

Téli védelem: Hideg éghajlaton a növényeket a tél beálltával védjük meg, például mulccsal.

Rendszeres metszés: Az Imperata cylindrica 'Red Baron' növényeket az év elején metszhetjük vissza, hogy megszabaduljunk a megsárgult levelektől és ösztönözzük az új növekedést.

Szaporítás: A növényeket tavasszal vagy késő ősszel osztozás útján szaporíthatjuk.

Az Imperata cylindrica 'Red Baron' egy lenyűgöző és könnyen gondozható dísznövény, amely színes kontrasztot és látványosságot adhat a kertjének.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Japán vérfű vagy Vörös alangfű (kicsi)	Imperata cylindrica 'Red Baron'	2 450 Ft	2 450 Ft
Japán zsurló	Equisetum japonica	2 950 Ft	2 950 Ft

A Japán zsurló (Equisetum japonica) egy lenyűgöző, évelő növény, amely híres különleges, üreges zöld száráról, amely a vízparti és árnyékos kertek esztétikáját emeli. A növény 30-100 cm magasra nő, és sűrű, bokros habitusa miatt remek talajtakaróként funkcionál.
A zsurló levelei nem klasszikus értelemben vett levelek, az üreges szárak és a kis, leveleket helyettesítő ágacskák adják a növény jellegzetes megjelenését.
Tavasszal és nyáron a növény szára zöld, amely vizes, nedves helyeken bőségesen fejlődik, és különösen vonzó látványt nyújt.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Japán zsurló részben árnyékos helyet kedvel, de tolerálja a napsütötte területeket is.
Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj ideális számára. A növény jól megél a nedves talajban, és nem kedveli a szárazságot.
Öntözés: Rendszeres öntözés szükséges, különösen szárazabb időszakokban, hogy a talaj mindig nedves maradjon.
Trágyázás: Általában nincs szükség trágyázásra, de tavasszal kis mennyiségű komposzt vagy organikus műtrágya jótékony hatással lehet a növekedésére.
Téliesítés: A zsurló télálló, de érdemes a növényt gondosan visszavágni ősszel, hogy frissebb hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A Japán Zsurló ideális választás vízi kertekbe, ahol gyönyörű kontrasztot alkothat más vízkedvelő növényekkel.
Talajtakaróként is funkcionálhat, segítve a gyomok visszaszorítását.
Remekül kombinálható esőkertek, tópartok és egyéb víz közelébe ültetett növényekkel, ahol természetes és rusztikus hatást kelt.

A Japán Zsurló (Equisetum japonica) nemcsak különleges megjelenésével, hanem robosztus növekedésével és minimalizált gondozási igényeivel is vonzó választás minden kertész számára, aki szeretné élénkíteni árnyékos területeit.

Jenny törpe őszirózsa	Aster dumosus 'Jenny'	2 150 Ft	2 250 Ft

A Jenny törpe őszirózsa elbűvölő, alacsony évelő növény, amely őszi virágzásával különösen népszerű a kertekben. A növény dús, sűrű zöld levelei között a lila-rózsaszín virágok nyílnak, amelyek ősszel a legszebbek. Ideális választás virágágyásokba, sziklakertbe vagy határszegélyek díszítésére.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A törpe őszirózsa napos vagy részben árnyékos helyet kedvel. A virágzás szempontjából ideális, ha napi 6 órányi közvetlen napfényt kap.
Talaj: A jó víáteresztő, tápanyagban gazdag talaj a legelőnyösebb számára. A pH-érték 6,0-7,0 között ideális.
Öntözés: Rendszeresen öntözzük a növényt, különösen a fiatal példányok esetében, hogy elkerüljük a kiszáradást. Az idősebb növények jól bírják a rövidebb száraz időszakokat.
Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni, hogy támogassuk a virágzást.
Téliesítés: A törpe őszirózsa fagyálló, de javasolt a téli mulcsozása a gyökerek védelme érdekében.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, ahol a különböző magasságú növényekkel együtt használva színt és textúrát ad a kompozíciónak.
Szegélyezésre, hogy kerítések vagy utak mentén diszkrét színt és szépséget nyújtson.
Sziklakertben is jól mutat, ahol a levelek és virágok kontrasztot alkothatnak a kövekkel.

A törpe őszirózsa egyszerűen gondozható és gyönyörű virágzása miatt tökéletes választás minden kertészkedéshez, legyen szó kezdőkről vagy tapasztaltakról.

Johanna afrikai szerelemvirág	Agapanthus 'Johanna'	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Johanna agapantusz, más néven afrikai szerelemvirág, Dél-Afrikából származó, rendkívül dekoratív évelő növény, amely a mediterrán kertek egyik meghatározó dísze. A 'Johanna' fajta feltűnő, élénkkék virágzataival a nyár közepétől késő őszig varázsol üde színfoltot a kertbe.
Évelő, bokros növekedésű, tőlevélrózsás növény, amely kifejlett állapotban 60-90 cm magas és 40-50 cm széles. Levelei vékonyak, 40-60 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, dús, sűrű lombtömeget alkotnak. A levelek örökzöldek, bár hidegebb teleken részben visszafagyhatnak.
A növény igazi dísze a nyári virágzat. Júliustól egészen szeptemberig, a nyár közepétől késő őszig emelkednek ki a lomb közül a vaskos, 60-80 cm hosszú virágszárak, melyek csúcsán 12-18 cm átmérőjű, ernyős virágzatok nyílnak. Az ernyőket számos – akár 40-60 darab – csillag alakú, élénkkék vagy középkék színű virág alkotja. A virágok hosszan tartóak, vágott virágként is kiválóak, csokrokban akár egy hétig is eltarthatók.
Igényei és gondozása
A 'Johanna' agapantusz napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza; félárnyékban virágzása mérsékeltebb lehet. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, homokos-vályogos kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, a gumós gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak.
Hazánkban a fagyérzékenysége miatt a legbiztonságosabb konténerben, dézsában tartani, és télen fagymentes, világos helyen (5-10 °C) teleltetni. Védett, déli fekvésű, házfal melletti kertekbe azonban ki is ültethető, ilyenkor téli takarást igényel: a tövét vastagon takarjuk be lombbal, komposzttal, a leveleit pedig fenyőágakkal vagy jutával védjük.
Gondozása egyszerű. A virágzás után az elnyílt virágszárakat vágjuk vissza. A rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja, de a túlöntözéstől óvakodjunk. Tavasszal és nyár elején tápanyag-utánpótlásról gondoskodjunk kálium- és foszforban gazdag műtrágyával. 3-4 évente tavasszal tőosztással szaporíthatjuk és frissíthetjük fel.
Felhasználás a kertben
A 'Johanna' agapantusz kiválóan alkalmas konténeres, dézsás tartásra, ahol teraszok, erkélyek, bejáratok dísze lehet. Mediterrán hangulatú kertekben, déli fekvésű ágyásokban, házfalak tövében csoportosan ültetve mutat a legjobban. Vegyes évelőágyások középső sorába ültetve magasságával és színével struktúrát ad a kompozíciónak. Vágott virágnak is kiváló, elegáns csokrok alapanyaga lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos, jó vízelvezetésű talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula (Lavandula) és a zsálya (Salvia) lila virágai, amelyek színben is harmonizálnak a kék agapantusszal. Sárga virágú növényekkel, például napvirággal (Helianthemum) vagy cserjés ligetszépével (Oenothera fruticosa) élénk, kontrasztos kompozíciót hozhatunk létre. Fehér virágú évelőkkel, mint a fehér harangvirág (Campanula) vagy a gyűszűvirág (Digitalis) fehér változata, elegáns, visszafogott együttest alakíthatunk ki. Díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a kínai ezüstfű (Miscanthus), ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthet.
USDA 8a

Juharlevél	**Mukdenia rossii**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Juharlevél egy alacsony növekedésű, gyönyörű évelő, amely főként levéldisze miatt értékes. A növény maximális magassága virágzáskor kb. 20-30 cm, szélessége pedig 30-40 cm körülire tehető. Korai tavasszal (március-április) a még zöld levelek felett kinyílnak a csillagszerű, fehér vagy halványrózsaszín virágok. A fő látvány azonban a levelek színváltozása: a friss, világoszöld levelek a nyár végén és ősz folyamán fokozatosan élénk vörös és bíbor árnyalatokba borulnak, különösen napos helyen.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Részleges árnyékban vagy félárnyékos helyen

Talaj: Nedves, de jól vízáteresztő, humuszban gazdag, kissé savanyú talaj

Időzítés: Kora tavasszal vagy ősszel

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal, talajtakaróként

Használat: Elülső sorokban, árnyékos talajtakaróként, patakpartokon, erdei kertekben

Gondozási útmutató

Metszés: Nem igényel metszést, csak a száraz vagy sérült levelek eltávolítását

Télvédelem: Teljesen téli álló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: A szárazságot nem kedveli, a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk

Táplálkozás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Gyakorlatilag problémamentes, lassan terjed, de tartós

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos és félárnyékos kertek

Erdőszéli beültetések

Patak-, vagy tóparti kertek

Japán stílusú kertek

Kőkertek nedvesebb részein

Júlia borbolya (kicsi)	**Berberis julianae**	2 450 Ft	2 450 Ft
Kaliforniai vízipipacs	**Anemopsis californica**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kaliforniai vízipipacs (Anemopsis californica) – A fehér virágú, mocsári talajtakaró

A kaliforniai vízipipacs a gyíklábúfélék (Saururaceae) családjába tartozó, Észak-Amerika délnyugati részéről származó, évelő lágyszárú növény. A nemzetség monotipikus, vagyis mindössze egyetlen fajt foglal magában. Ez a növény a mocsaras, alkalikus élőhelyek egyik legkülönlegesebb dísznövénye, amely a tavaszi fehér virágzatával és az őszi piros lombozatával egész évben dekoratív.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kaliforniai vízipipacs egy alacsony, terjedő gyöktörzzsel (rizómával) rendelkező, évelő növény. Magassága 8-80 cm között alakul. A szárak csomósak, a növény indákat (stolónokat) is fejleszt, ami elősegíti a gyors, szőnyegszerű terjedést.

A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A tőlevelek nagyok, 5-60 cm hosszúak, 1-25 cm szélesek, alakjuk elliptikus vagy hosszúkás-elliptikus, a levélváll szíves vagy tompa, a levél csúcsa lekerekített. A szárlevelek kisebbek, a szár felső részén egy átellenes, szárölelő levél található, amelynek hónaljában további kisebb levelek fejlődhetnek. A levelek a növény korával és az évszakokkal együtt változnak: a növény a nyár folyamán vörös foltokat fejleszt, majd ősszel az egész növény élénkpirosra színeződik.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 1-4 cm hosszú, kúp alakú, illatos füzérvirágzat. A virágzatot 4-9 darab, nagy, fehér vagy rózsás színű, sziromszerű murvalevél veszi körül, amelyek 5-35 mm hosszúak és 5-15 mm szélesek. Ez a szerkezet a virágzatnak az őszirózsafélék családjához hasonló, egyetlen nagy virág benyomását kelti. A virágzatban 75-150 apró, fehér virág található. A virágzási időszak a kora tavasztól a nyár közepéig tart: Magyarországon jellemzően márciustól júniusig, a legbőségesebb virágzás áprilistól májusig figyelhető meg. A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény jellegzetes, egységes, kemény termést fejleszt, amely a virágzat helyén alakul ki. Ez a termés a víz segítségével terjedhet, és a benne található apró, borsszerű magvakat szórja szét. A növény magról és vegetatív úton (a gyöktörzs és az indák segítségével) egyaránt szaporítható.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kaliforniai vízipipacs napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza.

Talaj: A növény kifejezetten nedvesség- és sótűrő. A legjobban az állandóan nedves, mocsaras, alkalikus vagy sós talajban érzi magát, de sekély vízben is megél. A talaj lehet agyagos, vályogos vagy homokos, de a vízelvezetésnek jónak kell lennie a pangó víz elkerülése érdekében, bár a növény a pangó vizet is elviseli.

Öntözés: A kaliforniai vízipipacs magas vízigényű; a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani. A természetes élőhelyein (mocsarak, patakpartok) is állandóan nedves talajban fordul elő. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, bőségesen kell öntözni.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A kaliforniai vízipipacs alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzás után a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 5-10 cm-es magasságúra, hogy serkentsük az új hajtások képződését. A növény 3-4 évente történő tősztása tavasszal javasolt.

Telelés és fagytűrés: A kaliforniai vízipipacs mérsékelten télálló. A kifejlett példányok rövid ideig elviselik a -10°C-ig terjedő hőmérsékletet is, de a tartós fagyok károsíthatják. Magyarországon a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a tövét télen vastag mulccsal takarni. A nedves, hideg teleken a növény töve elfagyhat, ezért a téli takarás elengedhetetlen. Konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A kaliforniai vízipipacs a fehér virágzatának, a dekoratív, évszakonként változó lombozatának és a nedves talajokhoz való alkalmazkodóképességének köszönhetően az egyik legkedveltebb mocsári növény a kertekben és parkokban:

Vízpartokra, tavak szélébe, mesterséges vizeságyásokba – a természetes élőhelyéhez hasonló, nedves közegben ideálisan érzi magát.

Mocsaras talajú kertekbe, természetes hatású kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Talajtakarónak nedves, napos vagy félárnyékos területeken – a sűrű, szőnyegszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténerekbe, cserepekbe – kiválóan nevelhető konténerben is, ahol a talajt folyamatosan nedvesen lehet tartani. Gyógynövénykertekbe – a hagyományos gyógyászati felhasználás miatt (sebek, torokfájás, gyomorpanaszok kezelésére) különleges értéket képvisel. Változatos növénytársítások A kaliforniai vízipipacs fehér virágzata és zöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (nedves, napos-félárnyékos) növénnyel kombinálhatók: Mocsári nőszirommal (Iris pseudacorus) – a sárga virágok és a fehér virágzat kiváló kontrasztot alkotnak. Mocsári gólyaorral (Geranium palustre) – a lilás virágok harmonizálnak a yerba mansa fehér virágaival. Díszfüvekkel: Tőzegmohával (Molinia caerulea), erdei sédbúzával (Deschampsia cespitosa) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiegészíti a kaliforniai vízipipacs tömöttebb, szőnyegszerű formáját. Páfrányokkal: Hölgypáfrányokkal (Athyrium) – a páfrányok finoman szeldelt lombozata kiváló kontrasztot alkot. USDA besorolása: 7-10 (Magyarországon a kaliforniai vízipipacs mérsékelten télálló; az USDA 7-es, 8-as, 9-es és 10-es zónákban a szabadban is áttelelhet, de Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) védett, szélvédett helyen, takarással nevelhető. A téli nedvesség és a pangó víz károsíthatja, ezért a jó vízelvezetésű talaj és a téli takarás kiemelten fontos.)		
Kamcsatkai varjúháj	**Sedum kamtschticum**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Kamcsatkai varjúháj (Sedum kamtschaticum) alacsony, sűrű, bokrosodó majd szőnyegszerűen elterülő évelő. Kifejlett magassága 10–20 cm, szélessége 30–45 cm, de hajtásai révén nagyobb felületet is beboríthat. Levelei húsosak, kanál alakúak, fűrészes szélűek, élénkzöldek; ősszel gyakran narancsvörös–vöröses árnyalatot vesznek fel. Virágai aprók, csillag alakúak, élénk sárgák, laza, dús bugákban nyílnak nyár elején, június–júliusban. A virágzás vonzza a méheket és a lepkéket. A növény habitusa lapos, terjedő, talajtakaró jellegű, így szép kontrasztot ad a kertben.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; enyhe árnyékot is elvisel, de napos helyen tömörebb és gazdagabban virágzik.

Talaj: Jó vízáteresztő, száraz, homokos, kavicsos vagy szegényes talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a szárazságot kiválóan tűri, de az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is megél; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágzatot távolítsa el, hogy megőrizze a kompakt formát. A régi, elhalt szárakat kora tavasszal vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek részben elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, tetőkertbe és ágyásszegélybe illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, mediterrán, minimalista és szárazságtűrő kertekben, ahol a húsos lombozat és a sárga virágok érvényesülnek.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa, más varjúhájfajok – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a varjúháj előtt.

Fűszer- és illatos növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.			
USDA télállósági zóna: 3-8.			
Kaméleonlevél	**Houttuynia cordata 'Chameleon'**	1 750 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kaméleonlevél egy alacsony növekedésű, gyorsan terjedő évelő növény, amely 15-30 cm magasra nő. Fő értéke a színes, szív alakú levél, amely zöld, piros, sárga és krém színárnyalatok keverékében pompázik. A levelek érintésre enyhén citrusos illatot árasztanak. Június-augusztus hónapokban nyílnak a fehér, négy szirmú virágok, amelyek a levelek fölött magasodnak. A növény rizómákon és felszíni indákon terjed, gyorsan szőnyegszerű takarót alkotva.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Nedves, mocsári talajt kedveli, de átlagos kerti talajban is megfelelően nő

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal

Használat: Nedves területek talajtakarója, mocsári kertek, patakpartok, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal visszavágás szükséges a kontrolláláshoz

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Magas vízigényű, a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Inváziós hajlammal rendelkezik, terjedését korlátozni kell

Ajánlott kerttípusok

Mocsári kertek

Patak- és tópartok

Nedves árnyékos kertek

Japán stílusú kertek

Talajtakaró ültetések

Konténeres kertészet

Kaméleonlevél 6 db-os csomagban	Houttuynia cordata 'Chameleon'	9 450 Ft	13 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Kaméleonlevél egy alacsony növekedésű, gyorsan terjedő évelő növény, amely 15-30 cm magasra nő. Fő értéke a színes, szív alakú levél, amely zöld, piros, sárga és krém színárnyalatok keverékében pompázik. A levelek érintésre enyhén citrusos illatot árasztanak. Június-augusztus hónapokban nyílnak a fehér, négy szirmú virágok, amelyek a levelek fölött magasodnak. A növény rizómákon és felszíni indákon terjed, gyorsan szőnyegszerű takarót alkotva.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Nedves, mocsári talajt kedveli, de átlagos kerti talajban is megfelelően nő

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal

Használat: Nedves területek talajtakarója, mocsári kertek, patakpartok, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal visszavágás szükséges a kontrolláláshoz

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Magas vízigényű, a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Inváziós hajlammal rendelkezik, terjedését korlátozni kell

Ajánlott kerttípusok

Mocsári kertek

Patak- és tópartok

Nedves árnyékos kertek

Japán stílusú kertek

Talajtakaró ültetések

Konténeres kertészet

Kaukázusi varjúháj 'Tricolor'	**Sedum spurium 'Tricolor'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Tricolor' kaukázusi varjúháj háromszínű, tarka leveleivel önmagában jelentős díszítő értékkel bíró fajta. Új hajtásai rózsaszínűek. Rózsaszín virágai júliustól nyílnak. Szegélyekbe, sziklakertekbe ajánljuk.

A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' rendkívül dekoratív és látványos növény, amely a Kaukázus térségéből származik. Különlegessége az élénk színű levelek és a gyors növekedés. A 'Tricolor' változatot a háromszínű levelek jellemzik. A levelek élénk zöld, krémszínű és rózsaszínű csíkokból állnak, ami különleges és szemet gyönyörködtető megjelenést kölcsönöz a növénynek. A levelek vastagok és fényesek, ami tovább fokozza a dekoratív hatást.Ez a faj egy erőteljes kúszónövény, amely gyorsan nő és alkalmas lefedni kerítéseket, falakat vagy más felületeket. A rugalmas hajtások lehetővé teszik, hogy a növényt formázzák és irányítsák, így alkalmazkodik kertépítési igényekhez. A Kaukázusi varjúháj ritkán hoz rózsaszín virágokat, és ha mégis, azok nem feltűnőek ezért az értéke főként a levelekben rejlik.
Gondozási útmutató:

Fényviszonyok: A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' számára ideális a fényes, közvetlen napfényes vagy enyhén árnyékos hely. Az erős napfény színes leveleit kiemeli.

Öntözés: Mivel ez a faj eredetileg szárazabb területeken él, száraz időszakokban rendszeresen öntözze meg a növényt. Az alapvető szabály, hogy várja meg, amíg a talaj felszíne kissé kiszáradt, mielőtt újraöntözi.

Talaj: A Kaukázusi varjúháj 'Tricolor' a jó minőségű, jól vízelvezető kerti talajban fejlődik a legszebben. A talajnak enyhén savas vagy semleges pH-jú kell lennie.

Műtrágyázás: Műtrágyázza a növényt tavasszal és nyáron.

Metszés: A Kaukázusi varjúhájat könnyen formázhatja metszéssel. Az elszáradt vagy beteg hajtások eltávolítása javítja az általános megjelenést.

Téli védelem: Erősen fagyérzékeny, ezért hideg téli időszakban óvatosan takarja be avarral vagy mulccsal, hogy megvédje a téli fagyoktól.

A színes levelek és az egyszerű gondozás kombinációja teszi ezt a n

Kék arizóna-ciprus (kicsi)	**Cupressus arizonica 'Glauca'**	2 950 Ft	2 950 Ft
Kék arizóna-ciprus (közepes)	**Cupressus arizonica 'Glauca'**	11 500 Ft	11 500 Ft
Kék arizóna-ciprus (nagy)	**Cupressus arizonica 'Glauca'**	14 900 Ft	14 900 Ft
Kék deres csenkesz	**Festuca glauca 'Blaue Auslese'**	2 450 Ft	184 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Festuca glauca 'Blaue Auslese' egy elegáns díszfű, amely gyönyörű, világos kék leveleivel és terjedő formájával díszíti a kerteket. Ez a díszfű 30-40 cm magasságra nő, és kompakt, sűrű növekedése miatt ideális választás a modern kertekbe. Az ezüstkék lombozat szép kontrasztot alkot a zöld és más színes növényekkel, ezzel fokozva a táj szépségét.
A nyári hónapokban a 'Blaue Auslese' aranyló sárga virágokat bontogat, amelyek még szebbé teszik a növényt. Az árnyalatok és a növény formája együtt varázslatos látványt nyújtanak, miközben vonzzák a méheket és más beporzó rovarokat.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Festuca glauca 'Blaue Auslese' napfénykedvelő növény, amelynek legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége a legszebb színének megőrzésére.
Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy kavicsos talaj ideális számára. A növény jól bírja a szárazabb környezetet is, és az egyenletes pH (6,0-7,0) a legkedvezőbb.
Öntözés: A 'Blaue Auslese' szárazságtűrő, de a fiatal növények esetében rendszeres öntözés javasolt, különösen az ültetés utáni időszakban.
Trágyázás: Általában nem igényel trágyázást, de tavasszal kis mennyiségű alacsony nitrogéntartalmú műtrágya használata segíthet a növekedés erősítésében.
Téliesítés: Fagyálló, de a téli hónapok előtt érdemes a leveleket összekötni, hogy megvédjük a növényt a hó nyomásától.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmas sziklakertbe, ahol szép kontrasztot alkothat a kövekkel és más dísznövényekkel.
Talajtakaróként is funkcionálhat, segítve a gyomnövények eltakarását, miközben dekoratív díszt ad a kertnek.
Érdemes szegélyezéshez is használni, különösen modern kertekben és tájképekben, ahol az elegáns megjelenés nélkülözhetetlen.

A Festuca glauca 'Blaue Auslese' szépsége és könnyű gondozhatósága miatt ideális választás minden kertész számára, aki szeretné feldobni a kertjét!

Kék léggömbvirág	**Platycodon grandiflorus 'Coda Blue'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fedezze fel Kék Léggömbvirág - Platycodon grandiflorus 'Coda Blue' varázsát! Tömör növekedésű, gazdagon virágzó évelő, mely tökéletes választás kőkertekbe és virágágyásokba. Egész nyáron díszít! Konténeres, jól begyökeresedett példányaink egész évben ültethetők. Főbb jellemzők Virágok: Élénk kék színű, 5 cm átmérőjű harang alakú virágok Levelek: Sötétzöld, lándzsás alakú levelek Növekedés: Tömör, felálló habitus, nem dől el Télállóság: -30°C-ig ellenálló (3-9. tűrési zóna) Gondozási útmutató Növény igényei: Fény: Teljes nap vagy félárnyék (napi 4-6 óra napfény) Talaj: Jól átázó, humuszban gazdag talaj (pH 5.5-7.0) Öntözés: Közepes vízigényű – a talajt egyenletesen nedvesen tartsuk Metszés: Virágzás után visszavágás új hajtás ösztönzésére Ültetési tanácsok: Társítás: Fehér virágú évelőkkel (pl. Gypsophila) vagy sárga sziklakerti évelőkkel Használat: Sziklakert, évelőágyás, konténerkompozíció Ültetés: 25-30 cm távolságra Kiemelt előnyök Hosszú virágzás – akár 3 hónapig díszít Rovar- és betegségálló – kevés karbantartást igényel Télálló – téli védelem nélkül is túlél Ez a Platycodon 'Coda Blue' kiváló választás azoknak, akik hosszan virágzó, könnyen gondozható növényt keresnek kertjükbe. Rendeljen most, és élvezze nyáron a csodás kék virágokat!			
Kék virágú szerelemvirág	**Agapanthus 'Blue'**	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kék virágú afrikai szerelemvirág, Dél-Afrikából származó, rendkívül dekoratív évelő növény, amely a mediterrán kertek egyik meghatározó dísze. Az Agapanthus nemzetség egyik legnépszerűbb képviselője, feltűnő, élénkkék virágzataival a nyár közepétől késő őszig varázsol üde színfoltot a kertbe.
Évelő, bokros növekedésű, tőlevélrózsás növény, amely kifejlett állapotban 50-80 cm magas és 40-50 cm széles. Levelei vékonyak, 30-60 cm hosszúak, sötétzöldek, fényesek, dús, sűrű lombtömeget alkotnak. A levelek örökzöldek, bár hidegebb teleken részben visszafagyhatnak.
A növény igazi dísze a nyári virágzat. Júliustól egészen szeptemberig, a nyár közepétől késő őszig emelkednek ki a lomb közül a vaskos, 50-70 cm hosszú virágszárak, melyek csúcsán 10-15 cm átmérőjű, ernyős virágzatok nyílnak. Az ernyőket számos - akár 30-50 darab - csillag alakú, középkék vagy sötétkék színű virág alkotja. A virágok hosszan tartóak, vágott virágként is kiválóak, csokrokban akár egy hétig is eltarthatók.
Igényei és gondozása
A Kék virágú agapantusz napos, meleg, szélvédett fekvést igényel. A legbőségesebb virágzást teljes napsütésben hozza; félárnyékban virágzása mérsékeltebb lehet. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, homokos-vályogos kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, a gumós gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak.
Hazánkban a fagyérzékenysége miatt a legbiztonságosabb konténerben, dézsában tartani, és télen fagymentes, világos helyen (5-10 °C) teleltetni. Védett, déli fekvésű, házfal melletti kertekbe azonban ki is ültethető, ilyenkor téli takarást igényel: a tövét vastagon takarjuk be lombbal, komposzttal, a leveleit pedig fenyőágakkal vagy jutával védjük.
Gondozása egyszerű. A virágzás után az elnyílt virágszárakat vágjuk vissza. A rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja, de a túlöntözéstől óvakodjunk. Tavasszal és nyár elején tápanyag-utánpótlásról gondoskodjunk kálium- és foszforban gazdag műtrágyával. 3-4 évente tavasszal tőosztással szaporíthatjuk és frissíthetjük fel.
Felhasználás a kertben
A Kék virágú agapantusz kiválóan alkalmas konténeres, dézsás tartásra, ahol teraszok, erkélyek, bejáratok dísze lehet. Mediterrán hangulatú kertekben, déli fekvésű ágyásokban, házfalak tövében csoportosan ültetve mutat a legjobban. Vegyes évelőágyások középső sorába ültetve magasságával és színével struktúrát ad a kompozíciónak. Vágott virágnak is kiváló, elegáns csokrok alapanyaga lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, napos, jó vízelvezetésű talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a levendula (Lavandula) és a zsálya (Salvia) lila virágai, amelyek színben is harmonizálnak a kék agapantusszal. Sárga virágú növényekkel, például napvirággal (Helianthemum) vagy cserjés ligetszépével (Oenothera fruticosa) élénk, kontrasztos kompozíciót hozhatunk létre. Fehér virágú évelőkkel, mint a fehér harangvirág (Campanula) vagy a gyűszűvirág (Digitalis) fehér változata, elegáns, visszafogott együttest alakíthatunk ki. Díszfüvekkel, mint a tollborzfű (Pennisetum) vagy a kínai ezüstfű (Miscanthus), ültetve izgalmas textúrabeli kontrasztot teremthetünk.
USDA 8a

Kékperje 'Black Arrows'	Molinia caerulea 'Black Arrows'	2 250 Ft	2 250 Ft

A Kékperje 'Black Arrows' lenyűgöző díszfű, amely a kertekben és tájképekben elegáns és drámai hatást kelt. Egyediséget és szépséget visz a környezetébe, mivel sötétbarna-vöröses árnyalatú lombozata és magas, fürtös virágai megkapó kontrasztot alkotnak. A 'Black Arrows' díszfű kifejezetten hosszú és karcsú növekedésű, akár 120 cm magasra is megnőhet. Széles szalmasárga lombozatával és vékony száraival elbűvöli a szemlélőt. A nyári hónapokban hozza virágait, amikor a szárok végén hosszú, kalászos virágzatok jelennek meg, melyek szépen lengedeznek a szellőben, varázslatos látványt nyújtva. Ez a díszfű rendkívül időjárásálló és ellenálló, így alkalmazkodik a különböző talaj- és klímaviszonyokhoz. Kiválóan fejlődik a napos vagy félárnyékos helyeken, és tolerálja az enyhén savas vagy semleges talajokat. Egyébként könnyen gondozható növény, és minimális figyelmet igényel, hogy egészséges és vonzó maradjon. A 'Black Arrows' díszfűvet ültethetjük szoliterként, vagy kiválóan mutat a gyep vagy a többi évelő között, amelyekkel ellensúlyozza a színvilágban valóban kiemelkedő megjelenését. Emellett tájképekbe és városi kertekbe is szépen illeszkedik. Bármelyik kert vagy táj egyedülállóbbá és érdekesebbé válik a Molinia caerulea 'Black Arrows' jelenlétében. Ez a díszfű valódi szépséget és eleganciát kölcsönöz környezetének, miközben könnyen gondozható és éveken át élvezhető. Ha egy igazán különleges növényt keres, amely kitűnik a tömegből, akkor a 'Black Arrows' díszfű tökéletes választás lehet.

Keleti hunyor	Helleborus orientalis	4 950 Ft	5 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Keleti hunyor egy tömör, bokros növekedésű örökzöld évelő, amely 30-45 cm magasra és 30-60 cm szélesre nő. Levelei tenyeresen összetettek, sötétzöldek, bőrszerűek és fényesek, amelyek télen is a növényen maradnak. Virágai február és április között nyílnak, színeik a fehértől a rózsaszínen át a sötétbíborig változnak, gyakran pettyes vagy foltos mintázattal. A virágok 5-7 cm átmérőjűek, serleg alakúak, és enyhe illatuk van.
Gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos helyeket kedvel, de napos helyen is megfelelően fejlődik

Talajigény: Jól vízelvezető, humuszban gazdag, semleges vagy enyhén lúgos talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól tűri a szárazságot

Metszés: Tavasszal a régi levelek eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -25°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komposzttal vagy speciális hunyor trágyával

Ültetési javaslat

Árnyékos kertek aljnövényzeteként

Fásítás alatti beültetésre

Előkertek és árnyékos virágágyásokba

Társítás: Hostákkal, páfrányokkal, tavaszi hagymás növényekkel

Konténeres nevelésre is alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Árnyékos kertek

Erdei kertek

Hagyományos kertek

Parkok és nagyobb kertek

Lakókertek

Keleti nőszirom	Iris orientalis	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A keleti nőszirom (Iris orientalis) a mediterrán térségben honos, Törökországból, Görögország környékéről származik. Jellemzően 100 cm fölötti virágszárakon hozza kedves üde virágait a késő tavaszi, nyár eleji időszakban. A levelei is karcsúak, kardszerűen fellálók, ezért levirágzás után is érdekes, figyelme magáravonó növény. Gyöktörzses, télen visszahúzódik, de pár éven belül masszív fészket alkot, így minden évben egyre gazdagabb virágdísszel lepi meg a tuladonosát.
Fontos azonban, hogy a jó fejlődéshez tápanyagra, és vízre van szüksége. Napos fekvést kedvel, szabad állásban, jó vízáteresztő talajon szépen fejlődik. Bolyagtást, vagy az átültetést nem szereti, ezért igyekezzünk rögtön a végleges helyére telepíteni. A téli időszakban érdemes lombbal takarni. Ugyan nem fagyérzékeny, de a télen is védő takarás alatt kedvező körülmények vannak, és tápanyag is bemosódik a tő környékén, így korábban hajt ki, és gazdagabban is virágzik.

Keleti tollborzfű	**Pennisetum orientalis**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A keleti tollborzfű egy kompakt, sűrűn csomós növekedésű évelő fű. Levelei keskenyek, zöldek vagy szürkészöldek, és ívesen hajlanak vissza, ami a növénynek egy lágy, szökőkút-szerű megjelenést kölcsönö.
Legfőbb díszét a késő tavasztól őszig megjelenő virágzatok képezik. Ezek lágy, tollas szerkezetű, világosbarna-rózsszaszín árnyalatú "üvegmosó kefe" alakú kalászok. A virágzatok a lombozat felett lebegve romantikus, természetes hatást keltenek a kertben. A növény magassága általában 50-70 centiméter között van, hasonló szélességgel.

Gondozási útmutató

A keleti tollborzfű egy igénytelen és könnyen nevelhető növény.

Fényigény: A napos helyeket részesíti előnyben, de félárnyékos helyen is jól fejlődik

. Minél több napot kap, annál bővebben fog virágozni.

Talajigény: A jól vízelvezető, laza talaj az ideális számára

. A pangó vizet egyáltalán nem tűri. Meglehetősen igénytelen a talaj minőségét illetően, és miután jól meggyökeresedett, jól tűrővé válik a szárazsággal szemben.

Metszés: A tavasz elején, a fagyok elmúlta után, de az új hajtások megjelenése előtt kell visszametszeni. Vágja vissza a növényt kb. 5-10 cm magasságra

. Ősszel ne vágja vissza, mert a száraz lomb védi a tövet a téli hideg és nedvesség ellen.

Télállóság és védelem: Jó télállóságú, akár -23 °C-ot (-10 °F) is kibír

. Az első telek után érdemes a lombozatot lazán összekötözni, hogy megvédje a tövet a téli csapadéktól és így elkerülje a korai tavaszi rothadást

Általános gondozás: Évente nem szükséges, de néhány évente osztható, ha a tő közepén kihalt foltok jelennek meg. Ilyenkor tavasszal a tövet feláshatja, és éles ásóval több részre oszthatja

Ültetési javaslat

A keleti tollborzfű rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Szoliter növényként: Egyedi, gömbölyded formája miatt kiváló kiemelő növényként ültethető egy gyepben vagy egy nagyobb kő mellett

Szegély- és sövényültetés: Alacsony termete és sűrű növekedése miatt tökéletes alacsony sövényként vagy ösvényszegélyként

Társítás: Kiválóan harmonizál más szárazságtűrő évelőkkel és díszfüvekkel, például rozmaringnal, levendulával vagy más fűfélékkel

Konténeres nevelés: Edénybe, lábasba ültetve is nagyon dekoratív, így terasz és erkély díszítésére is ideális

Ajánlott kerttípusok

A keleti tollborzfű jól illeszkedik az alábbi kerttípusokba:

Mediterrán és szárazságtűrő kertek

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Sziklakertek			
Modern kertek			
Természetes hangulatú, réti kertek			
Kelpak	**Ecklonia alga emelt auxinnal (gyökeresedés +virágzás segítésére)**	7 450 Ft	7 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kelpak - Ecklonia maxima alga kivonat a tökéletes gyökeresedésért és virágzásért
A Kelpak egy prémium minőségű, 100%-ban organikus tengeri alga készítmény, amelyet a dél-afrikai partoknál termesztett Ecklonia maxima algából nyernek ki. Ez az algafajta egyedülállóan magas koncentrációban tartalmaz auxin jellegű növényi hormonokat, amelyek elsősorban a gyökeresedést és a virágzást támogatják. A Kelpak segítségével növényei erősebb gyökérzettel rendelkeznek, bőségesebben virágoznak, és jobban ellenállnak a környezeti stresszhatásoknak.
Mi teszi egyedülállóvá a Kelpak-ot?
A Danuba két kiváló alga terméket kínál, amelyek eltérő növekedési fázisokban fejtik ki a legjobb hatásukat. Míg az Asco Alga az intenzív növekedési időszakban ideális, addig a Kelpak auxin túlsúlyos összetételének köszönhetően a következőkre specializálódott:

Gyökeresedés serkentése: Elősegíti a magok csírázását és a nagyobb gyökértömeg kialakulását, ami megalapozza a növény későbbi egészséges fejlődését.

Virágzás támogatása: Fokozza a virágpollen csírázását és a pollentömlők növekedését, ami javítja a megtermékenyülést és a terméskötődést.

Stressztűrés fokozása: A benne található betain és egyéb bioaktív anyagok segítenek a növénynek átvészelni a kedvezőtlen körülményeket, például a tavaszi fagyokat, aszályt vagy hőstresszt.

Hogyan működik az auxin?
Az auxin volt az első felfedezett növényi hormon, amely alapvető szerepet játszik a növényi növekedés és fejlődés irányításában. A Kelpak-ban található auxin hatású molekulák (szénhidrátok, aminosavak, lipidek, florotanninok, brasszinoszteroidok) a növény sejtjeihez érve aktiválják a kromoszómákban található, eddig szunnyadó géneket, beindítva ezzel a gyökér- és virágfejlődés folyamatait.
A Kelpak főbb előnyei:

Gyökérfejlesztés: Ideális palántázáskor, dugványozáskor és átültetéskor a gyorsabb és erőteljesebb gyökeresedésért.

Virágzás és terméskötődés: Javítja a virágok minőségét és a megtermékenyülés hatékonyságát.

Általános növényerősítés: Növeli a növények ellenálló képességét a biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szemben.

Több mint 100 bioaktív anyag: A Kelpak közel 100 féle biológiailag aktív összetevőt tartalmaz, amelyek komplex módon támogatják a növény anyagcseréjét.

Kijuttatás és dózis:

Gyökérkezelés (beöntözés): 1%-os oldatban használja, azaz 10 liter vízhez adjon 1 dl Kelpak-ot.

Lombkezelés (permetezés): 1-2%-os oldatban használja, azaz 10 liter vízhez adjon 1-2 dl Kelpak-ot, és permetezze a zöld lombfelületre.

Kijuttatási időszak: A legeredményesebb hatás érdekében a vetés/palántázás időszakában, valamint a virágzást megelőzően érdemes alkalmazni 1-2 alkalommal.

Miért a Kelpak-ot válassza?

Tiszta, adalékmentes formula: A Kelpak nem tartalmaz felesleges töltőanyagokat vagy szintetikus adalékokat, így biztos lehet a maximális hatóanyag-tartalomban.

Fenntartható forrásból: A gyár saját, szennyezésmentes óceáni algafarmokkal rendelkezik, ahol búvárok szelektíven, csak az érett algákat szüretelik.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Hazai engedélyek: A termék rendelkezik a magyarországi forgalmazáshoz szükséges regisztrációkkal és bio tanúsítványokkal.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 5-30°C között legalább 36 hónapig megőrzi minőségét. Felbontás után szorosan lezárva, hűtve tárolva 6 hónapon belül használja fel.
Kiszerelések: 1 L, 10 L

Kénsárga tündérvirág	**Epimedium 'Sulphureum'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kénsárga tündérvirág egy alacsony növekedésű, tömör habitusú évelő növény, amely 20-30 cm magasra nő. Fő értéke a kénsárga színű, csillag alakú virágok, amelyek hosszú, vékony szárakon nyílnak. A virágok április-május hónapokban nyílnak, és csüngő, kelyhes formájúak. A szív alakú, fényes levelek tavasszan vörösesbarnák, nyáron élénkzöldre válnak, ősszel pedig bronz árnyalatúak lesznek. A növény rizómákon terjed, lassan de biztosan szőnyegszerű takarót alkotva.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Árnyékos vagy félárnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag, kissé savanyú talaj

Távolság: 25-35 cm-es távolsággal

Használat: Talajtakaró árnyékos helyeken, erdei kertek, fák alatti beültetések, peremültetések

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágjuk vissza a tavalyi leveleket

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot jól tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Erdei kertek

Árnyékos kertek

Japán stílusú kertek

Fásított terülek aljának beültetése

Örökzöld aláültetések

Parkok és nagyobb árnyékos terülek

Kereklevelű harangvirág	Campanula rotundifolia	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kereklevelű harangvirág a hazai flóra egyik legbájosabb, mégis rendkívül dekoratív tagja, amely a vadvirágos kertek megkerülhetetlen ékessége. Alacsony, bokrosodó termetű évelő növény, amely kifejlett állapotban 20-40 cm magasra nő meg, és tövénél akár 30-40 cm széles bokrot is képezhet. Különleges tulajdonsága, hogy kétféle levélformával rendelkezik: tavasszal először a kerekded, szív alakú, fogazott szélű tőlevelei jelennek meg, melyek a virágzás idejére fokozatosan visszaszorulnak. Ezt követően a vékony, hajlékony szárakon megjelennek a keskeny, lándzsás szárlevelek. A nyár folyamán, júniustól egészen szeptemberig nyíló, lefelé bókoló, harang formájú virágok a szárak csúcsán laza fürtökben helyezkednek el, lágy ibolyáskék színükkel és kecses megjelenésükkel a természetesség érzetét keltik.
Igényei és gondozása
A növény rendkívül alkalmazkodóképes és hálás, kevés gondozást igényel. A napos vagy félárnyékos fekvést kedveli, de a tűző naptól is óvjuk, mert a forróságban virágzata hamarabb elnyílik. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kerti talajt részesíti előnyben. A pangó vizet nem tűri, ezért ültetéskor gondoskodjunk megfelelő vízelvezetésről, különösen kötöttebb talajok esetén. Szárazságtűrése jó, de a hosszan tartó aszályos időszakokban érdemes mérsékelten öntözni. Gondozása abból áll, hogy az elnyílt virágzatokat rendszeresen eltávolítva serkenthetjük az újabb bimbók képződését, és meghosszabbíthatjuk a virágzási időt. A nyár végi, ősz eleji visszavágással sűrűbb, bokrosabb növekedésre, illetve egy másodlagos, őszi virágzásra is ösztönözhetjük.
Felhasználás a kertben
Kecses megjelenésével könnyedén illeszkedik a legkülönbözőbb kertstílusokba, de leginkább a természetes hatású, vadvirágos kertekben, prériiültetésekben, sziklakertekben és rézsűkön mutat igazán jól. Alacsony termete miatt kiválóan alkalmas évelőágyások előterébe, szegélynövényként, de kőrakások között vagy támfalakból leomló dísze is lehet. Ültethetjük dézsába és más konténerekbe is, ahol balkonok, teraszok dísze lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor érdemes más, hasonló igényű, természetes megjelenésű növényekkel kombinálni. Kiváló társ lehet számára a kék vagy fehér árnyalatú pázsitviolák, a szárazságtűrő díszfüvek, mint a keskenylevelű csenkesz vagy az árvalányhaj. Sziklakertekben szépen mutat a varjúhájfélék és a kövirózsák társaságában. Alacsony, párnás kakukkfüvekkel ültetve illatos, szőnyegszerű kompozíciót hozhatunk létre. Más harangvirágfélékkel alkotott csoportban pedig változatos magasságú és formájú, egész nyáron át virágzó együttest kapunk.

Kerti kakukkfű	**Thymus vulgaris**	1 450 Ft	1 950 Ft

Alacsony 10-15 cm magas felálló szárú, fásodó tövű örökzöld félcserje. Virágai fehér – rózsaszínűek, melyek nyáron virágoznak. Kifejezetten napos sziklakertek növénye. Vegyes virágágyakba szegélyként telepíthetjük. Javasolható flórakosaras támfalakba, mert alacsonyan elágazik, és terül, ezért jól takarja a betonfelületeket. Mediterrán kertek kikerülhetetlen növénye. Vidéki tájképi kertekben is ügyesen alkalmazható ágyásszegélyekbe, vagy akár lépőkövek környezetébe. Erősen aromás növény, leveleinek illóolaj tartalma élénkítő hatású, gasztronómiában sültekhez, salátákhoz, de likőrök ízesítéséhez is használják.

6-9 USDA zóna

Képek forrása: Pinterest

Keskenylevelű sásbokor	**Sisyrinchium bermudiana**	1 950 Ft	1 950 Ft

Rizómás, lágyszárú évelő, az Iris közeli rokona. Örökzöld. Közepesen gyors növekedésű, 15-30 cm magas. Levelei keskenyek, hegyesek, sötétzöldek, kis széthajló csomót képeznek, melynek átmérője 30 cm. Teljesen téléálló. Dekoratív liláskék, kék virágai gyorsan elnyílnak, csak napsütésben virítanak, az időjárástól függően áprilistól június, augusztusig. Kedveli az üde, nedves, tápdús, semleges kémhatású, de tűri a meszes talajt. Gondozást nem igényel, kártevője, betegsége nincs.
A Keskenylevelű sásbokor szereti a napos vagy félárnyékos elhelyezést. A Keskenylevelű sásbokor ideális a kerti szegélyek, sziklakertek vagy tópartok díszítésére. Jól kombinálható más alacsony termetű évelőkkel és sziklakertekkel. A déli vagy délnyugati tájolású területeken szép virágzatot hoz létre.

Kínai jegenyeboróka (nagy)	**Juniperus chinensis 'Keteleeri'**	14 500 Ft	14 500 Ft
Kínai kenderpálma (kisebb)	**Trachycarpus fortunei**	3 950 Ft	3 950 Ft
Kínai magyal (közepes)	**Ilex pernyi**	6 590 Ft	6 590 Ft
Kínai magyal (nagy)	**Ilex pernyi**	9 900 Ft	9 900 Ft
Kínai szarvas magyal (nagyobb)	**Ilex cornuta**	9 900 Ft	9 900 Ft
Kínai tollbuga	**Astilbe chinensis**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A kínai tollbuga Kelet-Ázsiából (Kína, Japán) származó évelő növény. Ez a tollbuga faj kitűnik a többiek közül, mivel később (nyár közepétől-végéig) virágzik, jobban tűri a szárazságot, és a rizómái erőteljesebben terjednek. Kiváló választás azokba a kertrészekbe, ahol a talaj nem túl nedves, de a nyári virágzású, mutatós évelőkre vágyunk.
Külső megjelenés
A kínai tollbuga erőteljes, rizómás évelő, amely lazább, de a többi fajnál terjedőképesebb telepeket képez. Kifejlett magassága a fajtától függően 30-120 cm (a klasszikus fajta magassága 60-120 cm), szélessége 30-60 cm között alakul. A növény töve elfásodott, a rizómák vastagok, kúszók.
A levelek sötétzöldek, fényesek, összetettek, kétszeresen vagy háromszorosan szárnyaltak, 5-9 cm hosszú levélkékkel. A levélkék tojásdadok, a levél széle fűrészes, a levélnyél gyakran vöröses árnyalatú. A lombozat egész szezonban díszít.
A növény legnagyobb dísze a virágzat. A virágok aprók, de hatalmas számban, 10-35 cm hosszú, sűrű, felálló vagy enyhén bókoló bugavirágzatokba (tollas füzérekbe) tömörülnek. A virágzat a növény csúcsán, a lombozat fölé magasodva nyílik. A virágok színe fajtától függően változik: a típusfajé lila vagy rózsaszín, de a nemesített fajták között megtalálható a piros, a fehér és a világos rózsaszín árnyalatokban is. A kínai tollbuga jellemzője, hogy a virágzata általában felálló, a sziromlevelek (fellevelek) színe intenzívebb, mint a többi Astilbe fajé. A virágok illatosak, vonzzák a méheket és pillangókat.

Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Félárnyékos vagy napos (hűvösebb éghajlaton) helyet kedvel. A többi tollbuga fajnál jobban tűri a napot, de a tűző, déli napsütésben a levelei megéghetnek, ha a talaj nem elég nedves.

Talaj: Mély rétegű, tápanyagban gazdag, humuszos, jó vízáteresztő, de nyirkos (soha ki nem száradó) talajt igényel. A legtöbb tollbugával ellentétben a kínai tollbuga a rövidebb szárazságot is tolerálja, de a legszebb lombozatot nyirkos talajban hozza. A pH tekintetében nem válogatós (5,5-7,5).

Öntözés: Közepes vízigényű. A legtöbb tollbuga fajnál szárazságtűrőbb, de a hosszan tartó, tartós aszályt nem kedveli. A legszebb példányok a rendszeres, mélyreható öntözést kapják.

Tápanyag-utánpótlás: Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén érdemes komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatni a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést. Az elvirágzott, elszáradt szárakat késő ősszel vagy kora tavasszal a talaj szintjén lehet visszavágni.

Terjedés: A kínai tollbuga rizómái erőteljesen, a többi fajnál agresszívebben terjednek. Kiváló talajtakaró nagyobb felületekre, de kisebb kertekben érdemes a terjedését gyökérgáttal korlátozni.

Osztás, szaporítás: A növényt 3-4 évente tavasszal (vagy ősszel) érdemes rizómaosztással szaporítani, hogy megőrizze vitalitását.

Telelés: Kimondottan télálló, a növény akár -29°C-ig ellenáll a hidegnek. A föld feletti része ősszel elfagy, de a rizóma mélyen a talajban áttelel, és tavasszal újrahajt. Külön védelmet nem igényel.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló, de a pangó vizes talajban a gyökérrothadás előfordulhat. Ritkán a lisztharmat vagy a varasodás megjelenhet rajta, a meztelen csigák a fiatal hajtásokat károsíthatják.

Felhasználás a kertben
A kínai tollbuga a méretének, színének és viszonylagos szárazságtűrésének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Talajtakaróként – erőteljesen terjedő rizómái miatt kiváló nagyobb felületek beborítására

Szegélyágyásokba, évelőágyások középső sorába

Erdős, természetes hatású kertekbe, erdőszegélybe

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Árnyékágyásokba – ahol a napfény hiánya miatt más növények nem érzik jól magukat Vízparti (patak, tó) kertekbe, nyirkos talajú ágyásokba Tömeges csoportos ültetésre – a virágok egységes színfoltot alkotnak Vágott virágnak, szárított csokrokba – a virágzatok hosszú ideig frissek maradnak a vázában Változatos növénytársítások A kínai tollbuga lila, rózsaszín, piros vagy fehér virágai és sötétzöld lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló igényű növényekkel: Páfrányokkal – a páfrányok finom, szeldelt levelei tökéletesen kiegészítik a tollbuga tömeges lombozatát Árnyékliliomokkal (Hosta) – a különböző színű és méretű Hosta fajták a tollbuga alatti talajtakaróként szolgálhatnak Tüdőfűvel (Pulmonaria) – tarka levelű, kora tavaszi virágzása színt visz a kompozícióba Tűzesővel (Heuchera) – a tarka levelű Heuchera fajták textúrájával és színével kiegészítik a tollbugát Rododendronokkal, havasszépekkel- a tollbuga lombhullató növényként a savanyú talajt kedvelő, örökzöld cserjék társaságában is jól érzi magát Díszfüvekkel – a laza, mozgó habitusú fűfélék oldják a tollbuga tömöttebb formáját Tavaszi hagymásokkal (krókuszok, nárciszok) – a hagymások a tollbuga lombfakadása előtt, kora tavasszal még elegendő fényhez jutnak a tövében Lila virágú évelőkkel (pl. macskamenta, levendula) – ha a talaj nem túl nedves, más lila virágok is társíthatók hozzá USDA besorolása: 4-8 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is biztonságosan nevelhető).			
Kirigami Rose&Pink harangvirág	**Aquilegia caerulea 'Kirigami Rose&Pink'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Kirigami Rose&Pink harangvirág (Aquilegia caerulea 'Kirigami Rose&Pink') a Kirigami-sorozat tagja, amelyet a Syngenta nemesített a kompakt méret, a rövid nevelési idő és a minimális hideghatás-igény érdekében. Felálló, bokros tövet képez, amelynek hajtásai merevek, és nem igényelnek támasztékot. Kifejlett magassága 36–61 cm, szélessége 30–51 cm között alakul; a tövek a tövüknél sűrű, tömött lombozatot alkotnak, a virágzatok pedig a lombozat fölé emelkednek. Levelei finoman szeldeltek, kékeszöldek, és a lombozat a virágzás után is dekoratív marad.
A virágzat a szárak végén nyílik; a virágok feltűnően nagyok, felfelé nézők, rózsaszín és pink kétszínű színűek, és a sorozat virágai a hagyományos harangvirágokénál nagyobbak. Virágzása kora tavasztól késő tavaszig tart, és a virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek, lepkékenek és a kolibriknek. A növény minden része mérgező, ezért fogyasztásra nem alkalmas, és a kisgyermekektől, háziállatoktól érdemes távol tartani.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, humuszos talajt kedvel; a pangó vizet rosszul tűri, de a szárazabb időszakokat is átvészeli.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a rendszeres öntözést meghálálja, különösen virágzás idején, de a kifejlett növény a rövidebb szárazságot is elviseli.

Télállóság: Az USDA 4–9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbíthatja a virágzást. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza. A töveket 2–3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat és a levélfoltosság ritkán jelentkezhet. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, sziklakertbe, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, erdei kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és dézsába is kiváló választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Alacsony évelők: varjúháj, gólyaorr, szegfű, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a harangvirág tömör habitusát.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a harangvirág virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4–9.

Kis-ázsiai macskahere	**Phlomis russeliana**	2 250 Ft	2 250 Ft

A Kis-ázsiai Macskahere egy különleges megjelenésű évelő, melyet sárga, ajakos virágairól és örökzöld tőleveleiről ismernek. 70-120 cm magasra nő, és 50-80 cm szélesre terjed. Virágzási ideje júniustól augusztusig tart, de száraz virágzata egész télen díszít.
A Kis-ázsiai macskahere egy varázslatos évelő növény, amely egyedülálló szépséggel rendelkezik. Ez a növény rendkívül népszerű a kertészetekben és a kertbarátok körében, mivel különleges megjelenése mellett igen könnyen nevelhető. A Phlomis russeliana természetes élőhelyei a Földközi-tenger vidékén találhatók, de széles körben termeszthető más klímazónákban is. Ez a növény többéves, lombozatának jellegzetességei közé tartozik a vastag, szőrös levelekkel rendelkező szürke-zöld szín. A levélzet közepén hosszúkás virágzatok találhatók, amelyek gyűszű alakúak és a szürke levéltől különleges kontrasztot kölcsönöznek a növénynek. A Phlomis russeliana virágai nyáron nyílnak, és rendkívül lenyűgöző látványt nyújtanak a kertben. Sárga, ajakos virágai tömött, álörvökben nyílnak. A virágzatok hosszan kitartanak, és vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat, amelyek élettel töltik meg a kertet. Ez a növény jól alkalmazkodik különböző talaj- és fényviszonyokhoz. Legjobban naponos vagy részben árnyékos helyeken fejlődik, a talajtól pedig inkább jó vízelvezetésűt preferálja. A Kis-ázsiai macskahere szárazságtűrő és egyszerűen kezelhető, így ideális választás lehet olyan kertekbe, amelyek kevés gondozást igényelnek. Ez a növény csodálatosan mutat sziklakertekben, mediterrán stílusú kertekben vagy a szegélyekben, valamint csoportosítva vagy konténerben nevelt növényként is. A Phlomis russeliana a többi évelővel vagy virágos növénnyel kombinálva is kiválóan mutat, és változatos textúrájával és színeivel kiemelkedik a környezetéből.

Kisvirágú gyűszűvirág	**Digitalis parviflora**	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Kisvirágú gyűszűvirág (Digitalis parviflora) karcsú, felálló, bokros habitusú, tőlevélrózsás évelő. Kifejlett magassága általában 50–70 cm, szélessége 30–45 cm között alakul; a virágzati szárakkal együtt elérheti a 60–90 cm-t is. Levelei lándzsásak, középzöldek, enyhén szőrözöttek, a növény tövén rózsát alkotnak, a száron pedig ritkábban helyezkednek el. Virágai aprók, tölcsér alakúak, rozsdabarna-bronzos színűek, sötétebb erezettel, és tömött, hengeres fürtökben nyílnak a merev szárak végén. Virágzása május végétől júliusig tart, és a virágok vonzzák a méheket, poszméheket. A növény a virágzás után gyakran magot érlel, és könnyen önvetődik, így hosszú távon fenntarthatja magát a kertben.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; a reggeli napfényt kedveli, de a forró délutáni napsütéstől védett helyen szebben fejlődik.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, közepesen nedves, friss talajt kedvel. A pangó vizet és a tartósan száraz, kopár talajt egyaránt kerülni kell.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a rendszeres, mérsékelt öntözést igényli, különösen az első évben és száraz időszakokban. A talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, védett helyre, jó vízáteresztő, komposzttal dúsított talajba. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a talaj felszínének enyhe nedvesen tartása ideális; kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy megakadályozza a magszórást, vagy hagyja meg a magfejeket, ha önvetődést szeretne. A régi lombozatot kora tavasszal távolítsa el.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A rövid életű évelő hajlamos kipusztulni néhány év után, ezért érdemes hagyni, hogy magról újuljon.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló, de a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák kisebb kárt okozhatnak. Fontos: a növény mérgező, ezért kisgyermekektől és háziállatoktól érdemes távol tartani.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább woodland (erdei) stílusú kertekbe, cottage- és informális kertekbe, természetközeli ágyásokba, sziklakertbe és vadvirágos rétekre illik. Kiváló vágott virág, és függőleges akcentust ad a kompozíciónak. Jól mutat félárnyékos, nyirkosabb zugokban, ahol a rozsdabarna virágok meleg színfoltot hoznak a zöld lombozat közé.
Növénytársítások

Árnyéktűrő évelők: hosta, páfrányok, kankalin, tüdőfű – hasonló igényűek, és kiegészítik a gyűszűvirág finom textúráját.

Fűfélék: sásfajok, csenkesz – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Hagymások: krókusz, gyöngyike, nárcisz – korai színfoltot hoznak a gyűszűvirág virágzása előtt.			
Virágzó évelők: harangvirág, kúpvirág, zsálya – nyáron gazdagítják a kertet.			
Cserjék: törpe rododendron, azálea, hortenzia – savanyú talajon szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4–8.			
Kokárdavirág	**Gaillardia aristata**	1 950 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Gaillardia aristata, vagyis a kokárdavirág Észak-Amerika sziklás, füves pusztáiról származik, ahol vadon is megtalálható. Ez a rendkívül mutatós és hálás évelő növény gyorsan meghódította a világ kertjeit, köszönhetően hihetetlenül hosszú virágzási idejének, élénk színeinek és igénytelenségének. Júniustól egészen októberig ontja tűzpiros és aranysárga színekben pompázó virágait, amelyek valódi kokárdára emlékeztetnek .
Külső megjelenés és kifejlett méret: A kokárdavirág habitusa bokros, felálló szárú, tövétől sűrűn növő évelő. Levelei lándzsásak, szürkészöldek, enyhén molyhos tapintásúak, ami segít a növénynek a szárazság elviselésében. Júniustól októberig nyíló virágai a növény legfőbb díszei: fészekvirágzatok, amelyek átmérője elérheti az 5-8 cm-t is . A szirmok (sugaras virágok) általában kétszínűek, a vörös, narancs és sárga meleg árnyalataiban játszanak, gyakran a középen lévő sötétebb (bordó vagy bíbor) színű középponttól a szirmok csúcsán lévő aranysárga szegély felé halványodva . A virágokat szívesen látogatják a méhek és a pillangók.

Magasság: A virágzó szárak magassága fajtától függően 40-80 cm között változik. Léteznek alacsonyabb, 30 cm körüli (pl. 'Kobold'), és magasabb, akár 80 cm-es fajták is (pl. 'Burgunder', 'Bremen', 'Fackelschein').

Szélesség: Terjedése 30-40 cm körül alakul, szépen bokrosodó töveket alkot .

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos, meleg fekvésben érzi magát a legjobban, a bőséges virágzáshoz legalább napi 6-8 óra közvetlen napfényre van szüksége. Árnyékban gyéren virágzik .

Talaj: Jó vízelvezetésű, laza, homokos vagy kavicsos talajt kedvel. Szinte bármilyen kerti talajban megél, de a pangó vizet, a túl kötött, agyagos talajt nem tolerálja!. A semleges vagy enyhén savas pH ideális számára.

Öntözés: Ültetés után és fiatalon rendszeres öntözést igényel a begyökeresedésig. Idősebb korában kiváló szárazságtűrő, csak hosszan tartó aszály idején érdemes locsolni .

Télállóság (USDA-zóna): A növény rendkívül télálló, USDA 3-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Magyarország teljes területén megbízhatóan áttelel. Ősz végén, a virágzás után érdemes visszavágni a talajszintig, és takarni egy kevés lombbal vagy komposzttal .

Metszés és gondozás:

Elnyílt virágok eltávolítása: Az elnyílt virágfejeket érdemes rendszeresen eltávolítani, mert ezzel folyamatosan új virágok képződésére ösztönözzük a növényt, és meghosszabbíthatjuk a virágzási időszakot .

Visszavágás: Ha a virágzás alábbhagy, a növényt felére visszavágva új, dús virágzásra serkenthetjük .

Tavaszi tisztítás: Kora tavasszal vágjuk vissza az elszáradt vagy sérült leveleket.

Tápanyagutánpótlás: Különösebb tápanyagutánpótlást nem igényel, sőt, a túltrágyázás a virágzás rovására mehet. Kora tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú oldódású műtrágya kijuttatása serkentheti a növekedést .

Ellenállóság: Általában betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló . A túlöntözés gyökérrothadást okozhat.

Szaporítás: Magvetéssel (tavasszal) vagy tőosztással (tavasszal vagy ősszel) szaporítható .

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Kertstílus és növénytársítások:
Alacsony, bokros habitusa, hosszan tartó virágzása és élénk színei miatt sokféleképpen felhasználható:

Évelőágyások, virágágyások: Meleg színeivel vidám hangulatot teremt a vegyes ágyásokban.

Sziklakert: Alacsonyabb fajtái kiválóak sziklakertbe, ahol a kövek között, száraz, meleg környezetben pompázhatnak.

Szegélynövény: Ágyások, utak szegélyezésére alacsony, virágzó szegélyként ideális.

Természetközeli, rovarbarát kertek: Élénk színeivel vonzza a méheket és pillangókat.

Vágott virág: Vágott virágként is kiválóan alkalmas, mert vázában is sokáig eláll.

Konténeres növény: Teraszon, erkélyen cserépben is tartható.

Ajánlott növénytársítások:

Kék vagy lila virágú évelők: A piros-sárga virágok lenyűgözően kiemelkednek a kék-lila színű növények közül. Társítsuk levendulával (Lavandula) , macskamentával (Nepeta) , zsályával (Salvia) , harangvirággal (Campanula) vagy menyecskeszemmel (Coreopsis).

Díszfüvek: A könnyed, mozgó díszfüvek, mint a tollborzfű (Pennisetum alopecuroides), a kék csenkesz (Festuca glauca) vagy az árvalányhaj (Stipa) , szépen kiegészítik a kokárdavirág strukturális habitusát.

Sárga virágú évelők: A meleg színek harmóniáját erősíthetjük más sárga virágú évelőkkel, például kasvirággal (Rudbeckia), cickafarkkal (Achillea) vagy napfényvirággal (Helenium).

Fehér virágúak: A tüzes színek mellett a fehér virágok üde kontrasztot alkotnak, például fehér cickafarkkal (Achillea millefolium) vagy fehér kúpvirággal (Echinacea purpurea).

Ezüstös lombozatú növények: A szürkészöld lombozatú növényekkel, mint a gyapjas tisztesfű (Stachys byzantina) vagy az ezüstös varjúháj (Artemisia), izgalmas textúrájú és színű társítást hozhatunk létre.

Koloncos legyezőfű	**Filipendula vulgaris**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris) évelő, amely 30–60 cm magasra és 30–45 cm szélesre nő. Levelei tövüknél nagyok, szárnyasan szeldeltek, páfrányra emlékeztető textúrájúak, élénkzöldek, és ősszel sárgásbarnára színeződnek. A szárak vékonyak, felállók, a virágzat laza, dús fürtökben nyílik. A virágok aprók, krémes-fehérek vagy halvány rózsaszínűek, nyár elején (június–július) nyílnak, és kellemes, édes illatot árasztanak. A növény gyöktörzse koloncos, gumószerű megvastagodásokat visel, innen kapta magyar nevét. Virágzás után a magfejek is dekoratívak maradnak.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább szárazabb, meszes vagy semleges talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; a szárazságot jól tűri, de az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültethető napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő.

Metszés: Az elvirágzott virágzatot távolítsa el, hogy a növény ne magozzon el, és megőrizze kompakt formáját. A lombozatot kora tavasszal vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg, de a lisztharmatra érzékeny lehet. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább vadvirágos rétekbe, természetközeli kertekbe, préri stílusú kompozíciókba és évelőágyakba illik. Kiváló szárazságtűrő, napos fekvésű helyekre, de félárnyékban is megél. Jól mutat sziklakertben, kavicskertben és erdei kertekben is. Finom textúrájú lombozata miatt szép kontrasztot ad a nagyobb levelű évelőkkel.
Növénytársítások

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.

Évelők: kúpvirág, naprózsa, zsálya, levendula, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a legyezőfű előtt.

Őszi virágzók: őszirózsa, krizantém – meghosszabbítják a szezont.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szárazságtűrő társak: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa – hasonló talaj- és fényigényűek.

USDA télállósági zóna: 3-8.

Korai lonc	**Lonicera x purpusii**	2 950 Ft	2 950 Ft

A Lonicera standishii (Lándzsás lonc) és a Lonicera frangrantissima (Illatos lonc) közötti hibrid. Bőrszerű, sötétzöld leveleit enyhébb teleken nem hullajtja le, mert a mérsékelt övben félörökzöldként viselkedik. Tél végén, tavasz elején nyílnak nagyon szép fehér virágai. Kiválóan alkalmas, falak, pergolák befuttatására.

6a-9b USDA-zóna

Közönséges izsóp	**Hyssopus officinalis**	2 250 Ft	2 250 Ft

A Közönséges izsóp sziklakertekben, gyógynövényes ágyásokban vagy konténerbe ültetve is díszít. Teája felhasználható légúti problémák enyhítésére, emésztés serkentésére vagy nyugtató hatású. Friss vagy szárított levelei húsételek, saláták, levesek ízesítésére, valamint likőrök (pl. abszint) készítéséhez. Ápolás:

Metszés: Tavasszal visszavágás az egészséges növekedés érdekében.

Betegségek: Ritkán érinti a kártevők, de a lisztharmat elkerülésérez jó légáramlás fontos.

Termékjellemzők:

Magasság: 40-60 cm

Terjedés: 30-50 cm

Virágzás: Júniustól szeptemberig

Fénygény: Teljes nap

Talaj: Szegényes, jó vízelvezetésű, kötött-homokos

Télállóság: -34°C-ig (USDA 4-9)

Felhasználás: Gyógynövény, fűszer, mézelő növény, dísznövény

Állatbarát: Méhek, lepkék kedvelik

Kristályvirág, délvirág	**Delosperma cooperi**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A kristályvirág (Delosperma cooperi) Dél-Afrikából származó, alacsony, sűrű, szőnyegszerűen elterülő, örökzöld pozsgás évelő. Kifejlett magassága mindössze 10 cm, szélessége 0,5–1 méter között alakul; a tövek a talaj felszínén sűrű, összefüggő telepet alkotnak, amely alkalmas talajtakarásra és lejtők, töltések megkötésére is. Levelei hengerek, világoszöldek, húsosak, legfeljebb 5 cm hosszúak, és felületükön apró, csillogó képletek találhatók, amelyekről a növény a „kristályvirág” nevet kapta.
A virágzat a hajtások végén nyílik; a virágok margarétaszerűek, fényes bíborrózsaszín-mély rózsaszínűek, átmérőjük elérheti az 5 cm-t. Virágzása nyár közepétől késő nyárig tart, és a virágok csak napos időben nyílnak ki teljesen. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; árnyékban a virágok zárva maradnak, és a növény habitusa megnyúlik.

Talaj: Jó vízáteresztő, homokos vagy köves, sovány talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Mérsékelt; a fajtától és a termőhelytől függően –15 °C és –25 °C közötti fagyokat visel el, de a téli pangó víz a fő kockázati tényező.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. A növények közötti távolság 20–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Ősszel csökkentse az öntözést, hogy a növény felkészüljön a téli nyugalmi időszakra.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő.

Metszés: Metszésre nincs szükség; az elnyílt virágzatokat távolítsa el, és kora tavasszal a télen elhalt vagy sérült részeket vágja vissza.

Átteleltetés: A hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás (lomb, fenyőág) javasolt a nedvesség és a kifagyás ellen. Konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és betegségmentes; üvegházban a levéltetvek és a pajzstetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, rézsűre, zöldtetőre, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, szőnyegszerű habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás; konténerben a „spiller-thriller-filler” kombinációkban spiller (lecsüngő) szerepet tölt be.
Növénytársítások

Pozsgások: varjúháj (Sedum), kövirózsa (Sempervivum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű (Thymus), levendula (Lavandula), zsálya (Salvia) – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: csenkesz (Festuca), árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kristályvirág tömör habitusát.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Egyéb évelők: kúszó phlox (Phlox), naprózsa (Aurinia) – hasonló igényűek, és kiegészítik a kompozíciót.			
USDA télállósági zóna: 5-11 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).			
Kúszó fátyolvirág	**Gypsophila repens**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Kúszó fátyolvirág (Gypsophila repens) alacsony, talajon elterülő vagy sziklákon átbukó évelő. Kifejlett magassága 10–15 cm, szélessége 30–50 cm, így sűrű, finom textúrájú párnát képez. Levelei keskenyek, lándzsásak, szürkészöldek, aprók. Virágai nagyon kicsik, csillag alakúak, fehér vagy halvány rózsaszín árnyalatúak, laza, dús bugákban nyílnak nyár elején. Virágzás után a növény visszafogott, de lombozata őszig dekoratív marad. Gyökérzete sekélyen helyezkedik el, ezért jól alkalmazkodik sziklás, száraz élőhelyekhez.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; enyhe délutáni árnyékot is elvisel.

Talaj: Jó vízáteresztő, meszes, kavicsos vagy homokos talajt kedvel. A nehéz, agyagos és pangó vizes talajokat nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a szárazságot jól tűri, de az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elvirágzott virágzatot távolítsa el, hogy a növény ne magozzon el, és megőrizze kompakt formáját. A hosszú, elterülő hajtásokat tavasszal rövidítheti.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek részben elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, alpesi jellegű kompozíciókba és száraz falra illik. Kiváló ágyásszegélybe, évelőágyás előterébe, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, szárazságtűrő, minimalista és mediterrán hatású kertekben.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűszer- és illatos növények: levendula, izsóp, zsálya.			
Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.			
USDA télállósági zóna: 3-9.			
Lacerta kövirózsa	**Sempervivum 'Lacerta'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Lacerta kövirózsa (Sempervivum 'Lacerta') a kövirózsák egyik legmegbízhatóbb, színes lombozatú hibrid fajtája, amelyet a kerti körülményekhez való ellenálló képessége és igénytelensége miatt szerte a világon termesztenek. Sűrű, szabályos, tömött rozettákat képez, amelyek zöld alapon bordó-vöröses árnyalatúak; a levélvégek bordós színe napos helyen és hűvösebb időben mélyül a leginkább. Levelei húsosak, vastagok, a rozetták pedig szorosan egymáshoz simulnak. Kifejlett magassága 5–10 cm, szélessége 20–30 cm között alakul; a rozetták átmérője egyes források szerint elérheti a 6–12 cm-t is. A növény bőségesen hozza a sarjakat, amelyekkel könnyen szaporítható, és rövid idő alatt sűrű, összefüggő telepet alkot.
A virágzat a rozetta közepéből kiemelkedő száron nyílik; a virágok rózsaszínűek, csillag alakúak, és június és augusztus között nyílnak. A virágzati szárak magassága elérheti a 20–30 cm-t. A virágzás után a virágzó rozetta elhal, de a tövénél új sarjak fejlődnek, így a telep folyamatosan megújul.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a legintenzívebb bordós lombszínt és a legtömörebb rozettaformát napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár köves, homokos vagy sovány talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 3–9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta –23 °C és –29 °C közötti fagyokat is elvisel, a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 15–25 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést. Öntözéskor lehetőleg csak a talajt nedvesítse, a lombozatot ne.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a tömör rozettaforma rovására.

Metszés: Metszésre nincs szükség; az elnyílt virágzatokat távolítsa el, hogy a rozetta ne fordítsa minden erejét magképzésre. Kora tavasszal a télen elhalt, elszáradt rozettákat távolítsa el a telep tisztítása érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. A levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, zöldtetőre, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, valamint konténeres és teraszkerti ültetésekbe illik. Sekély cserépben, alpesi tálban is kiválóan mutat, és a bordós-zöld rozetták kontrasztos színfoltot adnak a többi kövirózsa és pozsgás között.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa-fajták, varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kövirózsa tömör rozettáit.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kövirózsa virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 3–9.

Lancaster Imperial bazsarózsa	**Paeonia lactiflora 'Lancaster Imperial'**	5 450 Ft	6 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Lancaster Imperial bazsarózsa egy erős növekedésű, felálló habitusú évelő növény, amely 80-100 cm magasra nő. Fő értéke a nagy, többszörösen teljes, fehér virág, amelynek finomráncolt szirmai vannak. A virágok május-június hónapokban nyílnak, átmérőjük elérheti a 15-18 cm-t is. A sötétzöld, dús levelek tökéletes hátteret képeznek a pompás virágoknak. A virágok kellemes illatúak és kiválóak vágott virágként, hosszú élettartamuk miatt.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon vagy enyhén árnyas helyen

Talaj: Mély, jó vízáteresztő, humuszban gazdag, tápanyagokban gazdag talaj

Távolság: 80-100 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliterként, évelőágyásokban, vágott virágként, bazsarózsagyűjteményekben

Gondozási útmutató

Metszés: Virágzás után elvirágzott részek eltávolítása, ősszel a szárak visszavágása földszintre

Télvédelem: Teljesen télálló, fejlett növények különösebb védelem nélkül

Öntözés: Mély gyökérzetével szárazságtűrő, de virágzás előtt és alatt öntözzük

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal és lassú hatású műtrágyával

Általános: A rügyek max. 3-5 cm mélyre ültetendők, ne mélyebbre

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Évelőágyások

Vágott virág kertje

Formális kertek

Rózsakert kísérő növénye

Nagyméretű konténerek

Lándzsalevelű árnyékliliom	**Hosta lancifolia**	2 450 Ft	2 650 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Lándzsalevelű árnyékliliom, más néven Lándzsás hosta vagy Keskenylevelű hosta, Japánban őshonos, rendkívül dekoratív évelő növény. A hosták egyik legigénytelenebb és legalkalmazkodóképesebb fajtája, amelyet látványos lombozata és kellemes illatú virágai miatt szívesen ültetnek árnyékos kertekbe. Közepes termetű, bokros növekedésű, évelő, lágyszárú növény, amely kifejlett állapotban 30-45 cm magas és 50-80 cm széles, dús, sűrű, gyorsan terjedő bokrot alkot. A növény lassan terjeszkedik, idővel nagyobb, összefüggő telepeket hoz létre. Gyökérzete rövid, húsos, a talaj felszíne alatt fut.
Levelei a növény fő díszei. A levelek lándzsásak, keskenyek, 10-20 cm hosszúak, 3-6 cm szélesek, a levél csúcsa hegyes, a levélalap kerekded vagy szíves. A levéllemez élénkzöld, fényes, a levél széle hullámos, néha enyhén fodros. A levélnyél vörösesbarna, ami a zöld lombozattal szép kontrasztot alkot. A levelek a talajt sűrűn borítják, hatékonyan elnyomva a gyomokat.
A növény második dísze a nyári virágzat. Július-augusztus folyamán a lombtömeg fölé magasodó, 30-60 cm-es vékony, vörösesbarna színű virágszárak emelkednek. A szárak csúcsán laza, egyoldalú fürtös virágzatok nyílnak, melyeket 10-20 darab, 2-3 cm hosszú, tölcsér alakú, lila vagy ibolyaszínű virág alkot. A virágok kellemes, édeskés illatúak, a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.
Igényei és gondozása
A Lándzsás árnyékliliom árnyékos vagy félárnyékos fekvést igényel. A legszebb, legdúsabb lombozatot szűrt fényben, fák vagy cserjék alatt, északi fekvésű ágyásokban hozza. A tűző napon a levelek könnyen megéghetnek, elveszítik élénk színüket. Talaj tekintetében a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag, humuszos, laza szerkezetű, üde kerti talajt kedveli. A pangó vizet nem tűri, de a rövid ideig tartó szárazságot is elviseli. A rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja.
Gondozása rendkívül egyszerű, igénytelen. Metszést nem igényel, csupán az elszáradt, elhalt leveleket kell tavasszal vagy ősszel eltávolítani. A virágzás után az elnyílt virágszárakat visszavághatjuk, ha nem akarjuk, hogy a növény magot érleljen. Tápanyag-utánpótlásról tavasszal komposzttal vagy érett szerves trágyával gondoskodjunk. 3-4 évente tavasszal tőosztással szaporíthatjuk és frissíthetjük fel. Télállósága kiváló, akár -30 °C-ig is ellenáll, így hazánkban gond nélkül teleltethető. Csigák és meztelen csigák kedvelhetik, ellenük védekezni érdemes.
Felhasználás a kertben
A Lándzsás árnyékliliom rendkívül sokoldalúan felhasználható a kert árnyékos részein. Kiválóan alkalmas talajtakarónak fák alá, cserjék tövébe, ahol sűrű lombozatával hatékonyan elnyomja a gyomokat, miközben egész évben díszít. Szegélynövényként is mutatós árnyékos utak, teraszok, virágágyások mentén. Vegyes évelőágyásokban, árnyéki ágyásokban, tópartokon csoportosan ültetve mutat a legjobban. Konténerbe, balkonládába ültetve a teraszok, erkélyek dísze lehet.
Növénytársítási ötletek
Társításakor hasonló igényű, árnyékos vagy félárnyékos helyet kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a páfrányok, amelyek eltérő lombszerkezetükkel izgalmas textúrabeli kontrasztot teremtenek. Hunyorral (Helleborus) és tüdőfűvel (Pulmonaria) ültetve a téli és kora tavaszi hónapokban is van díszítőértéke az ágyásnak. Gyöngyvirággal (Convallaria) és szívvirággal (Dicentra) társítva romantikus, erdei hangulatú kompozíciót hozhatunk létre. Árnyéki díszfüvekkel, például a Carex fajokkal kombinálva változatos textúrájú, egész évben dekoratív felületeket alakíthatunk ki. A lándzsás levelek szépen mutatnak nagyobb levelű hosták, például kék levelű fajták társaságában is.
A hosták rendkívül népszerűek a mai kertekben, mivel sokoldalúan használhatóak. Finom színeik, magas virágaik és széles, mutatós leveleik olyan rést töltenek be a kerttervezésben, amelyet kevés más növény képes elérni. Nagy leveleik kiváló fedést biztosítanak a tavasszal visszahúzódó hagymás növények helyén. Jól tűrik a szárazságot és fejlődnek városi környezetben is, ahol a levegőt szennyezhetik az autók kipufogógázai például.
Tekintse meg teljes Árnyas kertek - növény kínálatunkat.

Lápi nyúlfarkfű	**Sesleria caerulea**	1 950 Ft	1 950 Ft

A Lápi nyúlfarkfű (Sesleria caerulea) alacsony termetű, szürkészöld lombú, csomókban növő fű. Hazánkan honos, védett faj! A lápos területek uralkodó faja, mészkedvelő növény. A növény 20-40 cm magasra nő meg, lassan terjedő talajtakaró. Lombja a színen kékes árnyalatú, a fonákán sötétzöld. Száraz viszonyok között a levél kanalasodik, ettől érdekes, kétszínű megjelenésű lesz. Korán hozza virágfejeit, melyek sokáig díszítenek. Nedves vagy üde, napos vagy félárnyékos területre, meszes talajba ültessük.

Leading Lady Orchid méhbalzsam	**Monarda 'Leading Lady Orchid'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Leading Lady Orchid méhbalzsam (Monarda 'Leading Lady Orchid') a Monarda didyma és a Monarda bradburiana keresztezéséből származó, kompakt, sűrű, bokros tövet képező évelő. Kifejlett magassága a lombozattal 25–35 cm, virágzáskor a virágzatokkal együtt eléri a 35–36 cm-t; szélessége 55–70 cm között alakul, így a tövek széles, alacsony, félgömb alakú párnát formáznak. Levelei sötétzöldek, enyhén fényesek, illatosak, és a fajta lombozata a lisztharmattal szemben feltűnően ellenálló. Virágzata gömbölyded, tömött fészekvirágzat, amely a hajtások végén, murvalevelek örvében nyílik. A virágok orchidea rózsaszínűek (magenta-rózsaszín), a nyitott szirmokon apró, élénk fukszia színű pettyek láthatók, a virágzatot pedig sötét rózsaszín murvalevelek övezik. A virágzás kora nyáron (júniusban) kezdődik, és több héten át tart; a fajta a tipikus Monarda didyma fajtáknál mintegy két héttel korábban virágzik. A virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, lepkékenek és kolibriknek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, humuszos, nyirkos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a talajt folyamatosan enyhén nyirkosan kell tartani, de a túlöntözést kerülni kell. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Az USDA 4-9. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 55–70 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a talaj folyamatos enyhe nedvesen tartása ideális; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, hogy serkentse az új, egészséges hajtások fejlődését. A töveket 3 évente érdemes megosztani.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: A lombozat lisztharmattal szemben ellenálló, de a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság tovább csökkenti a gombás betegségek kockázatát. Az őzek és a nyulak általában elkerülik.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, pollinátorkertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a tömött, orchidea rózsaszín virágzatok és a rendezett habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a méhbalzsam tömör virágzatát.			
Évelők: kasvirág, lángszínű liatris, sédbúza, varjúháj – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a méhbalzsam virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4-9.			
Leading Lady Plum méhbalzsam	**Monarda 'Leading Lady Plum'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Leading Lady Plum méhbalzsam (Monarda 'Leading Lady Plum') a Monarda didyma és a Monarda bradburiana keresztezéséből származó, kompakt, sűrű, bokros tövet képező évelő. Kifejlett magassága a lombozattal 25–36 cm, virágzáskor a virágzatokkal együtt eléri a 36 cm-t; szélessége 56–71 cm között alakul. A tövek széles, alacsony, félgömb alakú párnát formáznak, amelyek az ágyás előterében rendezett, tömör megjelenést biztosítanak. Levelei sötétzöldek, enyhén fényesek, illatosak, és a fajta lombozata a lisztharmattal szemben feltűnően ellenálló.
A virágzat gömbölyded, tömött fészekvirágzat, amelyet sötétlila-feketés murvalevelek öveznek. A fészekvirágzatot nyelves virágok (a látványos „szirmok”) és csöves virágok (a központi, tűszerű rész) alkotják; a nyelves virágok magenta-lila („szilva”) színűek, a nyitott szirmokon apró, sötétlila pettyek láthatók, a csöves virágok pedig a fészek közepén tömörülnek. A virágzatok a szárak végén, dús csoportokban nyílnak, és a fajta a hagyományos Monarda didyma fajtáknál korábban, kora nyáron kezd virágozni, majd egy második virágzási hullám emelkedik a korábbi virágok fölé, így a szín a nyár közepéig kitart. A virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, lepkékenek és kolibriknek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, humuszos, nyirkos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a talajt folyamatosan enyhén nyirkosan kell tartani, de a túlöntözést kerülni kell. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Az USDA 4–8. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 56–71 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a talaj folyamatos enyhe nedvesen tartása ideális; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a lombozat felülről történő öntözését, mert ez elősegíti a gombás betegségek kialakulását.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, hogy serkentse az új, egészséges hajtások fejlődését. A töveket 3 évente érdemes megosztani. Késő ősszel, a téli nyugalmi időszak előtt a növényt tövig vissza lehet vágni.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: A lombozat lisztharmattal szemben jó ellenálló képességet mutat, de a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság tovább csökkenti a gombás betegségek kockázatát. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, természetközeli és erdei kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a tömött, magenta-lila

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
virágzatok és a rendezett habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben. Növénytársítások Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a méhbalzsam tömör virágzatát. Évelők: kasvirág (Coneflower), pillangófű (Butterfly Weed), lángszínű liatris, sédbúza, varjúháj – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót. Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a méhbalzsam virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 4–8.			
Leading Lady Razzberry méhbalzsam	**Monarda 'Leading Lady Razzberry'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Leading Lady Razzberry méhbalzsam (Monarda 'Leading Lady Razzberry') a Monarda didyma és a Monarda bradburiana keresztezéséből származó, kompakt, sűrű, bokros tövet képező évelő, amely nem futó tövű, így rendezett marad a kertben. Kifejlett magassága a lombozattal 25–36 cm, virágzáskor a virágzatokkal együtt eléri a 36 cm-t; szélessége 56–71 cm között alakul, így a tövek széles, alacsony, félgömb alakú párnát formáznak. Levelei sötétzöldek, enyhe bíbor árnyalattal, illatosak, és a fajta lombozata a lisztharmattal szemben feltűnően ellenálló. Virágzata gömbölyded, tömött fészekvirágzat, amely a hajtások végén, sötét murvalevelek örvében nyílik. A virágok élénk málnarózsaszín–málnapiros („fluorescent raspberry pink”) színűek, és a virágzatok a szárak végén, dús csoportokban nyílnak. A virágzás kora nyáron (a első virágok a nyár elején nyílnak) kezdődik, és több héten át tart; a fajta a tipikus Monarda didyma fajtáknál korábban virágzik. A virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, lepkékenek és kolibriknek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, humuszos, nyirkos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a talajt folyamatosan enyhén nyirkosan kell tartani, de a túlöntözést kerülni kell. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Az USDA 4–8. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 56–71 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a talaj folyamatos enyhe nedvesen tartása ideális; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, hogy serkentse az új, egészséges hajtások fejlődését. A töveket 3 évente érdemes megosztani.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: A lombozat lisztharmattal szemben ellenálló, de a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság tovább csökkenti a gombás betegségek kockázatát. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak előterébe, szegélyekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, pollinátorkertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és városi kertekbe is kiváló választás, ahol a tömött, málnarózsaszín virágzatok és a rendezett habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a méhbalzsam tömör virágzatát.

Évelők: kasvirág, lángszínű liatris, sédbúza, varjúháj – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a méhbalzsam virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4–8.

Legendary Mix csillagfürt	**Lupinus × hybrida 'Legendary Mix'**	3 550 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Legendary Mix csillagfürt (Lupinus × hybrida 'Legendary Mix') a pillangósvirágúak családjába tartozó, erőteljes, sűrű, bokros tövet képező, lombhullató évelő. Kifejlett magassága a fajtától és a termőhelytől függően 50–100 cm között alakul, szélessége mintegy 50 cm; a tövek rendezett, tömör csomót képeznek, és nem válnak túl terjedőssé. Levelei tenyérszerűen összetettek, hosszúkás levélkékből állnak, kékeszöld-szürkészöld színűek, és már a virágzás előtt is dekoratív textúrát adnak a kertnek. Virágzata felálló, karcsú fürt (füzér), amely a hajtások csúcsán nyílik; a virágok pillangósak, a kék, ibolya, vörös, sárga és fehér árnyalatok széles skálájában játszanak, és a fürtök hosszukkal és tömöttségükkel messziről feltűnőek. Virágzása tavasztól kora nyárig (május–július) tart; az elnyílt virágok visszavágásával másodvirágzásra is ösztönözhető. A virágok vonzzák a méheket, poszméheket és lepkéket, a virágfüzérek pedig kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyékos fekvés az ideális; a napos helyen hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, enyhén savas-semleges kémhatású (pH 6,0–7,5) talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Enyhén savas vagy semleges kémhatáson érzi jól magát.

Vízigény: Közepes; frissen ültetve rendszeres öntözést igényel a gyökérzet megerősödéséhez, később a mérsékelt szárazságot is jól tűri. A túlöntözés és a pangó víz gyökérrothadást okozhat.

Télállóság: Teljesen fagytűrő, a mérsékelt éghajlatú kertekben megbízhatóan áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágfüzéreket a szár tövénél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást, vagy másodvirágzást serkentsen. A régi, elhalt szárakat kora tavasszal vágja vissza a talajszint közelében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. Csapadékos, enyhe teleken a téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmatra, a levélfoltosságra és a levéltetvekre, valamint a csigákra lehet érzékeny. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyba, cottage- és vidéki kertekbe, természetközeli és vadvirágos kompozíciókba, pollinátorkertekbe, valamint konténeres és teraszkerti ültetésekbe illik. Kiváló függőleges akcentusként működik a kertben, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad. Kiváló vágott virág, és a méhek, valamint lepkék számára értékes nektárforrás.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Cottage-kerti évelők: gólyaorr, harangláb, kasvirág, margaréta – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.			
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a csillagfürt tömör virágfüzéreit.			
Illatos és fűszeres növények: zsálya, kakukkfű, levendula – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Korán virágzó hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a csillagfürt virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4–8.			
Lemon Light őszi zsálya	**Salvia greggii 'Lemon Light'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Lemon Light őszi zsálya (Salvia greggii 'Lemon Light', más néven Salvia × jamensis 'Lemon Light') a Salvia greggii fajból származó, kompakt, sűrű, bokros habitusú, örökzöld félcserje. Kifejlett magassága és szélessége a termőhelytől és a metszéstől függően 40–80 cm között alakul; a tövek a tövüknél elfásodnak, a hajtások vékonyak, sűrűn elágazók, így a növény rendezett, gömbölyded formát mutat. Levelei aprók, lekerekítettek, enyhén csipkés szélűek, fényes zöldek, és megdörzsölve jellegzetes, kellemesen gyümölcsös-fűszeres illatot árasztanak. Virágzata örvökben álló, fürtös virágzat, amely a hajtások felső részén nyílik. A virágok ajakosak, halvány citromsárga-krémsárga színűek, és a fajtára jellemző, hogy a felső ajak csúcsán nincs vöröses-lila elszíneződés, ami a hasonló fajtáktól megkülönbözteti. A virágzás tavasz végétől (május végétől) egészen a fagyokig (októberig-novemberig) tart, és a fajta a hőség legforróbb heteiben is képes virágozni; aszályos időszakokban a virágzás átmenetileg leállhat, de eső vagy öntözés után újraindul. A virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, lepkékenek és más beporzóknak, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes, tűző napfény az ideális; a meleg, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást. Félárnyékban a hajtások megnyúlnak, felkopaszodnak, és a virágzás elmarad.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, sovány, homokos, meszes vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Az USDA 7–11. zónában megbízhatóan áttelel; rövid fagyokat –8 °C és –12 °C között is elvisel, de a hosszan tartó, csapadékos hideg teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt. Hazánkban a 6–7. zónában védett fekvésben és fiatal korban takarással tartható hosszú távon.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Mivel félcserje, a hajtásai alul fásodnak. Kora tavasszal (a fagyok elmúltával) a bokrot erőteljesen, a talaj felett kb. 10–15 cm-re vágja vissza; ez dús, kompakt megújulást és rengeteg új virághajtást eredményez. Nyár közepén, ha a virágzás alábbhagy, a hajtásvégek enyhe visszavágásával újabb őszi virágzási hullám serkenthető. Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy lombtakarás segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a csigák, a levéltetvek, a kabócák és a rozmaringbogár kisebb kárt okozhatnak. Ritkán lisztharmat, verticilliumos hervadás és gyökérrothadás jelentkezhet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, mediterrán és kavicskertbe, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe is kiváló választás, ahol a halvány citromsárga virágok és a hosszú virágzás

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő világos színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Illatos és fűszeres növények: levendula, rozmaring, kakukkfű – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Zsályák: ligeti zsálya (kék, lila fajták) – a halvány citromsárga virágokhoz a kék és lila szín kontrasztot ad.

Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a zsálya tömör habitusát.

Rózsák: a zsálya függőleges virágzata szép kontrasztot ad a rózsák mellett, és jól elrejti a rózsák alsó, kopaszabb részeit.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 7-11 (egyes források a 6-10. zónát adják meg; hazánkban a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

Lidakense japán varjúháj	**Sedum cauticola 'Lidakense'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Kékesszürke lombozatú, hosszabb, 20 cm körüli szárakat fejlesztő, kevésbé ismert varjúháj fajta. Levelei húsosak, korong alakúak. Kora ősszel virágzik lehajló fürtökkel. Emiatt érdemes szárazon rakott sziklakerti falakba, flórakosarakba ültetni. Különleges dolog, ezért különlegesen is viselkedik, hiszen a varjúhájakra kevésbé jellemző módon a talaj fölötti részeit télre elveszíti, tehát nem örökzöld.

Fényigény - napos
Talajigény - jó vízáteresztő laza talaj
Vízigény - szárazságtűrő
Fagytűrés - nincs szükség fagyvédelemre

Társítás – más varjúhájak, kövirózsák, molyhos madárhúr, nyuszifül, deres csenkeszek, sziklai ternyék stb.

Limelight bugás hortenzia (kicsi)	**Hydrangea paniculata 'Limelight'**	3 450 Ft	3 450 Ft
Limelight széleslevelű ezüstfa (nagy)	**Elaeagnus x ebbingei 'Limelight'**	14 500 Ft	14 500 Ft
Little Bunny tollborzfű	**Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A tollborzfüvek kedvelt díszfüvek. A Little Bunny fajta egy kifejezetten apró termetű növény mely 30-40 cm-re nő meg, ugyanakkor hozza a tollborzfüvek többi előnyét. Finom gracilis levelek, és villogó fehér virágzat jellemzi. Alkalmazhatjuk sziklakertekben, növénykazettákban vegyes virágágyak alacsonyabb részein, tetőkertekben, kaspókban... Jól társítható levendulával, rozmaringgal, és más merevebb szerkezetű évelőkkel, amelyek összeültetve kiegyensúlyozott látványt kapunk. 4-5 évente érdemes felszedni, és a tövet szétválasztani, különben hajlamos elöregedni, és egyre kevesebb virágot hozni. Gondozási útmutató:

Ültetés: Válasszunk napos vagy félárnyékos helyet a kertben.

Talaj: Az ideális talaj jól lecsapolt, laza talaj, amely lehetővé teszi a víz gyors lefolyását. Ha a talaj túl sűrű, keverjünk hozzá homokot vagy komposztot a talaj javítása érdekében.

Öntözés: Az első időszakban rendszeresen öntözzük meg a növényeket, hogy segítsük a gyökerek növekedését. Később tartsuk a talaj egyenletesen nedvesen.

Metszés: A Pennisetum 'Little Bunny' fűfélék általában nem igényelnek metszést. Az elnyílt virágokat lehet eltávolítani, ha azt szeretnénk, hogy a növény esztétikailag vonzóbb maradjon.

Trágyázás: Tavasszal vagy kora nyáron adjunk meg egy lassan oldódó általános célú műtrágyát a növénynek, hogy támogassuk a növekedését és a virágzást.

Tél előkészítése: A Pennisetum 'Little Bunny' általában hidegtűrő növény, de erős hideg időjárás esetén fedjük be a növényeket száraz levelekkel vagy szalma réteggel a tél előtt.

Gyönyörű, puha krémfehér virágokkal díszített alacsony évelő fűféle. Kompakt növekedése miatt kiválóan alkalmas sziklakertek, szegélyek vagy virágágyások díszítésére.

Longfield Maxim sásliliom	**Hemerocallis 'Longfield Maxim'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Longfield Maxim sásliliom egy tömör, bokros növekedésű évelő növény, amely 50-60 cm magasra és 40-50 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, élénkzöld színűek. Virágai 12-14 cm átmérőjűek, halvány sárgaszínűek, sárga-zöld torkuk van. A virágok szirmai szélesek, enyhén fodrosak, és selymes felületűek. Virágzási ideje június és augusztus között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként elegáns hatású

Vegyes virágágyásokba finom színfolt

Társítás: Fehér virágú növényekkel, ezüstlevelű fajtákkal

Romantikus kertekbe tökéletes választás

Konténeres nevelésre is alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Romantikus kertek

Elegáns kertek

Városi kertek

Hagyományos kertek

Rózsakert társnövényeként

Luciana nektarin	Prunus persica 'Luciana'	5 300 Ft	5 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Prunus persica 'Luciana' nektarin egy kiemelkedő fajta, amely a nektarinok között különleges helyet foglal el édes ízével és lédús textúrájával. A 'Luciana' nektarin gyümölcse közepes méretű, amely a betakarítás időszaka alatt, július végén és augusztus elején érik be. A gyümölcs héja sima, sárga alapszínén mélypiros, vonzó csíkozással rendelkezik, amely nemcsak ízletes, hanem vizuálisan is vonzó. Az íz kombinációja a frissességgel és az édes-savanykás jegyekkel minden falatban élményt nyújt.
A 'Luciana' nektarin fája közepes magasságú, dús lombkoronával és vonzó, zöld levelekkel, ami díszíti a kertet. A fa öntözési igénye mérsékelt; a rendszeres öntözés elősegíti a gyümölcsök egészséges növekedését, különösen a virágzás és a gyümölcs fejlődésének időszakában. A 'Luciana' nektarin jól tűri a különböző talajtípusokat, azonban a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj a legideálisabb számára.
Ez a nektarin nemcsak frissen fogyasztható, hanem kitűnő választás süteményekhez, gyümölcssalátákhoz és párolt ételekhez is. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, így nemcsak ízletes, hanem tápláló is. A Prunus persica 'Luciana' nektarin minden kertbe remek választás, hiszen bőséges termésével és csodás megjelenésével örömet okoz a gyümölcsfogyasztóknak.

Magical Vulcano korallberkenye	**Photinia x fraseri 'Magical Vulcano'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Magical Vulcano korallberkenye (Photinia x fraseri 'Nagical Vulcano') elterjedt változatok mellett egy kifejezetten erős, bordós színűre szineződő fajta fűrészes levélszéllel. Korai kihajtása miatt védettebb kertekbe javasolható, de ott ugyan úgy szoliterként is tartható, de sövénynek is nevelhető. 2-3 méter magas szabályos növekedésű bokorrá válik, de ügyes kertészek könnyen nevelhetnek belőle egzotikus megjelenésű több törzsű kis fát is.

Magnus bíbor kasvirág	**Echinacea purpurea Magnus**	3 250 Ft	3 750 Ft

Fedezze fel az Echinacea purpurea 'Magnus', Bíbor Kasvirág exkluzív változatát! Díjnyertes, hosszan virágzó évelő mélyrózsaszín virágokkal, mely vonzza a méheket és pillangókat. Tökéletes szárazságtűrő választás kertekbe. Konténeres, egész évben ültethető!
Főbb jellemzők
Virágok: 10-12 cm átmérőjű, sötétbarna központú, vízszintes szirmú virágok (a hagyományos lecsüngő szirmú fajtákkal ellentétben). Levelek: Sötétzöld, lándzsás alakú, érdes felületű. Télállóság: -30°C-ig ellenálló (USDA 3-9 zóna) . Díjak: 1998-ban az "Év Évelője", 2003-ban a Royal Horticultural Society díjazottja.
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap (napi 6+ óra) – félárnyékban is él, de kevesebbet virágzik.

Talaj: Jól átázó, laza talaj (pH 5.5-7.5). Tűri az agyagos és köves talajt is.

Öntözés: Szárazságtűrő, de hosszú aszályban öntözendő.

Metszés: Hervadt virágok eltávolításával hosszabbítható a virágzás.

Ültetési tanácsok:

Társítás: Rudbeckia, Salvia vagy más kasvirág fajtákkal kontrasztos hatásért.

Használat: Évelőágyások, vadkertek, vágott virágként is kiváló.

Ültetés: 50-70 cm tőtávolsággal, tavasszal vagy ősszel.

Kiemelt előnyök
Hosszú virágzás – akár 3 hónapig. Mézelő és madárbarát – télen a magvak madarakat táplálnak. Alacsony karbantartás – betegség- és szarvasálló.
Ez a 'Magnus' tökéletes választás kezdőknek és tapasztalt kertészeknek egyaránt, kombinálva látványosságot és könnyű gondozást.

Mahoborbolya	**Mahoberberis aquisargentii**	3 250 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Mahoberberis aquisargentii (mahoborbolya) egy ritka örökzöld cserje, amely télizöld, fényes leveleiről és tavaszi sárga virágairól ismert. Ideális választás sövényként, díszcserjeként vagy akár erdei kerti környezetbe is. Könnyen gondozható, szárazságtűrő és teljesen télálló. A Mahoberberis aquisargentii (Mahoborbolya) a Mahonia aquifolium és a Berberis sargentii kereszteződéséből származó örökzöld cserje. Fiatal hajtásain a levelek szinte a magyalra emlékeztetőek, míg az idősebbeken egyszerű tojásdadok.
Külső tulajdonságok

Magasság és forma: 1,5-2,5 méter magasra és hasonló szélességre nő, buszos, felálló habitussal.

Levelek: Télizöldek, bőrszerűek és fényesek. Alakjuk változatos: a csúcshajtásokon mélyen karéjosak és fogazottak, míg az idősebb ágakon oválisak és finoman fogas szélűek15. Hideg időben a levelek vörös árnyalatot ölthetnek.

Virágok: Apró, sárga virágok nyílnak tavasz végén vagy nyár elején, tömött fürtökben. A virágzás május-júniusban történik.

Termés: Fekete bogyók formálódnak a virágzás után, amelyek madarak számára vonzóak, de emberi fogyasztásra nem alkalmasak.

Gondozási útmutató

Fényigény: A napos vagy félig árnyékos helyeket kedveli. A délutáni szűrt napsütés ideális számára.

Talaj: Közömbös a talajjal, de a jó vízelvezetésű, laza talajt preferálja. Tolerálja a savas, semleges és lúgos talajt is.

Öntözés: Közepes vízigényű. Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, de az állandóan nedves talajt kerülje.

Táplálás: Nem igényel rendszeres trágyázást. Tavasszal egy kis komposzt vagy lassan felszabaduló műtrágya hasznos lehet.

Metszés: Nem igényel rendszeres metszést. Ha szükséges, tavasszal visszavágható, vagy néhány évente érdemes eltávolítani az idősebb ágakat a formája megőrzése érdekében.

Télállóság: Jól tűri a hideget (akár -25°C-ig is), de fiatal növényeket érdemes mulccsal védeni a talajfagy ellen.

Ültetési javaslatok

Módszer: Ültesse legalább 1,5-2 méter távolságra más növényektől, hogy elegendő teret kapjon a fejlődéshez.

Hely: Használhatók sövényként, határok kialakítására, vagy akár erdei kerti környezetben is.

Növénytársítás
A mahoborbolya kiválóan kombinálható más árnyékot tűrő és örökzöld növényekkel:

Háttérnövények: Rhododendron és Pieris japonica.

Aljnövények: Hosta és Hedera helix (borostyán).

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kiegészítők: Fagyal (Ligustrum) és Magyal (Ilex aquifolium).			
Kertstílus			
Erdei kert: Természetes megjelenése miatt kiválóan illeszkedik erdei környezetbe.			
Díszkert és sziklakert: Egyedi megjelenése miatt hangsúlyos eleme lehet a kertnek.			
Városi kert: Jól tolerálja a szennyezett levegőt és a szárazságot is.			
6b-10a USDA-zóna			
Maikönigin sásliliom	**Hemerocallis 'Maikönigin'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Maikönigin sásliliom egy erőteljes növekedésű évelő növény, amely 70-80 cm magasra és 60-70 cm szélesre nő. Levelei ívesek, kardformájúak, élénkzöld színűek. Virágai 14-16 cm átmérőjűek, gazdag aranysárga színűek, sötétebb sárga torkuk van. A virágok szirmai szélesek, enyhén hullámosak, és bársonyos felületűek. Virágzási ideje június és július között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként lenyűgöző hatású

Vegyes virágágyások kiemelkedő eleme

Társítás: Kék és lila virágú növényekkel

Nagyobb kerti terekbe tökéletes választás

Konténeres nevelésre is kiválóan alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Nagy kertek

Parkok

Városi zöldterületek

Hagyományos kertek

Mediterrán kertek

Maillette levendula	Lavandula angustifolia 'Maillette'	2 550 Ft	3 150 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Lavandula angustifolia 'Maillette' egy édes illatú, sötét ibolya-kék virágú angol levendula, amelyet kiváló illóolaj-termelő képességeiről ismernek. Ismerje meg részletes gondozási útmutatónkat a sikeres neveléshez!
Alkalmazás és előnyök

Illóolaj-termelés: A 'Maillette'-t azért nemesítették, hogy nagy hozamú és kiváló minőségű illóolajat termeljen, amelynek magas a linalil-acetát tartalma. Ettől az olajtól lágy, édes és mézes illata van.

Dísznövény: Nemcsak illóolaj-termelésre kiváló, de dísznövényként is ültetik. Virágzata elegáns, és jól szárítható.

Betegségtolerancia: Sok más angol levendulánál ellenállóbb a betegségekkel szemben, és elviseli a nehéz agyagtalajt is.

Gondozási útmutató

Fényigény: A teljes napsütés ideális a számára.

Talaj: A jól vízelvezető talaj a legfontosabb. A 'Maillette' a nehéz, agyagos talajt is tolerálja, ami más levenduláknak problémát okozhat.

Metszés: A virágzás után vissza kell metszeni, hogy kompakt formájú maradjon. A tavaszi erősebb metszés elősegíti az egészséges új hajtások növekedését.

Télállóság: Jó télállóságú, az USDA 5-9-es zónáiban tartható.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Mandarin's Coat bazsarózsa	**Paeonia lactiflora 'Mandarin's Coat'**	5 950 Ft	6 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Mandarin's Coat bazsarózsa egy tömör, felálló habitusú, törpenövekedésű évelő, amely 50-60 cm magasra nő. Fő értéke a sötét rózsaszín, japán típusú virág, amelynek közepén aranysárga porzók ragyognak. A virágok május-június hónapokban nyílnak, átmérőjük 10-15 cm között mozog. A sötétzöld, mélyen szeldelt levelek a növény egész vegetációs időszakában dekoratívak. A virágzatok kiválóak vágott virágként is, hosszú élettartamuk miatt.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon vagy enyhén árnyas helyen

Talaj: Mély, jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj

Távolság: 40-50 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Évelőágyások első sora, kisebb kertek, edényesültetés, vágott virág

Gondozási útmutató

Metszés: Virágzás után elvirágzott részek eltávolítása, ősszel a szárak visszavágása

Télvédelem: Teljesen télálló, fiatal növényeket téli takarással védjünk

Öntözés: Mély gyökérzetével szárazságtűrő, de virágzás előtt öntözzük

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy bazsarózsa trágyával

Általános: A rügyek max. 3-5 cm mélyre ültetendők

Ajánlott kerttípusok

Kistermetű kertek

Évelőágyások

Vágott virág kertje

Formális kertek

Konténeres kertészet

Bazsarózsagyűjtemények

Marrakech marokkói százszorszép	**Rhodanthemum hosmariense 'Marrakech'**	3 250 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Marrakech marokkói százszorszép (Rhodanthemum hosmariense 'Marrakech') Marokkóból és a Földközi-tenger vidékéről származó, alacsony, sűrű, párnás tövet képező, örökzöld évelő. Kifejlett magassága 15–30 cm, szélessége 30–60 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, és virágzáskor a virágzatok sűrű csoportokban emelkednek a lombozat fölé. Levelei finoman szeldeltek, ezüstszürke-zöld színűek, sűrűn borítják a hajtásokat, és a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad.
A virágzat margarétaszerű fészekvirágzat, amelynek nyelves virágai halvány rózsaszínűek, a központi csöves virágok pedig vörös vagy bronzos-barna színűek. A virágok átmérője mintegy 3–5 cm. Virágzása tavasztól (áprilistól) nyár elejéig (júniusig) tart, majd a nyár folyamán és ősszel szórványosan újabb virágok jelenhetnek meg. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár homokos, kavicsos vagy meszes, sovány talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, -5 °C és -10 °C közötti hőmérsékletet visel el. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a növényt enyhén visszavághatja, hogy megőrizze tömör, párnás formáját. Kora tavasszal a télen elhalt vagy sérült részeket távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télállósága közepes, ezért a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, ágyásszegélybe, mediterrán hangulatú kertekbe, városi és udvari kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején lágy rózsaszín színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: levendula, kakukkfű, zsálya – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a százszorszép tömör habitusát.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a százszorszép virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 7-9 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).			
May Night ligeti zsálya	**Salvia nemorosa 'May Night'**	2 350 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A May Night ligeti zsálya (Salvia nemorosa 'May Night', szinonim nevei: 'Mainacht', Salvia sylvestris 'May Night', Salvia × superba 'May Night') a ligeti zsálya egyik legismertebb és legmegbízhatóbb kertészeti fajtája, amelyet 1997-ben az Év Évelőjévé választottak. Kompakt, sűrű, bokros tövet képez, amelynek felálló, merev szárai rendezett, tömör formát mutatnak, és nem igényelnek támasztékot. Kifejlett magassága 45–60 cm, szélessége 30–45 cm között alakul; egyes termesztési körülmények között a magasság a 60–75 cm-t is elérheti. Levelei sötétzöldek, hosszúkásak, lándzsásak, ráncos felületűek, és megdörzsölve kellemes, fűszeres illatot árasztanak; a lombozat a tövénél sűrű, tömött rózsát alkot.
A virágzat sűrű, karcsú fürt, amely a szárak felső részén nyílik. A virágok ajakosak, sötét ibolyakék-ibolyáslila színűek, a bimbók lilák, és a virágok a fürtök mentén sűrűn helyezkednek el. Virágzása kora nyáron (május végétől-június elejétől) kezdődik, és az elnyílt virágfürtök rendszeres eltávolításával a nyár folyamán újabb virágzási hullámok következnek, így a szín egészen a nyár végéig kitarthat. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek, és a szárak kiválóan alkalmasak vágott virágnak, frissen és szárítva is.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél; a talaj kémhatására nem különösebben érzékeny.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kifejezetten szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Az USDA 3–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a hazai besorolás szerint a 4. zónától (mintegy –29 °C-ig) tartható biztonságosan, és a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül is áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására, és a szárak megnyúlását, megdőlését okozhatja.

Metszés: Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. Kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt a régi, elhalt szárakat a talajszint közelében vágja vissza. A töveket 3–4 évente érdemes megosztani a vitalitás és a tömör habitus megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel, és ritkán lisztharmat, valamint levélfoltosság jelentkezhet.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kis kertekbe és dézsába is kiváló választás, ahol a sötét ibolyakék virágfürtök és a hosszú virágzás érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő, mély színfoltot ad a kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Növénytársítások			
Rózsák: a ligeti zsálya alacsony, rendezett habitusa és függőleges virágzata szép kontrasztot ad a rózsák mellett, és jól elrejti azok alsó, kopaszabb részeit.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, kakukkfű, rozmaring – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a zsálya tömör virágfürtjeit.			
Évelők: cickafark, kasvirág, varjúháj, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 3–8 (a hazai termesztésben a 4. zónától biztonságos, a magyarországi klímán teljesen télálló).			
Mellow Scarlets bíbor kasvirág	**Echinacea purpurea 'Mellow Scarlets'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Mellow Scarlets bíbor kasvirág (Echinacea purpurea 'Mellow Scarlets') évelő, amely 60–80 cm magasra és 45–60 cm szélesre nő. Levelei sötétzöldek, lándzsásak, tövüknél szélesebbek, a száron felváltva helyezkednek el. Virágai feltűnőek: a sugárvirágok élénk narancsvörös-skarlátvörös színűek, visszahajlók, a központi kúp pedig sötétbarna-narancsos árnyalatú. Nyár közepétől kora őszig virágzik, és a virágok vonzzák a méheket, lepkéket. Virágzás után a magfejek télen is díszítenek, és madarak táplálékául szolgálnak.
Igényei

Fény: Teljes nap, esetleg enyhe délutáni árnyék a forró nyári időszakban.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, de szárazságot is tűrő talaj. A pangó vizet nem kedveli.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; az első évben rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot is jól tűri.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültethető napos, jó vízáteresztő helyre.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő.

Metszés: Az elvirágzott virágokat rendszeresen távolítsa el a hosszabb virágzás érdekében; a magfejeket hagyhatja télen a madaraknak.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg, de a lisztharmatra érzékeny lehet. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább préri stílusú kertekbe, vadvirágos rétekbe, évelőágyakba és cottage kertekbe illik. Kiváló napos, szárazságtűrő kompozíciókba, és vágott virágként is kiváló. Jól mutat természetközeli, laza szerkezetű ültetésekben.
Növénytársítások

Fűfélék: árvalányhaj, csenkesz, préri fű – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.

Évelők: nyári orgona, kúpvirág, naprózsa, zsálya, levendula – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a kasvirág előtt.

Őszi virágzók: őszirózsa, krizantém – meghosszabbítják a szezont.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
USDA télállósági zóna: 3-8.			
Metélőhagyma / Snidling	Allium schoenoprasum	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Metélőhagyma (Allium schoenoprasum) - ízletes fűszernövény és díszes lila virágokkal. Könnyen termeszthető, egész évben használható friss zöldségforrás, méhek kedvence!
Külső jellemzők

Levelek: Vékony, üreges, zöld szárak, enyhe hagymaízzel

Virágzás: Május-július között, lila, gömb alakú virágzatok

Növekedés: 20-40 cm magas, tömött csomókban terjed

Helyigény és gondozás

Talaj: Jól átázó, tápanyagban gazdag talaj

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyek ideálisak

Öntözés: Közepes vízigényű, a talajt egyenletesen nedvesen kell tartani

Metszés: Szükség szerint szüretelhető, virágzás után vissza lehet vágni

Felhasználási lehetőségek

Friss fűszerként salátákhoz, levesekhez, szendvicsekhez

Dísznövényként virágágyásokba

Méh- és pillangóbarát kertekbe

Konténeres termesztésre

Társítási javaslatok

Petrezselyemmel

Kakukkfűvel

Zsályával

Paradicsommal (növényvédő hatása van)

Megjegyzés: A metélőhagyma évelő növény, amely télen is áttelel, és tavasszal újra hajt. Virágzás után érdemes visszavágni a leveleket az új hajtások elősegítésére.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
MikoMax Garden 60 g	...egy életre szóló kapcsolat	1 250 Ft	1 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Hogyan kell alkalmazni a MikoMax Gardent?
A MikoMax Gardent úgy kell kijuttatni, hogy az ültetőgödörbe szórjuk, közvetlenül a növény gyökereihez közel. Nincs szükség nagy mennyiségre; egy kávéskanálnyi mennyiség elegendő, mivel elméletileg egyetlen spóra hifájának is elég, ha bejut a növény gyökerébe, és utána az már képes behálózni a növényt.

Tudta?
A mikorrhiza gombafajok szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki a gazdanövénnyel, amelynek révén növelik a növény víz- és tápanyagellátottságát, javítják stressztűrő képességét és ellenálló képességét a kártevőkkel szemben.
Tudjon meg többet a Mikorrhizáról
A mikorrhiza a gazdanövénnyel szimbiózisra lépve segít a növénynek olyan stresszes időszakokban, mint a fagy vagy az aszály, mivel hozzájárul a megfelelő mennyiségű víz- és tápanyagfelvételhez. A mikorrhiza hifafonala, amely sokszázszoros méretű a gyökérhez képest, sokkal messzebbről és hatékonyabban képes felvenni a víz és tápanyagok a gazdanövény számára.
A mikorrhiza gomba gyökérkapcsolatra van szüksége, ezért a kijuttatás során fontos, hogy a terméket a gyökér közelébe, maximum 1-2 cm-re helyezzük el. Nagyobb fák esetén ajánlott a lombkorona csurgója alatt körben, több helyen kijuttatni, és a kisebb, vékonyabb gyökerekhez is érdemes hozzáférni.

Miért jó ez az együttműködés a kultúrnövénynek, és hogyan jön létre?
A növények növekedési időszakuk kezdetén természetes támogatást kapnak a mikorrhiza gombáktól, amely segíti őket a víz és tápanyagok hatékonyabb felvételében. Ez a kapcsolat akkor alakul ki, amikor a növények olyan anyagokat választanak ki, amelyek vonzzák a gombákat, és arra ösztönzik őket, hogy hifafonalaik egy részével behatoljanak a növény gyökereibe. Ezzel a szimbiotikus együttműködéssel a növények kedvezőbb környezetet teremtenek a fejlődésükhöz.
Gyepesítés Mikorrhizával
A MikoMax Garden egy arbuszkuláris, vagyis endo mikorrhizát tartalmaz, amely szimbiotikus kapcsolatot alakít ki a növények 90%-ával, így például a gyepekkel is. A termék kijuttatására az alábbi módszerek javasoltak:

Gyepesítés előtt: Szórd ki a terméket és sekélyen dolgozd el a talajban.
Gyep magokkal való keverés: Keverd össze a gyepmagokat a termékkel, és egyben juttasd ki a keveréket.

Ezek a lépések elősegítik a mikorrhiza gombák és a gyep közötti szimbiotikus kapcsolat kialakulását, ezzel javítva a gyepszőnyeg egészségét és ellenállóságát.

Ha a gyepesítés már megtörtént, a mikorrhiza kijuttatására a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Gyepszellőztetés: A mikorrhiza terméket a gyepszellőztetés során kell bejuttatni a talaj felső rétegébe, majd alaposan be kell locsolni, hogy a gombák jól elterjedhessenek a talajban.

Folyékony mikorrhiza alkalmazása: Biztosabb módszer a folyékony Ino-Myc mikorrhiza termék kijuttatása a gyepre. Ezt permetezve, vagy nagy mennyiségű vízzel való öntözés formájában lehet alkalmazni, ami elősegíti a gombák gyors bejutását és hatékony működését.

Ezek a módszerek optimalizálják a mikorrhiza gombák jelenlétét a gyepben, segítve annak egészségét és fejlődését.

Miért jó ez az együttműködés a kultúrnövénynek, és hogyan jön létre?
A növények növekedési időszakuk kezdetén természetes támogatást kapnak a mikorrhiza gombáktól, amely segíti őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak vizet és tápanyagokat felvenni. E folyamat során a növények olyan anyagokat választanak ki, amelyek vonzzák a gombákat, és arra ösztönzik őket, hogy hifafonalaik egy részével behatoljanak a kultúrnövény gyökereibe.
A növény képes érzékelni, hogy egyedül megbirkózik-e a talajban található víz és tápanyagok felvételével, vagy szüksége van-e a mikorrhiza gomba támogatására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szüksége van a segítségre, a gyökerei révén tápanyagokat, szénhidrátokat, aminosavakat és egyéb jelzőanyagokat juttat a talajba. E jelzéseket a mikorrhiza gomba érzékeli, majd elindul a gyökér felé, ahol behatol a gyökérbe, létrehozva ezzel egy szimbiotikus kapcsolatot.
Ez az együttműködés kedvezően hat a növény növekedésére és ellenálló képességére, mivel a mikorrhiza gomba által biztosított tápanyag- és vízfelvételi előnyök lehetővé teszik a kultúrnövény számára, hogy jobban alkalmazkodjon a környezeti kihívásokhoz.

Fontos megjegyezni, hogy minden kiskiszerelésű termékünk esetében a gyártó 18 hónapig garantálja a megjelölt csíraszám és hatóanyagtartalom meglétét a gyártástól számítva.

Tárolása
A MikoMax Garden tárolása során a termék eredeti csomagolásában, 5-30 Celsius-fok között, legalább 18 hónapig megőrzi szavatosságát. Felbontás után a lehető leghamarabb ki kell juttatni, de ha szorosan visszazárva, hűvös, fagymentes helyen tárolják, akkor 6 hónapig minőségromlás nélkül felhasználható.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
MikoMax Garden 360g			
MikoMax Garden + grátisz gél 360g			
Mint Julep boróka (kicsi)	**Juniperus x media 'Mint Julep'**	2 450 Ft	2 450 Ft
Mint Julep boróka (nagy)	**Juniperus x media 'Mint Julep'**	4 450 Ft	5 390 Ft
Mirage Burgundy őszi zsálya	**Salvia greggii 'Mirage Burgundy'**	2 950 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Mirage Burgundy őszi zsálya (Salvia greggii 'Mirage Burgundy') az Észak-Amerikából származó Salvia greggii faj kompakt, bokros növekedésű fajtája. Kifejlett magassága 30-36 cm, szélessége 36-41 cm, habitusa lekerekített, sűrű és szétterülő, így kiválóan alkalmas csoportos ültetésre és konténeres termesztésre is. Levelei keskenyek, lándzsásak, élénkzöldek, enyhén aromásak, és enyhe teleken részben vagy egészben megmaradnak. Virágai aprók, kétajkúak, burgundi vörös és magenta árnyalatúak, laza fürtökben nyílnak hosszú, vékony szárakon. Kora nyártól (június) egészen késő őszig (október) virágzik, folyamatosan újabb virágokat hozva. A virágok kellemes, finom illatot árasztanak, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; félárnyékban is megél, de a virágzás ilyenkor gyengébb lehet.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért nehéz agyagtalajba ne ültesse.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; az első évben rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot is jól tűri. A talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni, de a túlöntözést is kerülni kell.

Télállóság: Fagytűrő, rövid fagyokat (-17 °C-ig) elvisel. Hazánkban enyhe teleken szabadföldben is áttelelhet, de zord teleken érdemes takarással védeni vagy konténerben átteleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos vagy félárnyékos helyre, jó vízáteresztő talajba. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy homokot a jobb vízáteresztés érdekében. Konténerben is nevelhető, ekkor ültesse jó minőségű, vízáteresztő komposztba.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később hetente egyszer mélyen locsolja meg; aszályos időszakban gyakrabban. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású trágya támogatja a növekedést és a virágzást. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást és serkentse az új hajtásokat. A növényt kora tavasszal enyhe visszavágással formázhatja, ami sűrűbb, bokrosabb növekedést eredményez.

Átteleltetés: Hazánkban a növényt takarással vagy védett helyen, konténerben teleltetheti át. A föld feletti részek fagyokban elhalhatnak, de tavasszal a tövéről újra hajt.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A jó szellőzés és a megfelelő öntözés segít megelőzni a gombás betegségeket. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább ágyásszegélybe, kavicskertbe, szárazságtűrő ágyásokba és modern, strukturált kompozíciókba illik. Kiváló talajtakaróként, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, mediterrán és minimalista kertekben, ahol a hosszú virágzási idő és az élénk szín érvényesül. Kiváló vágott virág, és vonzza a beporzó rovarokat.
Növénytársítások

Napos, szárazságtűrő évelők: cickafark, naprózsa, kúpvirág, sásliliom – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Kék és lila virágú társak: zsálya, macskamenta, ördögszem, veronika – színkontrasztot alkotnak a burgundi virágokkal.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.			
Illatos növények: levendula, izsóp, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 7a-9b.			
Mocsári nőszirom vagy Sárga írisz	**Iris pseudacorus**	3 450 Ft	3 990 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Iris pseudacorus a nősziromfélék egyik leglátványosabb és legmegbízhatóbb vízparti évelője. Őshonos európai és ázsiai vizes élőhelyeken, így a Kárpát-medencében is természetes állományai találhatók. Késő tavasszal hozza el varázslatos virágzását: a magasra törő, kard alakú levelek közül kiemelkednek a dús, élénksárga virágok, amelyek messziről felhívják magukra a figyelmet, és igazi ékkövei a tavak, patakok partjának.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A mocsári nőszirom habitusa bokros, felálló szárú, amelyet vastag, elágazó gyöktörzse (rizómája) tart. Levelei kard alakúak, kékeszöld színűek, erős középső érrel, 40-100 cm hosszúak és 2-3 cm szélesek. Május-júniusban nyíló virágai a növény legfőbb díszei: élénksárga, nagy méretű virágok, amelyek 7-12 cm átmérőjűek is lehetnek. A három lefelé hajló szirom (csészelevél) tövén gyakran barna vagy ibolyás erezet, mintázat látható. Virágzáskor egy száron akár 4-12 virág is nyílhat. Termése 6 élű, zöld toktermés, amely számos lapos, parás szélű magot tartalmaz; a magok akár 2 hónapig is képesek a vízen úszva terjedni.

Magasság: A virágzó szárak magassága eléri az 50-150 cm-t.

Szélesség: Terjedése 100-200 cm is lehet, mivel vastag rizómái segítségével nagy telepeket alkot.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban. Napos fekvésben hozza a legdúsabb virágzatot.

Talaj: Minden nedves, mocsaras vagy sekély vízzel borított talajtípust kedvel. Kiválóan érzi magát sekély vízben (akár 10-25 cm mélyen is), de egyszerűen nyirkos kerti talajban is megél. A pangó vizet kifejezetten igényli, szárazság idején is hálás a nedvességért.

Ültetési mélység: Vízi környezetbe ültetve a gyökérzet legfeljebb 10-30 cm mélyre kerüljön a vízszint alá.

Öntözés: Folyamatos vízellátást igényel, talaja soha ne száradjon ki.

Télállóság (USDA-zóna): A növény rendkívül télálló, USDA 5-8 zónákban teleltethető biztonsággal. Magyarország teljes területén megbízhatóan áttelel, a téli fagyokra nem érzékeny.

Metszés és osztás:

Tavaszi visszavágás: Kora tavasszal (márciusban) érdemes visszavágni az elszáradt leveleket földközelben, hogy helyet adjunk az új, friss hajtásoknak.

Őszi visszavágás: Ha nem szeretnénk, hogy a magokkal terjedjen, virágzás után távolítsuk el a toktermeséket.

Osztás: A növényt 3-4 évente érdemes tavasszal vagy ősszel osztással felfrissíteni. A rizómákból könnyen szaporítható.

Terjedésének korlátozása: Mivel a növény gyorsan terjed tarackjaival (rizómáival) és magjai vízen úszva is továbbterjednek, kisebb kertekben érdemes gyökércsapdában (pl. vízinövény-kosárban, műanyag edényben) nevelni, vagy rendszeresen visszavágni a terjedő hajtásokat.

Figyelmeztetés: A növény minden része, különösen a rizómája, enyhén mérgező, fogyasztása nem ajánlott. A levelek és a rizóma bőrirritációt is okozhat érzékeny személyeknél, ezért ültetéskor és osztáskor ajánlott kesztyűt viselni.

Kertstílus és növénytársítások:
Élénk színű, feltűnő virágai és robusztus habitusa miatt sokféleképpen felhasználható:

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Tavak, patakok partja: A vízparti sáv nélkülözhetetlen dísze.

Mocsárkertek: Nedves, mocsaras részek színesítésére ideális.

Vízi kertek konténerben: Vízinövény-kosarakban, akár kisebb tavacskákban is nevelhető.

Természetes hangulatú kertek: Jól illik a vadvízi, természetközeli kertekbe.

Víztisztító növényként: Gyökérzete jól szűri a vizet, ezért természetes víztisztításra is alkalmazzák.

Ajánlott növénytársítások:

Fehér virágú vízinövények: A sárga virágok lenyűgözően kiemelkednek a fehér virágú növények közül. Társítsuk fehér tündérrózsával (Nymphaea alba).

Lila vagy kék virágú mocsári növények: A sárga és lila klasszikus, élénk színkontrasztot alkot. Ültessük mellé vízi mentát (Mentha aquatica)

Rózsaszín virágú mocsári növények: Lágy, romantikus kombináció a rózsaszínnel, például mocsári hibiszkusszal (Hibiscus moscheutos) .

Díszfüvek: Társíthatjuk más, vízparti díszfüvekkel, példáu sással (Carex) a különböző textúrák játékához.

Money Maker gyepliliom	Liriope 'Money Maker'	3 450 Ft	3 950 Ft

A Money Maker gyepliliom egy tömör, bokros növekedésű örökzöld évelő, amely 20-50 cm magasra és 20-50 cm szélesre nő meg. Levelei lándzsa formájúak, sötétzöldek, fényes felületűek, melyek sűrű csomókat alkotnak.
Legfőbb díszét a késő nyártól őszig megjelenő, élénk lila virágok képezik. A virágok aprók, gyöngyházszerűek, és a lombozat felett magasodó, felálló kocsányon nyílnak. A virágzás után kialakuló kék-fekete bogyók további dekoratív értéket képviselnek.
Gondozási útmutató

Fényigény: A félárnyékos vagy teljes árnyékos helyeket kedveli. Napos helyen is megél, de ott a levelei sárgulhatnak.

Talajigény: A jól vízelvezető, laza szerkezetű, közepesen termékeny talaj az ideális számára. Meglehetősen igénytelen, és tűri a szárazságot is.

Vízigény: Közepes vízigényű. Fiatalon rendszeres öntözést igényel, de kifejlett állapotban jól tűri a szárazabb időszakokat.

Metszés: Alig igényel metszést. Tavasszal eltávolíthatók a száraz vagy sérült levelek.

Télállóság: Jó télállóságú, de extrém hidegben érdemes védeni.

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával vagy komposzttal támogatható.

Ültetési javaslat
A Money Maker gyepliliom rendkívül sokoldalúan használható fel. Kiváló választás talajtakaróként, sövényként, erózióvédelemre vagy konténeres nevelésre
Társítás: Páfrányokkal, hostákkal, árnyliliomokkal jól harmonizál

Moundry tollborzfű	Penisetum alopecuroides 'Moundry'	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Moundry tollborzfű egy rendkívül dekoratív, alacsonyabb növekedésű évelő, melyet dús virágzata és szabályos, domború formája jellemez. A növény elérheti a 60-80 cm magasságot és szélességet, így kiválóan alkalmas kisebb kertek számára is.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon, minél több napfényben

Talaj: Jól vízáteresztő, laza, szárazságtűrő talaj

Távolság: 50-60 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Elülső sorokban, határok kialakítására, kőkertekben, konténeres ültetésben

Gondozási útmutató

Metszés: Késő télen vagy korai tavasszal vágjuk vissza rövidebre

Télvédelem: Átteleltető takarás csak szükség esetén

Öntözés: Fiatalon rendszeresen, éretten csak szárazsággal szemben

Táplálkozás: Tavaszi időszakban egy kevés komposzttal

Általános: Nagyon egyszerűen tartható, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Kortárs és modern kertek

Mediterrán stílusú beültetések

Prérikertek és szárazságtűrő kompozíciók

Konténerbe ültetve teraszokra

Mountain Frost Pink Twinkle szegfű	**Dianthus caryophyllus 'Mountain Frost Pink Twinkle'**	2 150 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Mountain Frost Pink Twinkle szegfű egy tömör, párna formájú habitusú örökzöld évelő növény, amely 15-25 cm magasra és 30-40 cm szélesre nő. Fő értéke a nagy, 3-4 cm átmérőjű, rózsaszín-fehér csíkos virágok, amelyek tavasztól őszig folyamatosan nyílnak. A virágok kellemes, fűszeres illatúak és hosszú szárakon magasodnak a levélzet felett. A szürkészöld, lándzsa alakú levelek sűrű párnát alkotnak, és a növény egész évben dekoratív marad. A virágok kitűnőek vágott virágként is.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon

Talaj: Jól vízáteresztő, meszes talaj

Távolság: 25-35 cm-es távolsággal

Használat: Elülső sorok növényágyásokban, határok, sziklakertek, konténeres ültetés

Gondozási útmutató

Metszés: A elvirágzott szárak rendszeres eltávolítása elősegíti a folyamatos virágzást

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Alacsony vízigényű, a szárazságot jól tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Mediterrán kertek

Sziklakertek

Konténeres kertészet

Városi kertek

Hangulatos kertek

Illatos kertek

Mountain Frost Rose Bouquet kerti szegfű	**Dianthus caryophyllus 'Mountain Frost Rose Bouquet'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Mountain Frost Rose Bouquet kerti szegfű (Dianthus caryophyllus 'Mountain Frost Rose Bouquet') a Mountain Frost sorozat egyik legkeresettebb tagja, amelyet a hosszú virágzás, a kiemelkedő hőtűrés és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség érdekében nemesítettek. Alacsony, sűrű, párnás tövet képez, amelynek hajtásai röviden emelkednek a lombozat fölé. Kifejlett magassága 15–30 cm, szélessége 25–45 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, és virágzáskor szinte teljesen beborítják a lombozatot. Levelei keskenyek, szálasak, kékeszöldek-szürkészöldek, örökzöldek, és a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad.
A virágzat a szárak végén nyílik; a virágok gazdagon telt, rózsaszín–mélyrózsaszín színűek, a szirmok széle enyhén fodrozott, és a virágok illatosak. A virágok átmérője mintegy 4–5 cm. Virágzása kora tavasztól késő őszig tart, és a fajta a nyár folyamán is folyamatosan újabb virágokat hoz. A virágok vonzzák a lepkéket, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak. A növény minden része mérgező.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású, inkább száraz, tápanyagszegény talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson érzi jól magát.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A Mountain Frost sorozat tagjaként a tartós esőzést és a nedvességet is jól tűri.

Télállóság: Az USDA 4–9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta –32 °C körüli fagyokat is elvisel, és a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a növényt enyhén visszavághatja, hogy megőrizze tömör, párnás formáját. A töveket 2–3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: A Mountain Frost sorozatot kifejezetten a betegségekkel szembeni ellenálló képesség érdekében nemesítették. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, sziklakertbe, kavicskertbe, mediterrán hangulatú kertekbe, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő rózsaszín színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág, gólyaorr – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.			
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a szegfű tömör habitusát.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a szegfű virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4-9.			
Mountain Frost Ruby Snow kerti szegfű	**Dianthus caryophyllus 'Mountain Frost Ruby Snow'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Mountain Frost Ruby Snow kerti szegfű (Dianthus caryophyllus 'Mountain Frost Ruby Snow', más néven 'KonD1400K4') a Mountain Frost sorozat egyik legkeresettebb tagja, amelyet a hosszú virágzás, a kiemelkedő hőtűrés és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség érdekében nemesítettek. Alacsony, sűrű, párnás tövet képez, amelynek hajtásai röviden emelkednek a lombozat fölé. Kifejlett magassága 15–20 cm, szélessége 25–30 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, és virágzáskor szinte teljesen beborítják a lombozatot. Levelei keskenyek, szálasak, kékeszöldek-ezüstszürkék, örökzöldek, és a lombozat a szezon nagy részében dekoratív marad.
A virágzat a szárak végén nyílik; a virágok gazdagon telt, fehér színűek, a szirmok széle enyhén fodrozott, a virágok közepén pedig élénk rubinvörös szem vagy gyűrű található. A virágok illatosak, és átmérőjük mintegy 4–5 cm. Virágzása kora tavasztól késő őszig tart, és a fajta a nyár folyamán is folyamatosan újabb virágokat hoz; a virágok a hőségben és erős napsütésben sem fakulnak ki. A virágok vonzzák a méheket és a lepkéket, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza szerkezetű, meszes vagy semleges kémhatású, inkább száraz, tápanyagszegény talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: A talaj kémhatására nem különösebben érzékeny.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A Mountain Frost sorozat tagjaként a tartós esőzést és a nedvességet is jól tűri.

Télállóság: Az USDA 4–9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta –31 °C körüli fagyokat is elvisel, és a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 20–25 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást és serkenti az újabb bimbók képződését. A virágzás után a növényt enyhén visszavághatja, hogy megőrizze tömör, párnás formáját. A töveket 2–3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: A Mountain Frost sorozatot kifejezetten a betegségekkel szembeni ellenálló képesség érdekében nemesítették. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, sziklakertbe, kavicskertbe, mediterrán hangulatú kertekbe, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás; konténerben a „spiller-thriller-filler” kombinációkban filler (kitöltő) szerepet tölt be. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő fehér-rubinvörös színfoltot ad a kertben.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Növénytársítások

Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág, gólyaorr – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a szegfű tömör habitusát.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a szegfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-9.

Nádtippan	**Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'**	2 750 Ft	2 950 Ft

Fedezze fel a Calamagrostis 'Karl Foerster' Nádtippan különlegességét! Függőleges habitusú, évszakokat átívelő szépségű díszfű. Tálló, alacsony karbantartású. Konténeres, egész évben ültethető példányokat küldünk!
Főbb jellemzők
Megjelenés: Szürkészöld levelek, rózsaszín árnyalatú fiatal hajtások Virágzat: Sűrű, sárgásbarna kalászvirágzat (június-július) Téli hatás: Szalmasárga színű, merev szárak egész télen Télállóság: -34°C-ig ellenálló (USDA 4-9 zóna)
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap vagy félárnyék (napi 4+ óra napfény)

Talaj: Minden talajtípusban megél, de nedvesebb helyeken erősebb növekedésű

Öntözés: Közepes vízigényű - aszályban öntözendő

Metszés: Tavasszal (március) visszavágás 10-15 cm magasra

Ültetési tanácsok:

Társítás: Miscanthus-szal vagy Echinacea-val kontrasztos hatásért

Használat: Modern kertek, függőleges hangsúly, téli kerti dekoráció

Ültetés: 3-5 db/m² sűrűségben

Kiemelt előnyök
Évszakok átívelő díszértéke - tavasztól tél végéig Betegség- és kártevőmentes Szélálló - nem dől össze Kiváló vágott virágként és száraz dekorációhoz
Ez a 'Karl Foerster' nádtippan valódi kincse bármely kertnek - rendelje meg most, és élvezze évről évre elegáns megjelenését!

Nagyvirágú tárnicslonc (kisebb)	**Abelia grandiflora**	3 950 Ft	3 950 Ft
Narancs tündérvirág	**Epimedium 'Orange Königin'**	3 950 Ft	4 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Narancs tündérvirág egy alacsony növekedésű, tömör habitusú évelő növény, amely 25-35 cm magasra nő. Fő értéke a narancssárga színű, csillag alakú virágok, amelyek hosszú, karcsú szárakon nyílnak. A virágok április-május hónapokban tömör fürtöket alkotnak. A szív alakú, fényes levelek tavasszan bronzszínűek, nyáron élénkzöldre válnak, ősszel pedig vörösbarnára színeződnek. A növény gyökértörzseken terjed, lassan de biztosan szőnyegszerű takarót alkotva.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Árnyékos vagy félárnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag talaj

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal

Használat: Talajtakaró árnyékos helyeken, erdei kertek, fák alatti beültetések, sziklakertek

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal, a új hajtások megjelenése előtt vágjuk vissza a tavalyi leveleket

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot rövid ideig tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Erdei kertek

Árnyékos kertek

Japán stílusú kertek

Fásított terülek aljának beültetése

Sziklakertek árnyékos részei

Örökzöld aláültetések

Nelly terülő szegfű	**Dianthus deltoides 'Nelly'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Terülő szegfű 'Nelly' egy különösen bájos, rózsaszínű virágú változata, amely sűrű, örökzöld szőnyegként borítja be a napos, száraz kertrészeket. Alacsony termetű, párnás növekedésű évelő növény, amely kifejlett állapotban csupán 10-15 cm magas, de akár 30-40 cm széles, tömött, szőnyegszerű telepeket alkot.

Megjelenésében visszafogottan elegáns: keskeny, lándzsás, sötétzöld vagy enyhén kékeszöld árnyalatú levelei sűrűn borítják a talajt, és egész évben megőrzik dekorativitásukat. A növény igazi látványossága a késő tavaszi és kora nyári virágzás idején bontakozik ki. Május-július folyamán a lombpárnákból rövid szárakon nyíló, közepes méretű virágok ezrei borítják a növényt. A virágszirmuk finoman rojtos, és gyakran sötétebb, vöröses vagy bordó gyűrű díszkedik a középpontban, ami még különlegesebbé teszi a virágokat.

Igényei és gondozása

A Terülő szegfű 'Nelly' a napfény és a jó vízelvezetés megszállottja. Teljesen napos, lehetőleg déli fekvésbe ültessük, ahol a lehető legtöbb fény éri. A legkritikusabb tényező a talaj: kiváló vízelvezetésű, laza, köves vagy homokos, meszes (magas kalciumtartalmú) talajt igényel. A pangó vizet egyáltalán nem tűri, gyökerei könnyen kirothadnak. Ültetéskor keverjünk a talajba meszes zúzottkövet vagy söder, hogy biztosítsuk a megfelelő vízelvezetést. Szárazságtűrése kiváló, öntözni csak tartósan aszályos időszakban szükséges. Gondozása minimális: a virágzás elmúltával távolítsuk el az elnyílt virágokat, hogy a növény ne gyengüljön a magkötéstől. Virágzás után enyhén vágjuk vissza a növényt, hogy megőrizze tömött formáját és sűrűbb növekedésre ösztönözzük. Tápanyagutánpótlást nem igényel, sőt, a túlzott tápanyag ellágyuláshoz és kórokozók megjelenéséhez vezethet. 2-3 évente érdemes tőosztással felfrissíteni, hogy megelőzzük a középen való kiritkulást.

Felhasználás a kertben

A Terülő szegfű 'Nelly' rendkívül sokoldalúan felhasználható a kertben. Kiválóan mutat sziklakertekben, ahol sziklák repedéseibe, kövek közé ültetve lágy, virágzó párnákat alkot. Szárazon rakott kőfalak felső élére ültetve gyönyörűen omlik alá, lágyítva a kemény vonalakat. Kavicságyásokban, sóderágyásokban is megállja a helyét, ahol a kavicsok közül kikandikáló fehér virágok különösen mutatósak. Alacsony termete miatt évelőágyások előterébe, szegélynövényként is ültethetjük. Kiváló talajtakaró napos, száraz területeken, ahol sűrű szőnyege elnyomja a gyomokat. Jól tűri a szárazságot, ezért zöldtetők beültetésére is alkalmas. Konténerekbe, dézsákba, balkonládákba ültetve is dekoratív.

Növénytársítási ötletek

Társításakor hasonló igényű, napos és jó vízelvezetésű talajt kedvelő növényeket válasszunk. Kiváló partnerei lehetnek a különböző alacsony harangvirágok, mint a kárpáti harangvirág (Campanula carpatica) kék vagy fehér változatai. Pozsgások közül a kövirózsák (Sempervivum) és a varjúhájfélék (Sedum) társaságában is remekül érzi magát, ahol a különböző formák és textúrák izgalmas kontrasztot alkotnak. Alacsony termetű, illatos kakukkfüvekkel (Thymus) ültetve illatos, szőnyegszerű kompozíciót hozhatunk létre. Díszfüvek közül a kékesszürke levelű csenkeszekkel (Festuca glauca) alkot harmonikus, természetes hatású együttest. Társíthatjuk még törpe termetű harangvirágokkal, habszegfűvel (Armeria) vagy más szegfűfélékkel.

Nemes babér (nagy)	**Laurus nobilis**	4 950 Ft	4 950 Ft
Neon Lights gyújtóványfű	**Linaria aeruginea 'Neon Lights'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Neon Lights gyújtoványfű (Linaria aeruginea 'Neon Lights') – A változatos színű, kompakt évelő

A Neon Lights gyújtoványfű 'Neon Lights' az útifűfélék (Plantaginaceae) családjába tartozó, az Ibériai-félszigetről (Portugália, Spanyolország) származó fajta. A 'Neon Lights' fajta a német JELITTO PERENNIAL SEEDS cég nemesítése. A Linaria nemzetség magyar neve gyújtoványfű, ami a virágok gyertya lángjára emlékeztető alakjára utal. Ez a növény rendkívül változatos, élénk színű virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb sziklakereti évelővé vált. A könnyű gondozhatósága, bőséges virágzása és a méhek, pillangók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A gyújtoványfű 'Neon Lights' egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 10-20 cm, szélessége 20-30 cm között alakul, ami kiváló talajtakaró és szegélynövényré teszi. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások egyenesen felállók vagy enyhén felemelkedők.

A levelek szürkészöldek, vékonyak, lándzsás vagy szálas-lándzsás alakúak. A levelek a szár alsó részén örvökben, a felső részen váltakozva helyezkednek el.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, végálló fürt, amelyen 3-34 virág található. A virágok kicsik, oroszlánszájhoz hasonló, kétajkú formájúak, jellegzetes sarkantyúval. A 'Neon Lights' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok rendkívül változatos színkombinációja: a színskála a lilától a bíboron, piroson, narancssárgán, sárgán és fehéren át a rózsaszínig terjed, a virágok gyakran kéttónusúak, például bíbor/lila, sárga/narancs vagy fehér/piros kombinációkban. A virágzási időszak a késő tavasztól a nyár közepéig tart: Magyarországon jellemzően májustól augusztusig, a legbőségesebb virágzás június-júliusban figyelhető meg. A növény már az első évben virágzik. A virágok a méheket, a poszméheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded toktermeséket fejleszt. A magok vese alakúak, sötétbarnák vagy feketék, szárnyas szélűek. A növény magról és vegetatív úton (tősztással, dugványozással) egyaránt szaporítható. A magokat tavasszal, hideg keretben vetjük el.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A gyújtoványfű 'Neon Lights' napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. Délre vagy nyugatra fekvő, védett vagy széltől kitett hely egyaránt megfelelő.

Talaj: A gyújtoványfű 'Neon Lights' nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, köves, sziklás talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A gyújtoványfű 'Neon Lights' szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első néhány hetében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A gyújtoványfű 'Neon Lights' alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában adható egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágya. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők.

Metszés és ápolás: A gyújtoványfű 'Neon Lights' alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzás után a növényt érdemes visszavágni, hogy megakadályozzuk a túlzott magképzést és az önvetést. A virágzási időszak végén a növényt visszavághatjuk a talajszinttől számított 5-10 cm-es magasságúra. A növény 3-4 évente történő tősztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését és a virágzás gyengülését.

Telelés és fagytűrés: A gyújtoványfű 'Neon Lights' kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett példányok akár -25°C és -30°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A gyújtoványfű 'Neon Lights' a változatos, élénk színű virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának, szárazságtűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb sziklakereti évelő:

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény. Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret miatt kiválóan nevelhető konténerben is. Természetes hatású kertekbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat. Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a pillangók, méhek és más beporzók számára. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A gyújtóványfű 'Neon Lights' változatos színű virágai és szürkészöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók: Ezüstös levelű növényekkel: Bárányfül (Stachys byzantina), üröm (Artemisia) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik az élénk virágokat. Törpe nőszirommal (Iris pumila) – a nőszirom virágai és a gyújtóványfű színkavalkádja együttesen változatos, színpompás hatást keltenek. Varjúhájakkal (Sedum) – a pozsgás varjúhájak jól társíthatók a hasonló szárazságtűrésű gyújtóványfűvel. Sárga virágú évelőkkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis grandiflora) – a sárga és a többi élénk szín vidám, napsütötte hatást keltenek. Díszfüvekkel: Árvalányhaj (Stipa), tollbuga (Pennisetum) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a gyújtóványfű tömöttebb, bokros formáját. USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a gyújtóványfű 'Neon Lights' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -25°C és -30°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
New Hybrids kínai virágosnád	**Miscanthus sinensis 'New Hybrids'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kínai virágosnád 'New Hybrids' (Miscanthus sinensis 'New Hybrids') – A változatos színű, elegáns díszfű

A kínai virágosnád 'New Hybrids' a perjefélék (Poaceae) családjába tartozó, Kelet-Ázsiából (Kína, Japán, Korea) származó, évelő díszfű. A faj a magyar szakirodalomban több néven is ismert: kínai virágosnád, japánfű vagy kínai nád néven is említik. Ez a díszfű a nyár végétől az őszig tartó időszakban nyíló, látványos tollvirágzataival és elegáns habitusával az egyik legkedveltebb díszfű a kertekben és parkokban. A könnyű gondozhatósága, a változatos színvilága és a téli szerkezetet adó megjelenése miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kínai virágosnád 'New Hybrids' egy erőteljes növekedésű, ívesen hajló, szökőkútszerű bokrot alkotó, lombhullató évelő fű. Kifejlett magassága 150-250 cm, szélessége 90-120 cm között alakul . A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások ívesen hajlanak lefelé, ami a fűnek elegáns, leomló megjelenést kölcsönöz.

A levelek keskenyek, szálasak, mélyzöld színűek, a növény sűrű, bokros lombozatát alkotják, amely egész szezonban dekoratív. Ősszel a levelek aranysárgára vagy bronzos-barnás árnyalatokra színeződnek .

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a tollvirágzatok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-30 cm hosszú, tollas, legyezőszerű bugák, amelyek a nyár végén (szeptember-október) jelennek meg . A 'New Hybrids' keverék legkiemelkedőbb tulajdonsága a tollvirágzatok változatos színvilága: a fajtakeverékben megtalálhatók az ezüstös-krémszínű, a lazac- vagy rózsaszín, valamint a rozsdavörös árnyalatú tollazatok is . A tollak a téli hónapokban is a növényen maradnak, és a kert szerkezeti elemeiként szolgálnak, különösen a téli napfényben . A virágok a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, száraz magokat fejleszt. A növény magról szaporítható; a magokat a fagyok elmúltával (májustól) közvetlenül a szabadba vethetjük, vagy beltérben, meleg helyen (16-24°C) neveljük a palántákat. Fontos tudni, hogy a magból nevelt növények változatos tulajdonságokat mutathatnak; a fajták vegetatív úton (tőosztással) is szaporíthatók a fajtajellemzők megtartása érdekében.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kínai virágosnád 'New Hybrids' napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legbőségesebb virágzást napos, szellős fekvésben hozza . A napi minimum 4-6 óra közvetlen napsütés az optimális.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, közepesen nedves, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát . A pangó vizet nem tolerálja, de a szárazságot a begyökeresedés után jól tűri.

Öntözés: A kínai virágosnád 'New Hybrids' közepes vízigényű; a fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövidebb szárazságot is elviselik, de a legszebb növekedést a rendszeres öntözés biztosítja.

Tápanyag-utánpótlás: A növény közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adható egy kevés lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágya.

Metszés és ápolás: A kínai virágosnád 'New Hybrids' metszése fontos a növény egészsége és a rendezett megjelenés szempontjából. A metszést kora tavasszal (február-március), az új hajtások megjelenése előtt kell elvégezni. Vágjuk vissza a régi, elszáradt szárakat és tollakat a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. A tollak télikert esztétikai értékük miatt csak tavasszal vágandók vissza. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal javasolt.

Telelés és fagytűrés: A kínai virágosnád 'New Hybrids' kifejezetten kiváló télállóságú; az USDA 4-9-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Kártevők és betegségek: A kínai virágosnád 'New Hybrids' általában ellenálló, és a szarvasok sem kedvelik. Ritkán előfordulhat:

Levéltetvek és takácsatkák: Ritkán, száraz körülmények között jelenhetnek meg; ellenük erős vízsugár vagy rovarölő szappan használható.

Gyökérrothadás: A pangó vizes, nehéz, agyagos talajokon alakul ki. Megelőzés: jó vízelvezetésű talaj, túlöntözés kerülése.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A kínai virágosnád 'New Hybrids' a látványos tollvirágzatának, elegáns habitusának, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb díszfű a kertekben és parkokban: Szoliter növényként – a szökőkútszerű habitus és a látványos tollazat miatt kiváló magányos díszelem. Csoportos ültetésbe, tömeges telepítésbe – 3-5 példány együttes ültetése látványos, színpompás hatást kelt. Szegélyágyások hátsó részébe – a 150-250 cm-es magasság miatt kiváló háttérnövény. Tópartokra, vízközelbe – a nedves talajt jól tűri. Vágott virágnak – a tollvirágzatok frissen és szárítva egyaránt felhasználhatók csokrokban és virágkötészeti alkotásokban. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A kínai virágosnád 'New Hybrids' tollvirágzata és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, közepesen nedves talajú) növénnyel kombinálhatók: Évelőkkel: Kasvirág (Echinacea), őszirózsa (Aster), napvirág (Heliopsis) – a virágok és a díszfű együttesen gazdag, nyárias és őszi hatást keltenek. Más díszfüvekkel: Tollbuga (Pennisetum), árvalányhaj (Stipa) – a különböző textúrájú és habitusú füvek egymás mellett változatos, színpompás hatást keltenek. Lila virágú évelőkkel: Levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta) – a lila és az ezüstös szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak. USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a kínai virágosnád 'New Hybrids' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -34°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Novita babérmeggy (kicsi)	**Prunus laurocerasus 'Novita'**	2 950 Ft	2 950 Ft
Novita babérmeggy (nagy)	**Prunus laurocerasus 'Novita'**	4 250 Ft	4 250 Ft
Nyúlszapuka	**Anthyllis vulneraria var. coccinea**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A nyúlszapuka változata a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó, Európában, Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában honos növény, amely a száraz gyepek, sziklás lejtők, homokpuszták, valamint a meszes sziklafalak és a tengerparti rétek lakója. A fajt a 16. század óta gyógynövényként is ismerik Európában. A 'Rubra' változatot a hagyományos sárga virágú nyúlszapukával szemben a feltűnő, skarlátvörös virágszíne teszi különlegessé a kertekben.
Külső megjelenés
A nyúlszapuka alacsony, tőlevélrózsás növekedésű, de a virágzat magasabb lehet. Kifejlett magassága a virágzat nélkül 15-25 cm, a virágzati szárakkal együtt akár 40-60 cm, szélessége a terjedő hajtásokkal 30-50 cm között alakul. A növény lassú növekedésű, de idővel sűrű, párnás telepeket képezhet.
A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a lombozat. A levelek páratlanul szárnyaltak (szárnyasan összetettek), 5-11 darab, tojásdad vagy lándzsás levélkéből állnak. A levelek mindkét oldalát sűrű, fehér vagy szürkés, finom szőr borítja (sericeous), ami a növénynek puha, bársonyos tapintást és ezüstszürke, nemezes megjelenést kölcsönöz. A tőlevélrózsa (a tövénél található levélcsokor) levelei szélesebbek, a szárlevelek kisebbek, lándzsás alakúak. A növény alacsony, feltörekvő (decumbent to ascending) vagy elfekvő hajtású.
A növény legnagyobb dísze a virágzat. A virágok aprók (1-1,5 cm hosszúak), borsóvirágszerűek (pillangós virágok), a szárak csúcsán 2-5 cm átmérőjű, tömör, gömb vagy félgömb alakú fejecskékbe tömörülnek (sűrű, fürtös virágzat). A 'Rubra' változat virágainak színe a nyíláskor élénk vörös, skarlátvörös (scarlet) vagy vöröses-narancs (red-orange). A virágok a kocsány végén helyezkednek el, és a virágzat tövénél gyakran feltűnő, szőrös fellevelek találhatók. A virágok a méheket, a pillangókat és a legyeket vonzzák.
Virágzás
A nyúlszapuka 'Rubra' virágzási ideje a tavasz végétől a nyár végéig, nyár közepéig tart: májustól augusztusig (szeptemberig) nyílik, a virágzási időszak a második évben kezdődik. A virágzatot követően a növény apró, szőrös hüvelyterméseket (kasztokat) fejleszt.
Terjedés, növekedési erély
A növény a gyökérsarjakkal (sztólonokkal) lassan terjed, valamint a magokat is termel, és a kert más részeire is eljuthatnak, de nem számít inváziósnak. A magról való szaporítás a legegyszerűbb.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, sziklakerti fekvésű helyet igényel. A legdúsabb, legszebb lombozatot és a legbőségesebb virágzást teljes napfényben hozza. Félárnyékban a levelek elveszíthetik intenzív ezüstszürke színüket, a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, laza, homokos vagy kavicsos, meszes, tápanyagszegény talajban érzi magát. A pH tekintetében toleráns: a savanyútól a lúgos (meszes) talajokig is megél. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri. Kifejezetten előnyös a tápanyagszegény, száraz talaj, mert ott a legszebb a lombozat ezüstszürke színe és a legtömöttebb a növekedés.

Öntözés: Kimondottan szárazságtűrő. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést nem igényelnek, a természetes csapadék is elegendő számukra. A túlöntözés a leggyakoribb hiba, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: Kifejezetten alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor ne keverjünk komposztot a talajhoz, és a későbbiekben se trágyázzuk. A túlzott tápanyag (különösen a nitrogén) a lombozat kárára megy: a növény elveszíti kompakt formáját, a szárai megnyúlnak, a lombozat színe elveszíti ezüstös színét.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést. Az elvirágzott szárakat a virágzás után (nyár végén) érdemes visszavágni, hogy a növény ne a magképzésre, hanem az új lombozat és a következő évi virágbimbók fejlesztésére koncentráljon.

Szaporítás: A növényt magról (ősszel vagy tavasszal), félfás dugványozással (nyár végén) vagy tőosztással (kora tavasszal) lehet szaporítani.

Telelés: Kimondottan télálló. USDA besorolása Z5-Z9 (egyes források szerint 4-9 vagy akár 3-ig is), így Magyarország egész területén gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel. A növény a téli hidegben is megőrizheti a lombozatát (örökzöld), de a nagyon zord, hótalan teleken a levelek megfagyhatnak, de a növény a gyökérzettől tavasszal újrahajt.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, kártevők és betegségek nem támadják. A szarvasok és nyulak kerülik.

Felhasználás a kertben
A nyúlszapuka 'Rubra' a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Sziklakertekbe, kőkertekbe, sziklaüledékekre, kavicsos kertekbe – eredeti élőhelyét idézi			
Szegélyágyásokba, törpe kerti ágyásokba, évelőágyások előterébe – alacsony termete miatt ideális			
Talajtakarónak – nagyobb felületek beborítására, ahol megakadályozza a gyomok növekedését			
Zöldtetőkre – sekély gyökérzete és szárazságtűrése miatt kiváló			
Tömeges csoportos ültetésre – a virágok egységes, vörös színfoltot alkotnak			
Konténeres teraszokra, erkélyekre – a növény a cserepekben is jól érzi magát, de a cserépnek jó vízelvezetésűnek kell lennie			
Vadvirágos, természetes hatású kertekbe – a virágok vonzzák a beporzó rovarokat			
Változatos növénytársítások A nyúlszapuka 'Rubra' vörös virágai és ezüstszürke lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló igényű növényekkel:			
Alacsony tűlevelűekkel: Törpe boróka, törpefenyő – a sötétzöld szín és az ezüstös szürke kontrasztot alkot			
Pozsgásokkal: Varjúháj fajták, kövirózsa – a pozsgások szintén szárazságtűrők, és szép textúrát adnak a kompozíciónak			
Kakukkfűvel, kék csenkesszel – a különböző zöld és szürke árnyalatok harmonikus egységet alkotnak			
Alacsony harangvirágokkal – a kék-lila harangvirágok a vörössel harmonikus, elegáns párost alkotnak			
Gyöngyvirág, árnyékliliom – a részleges árnyékban a növény alatti talajtakaróként szolgálhatnak			
USDA besorolása: 5-9 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban a növény teljesen téli álló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is biztonságosan nevelhető).			
Obsidian tűzeső	**Heuchera hybrida 'Obsidian'**	3 350 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az 'Obsidian' tűzeső rendkívül vonzó dísznövény, amely a lombozatának sötét színével és elegáns megjelenésével bűvöli el a kert szerelmeseit. Ez a hibrid növény a Heuchera nemzetségbe tartozik, amely híres a változatos színű és textúrájú leveleiről. Az 'Obsidian' a nevét a lombozatának sötét, bársonyos-fekete színéről kapta. A levelek ovális vagy szív alakúak, és a növényen kompakt rozetta formájában nőnek. A sötét színű levelek gyönyörűen kontrasztot alkotnak a környező növényekkel és a kerti tájakkal, és a növényt egyedivé és elegánssá teszik. Az 'Obsidian' közepes méretű bokrot alkot, amely tökéletesen illeszkedik kerti ágyásokba, sziklakertekbe vagy konténerekbe. Bár a 'Obsidian' virágai kisebbek és kevésbé feltűnőek, a lombozatával valóban kimagasló a kertben. A virágok általában rózsaszín vagy fehér árnyalatúak, és a nyári hónapokban jelennek meg. Az 'Obsidian' virágzása idején vonzza a méheket és a pillangókat, hozzájárulva a kert ökoszisztémájához. A Heuchera hybrida 'Obsidian' könnyen gondozható növény, amely a részleges árnyékot vagy a félárnyékot kedveli. A talajnak jól kell vízelvezetettnek lennie, és a növény igényli a rendszeres öntözést, különösen a szárazabb időszakokban. A 'Obsidian' ellenálló és télálló, és hosszú élettartammal rendelkezik, így hosszan élvezhető a kertben. Ez a növény kiválóan kombinálható más dísznövényekkel és színárnyalatokkal. Az 'Obsidian' sötét lombozata remek kontrasztot hoz létre a világosabb színű növényekkel, például a tarka levelű Hostákkal vagy a színes virágokkal. Az elegáns megjelenése miatt a 'Obsidian' szoliter növényként is szépen mutat a kertben. Kitűnően alkalmazkodik a különböző környezeti feltételekhez. Tolerálja a részleges árnyékot és a naposabb területeket is, így széles körben felhasználható a kert tervezésében. Az 'Obsidian' szereti a jó vízelvezetéssel rendelkező talajt, amely enyhén savas vagy semleges pH-értékű. Fontos, hogy a talaj nedvessége megfelelő legyen, de ne legyen túl nedves, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. Különleges megjelenése miatt remekül kombinálható más dísznövényekkel. Próbálja párosítani világosabb színű növényekkel, például fehér virágokkal vagy ezüstszínű levelekkel, hogy kiemelje a 'Obsidian' kontrasztját és eleganciáját. Készítsen kertkompozíciókat, ahol az 'Obsidian' a központi fókuszpont, és körülötte más színű és formájú növények alkotnak egy harmonikus egészet. Az 'Obsidian' egész évben díszítőelem a kertben. A sötét színű levelek állandóan jelen vannak, így nemcsak a virágzás idején, hanem az egész szezonban lenyűgöző látványt nyújtanak. Ezzel a növénnyel a kert mindig elegáns és stílusos lesz.

Olasz nyúlfarkfű	**Sesleria nitida**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az olasz nyúlfarkfű (Sesleria nitida) Közép-Olaszország és Szicília hegyvidékeiről származó, sűrű, párnás, kompakt tövet képező, örökzöld évelő díszfű. Kifejlett magassága a lombozattal általában 20–50 cm, virágzáskor a kalászokkal együtt elérheti a 60–80 cm-t; szélessége 30–50 cm között alakul. Levelei keskenyek, sűrűn állók, szürkéskék–ezüstkék színűek, fonákjuk sötétebb, és a tövüknél sűrű, tömött párnát alkotnak. Tavasszal (márciustól májusig) rövid, tömött, kezdetben feketés-barna, majd kifakuló kalászvirágzatokat hoz, amelyek finoman kiemelkednek a lomb fölé. A növény habitusa rendezett, kompakt, így kiválóan alkalmas szegélyek kialakítására és konténeres termesztésre is.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a félárnyékot is elviseli, de a legszebb lombszínt és a legbőségesebb virágzást napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár szegényes, köves, homokos vagy meszes talajt kedvel; a pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson érzi jól magát, de a savasabb talajt is elviseli.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, az USDA 4–9. zónában tartható hosszú távon. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: A régi, elszáradt leveleket és a elvirágzott kalászokat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt távolítsa el a tövek tövéről. Erős visszavágást általában nem igényel.

Átteleltetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a verticilliumos hervadásra is ellenálló.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, mediterrán hatású ágyásokba, préri stílusú ültetésekbe, valamint modern, alacsony fenntartású kertekbe illik. Kompakt mérete miatt kiváló szegélynövényként utak mentén, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókban is. Finom textúrájú lombozata szép kontrasztot ad a nagyobb levelű évelők mellett, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét.
Növénytársítások

Évelők: varfű, cickafark, zsálya, naprózsa – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a nyúlfarkfüvet.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Illatos és fűszeres növények: levendula, kakukkfű, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-9.

Olasz szalmagyopár, curryfű	Helichrysum italicum	2 450 Ft	2 450 Ft

Az Olasz szalmagyopár (Helichrysum italicum), közismert nevén curryfű, egy alacsony, 30-50 cm magasra növő évelő cserje, amely sűrűn elágazik. Az érdes, keskeny levelek ezüstös árnyalatúak, és intenzív aromájuk miatt népszerű fűszer- és gyógynövény. Nyáron hozzák érdekfeszítő, élénk sárga virágaikat, amelyek szárítva is megőrzik szépségüket. Az Olasz szalmagyopár hőség- és aszálytűrő, alacsony vízigényű, így kiválóan alkalmazkodik a mediterrán klímához. Használható mind dísznövényként, mind fűszerként különféle ételek ízesítésére.
Gondozási útmutató
Az Olasz szalmagyopár gondozása egyszerű, de néhány lépést érdemes követni:

Öntözés: Csak száraz időben szükséges öntözni, a túlzott víz kedvezőtlen a számára.
Talaj: A legjobban a jó vízelvezető, homokos vagy vályogos talajban fejlődik.
Metszés: A virágzás után javasolt a visszametszés, hogy serkenthesse az új hajtások növekedését és a növény formáját.
Napsütés: A teljes napsütést kedveli, így napos helyen ültessük.

Ültetési javaslat
Az Olasz szalmagyopár ültetésekor napos, meleg helyet válasszunk, ahol a talaj jó vízelvezető képességgel rendelkezik. A legjobb ültetési idő a tavasz vagy kora nyár és az ősz. Az ültetési gödröt kétszer akkora méretűre ássuk, mint a gyökérlabda, és ültetés után bőségesen öntözzük meg. A növények között biztosítsunk elegendő helyet a légáramlás számára, ami elősegíti a szép fejlődést.

Oregoni varjúháj	Sedum oreganum	1 950 Ft	1 950 Ft

Az Oregoni varjúháj a teljes napfénytől az enyhe félárnyékig terjedő környezetben jól fejlődik. Minél több napfényt kap, annál erősebben fejlődik, és az élénk színű virágok is jobban kihangsúlyozódnak. Általában 15-30 centiméter magasra nő megfelelő gondozás mellett. Könnyen gondozható és dekoratív növény, sziklakertekbe, szegélyekbe, támfalakba vagy zöldtetőkre ajánljuk.
Gondozási útmutató:

Fény és elhelyezés: Helyezzük a növényt olyan területre, ahol naponta legalább 6-8 óra napfény éri. A délelőtti napfény általában különösen jót tesz ennek a növénynek.

Öntözés: Az Oregoni varjúháj nem igényel túlzott öntözést. A szárazság és a jó vízelvezetés segít a gyökerek fejlődésében.

Talaj: A növény kedveli a jó vízelvezetésű, homokos vagy kavicsos talajt. A talajbanak laza és jól szellőzőnek kell lennie.

Tápoldat: Az Oregoni varjúháj általában nem igényel különösebb tápoldatozást.

Metszés: A növény metszése ritkán szükséges, de ha sérült vagy elszáradt részeket érdemes eltávolítani a rendezett megjelenés és az egészséges növekedés érdekében.

Óriás árvalányhaj	Stipa gigantea	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az óriás árvalányhaj (Stipa gigantea) Dél-Európából és Nyugat-Ázsiából származó, örökzöld, sűrű tövet képező díszfű. Kifejlett magassága virágzáskor általában 1,5–2,5 méter, szélessége 0,5–1 méter között alakul; a levélcsomó maga mindössze 60–80 cm magas, így a növény látványos kontrasztot alkot az alacsony lombozat és a magasba törő virágzat között. Levelei keskenyek, szalagszerűek, ívesen széthajlók, szürkészöldek, és télen is részben megmaradnak. Virágzata laza, tollas buga, amely júniustól augusztusig nyílik; a virágok eleinte ibolyás árnyalatúak, majd aranysárgára érnek, és a fényben visszafénylenek. A virágzatok a nyár végén és ősszel is díszítőértékűek maradnak, és kiválóan alkalmasak vágott, illetve szárított virágnak. A növény habitusa merev, felálló, a virágzatok súlya alatt enyhén ívesen lehajló.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos fekvésben hozza a legtöbb virágot és a legmerevebb szárakat.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz, homokos, kavicsos vagy meszes talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, -15 és -20 °C közötti hőmérsékletet visel el. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság legalább 1 méter legyen, hogy a légies virágzatok érvényesüljenek.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is megél; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és megdőlését okozhatja.

Metszés: A régi lombozatot és az elvirágzott szárakat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz részek a növényen maradhatnak. A fiatal vagy legyengült töveket óvatosan metssze, mert a túl erős visszavágás károsíthatja őket.

Átteleltetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább szoliterként, modern és minimalista kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, kavics- és sziklakertbe, valamint természetközeli kompozíciókba illik. Kiváló függőleges akcentusként működik a kertben, és a hátsó napfényben visszafénylő virágzata különösen látványos. Alacsony levelű évelők fölé ültetve érvényesül igazán, de konténerben és teraszon is nevelhető. Kiváló vágott és szárított virág.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Évelők: cickafark, zsálya, sarkantyúvirág, kúpvirág, naprózsa, varjúháj – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki az óriás árvalányhajat.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 7-10 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában téli takarással tartható megbízhatóan).

Orvosi lestyán	**Levisticum officinale**	1 950 Ft	1 950 Ft

Az orvosi lestyán (Levisticum officinalis) inkább konyhakeri fűszernövény, mint dísznövény, annk viszont nagyon hasznos. Ha be tudjuk terelni valamilyen sarki részre, ahol könnyebben tudjuk kontrolálni a terjeszkedését, magas, érdekes struktúrájú növény fejlődik belőle, melyet a méhek szívesen látogatnak. Más nagyobb termetű fűszernövények közé bátran telepíthető azzal, hogy a lestyánnak nagyobb valamivel a vízigénye, mint mondjuk, egy rozmaringnak.

Orvosi zsálya	**Salvia officinalis**	1 950 Ft	2 450 Ft

Mediterrán származású, évelő félcserje, hosszúkás, ezüstös színű, illatos, aromás ízű levelekkel, melyek fűszerként is kedveltek, de fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyógynövényként is használhatók. Lilás-kékes virágai hosszú szárakon nyílnak júniusban. A Salvia officinalis, más néven Orvosi zsálya örökzöld növény és népszerű gyógynövény, amelyet évszázadok óta használnak kulináris, orvosi és dekoratív célokra. A Salvia officinalis a lamiaceae (árvacsalánfélék) családjába tartozik, és számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Első pillantásra az Orvosi zsálya lenyűgözi az embert gyönyörű megjelenésével. A lombozata sűrű, szürke-zöld színű és finom szőrszerű bevonattal rendelkezik, ami nagyszerű textúrát és látványt kölcsönöz a kertnek vagy a terasznak. A növény magassága általában 30-60 centiméter között változik, és kis lila vagy kékes-lila virágokat hoz, amelyek szintén vonzók. Az Orvosi zsálya nem csak szép, hanem jellegzetes ízével és illatával is kitűnik. A levelek aromások, erőteljes illatúak és enyhén keserű ízűek. A főzés során a zsályalevelek felhasználhatók számos ételben, például levesekben, szószokban, süteményekben és húsok fűszerezésére. Emellett a zsálya tea formájában is élvezhető, amely kellemes és élénkítő ital. Az Orvosi zsálya hosszú történelme van a gyógyászatban is. A növényben található hatóanyagoknak antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságai vannak. Ezért a zsálya gyakran használják torokgyulladás, torokfájás vagy szájüregi problémák kezelésére. A tea vagy kivonat formájában fogyasztva a Salvia officinalis enyhítheti az emésztési problémákat és csökkentheti a menopauza tüneteit is. Emellett az Orvosi zsálya kiváló választás lehet a kertészek és tájkertészek számára is. A növény könnyen nevelhető, és számos környezeti feltételnek megfelel. Jól tűri a napos vagy félárnyékos helyeket és a jó vízelvezetésű talajt. A zsályákat 1-2 évente vágjuk vissza. A Salvia officinalis hosszú életű és ellenálló növény, amely kevés gondozást igényel. Kiválóan alkalmazkodik a szárazsághoz és a meleg klímához, így ideális választás lehet a napos sziklakertekben, virágágyásokban, hétvégi telkeken vagy ott, ahol a vízforrás korlátozott. Ezenkívül vonzza a méheket, pillangókat és más hasznos rovarokat, ami segít a kert ökoszisztémájának fenntartásában és a beporzásban. Válassza a Salvia officinalist, és élvezze annak változatos előnyeit és szépségét, ami garantáltan színesíti környezetét és gazdagítja az életterét.

Őszi gyeptrágya 25 kg	**NPK gyeptrágya 6+5+12 kénnel és vassal**	24 299 Ft	30 799 Ft

TERMÉKLEÍRÁSValamennyi sport- és díszpázsit-felülethez. A nyári időszak során fellépő stressz után regenerálja a gyepet.A magas káliumtartalom erősíti a sejtfalakat és csökkenti az elfagyás és a betegségek kockázatát.A magas vastartalom biztosítja a gyep zöldebb színét és visszaszorítja a mohát.Az őszi gyeptrágya elősegíti az áttelelést és a tavaszi egészséges növekedéshez szükséges anyagok elraktározását.A gyeptrágya vízoldékonysága kiváló.A finom szemcséjű gyeptrágya akár kézzel, akár szóró berendezéssel tisztán, porképződés nélkül kiszórható.FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁSSzeptembertől október végéig kijuttatható. A fűnyírást követő 1-2 nap múlva szórja a száraz gyepre, ha nedves gyepre szórja, vagy hosszabb szárazság esetén végezzen utána alapos öntözést. A rendszeres öntözés biztosítja a fű egyenletes növekedését. Tavasszal végezzen további tápanyag-utánpótlást. Javasolt felhasználási mennyiség: Adagolás: 35 g/m², intenzíven használt gyepfelületek esetén 40-50 g/m². Hatás: gyors Tárolási útmutató:Száraz helyen és a napfénytől védve tárolja. A bontott csomagolást szorosan zárja vissza. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A gyeptrágyát a szennyvízbe vagy nyíltvízbe engedni tilos. A padlóburkolattal (járólapok, fa padlók) vagy ruhával érintkezve foltosodást okozhat. A padlóburkolatra (járólap, fapadló, stb.) került terméket haladéktalanul távolítsa el. Ugyanez vonatkozik a cipőre vagy a háziállatokra tapadt maradékokra is.ALKALMAZÁSI IDŐSZAK: szeptember - október

Őszi nyulfarkfű	**Sesleria autumnalis**	1 950 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az őszi nyúlfarkfű (Sesleria autumnalis) 30-40cm magasra megnövő, világoszöld árnyalatú levelekkel rendelkező díszfű. Levelei lágyan, ívesen széthajlanak, ezzel díszít. Talajok között nem válogat, átlagos víz, és tápanyagigényű, nem tartózik a jó szárazságtűrők közé, ezért sziklakertekbe nem javasoljuk, viszont megbízhatóan fagytűrő. Virágai nyár végén nyílnak de jelentéktelenek, nem különösebben díszítenek.
Fényigény: napos, félárnyékos
Vízigény: átlagos
Talajigény: átlagos, nem kötött
Fagytűrés: jó fagytűrő
Virágzás: nyár vége, ősz eleje
Díszítő érték: leveleivel díszít
Felhasználás: vegyes virágágyakba, nagyobb foltokba telepítve

Őszi zsálya	**Salvia microphylla**	2 950 Ft	3 350 Ft

Az őszi zsálya nevével ellentétben egész nyáron, és ősszel virágzik. A növény virágai piros színben pompáznak. A növény töve kissé fásodik, alul tömöttebb, felül légiesebb koronát nevel. A bokor kifejlett mérete egy kb. 80 cm átmérőjű gömbbe foglalható. Napos, meleg fekvésű jó vízelvezetésű talajba ültessük, ősszel vágjuk vissza, majd tövét takarjuk. Csodás és hálás növény, melynek sok meleg fekvésű kertben meg lehet találni a helyét. Talajigényei alacsonyak, az agyagos kötött nedves talajokon kívül mindet elvisel. Ha meleg dél kitettségben van, akkor akár végig virágozza a telet is. USDA zóna: 7a-10b

Oszlopos arizóna ciprus (nagy)	**Cupressus arizonica 'Fastigiata'**	14 500 Ft	14 500 Ft
Oszlopos tiszafa (nagyobb)	**Taxus baccata 'Fastigiata'**	6 950 Ft	7 250 Ft
Palmer agávé	**Agave palmeri**	3 950 Ft	4 350 Ft

Az Agave palmeri mediterrán eredetű, Egyesült Államokban, Arizona déli részén, Új-Mexikó délnyugati részén őshonos növény. Impozáns méreteivel, akár 90-120 cm-es vastag, húsos, lándzsa alakú, kékes zöld leveleivel hívja fel magára a figyelmet. A növény egyszer virágzik 5-20 éves távlatban, majd elpusztul. A virágzás nyári időszakban következik be, amikor magas 4-5 méteres száron halvány sárga - zöld virágokból álló gyönyörű virágzatot fejleszt. A növény jól tolerálja a hideget, -10 C fokot is elvisel, így hazánkban melegebb kiegyenlítettebb klímájú tájain védett, napos helyekre, épületek takarásába, vagy akár városi hőszigetekbe nyugodtan ültethető. A növény igazán szárazságtűrő, az öntözés tekintetében tehát óvatosan kell eljárni. Már az ültetésnél gondolni kell a jó vízáteresztő talajkeverék összeállítására. Sziklakerteknél is érdemes kicserálni a talajt, különösen az agyagos, kötött, nagy víztartó képességű talajféleségektől kell óvjakodni. Az öntözésnél ritkán, de akkor nagyobb vízmennyiséget kell kijuttatni. Az edényben nevelt növények földlabdáját alaposan át kell nedvesíteni, majd hagyni kifolyni belőle a fölösleges mennyiségű vizet. Nagy hellyel rendelkező gyűjtőknek, ill. különlegességeket kedvelők számára szolter növényként, sziklakertekbe, védett helyeken lévő, növénykazettákba, nagy edényekbe ajánljuk. Legjobban más sziklakerti évelőkkel, vagy apró bőrszerű levelekkel rendelkező egyéb mediterrán növényekkel társítható. 9a USDA-zóna

Pampafű	**Cortaderia selloana**	4 950 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A pampafű (Cortaderia selloana) dél-amerikai eredetű, üde zöld levelei és óriási ezüstfehér bugái miatt kedvelt kerti és parknövény. Teljes napsütésben, homokos vagy laza talajban érzi jól magát, de rövid időre elviseli a szárazságot is. Tavasszal vágjuk vissza a száraz leveleket és bugákat, hogy új hajtásokat ösztönözzünk. Téli védelmet csak fiatal egyedeknél alkalmazzuk. A faj (selloana) névadója Friedrich Sello, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A díszfüvek legimpozánsabbika! 2-3 méteres magasságot is elérő hatalmas, méltóságteljes, szökőkútszerűen visszahajló, szálas levelek nagy tömegéből álló telepeiből nyár végén, vagy ősszel emelkednek ki hatalmas fehér bugavirágzatai. A túl sok téli csapadékra érzékeny, ezért ügyeljünk rá, hogy töve körül ne legyen pangó víz. Szabad térállásba, például pázsitba ültetve az egyik legszebb kerti dísz!
Megjelenés és jellemzők

Magasság: 2-3 méter magasra nő, bugavirágzata akár 1 méter hosszú is lehet.

Virágzás: Szeptembertől novemberig nyújt látványos, ezüstös vagy krémszínű bugákat, amelyek szélben elegánsan lengenek.

Levelek: Hosszú, íves, szürkészöld levelei éles szélűek – gyerekek és háziállatok közelében ültetéskor óvatosság javasolt.

Ültetési javaslatok

Hely: Teljes napsütés – a napfényes helyen a virágzás a legbővébb.

Talaj: Jó vízelvezetésű, szárazabb talajt részesíti előnyben. Ne ültesse vízgyűjtő területekre vagy agyagos talajba.

Térköz: Szoliterként vagy csoportos ültetésben is díszít. Távolságtartás javasolt (legalább 2 méter más növényektől vagy épületektől).

Gondozás

Vágás: Tavasszal (március-április) vágja vissza a száraz hajtásokat 10-15 cm magasságra.

Öntözés: Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, érett korban szárazságtűrő.

Téli védelem: Fagyos területeken téli mulcsozás (szalma, levelek) javasolt a gyökérzet védelmére.

Invázió ellen: A magvak könnyen terjednek – távolítsa el a virágzatokat a magképződés előtt, ha nem szeretné, hogy elszaporodjon.

Fontos tudnivalók

Biztonság: Éles levelei miatt ültetéskor kerülje a járdák, játszóterek közvetlen közelét.

Díszítő használat: Virágzata kiváló száraz virágkötéshez, de vágáskor használjon kesztyűt!
Ötletek a kerthez

Hangsúlyozza a térhatásokat: Ültesse medencék mellé vagy vízparti területekre, ahol tükröződő fényben csillog.

Modern kertészet: Kombinálja alacsony örökzöldekkel (pl. Buxus) vagy rozsdás tárgyakkal ipari stílusú kertben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Magányos szépség: Szoliterként ültetve kiemelkedő központi elem lesz. Treemail Kertészet ajánlja: A pampafű tökéletes választás mediterrán vagy egzotikus hangulatú kertjeihez, de gondoskodjon a terjedésének megfékezéséről! 8a-9b USDA-zóna			
Pampafű nagyobb		3 950 Ft	3 950 Ft
Paprika cickafark	**Achillea millefolium 'Paprika'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Paprika cickafark (Achillea millefolium 'Paprika') – élénkpiros virágú, szárazságtűrő évelő, méh- és pillangóbarát növény. Tökéletes napos kertekbe, virágágyásokba és sziklakertekbe. Begyökeresedett konténeres növény, egész évben ültethető! Külső jellemzők és helyigény Virágzás: Június-szeptember között nyílik, élénkpiros virágai sárga központtal. Levelek: Szürkészöld, finoman osztott, aromás. Magasság: 60-80 cm, tömör, felálló habitussal. Helyigény: Teljes napfényt igényel, de elviseli a félárnyékot is. Talajra nem válogatós, de a jól vízáteresztő, szárazságtűrő talajt részesíti előnyben. Gondozás Öntözés: Mérsékelt vízigényű, fiatal növényeknél a talajt nedvesen tartjuk, de túlöntözést kerüljük. Metszés: Tavasszal visszavágjuk, és a hervadt virágzatokat eltávolítjuk a folyamatos virágzás érdekében. Tápanyag: Alacsony igényű, de tavaszi komposztálás előnyös. Ültetési javaslatok Társítás: Kiválóan harmonizál más szárazságtűrő növényekkel, mint a fűszeres kakukkfű (Thymus), lángvirág (Phlox subulata) vagy kasvirágokkal. Kertstílus: Mediterrán, természetes hangulatú, sziklás vagy prérijellegű kertekbe illik legjobban. Felhasználás: Vágott virágként is tartós, dekoratív a váza számára. Konténeres növény előnyei Egész évben ültethető, mivel jól begyökeresedett, stressztűrő. Könnyen áttelel, fagytűrő (USDA 3-9 zóna). Környezetbarát választás, mert támogatja a beporzó rovarok populációját. Válassza a Treemail megbízható szállítását, és hozza életre kertjét ezzel a lenyűgöző növénnyel! További évelők itt találhatóak!			
Parkékszer borbolya (kicsi)	**Berberis media 'Parkjuweel'**	2 450 Ft	2 450 Ft
Patriot árnyékliliom	**Hosta Patriot**	3 990 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Patriot árnyékliliom látványos, fehér szegélyű sötétzöld leveleivel és levendulaszínű virágaival varázslatos textúrát teremt! Télálló, alacsony igényű, konténeres példányaink egész évben ültethetők. Ideális társnövény árnyékos kertekhez.
Főbb jellemzők

Levelek: Sötétzöld alapszínű, széles fehér szegéllyel, szív alakúak és mutatósak.

Virágzás: Levendulaszínű virágok június-augusztusban, magas (30-75 cm) szárakon.

Növekedés: Közepes ütemű, teljes méretét 2-5 év alatt éri el.

Télállóság: -30°C-ig ellenálló, 3-9. tűrési zónákban ajánlott.

Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Árnyék vagy félárnyék (túl erős napon a fehér szegély éghet).

Talaj: Nedves, humuszban gazdag, kissé savanyú talaj (pH 5.5-7.5).

Öntözés: Közepes vízigényű – a talajt nedvesen, de nem állóvízben tartsuk.

Metszés: Tavasszal távolítsuk el a száraz leveleket.

Ültetési tanácsok:

Társítás: Fehér virágú árnyéknövényekkel (pl. Astilbe) vagy sárga levelű hostákkal kontrasztért.

Használat: Talajtakaróként, szegélyültetvényben vagy soliterként egyaránt jól működik.

Ültetés: Konténeres példányok egész évben ültethetők (kivéve fagyos időszak) Télen teljesen visszahúzódik.

Problémák és megoldások

Csigák: A vastag levelek ellenállóbbak, de fiatal hajtásokra vigyázni kell.

Napégés: Kerülje a déli napot – a fehér szegély sérülékeny.

Kiemelt előnyök

Látványos levélvariegáció – egész évben díszít.

Alacsony karbantartású – kezdőknek is ideális.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
1997-es "Az Év Hostája" - minősítést kapta.			
Peszterce	**Ballota pseudodictamnus**	3 550 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A peszterce (Ballota pseudodictamnus) a Földközi-tenger keleti medencéjéből, Görögországból és Kis-Ázsiából származó, alacsony, sűrű, párnás vagy félgömb alakú tövet képező, örökzöld évelő. Kifejlett magassága a termesztési körülményektől függően 40–60 cm, szélessége 60–90 cm között alakul; egyes források ennél nagyobb, akár 80 cm magas és 70 cm széles példányokat is említenek, ami a termőhely tápanyagellátottságától és a metszéstől függ. Levelei kerekdedek, tojásdadok, bársonyosan molyhos tapintásúak, ezüstszürke–szürkészöld színűek, és a szárakon átellenesen helyezkednek el. A szárak fiatalon fehéren molyhosak, később tövüknél elfásodnak. Virágai aprók, halvány rózsaszínűek vagy fehéresek, örvökben nyílnak a hajtások felső részén, és a nagy, csészére emlékeztető csészelevelek a virágzás után is dekoratívak maradnak. Virágzása nyár elejétől nyár közepéig tart, és a virágok vonzzák a méheket. A lombozat dörzsölésre enyhe, aromás illatot áraszt.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos fekvésben hozza a legtömörebb formát és a legszebb ezüstös lombszínt, árnyékban a növény megnyúlik és elveszíti jellegzetes habitusát.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár szegényes, homokos, meszes vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél, a meszes talajt kifejezetten meghálálja.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a téli pangó víz károsítja.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, –10 °C körüli hőmérsékletig viseli el a fagyokat. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy enyhe takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 40–60 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a növény megnyúlását és laza habitusát okozhatja.

Metszés: A növényt kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, hogy megőrizze a tömör, párnás formát és serkentse a friss, ezüstös hajtások fejlődését. Az elvirágzott virágzatokat nyár végén távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és betegségmentes; a kabócák kisebb kárt okozhatnak. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, mediterrán hatású ágyásokba, száraz falra, városi és udvari kertekbe, valamint modern, minimalista kompozíciókba illik. Kiváló talajtakaróként és szegélynövényként is, és konténerben, teraszon is nevelhető. Bársonyos, ezüstös lombozata egész évben struktúrát és textúrát ad a kertnek, és jól mutat a nagyobb levelű évelők mellett.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Illatos és fűszeres növények: rozmaring, levendula, zsálya, kakukkfű – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet, valamint szép kontrasztot adnak az ezüstös lombozathoz.

Évelők: varfű, cickafark, naprózsa, sarkantyúvirág – szárazságtűrők, és változatos virágzási idővel egészítik ki a pesztercét.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a peszterce tömör formáját.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a peszterce virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 7–10 (a magyarországi klímán, a 6–7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

Pettyegetett harangvirág	**Campanula punctata 'Rubriflora'**	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A pettyegetett harangvirág a harangvirágfélék (Campanulaceae) családjába tartozó, Kelet-Ázsiából (Kína, Japán, Korea, Kelet-Szibéria) származó évelő növény. Ez a feltűnő, közepes termetű évelő a szárak csúcsán bókoló, különleges színű virágaival a nyár közepén igazi látványossággá teszi a kert napos, félárnyékos részeit. Nevét a latin "punctatus" (pontozott, pettyezett) szóból kapta, ami a virágok belső felületének jellegzetes mintázatára utal.
Külső megjelenés
A pettyegetett harangvirág erőteljes, rizómás évelő, amely lassan terjedve sűrű, tömött telepeket képez. Kifejlett magassága 30-60 cm, szélessége 30-45 cm között alakul. A növény gyors növekedésű, de a kifejlett méretet 2-5 év alatt éri el.
A levelek két típusúak. A bazálrózsa (tőálló) levelei szív alakúak vagy tojásdadok, 5-10 cm hosszúak, hosszú nyéllel, szélük durván fűrészes. A szárlevelek ülők (nyél nélküliek), szív alakúak, a szárat szorosan körülölelve, felfelé haladva egyre kisebbek. A levelek felülete érdes, szőrös. A fiatal hajtások és a levelek gyakran bronzos árnyalatúak, ami a növénynek még a virágzás előtt is dekoratív megjelenést kölcsönöz.
A növény legnagyobb dísze a virág. A virágok 4-6 cm hosszúak, lecsüngő, tölcséres vagy harang alakúak, a szárak csúcsán és a felső levélhónaljakban laza fürtökben (sátorozó virágzatban) helyezkednek el. A 'Rubriflora' változat virágainak alapszíne krémszínű, halvány rózsaszín vagy krémszín, amelyet a belső felületen sűrűn elszórt sötét bíborpiros, málnapiros pettyek, foltok díszítenek. A típusfajhoz (lila vagy rózsaszín virág) képest a 'Rubriflora' intenzívebb, vörösesebb színű. A virágok a méheket és pillangókat vonzzák.
Virágzás
A pettyegetett harangvirág június végétől augusztusig virágzik. Virágzási ideje hosszú, akár 2-3 hónap is lehet. A virágzás utáni elnyílt virágzatok visszavágásával a második, őszi virágzás is serkenthető.
Terjedés, növekedési erély
A pettyegetett harangvirág rizómái révén lassan, de folyamatosan terjed, és sűrű, tömött telepeket képezhet. A növény nem invazív, de kisebb kertekben érdemes a terjedését figyelemmel kísérni, és szükség esetén gyökérgáttal korlátozni.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyet egyaránt kedvel. A legbőségesebb virágzást napos fekvésben hozza, de a tűző, déli napon a levelei megéghetnek, ha a talaj nem elég nedves.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén meszes kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet nem tűri, a túl nedves, agyagos talajokban a rizómák rothadásnak indulhatnak.

Öntözés: Közepes vízigényű, a rendszeres, mélyreható öntözést kedveli. A legszebb, legdúsabb virágzást és a leghosszabb élettartamot a nyirkos, de nem pangó vizes talajban hozza. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen kell öntözni. Idősebb korban szárazságtűrőbb, de a legszebb példányok a rendszeres öntözést kapják.

Tápanyag-utánpótlás: Közepes tápanyagigényű. Tavasszal, a növekedési időszak kezdetén egy kevés komposzttal vagy lassú oldódású, általános célú műtrágyával megtámogatható a dús lombozat és a bőséges virágzás érdekében.

Metszés: A növény nem igényel rendszeres metszést. Az elvirágzott szárakat a virágzás után érdemes visszavágni a másodvirágzás serkentése érdekében. Az elszáradt szárakat késő ősszel vagy kora tavasszal a talaj szintjén lehet visszavágni.

Telelés: Kimondottan télálló, a növény akár -20°C-ig is ellenáll a hidegnek, így Magyarország egész területén gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel. A föld feletti része ősszel elfagy, de a rizóma áttelel, és tavasszal újrahajt.

Kártevők, betegségek: A meztelen csigák és a levéltetvek időnként károsíthatják. A párás, szellőzetlen környezetben a lisztharmat, a rozsda vagy a levélfoltosság is előfordulhat. A pangó vizes talajban a gyökérrothadás alakulhat ki.

Felhasználás a kertben
A pettyegetett harangvirág a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Szegélyágyásokba, évelőágyások középső sorába

Tömeges csoportos ültetésre – a virágok egységes színfoltot alkotnak

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szoliterként – egy-egy példány is feltűnő

Sziklakertekbe, kőkertekbe – szárazságtűrése és alacsony igényei miatt kiváló

Vadvirágos rétek szélére, természetes hatású kertekbe, erdőszegélybe – eredeti élőhelyét idézi

Konténeres teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültethető

Vágott virágnak – a virágzatok hosszú ideig frissek maradnak a vázában

Változatos növénytársítások
A pettyegetett harangvirág krém-rózsaszín pettyes virágai kiválóan kombinálhatók más növényekkel, mivel szinte minden színnel kontrasztot alkotnak, és a laza, természetes hatású ültetések nélkülözhetetlen eleme:

Lila és kék virágú évelők: Levendula, macskamenta, perovszkia – a lila-kék színek a rózsaszínnel harmonikus, elegáns párost alkotnak.

Sárga virágú évelők: Kúpvirág, napvirág – a komplementer színek (sárga és lila) a rózsaszínnel összefogva vidám, vibráló kontrasztot adnak.

Rózsák: Különösen a fehér vagy sárga színű rózsák mellett a rózsaszín virágok gyönyörű kiegészítést jelentenek.

Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz – az ezüstös szürke kiemeli a virágok finom színét.

Díszfüvek: Tollbuga, kék csenkesz – a füvek laza, mozgó habitusa tökéletesen kiegészíti a növény bókoló virágait.

Páfrányok, árnyliliomok: A részleges árnyékban a növény alatti talajtakaróként szolgálhatnak.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is biztonságosan nevelhető).

Pink dúsvirágú verbéna	**Verbena hastata 'Pink Spires'**	2 150 Ft	2 350 Ft

A rózsaszín dúsvirágú verbéna (Verbenahastat 'Pink Spires') egy 60-80 cm magasra növő, a virágzati szárak tetején füzérben rózsaszín virágokat fejlesztő fajta, mely nem hasonlít a mostanra széles körben elterjedt ernyős virágzatú rokonához.
Az alapfaj a Verbena hastata (Ejtsd: verbéna hasztáta) amelyet általában kék verbának neveznek, egy Amerikában őshonos évelő növény, amely általában nedves réteken, nedves folyók fenekén, patakpartokon, mezőkön fordul. Ez egy robosztus évelő, merev, felfelé törő habitussal, amely jellemzően 60-80 cm magasra nő, négyzet keresztmetszetű szőrös szárral, amely jellemzően felül elágazik. Felálló, karcsú, 8-10 cm hosszú) fűzér virágzattal rendelkezik, apró, csőszerű, 5 karéjos, sűrűn benőtt, virágokkal. Július - szeptember a virágzási időszak. Az egyes fűzérekben lévő virágok alulról felfelé nyílnak, egyszerre csak néhány. Vonzóak a lepkék és más beporzók számára.
Jól társítható levendulával, cickafarkkal, kúpvirággal, menyecskeszemmel, díszfüvekkel.

Pink Puff sásliliom	**Hemerocallis 'Pink Puff'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Pink Puff sásliliom egy tömör, bokros növekedésű évelő növény, amely 50-70 cm magasra és 40-60 cm szélesre nő. Levelei ívesek, szalagszerűek, élénkzöld színűek. Virágai kagylórózsaszínűek, gyönyörű sárga torkúak, 10-12 cm átmérőjűek. A virágok enyhén fodros szélűek és delikát textúrájúak. Virágzási ideje június és augusztus között van, és bár egyes virágok csak egy napig nyílnak, a növény folyamatosan hozza az új bimbókat.
Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvel

Talajigény: Jól vízelvezető, tápanyagban gazdag talajt igényel

Vízigény: Közepes vízigényű, de jól alkalmazkodik szárazabb körülményekhez

Metszés: Elvirágzott szárak eltávolítása javasolt

Télállóság: Kiváló télállóságú, -35°C-ig is ellenáll

Trágyázás: Tavasszal komplex műtrágyával

Ültetési javaslat

Szoliter növényként kiemelkedő hatású

Vegyes virágágyásokba ideális választás

Társítás: Fehér virágú növényekkel, örökzöldekkel

Patakpartok és vízparti ültetésekbe

Konténeres nevelésre is alkalmas

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Falusi kertek

Rózsakert társnövényeként

Városi kertek

Parti ültetések

Piros sarkantyúvirág	Centranthus ruber 'Coccineus'	2 750 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A piros sarkantyúvirág (Centranthus ruber 'Coccineus') egy újra felfedezett, korábban közkedveltnek számító évelő, mely sok helyen volt látható első sorban romantikus falusi udvarokon. A vegyes virágágyi kiültetésekben a virágszerető kertészek, ill. a tervezők ismét megtalálták a helyét, ezért mostanra újra széles körben alkalmazott növény. Jogosan, hiszen a klímaváltozásnak igazi nyerteseinek körébe tartózhat, hiszen jó szárazságtűrő, napimádó, betegségekkel szemben ellenálló növény, mely elég jól szaporodik magról. Javasolható vegyes virágágyi kiültetésekbe, vagy kevesebb gondozásra számot tartó kertrészletekbe. Kivadulására számítani kell. Jól társítható más középmagas nyári virágzású szárazságtűrő növényekkel. Lágyszárúak közül javasolhatóak a levendula, ernyős verbéna, cickafark, tollborzfű, nagyobb növekedésű varjújájak, sőt akár pálmaliliomok is. Fás szárúak közül a széles levelű ezüstfa, alacsonyabb cserszömörce és nyári orgona fajták, cserjés gamandor, illatcsrjék, jeneszter stb.			
Poco Sunset fáklyaliliom	Kniphofia 'Poco Sunset'	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Poco Sunset fáklyaliliom (Kniphofia 'Poco Sunset') a Terra Nova Nurseries Poco-sorozatának tagja, amelyet a hagyományos fáklyaliliomoknál lényegesen kompaktabb, törpe méret és a hosszú virágzás érdekében nemesítettek. Sűrű, csomósodó tövet képez, amelynek keskeny, fűszerű, középzöld levelei az év nagy részében díszítőértékűek maradnak; mérsékelt teleken a lombozat részben meg is maradhat.
Kifejlett magassága a lombozattal 40–50 cm, virágzáskor a virágszárakkal együtt 60–80 cm között alakul; szélessége 40–50 cm. A virágzat sűrű, kalászszerű fürt, amely apró, csöves virágokból áll, és a szárak végén nyílik. A virágok színe a kalász felső részénél mélyvörös és vörös-narancssárga, lejjebb narancsos, a tövénél pedig meleg sárga vagy sárga-narancssárga árnyalatba vált – ez a fokozatos színátmenet adja a fajta jellegzetes „naplemente” hatását. A virágzás júniustól szeptemberig-októberig tart, és a fajta hajlamos a másodvirágzásra is. A virágok bőséges nektárt kínálnak a méheknek, poszméheknek és lepkéknek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást.

Talaj: Jó vízáteresztő, termékeny, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt, később a kifejlett növény a szárazságot is jól tűri, és a rendszeres öntözést csak hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 6–9. zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot vagy homokot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság 40–50 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágfüzéreket a szár tövénél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást és serkentse az új hajtásokat. A régi, elszáradt leveleket kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt távolítsa el a tövek tövéről.

Átteleltetés: A növény télálló, de a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyba, szegélyekbe, mediterrán és kavicskertbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Törpe mérete miatt kis kertekbe, városi kertekbe és dézsába is kiváló választás, ahol a tüzes színátmenetű virágfürtök és a kompakt habitus érvényesül. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején messziről feltűnő színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet, valamint szép kontrasztot adnak a tüzes virágokhoz.			
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a fáklyaliliom tömör virágfürtjeit.			
Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel egészítik ki a kompozíciót.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a fáklyaliliom virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 6-9.			
Polar Bear, Jegesmedve óriásvirágú bugás hortenzia (nagyobb)	**Hydrangea paniculata 'Polar Bear'**	4 450 Ft	4 950 Ft
Pompás bugatölcsér	**Penstemon superbus**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Pompás bugatölcsér (Penstemon superbus) – A korallvörös virágú, robusztus évelő

A pompás bugatölcsér Észak-Amerika délnyugati részén, különösen Colorado, Új-Mexikó, Arizona és Utah államokban őshonos, rövid élettartamú évelő növény. A 'superbus' fajnév (latin: büszke, fenséges, pompás) a növény robusztus méretére és látványos virágzatára utal. Ez a növény a nyár első felében nyíló, élénk színű virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, a szárazságtűrése és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A pompás bugatölcsér egy robusztus, felálló szárú, bokrosodó, rövid élettartamú évelő növény. Kifejlett magassága 50-90 cm, szélessége 30-45 cm között alakul. A növény habitusa mereven felálló, a hajtások erősek, a virágzó szárak a növény fölé emelkednek. A növény rövid élettartamú (3-5 év), de az önvetés révén hosszú távon is fenntartható a kertben.

A levelek szürkészöldek, lándzsásak vagy hosszúkásak, 5-12 cm hosszúak, szélük ép vagy finoman fogazott. A levélfelület sima vagy enyhén szőrözött, a levelek a szár alsó részén tőrózsát alkotnak.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 15-30 cm hosszú, hosszú, egyenes, végálló fürt, amelyen 20-40 db trombita alakú, 2-4 cm hosszú virág helyezkedik el. A pompás bugatölcsér legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok élénk korallvörös vagy narancsvörös színe, amely a virágzatot távolról is feltűnővé és mutatóssá teszi. A virágzási időszak a késő tavasztól a nyár közepéig tart: Magyarországon jellemzően májustól júliusig, a legbőségesebb virágzás júniusban figyelhető meg. A virágok a kolibriket, a pillangókat, a méheket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, gömbölyded, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról szaporítható; a magokat a fagyok elmúltával (május végétől) közvetlenül a szabadba vethetjük, vagy beltérben, meleg helyen (20°C körül) neveljük a palántákat. A növény a kertben önmagát is szaporíthatja.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A pompás bugatölcsér napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés az optimális. Félárnyékban a virágzás gyengébb, a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A pompás bugatölcsér szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a hosszabb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első néhány hetében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés és a pangó víz a leggyakoribb gondozási hiba.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy, és a növény felnyurgulhat. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A pompás bugatölcsér alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzási időszak alatt az elnyílt virágok eltávolítása serkenti az újabb virágzást és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A virágzási időszak végén (július-augusztus) a növényt érdemes visszavágni, hogy serkentsük a másodvirágzást és a növény rendezettebb megjelenését.

Telelés és fagytűrés: A pompás bugatölcsér mérsékelten télálló; az USDA 5-9-es zónákban nevelhető. Magyarország nagy részén (USDA 5-7-es zóna) a jó vízelvezetésű talajban és szélvédett helyen takarással áttelelhet, de a zordabb teleken fagykárosodás előfordulhat. A növény rövid élettartamú, ezért az önvetés biztosítja a folytonosságot.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A pompás bugatölcsér az élénk korallvörös virágzásának, robusztus habitusának, szárazságtűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben:

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Szegélyágyások középső részébe – a 50-90 cm-es magasság miatt kiváló középtérnövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Természetes hatású kertekbe, vadvirágos kertekbe, préri kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt gyökerű fajta miatt konténerben is nevelhető.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A pompás bugatölcsér korallvörös virágai és szürkészöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), bárányfül (Stachys byzantina) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a korallvörös virágokat.

Kék virágú növényekkel: Macskamenta (Nepeta), zsálya (Salvia) – a kék és a korallvörös szívek kontrasztos, vibráló hatást keltenek.

Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis), kúpvirág (Rudbeckia) – a korallvörös és a sárga szívek meleg, napsütötte hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Árvalányhaj (Stipa), tollbuga (Pennisetum) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a pompás bugatölcsér merevebb, felálló formáját.

Lila virágú növényekkel: Levendula (Lavandula) – a lila és a korallvörös szívek harmonikus, mediterrán hangulatú párost alkotnak.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a pompás bugatölcsér mérsékelten télálló; az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban a jó vízelvezetésű talajban és szélvédett helyen takarással áttelelhet, de a zordabb teleken fagykárosodás előfordulhat. A növény rövid élettartamú, az önvetés biztosítja a folytonosságot a kertben.)

Pompás ligetszépe	Oenothera speciosa 'Siskiyou Pink'	2 650 Ft	2 650 Ft

A pompás ligetszépe (Oenothera speciosa) idehaza kevésbé ismert, inkább a nemzetség sárgvirágú fajai terjedtek el. Ez a növény is gazdag virágdísszel rendelkezik, de a szirmai halvány rózsaszínek. kedvezőtlen száraz talajviszonyokat is jól tűr, így rossz termőhelyi adottságok között is szépen fejlődik. Emellett filigrán száraival, és légéies nagy tömegben megjelenő virágaival igényes kertek dasznövényei is lehet. Jól társítható levendulával, rozmaringgal, veronikákkal, árvalányhajjal, tolborzfüvekkel. Nem örökzöld, visszahúzódik télen, de a következő esztendőben ügyesen terjeszkedik, és egyre nagyobb párnaként tölti ki a rendelkezésére álló teret.

Porcelán kőtörőfű	Saxifraga urbium 'Aureopunctata'	1 950 Ft	1 950 Ft

A porcelán kőtörőfű (Saxifraga urbium ‘Aureopunctata’) alacsony termetű, tőlevélrózsát alkotó évelő növény, mely évelőágyak előterébe, valamint kisebb területekre talajtakaróként is ültethető. Nevét a leveleit díszítő sárga foltocskákról kapta. Félárnyékos, ritkás árnyékos, kellemesen párás helyen, üde, humuszos, savanyú talajba ültetve fejlődik legszebben.

Portugál babérmeggy	Prunus lusitanica	4 450 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Prunus lusitanica (Portugál babérmeggy) az Ibériai-félszigeten honos, nagyobb cserjévé, vagy kisebb fává fejlődő, fénylő sötétzöld lombú, örökzöld növény. Hófehér virágai nagyon kellemes, erős illatúak, hosszú fürtökben, nyár elején nyílnak, a belőlük fejlődő termések eleinte korallpirosak, majd feketés-lilára érnek. Védett fekvésben igen jelentős díszértékű növény lesz, de nevelhetjük edényben is, teraszok, balkonok gyönyörű dísze!

Külső tulajdonságok

Magasság és forma: 3-4 méter magasra és 2-2,5 méter szélesre nő, sűrű, felálló vagy kerekded habitussal.

Levelek: Bőrszerű, fényes sötétzöld, lándzsa alakú, fogazott szélű levelek. A friss hajtások barnás-pirosas árnyalatúak, a levélnyél pirosas-bordó színű.

Virágok: Édes illatú, fehér virágok, amelyek hosszú fürtökben nyílnak május-június között.

Termés: Ritkán hoz piros termést, amely megérve feketévé változik. Nem ajánlott emberi fogyasztásra, de madarak számára vonzó.

Gondozási útmutató

Fényigény: Napos vagy félig árnyékos helyeket kedvel. Teljes árnyékban gyengébben fejlődik.

Talaj: Jó vízelvezető, laza talajt preferál. Tolerálja a meszes talajt is, de a pangó vizet nem tűri.

Öntözés: Közepes vízigényű. Fiatal növényeket rendszeresen öntözzön, míg a kifejlett példányok szárazságot is jól tolerálnak.

Táplálás: Nem igényel rendszeres trágyázást. Tavasszal egy kis komposzt vagy lassan felszabaduló műtrágya hasznos lehet 7.

Metszés: Ritkán igényel metszést. Ha szükséges, a beteg vagy elhalt hajtások eltávolíthatók.

Télállóság: Fagytűrő, de az erős fagyok károsíthatják. Szélvédett helyre ültetendő.

Ültetési javaslatok

Távolság: Sövényként ültetve 2-3 méteres távolságot ajánlunk a zárt hatás érdekében.

Hely: Napos vagy félig árnyékos, szélvédett hely, jó vízelvezetésű talajjal.

Növénytársítás
A portugál babérmeggy kiválóan kombinálható más mediterrán vagy árnyékot tűrő növényekkel:

Háttérnövények: Hydrangea aspera 'Sargenteana' (érdes levelű hortenzia) és Rhododendron 'Horizon Monarch' (örökzöld havasszépe).

Aljnövények: Hemerocallis 'Strawberry Candy' (sásliliom) és Deutzia crenata 'Nikko' (törpe gyöngyvirágcserje)

Kiegészítők: Cornus officinalis (keleti som) és Deutzia scabra 'Candidissima' (fehér virágú gyöngyvirágcserje).

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Alkalmazási javaslatok

Sövényként: Sűrű növekedése miatt kiváló élőkerítés vagy zaj- és szélfogó.

Szoliterként: Egyedi megjelenése miatt hangsúlyos elem a kertben vagy parkban.

Dísznövény: Levél- és virágdíszes megjelenése kontrasztot teremt más növényekkel kombinálva.

Extra tipp: A portugál babérmeggy madárbarát növény, termései madarak számára vonzóak, és sűrű ágazata menedéket nyújt a kisebb állatok számára
A portugál babérmeggy nemcsak díszít, hanem praktikus funkcióval is bír: például por- és zajvédelmet nyújt, és gyorsan növekvő habitusa miatt rövid idő alatt zárt sövényt alkot.

7a-10a USDA-zóna

Portugál babérmeggy (nagy)	**Prunus lusitanica**	13 200 Ft	13 200 Ft
Prairie Blues fenyérfű	**Andropogon scoparius Prairie Blues**	2 750 Ft	2 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Prairie Blues fenyérfű (Andropogon scoparius 'Prairie Blues', újabb besorolás szerint Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues') Észak-Amerika prérijeiről származó, sűrű, felálló, kompakt tövet képező, lombhullató évelő díszfű. Kifejlett magassága a virágzatokkal együtt általában 80–100 cm, szélessége 40–60 cm között alakul; a tövek sűrű, oszlopos vagy szűk kúp alakú csomót képeznek. Levelei keskenyek, szalagszerűek, szürkéskék-acélkék színűek, és a nyár folyamán végig megőrzik feltűnő színüket; ősszel narancsvörös, rézvörös és bíboros árnyalatokat vesznek fel, amelyek télen is megmaradnak. Virágzata laza, finom, ezüstös-rózsaszín kalászbuga, amely júliustól szeptemberig nyílik, és a virágzatok a téli kertben is díszítőértékűek. A növény habitusa merev, felálló, így kiválóan alkalmas függőleges akcentus képzésére és tömeges, összefüggő színfelületek létrehozására.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legintenzívebb acélkék lombszínt és a legbőségesebb virágzást, árnyékban a tövek megnyúlhatnak és megdőlhetnek.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen száraz, homokos, kavicsos vagy szegényes talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, az USDA 3–9. zónában megbízhatóan áttelel, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül is biztonságosan tartható.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 40–60 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: A régi lombozatot és az elvirágzott szárakat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, kb. 10–15 cm-re. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz részek a növényen maradhatnak. A töveket 3–4 évente érdemes megosztani a kompakt forma és a bőséges virágzás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább préri stílusú ültetésekbe, évelőágyba, kavics- és sziklakertbe, modern és minimalista kompozíciókba, valamint természetközeli, vadvirágos rétekre illik. Kiváló szoliterként, de tömeges ültetésben is lenyűgöző, ahol összefüggő acélkék, majd őszi vörös színfelületet hoz létre. Konténerben és teraszon is nevelhető. Kiváló vágott és szárított virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Préri évelők: kúpvirág, varfű, cickafark, sédbúza, naprózsa – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a fenyérfüvet.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 3-9.

Prairie Sky vesszősköles	**Panicum virgatum 'Prairie Sky'**	2 950 Ft	3 450 Ft

Prairie Sky vesszősköles (Panicum virgatum 'Prairie Sky') kékes zöld lombozatot fejlesztő, mely augusztusban a lombozat fölött felálló virágzati szárakon hasonló színű virágzatot hozó magasra fejlődő évelő díszfű. Csodálatosan néz ki merész csomókba ültetve, amelyek a szellőben ringatózhatnak. Később ősszel a lombozat szép aranysárga színűvé válik. De ültethető nagyobb virágágyak hátterébe is hasonlóan magas színes virágú évelőkkel társítva, vagy tavak mellé imitátor növényként.
Jól viseli a hosszabb-rövidebb száraz időszakokat. Emellett napos helyeken fejlődi ki jól, de félárnyékban is hozza magát, legfeljebb nem lesz annyira tömött a lombozat. Talajra nem igényes, de természetesen a jó tápanyag ellátottságot meghálálja.
Könnyen gondozható, nincs más feladat vele, mint tavasszal lenyírni az elszáradt lombozatot. A tövet érdemes 5-6 évente felszedni, feldarabolni, és elajándékozni a felesleget az ismerősöknek, biztosan nagy örömöt szerezhetünk vele.

Prima indián banán, Pawpaw (nagyobb)	**Asimina triloba 'Prima'**	21 000 Ft	26 000 Ft
Prof. Anton Kippenberg törpe őszirózsa	**Aster dumosus Prof. Anton Kippenberg**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Az Prof. Anton Kippenberg törpe őszirózsa (Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg') - ibolya-kék virágú, tömött növekedésű törpe őszirózsa. Hosszú virágzású, pollinátor-barát, ideális konténerekbe és őszikertbe!
A növény jellemzői

Magasság: 30-40 cm, terjedés: 30-45 cm (tömött, bokros habitus).

Levelek: Lándzsa alakúak, sötétzöld színűek, fényes felületűek.

Virágok: Ibolya-kék színű, sárga központtal, 2-3 cm átmérőjű, illatos virágfürtökben.

Tenyészhely: Teljes nap (optimális virágzásért), de félárnyékot is tűr. Jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt kedvel.

Ültetés és gondozás

Talajigény: Közepesen nedves, laza talaj. Agyagos talajt homokkal javíthatunk.

Vízellátás: Közepes vízigényű - a szárazságot rosszul tűri, de túlöntözést kerüljünk.

Metszés: Tavasszal visszavágás az új hajtások elősegítésére, hervadt virágok eltávolítása a folyamatos virágzás érdekében.

Télállóság: -23 °C-ig tűri (USDA 4-es zóna).

Felhasználás

Dísznövényként: Őszi virágágyások, határok, konténerek, sziklakert.

Pollinátor-barát: Méhek, pillangók és lepkék kedvelik virágait.

Vágott virágként: Akár 7-10 napig friss marad vázában.

Ültetési társítás

Őszi virágú társak: Sedum spectabile, Rudbeckia, Echinacea .

Díszfüvek: Festuca glauca, Miscanthus (szín- és textúrakontrasztért)

Provence gránátalma	**Punica granatum 'Provence'**	7 950 Ft	8 200 Ft
A franciák egyik legszebb, legnépszerűbb, kiváló termésminőségű fajtája!			
Pulsar Violet Shades Tavaszi kökörcsin	**Pulsatilla vulgaris 'Pulsar Violet Shades'**	2 250 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Pulsatilla vulgaris 'Pulsar Violet Shades' valódi gyöngyszem a tavaszi kertekben, kecses, lila virágfejeivel, amelyek már a tavasz elején megjelennek, hirdetve a meleg időszak közeledtét. A virágok gyönyörű, tollas levelek között bontakoznak ki, amelyek különleges textúrát adnak a növénynek. Alacsony növekedésű, 20-30 cm magasságra nő, és 30-40 cm szélességet is elérhet, ami tökéletes a szegélyezéshez és a sziklakertek díszítéséhez.
Gondozási útmutató: A tavaszi kökörcsin a napos vagy félárnyékos helyeket kedveli, jól áteresztő, szárazabb talajban érzi magát a legjobban. Fontos, hogy ne legyen túlöntözve, mivel érzékeny a pangó vízre. Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, hogy serkentsük az új virágzást. Tavasz végén a levelek visszavágása segít a növény egészséges növekedésében és ápolásában.
Ajánlott kertstílus: A 'Pulsar Violet Shades' ideális választás sziklakertbe, gyógynövénykertekbe vagy angolkertbe, ahol jól mutat más korai virágzó évelőkkel, például tavaszi hóvirágokkal vagy ibolyákkal.

Red Bells tavaszi körörcsin	**Pulsatilla vulgaris 'Red Bells'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Red Bells tavaszi körörcsin (Pulsatilla vulgaris 'Red Bells') alacsony, sűrű, párnás bokrot képező évelő. Kifejlett magassága 20–30 cm, szélessége 20–30 cm. Levelei mélyen szeldeltek, finoman selymesen szőrözöttek, ezüstös-zöld színűek, és a virágzás után is dekoratívak maradnak. Virágai harang alakúak, bókolók, élénk vörös színűek, kora tavasszal (március–április) nyílnak, mielőtt a lombozat teljesen kifejlődne. A virágokat ezüstös, bolyhos magtokok követik, amelyek nyáron is szépen díszítenek. A növény habitusa lekerekített, kissé szétterülő.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; enyhe délutáni árnyékot is elvisel.

Talaj: Jó vízáteresztő, meszes vagy semleges, inkább száraz, homokos vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a szárazságot jól tűri, de az első évben rendszeres öntözést igényel.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: Az elvirágzott virágokat távolítsa el, hogy a növény ne magozzon el, és megőrizze kompakt formáját. A lombozatot kora tavasszal vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek részben elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, alpesi jellegű kompozíciókba és száraz falra illik. Kiváló ágyásszegélybe, évelőágyás előterébe, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, szárazságtűrő és minimalista kertekben.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz.

Fűszer- és illatos növények: levendula, izsóp, zsálya.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Red Chief japán díszfű vagy molnárpántlika	Miscanthus sinensis 'Red Chief'	2 450 Ft	2 750 Ft

Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.

USDA télállósági zóna: 4-8.

A Miscanthus 'Red Chief' (japán díszfű) az egyik legszebb díszfű, amely elérheti a 1-1,2 méteres magasságot a kifejlett állapotában. Tavasztól őszig folyamatosan változik; kezdetben zöld levelei vannak, amelyek ősszel csodálatos vörösesbarna színbe fordulnak. A díszfű jellegzetes, pirosas-barnás bugavirágzata, a nyári estéket varázslatosabbá teszi, ahogy a napfényben csillognak. A Miscanthus 'Red Chief' nemcsak dekoratív, hanem környezetbarát is, mivel vonzza a beporzókat, például a méheket és a lepkéket.
Gondozási útmutató

Öntözés: Közepes vízigényű; a talaj nedvességtartalmát tartsuk egyensúlyban.
Trágyázás: Tavasszal lehetőség szerint organikus trágyával tápláljuk, hogy támogassuk a növekedését.
Metsszés: Az őszi hónapok végén vagy kora tavasszal célszerű visszametszeni, hogy biztosítsuk a szép új hajtások fejlődését.
Télállóság: télálló, de a kérgének védelme érdekében mulcsozás ajánlott.

Remek választás modern kertekhez, természetes kertekhez és tájképi tervezéshez. Jól alkalmazható csoportos ültetésekhez, szegélyekhez vagy vegyes virágágyásban, tópartokra.
Ültetési javaslat
Ültessük tavaszi vagy őszi időszakban napos helyre, ahol legalább napi 6-8 órányi közvetlen napfényt kap. A talaj legyen jól áteresztő, tápanyagban gazdag. Az ültetési távolság 45-60 cm, hogy elegendő helyet biztosítsunk a növényeknek.

Red Sparkle varjúháj	Sedum 'Red Sparkle'	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Red Sparkle varjúháj (Sedum 'Red Sparkle') a varjúhájok egyik legkompaktabb, legszínesebb fajtája, amelyet sűrű, félgömb alakú, párnás töve és feltűnő lombozata miatt kedvelnek. Kifejlett magassága 20–30 cm, szélessége 30–50 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén sűrű, összefüggő párnát alkotnak, a virágzati szárak pedig mereven, felállóan emelkednek a lombozat fölé. Levelei húsosak, tojásdadok vagy szélesen oválisak, fogazott szélűek, tavasszal világoszöldek, nyáron szürkészöld-lila árnyalatot öltenek, ősszel pedig élénk vörösre színeződnek – ez a lombszín-változás önmagában is figyelemre méltó díszítőérték.
A virágzat tömött, lapos tetejű, ernyőszerű fészekvirágzat, amely apró, csillag alakú, élénkpiros-korallrózsaszín virágokból áll. A virágok augusztusban nyílnak, és egészen októberig díszítenek, így a fajta a késő nyári és őszi kert egyik legértékesebb színfoltja. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek, és kiválóan alkalmasak vágott virágnak is.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust, a legszebb lombszínt és a legbőségesebb virágzást, de a félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár homokos, köves vagy sovány, enyhén lúgos kémhatású talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Az USDA 4. éghajlati zónában (akár –34 °C-ig) megbízhatóan áttelel; a hazai termesztési tapasztalatok szerint –25 °C-ig fagytűrő, a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül is biztonságosan tartható.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Öntözés után hagyja a talajt kiszáradni, hogy megelőzze a gyökérrothadást. Télen a rendszeres öntözés szükségtelen.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbíthatja a virágzást. Kora tavasszal az előző évi összes szárat vágja vissza a talajszint közelében; ez serkenti a friss, tömör hajtások fejlődését. A töveket 3–4 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, ágyásszegélybe, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Kompakt, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
is jó választás; konténerben a „spiller-thriller-filler” kombinációkban filler (kitöltő) szerepet tölt be. Ősszel a lombszín és a virágok együtt különleges, meleg színhatást kölcsönöznek a kertnek. Növénytársítások Pozsgások: kövirózsa (Sempervivum), más varjúhájfajták (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak. Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet. Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a varjúháj tömör habitusát. Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a varjúháj virágzása előtt. Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak. USDA télállósági zóna: 4 (a magyarországi klímán teljesen télálló).			
Réti legyezőfű	**Filipendula ulmaria**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Réti legyezőfű (Filipendula ulmaria) – Az illatos, fátyolos virágú nedves élőhelyi évelő

A réti legyezőfű Európában és Nyugat-Ázsiában őshonos évelő növény. A nemzetség neve (Filipendula) a latin „filum” (fonál) és „pendulus” (lógó) szavakból ered, ami a növény föld alatti tarackos gyöktörzsére utal. Ez a növény a nyár közepén bolyhos, fehér, illatos virágfürtjeivel és a levélfonák fehér molyhos szőrzetével válik a nedves kertek egyik legdekoratívabb évelőjévé. A közönséges magyar név („réti legyezőfű”) mellett ismert még „réti füzény”, „mézvirág” vagy angol nevén „meadowsweet” (réti édes) néven is. A növény történelmi jelentőségű: a szalicil-sav (az aszpirin előanyaga) először a réti legyezőfű virágából izolálták 1838-ban.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A réti legyezőfű egy robusztus, bokros növekedésű, felálló szárú, évelő lágyszárú növény, amely kiterjedt tarackos gyöktörzset (rizómát) fejleszt. Kifejlett magassága 60-120 cm között alakul, szélessége 50-100 cm. A szár egyenes, felálló, a virágzat alatt elágazó, sima vagy kopasz, idősebb korban a szár alsó része megfásodhat.

A levelek a növény egyik meghatározó díszítő elemei, különösen a virágzás előtti időszakban. A tőlevelek a legnagyobbak, 10-25 cm hosszúak, páratlanul szárnyalt összetettek, 2-5 pár nagyobb, tojásdad vagy elliptikus alakú, kihegyezett csúcsú, kétszeresen fűrészes szélű levélkével, a levélkék között apróbb, köztes levélkékkel. A levél felszíne sötétzöld, sima, a fonákot sűrű, fehér vagy szürkés nemezes szőrzet borítja, ami a növényt távolról is könnyen felismerhetővé teszi. A levélnyél hosszú, a szárlevelek kisebbek, fokozatosan ülővé válnak. A pálhák (stipulák) nagyok, oválisak, fűrészes szélűek, zöld színűek. A levelek megdörzsölve kellemes, mandula- vagy mézillatot árasztanak.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 10-25 cm hosszú, sűrű, bugaszerű vagy füzéres, több száz virágból álló, illatos fürt. A virágok aprók, 5-10 mm átmérőjűek, öt (ritkán négy-hat) szirommal. A szirmok fehérek vagy krémszínűek, kerekdedek, röviden karmosak, a virág közepe felé szűkülnek. A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a porzók: a porzószálak (filamentumok) száma 20-40, hosszuk 3-8 mm, a szirmoknál jóval hosszabbak, a virágokat bolyhos, fátyolos megjelenést kölcsönöznek. A virágok illata erős, édeskés, mandula- vagy mézillatú, amely távolról is érzékelhető. A virágzási időszak a nyár közepétől a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően júniustól augusztusig, a legbőségesebb virágzás júliusban figyelhető meg. A virágok a méheket, a poszméheket, a pillangókat, a legyeket és más beporzó rovarokat vonzzák.

Termés és magszaporítás

A virágzást követően a növény jellegzetes, csavarodott, spirál alakú kaszatterméseket (acheniumokat) fejleszt, amelyek 3-6 mm hosszúak, a termőtájon (a vacokon) 6-8 darabban helyezkednek el. A termések éréskor (szeptember-október) a széllel vagy vízzel terjednek. A magok a talajban 1-2 évig maradnak csírázóképesek, ha a talaj nem állandóan vízzel borított. A növény magról és vegetatív úton (tarackos gyöktörzzsel) egyaránt szaporodik, ami lehetővé teszi a gyors terjedést.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A réti legyezőfű napos vagy félárnyékos fekvést egyaránt tolerál, de a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza, feltéve, hogy a talaj kellően nedves. A napi minimum 4-6 óra közvetlen napsütés az optimális. Félárnyékban is jól fejlődik, de a virágzás kevésbé bőséges, a növény magasabbra nőhet, és a szárak hajlamosabbak megdőlni. Teljes árnyékban a növény nem virágzik.

Talaj: A réti legyezőfű kifejezetten nedvesség- és tápanyagigényes. A legjobban a jó vízáteresztő képességű, de állandóan nyirkos vagy akár pangó vizű, humuszban gazdag, agyagos vagy vályogos, enyhén savanyú vagy semleges kémhatású (pH 5,5-7,5) talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a pangó vizet és az időszakos elárasztást, a rizómái akár több hétig is elviselik az oxigénhiányt. A száraz, homokos, tápanyagszegény talajokat nem tűri; ilyen körülmények között satnya marad, nem virágzik, vagy elpusztul. Ültetéskor javasolt a talajba érett komposztot, szerves trágyát keverni a tápanyagtartalom és a víztartó képesség növelése érdekében.

Öntözés: A réti legyezőfű közepes vagy magas vízigényű; a rendszeres, bőséges öntözést kedveli, és a pangó vizet is jól tűri. A természetes élőhelyein (patakpartok, mocsarak, nedves rétek) is állandóan nedves talajban fordul elő. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 2-3 alkalommal) kell öntözni, hogy a talaj ne száradjon ki. Az idősebb, begyökeresedett példányok a rövid szárazságot is elviselik, de a legszebb lombozatot és a bőséges virágzást nedves talajban hozzák. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban akár naponta is öntözni kell, hogy a földje ne száradjon ki.

Tápanyag-utánpótlás: A réti legyezőfű közepes vagy magas tápanyagigényű. Tavasszal, a rügyfakadás időszakában (március-április) adjunk neki egy adag lassan oldódó, évelők számára kifejlesztett műtrágyát (pl. NPK 10-10-10), vagy egy réteg (3-5 cm) érett komposztot vagy szerves trágyát a talaj felszínére kijuttatva (mulcsozva). A második, kisebb adag a virágzás előtt (június eleje) adható. A kifejezetten magas nitrogéntartalmú műtrágyák kerülendők, mert az a lombozat rovására megy (a növény sokat nő, de a szárak puhányok lesznek, és a virágzás gyengül).

Metszés és ápolás: A réti legyezőfű alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de az alábbi ápolási műveletek javíthatják a növény megjelenését és élettartamát:

Elvirágzott virágzatok eltávolítása (deadheading): Az elnyílt, elhervadt virágzatokat a virágzási időszak alatt (augusztus-szeptember) érdemes eltávolítani (visszavágni az első levélpárig). Ez megakadályozza a túlzott magképzést és az önvetést, és a növény energiáit a gyökérzet erősítésére és a következő évi virágbimbók képzésére irányítja. Ha szeretnénk, hogy a növény magról szaporodjon, hagyjunk néhány virágzatot a növényen a magok beéréséig.

Visszavágás a virágzás után: A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt visszavághatjuk a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. Ez segíti a növény telelését, megakadályozza a lisztharmat áttelelését, és tavasszal a növény gyorsabban, erőteljesebben hajt.

Tőosztás (ritkítás): A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal (március-április) vagy kora ősszel (szeptember) javasolt, különösen akkor, ha a növény túlzottan elterjedt, vagy a középrész kipusztult. A tőosztást végezhetjük úgy, hogy a tövet kiássuk, éles ásóval 2-4 részre osztjuk, és az osztásokat azonnal visszaültetjük. A tőosztás a növény vegetatív szaporításának is módja, ami garantálja a fajtajellemzők megtartását.

Terjedés szabályozása: Mivel a növény tarackos gyöktörzzsel (rizómával) is terjed, és agresszívan nőhet a kedvező körülmények között, a nem kívánt terjedés megakadályozása érdekében érdemes a növény köré gyökérgátat (rizóma-gátat) telepíteni.

Telelés és fagytűrés: A réti legyezőfű kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok akár -40°C és -45°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén (az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os zónáiban) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a rizómák telelnek át a talajban. Tavasszal a növény a rizómákból újrahajt. A fiatal, ősszel ültetett növények számára az első tél előtt egy vékony lombtakaró (3-5 cm) nyújthat extra védelmet, de ez nem kötelező.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A réti legyezőfű a bolyhos, fehér, illatos virágzásának, a lombozat dekoratív fehér fonákjának, a kiváló télállóságának és a nedvességtűrésének köszönhetően az egyik legkedveltebb nedves élőhelyi évelő. Alkalmazási területei:

Patakpartokra, tavak szegélyébe, mesterséges vizeságyásokba (bog garden) – a természetes élőhelyéhez hasonlóan, az állandóan nedves vagy pangó vizű talajban ideálisan érzi magát.

Nedves rétekre, láprétekre, vadvirágos kertekbe – a növény a nedves, természetes vagy féltermészetes réti hangulatot erősíti.

Évelőágyások hátsó részébe – a 60-120 cm-es magasság miatt kiváló háttérnövény; a fehér virágok világosítják a sötétebb hátteret.

Természetes hatású kertekbe, réti kertekbe, cottage kertekbe – a növény a természetközeli hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a pillangók, méhek és más beporzók számára.

Vágott virágnak – a réti legyezőfű kiváló vágott virág, tartós (akár 7-10 napig is eláll a vázában), a bolyhos, fehér, illatos virágfürtök különösen mutatósak csokrokban.

Gyógy- és fűszerkertekbe (gyógynövény kertbe) – a növény salicilát-tartalma miatt hagyományos gyógynövény; a virágokat és a leveleket gyulladáscsökkentő, lázcsillapító teák készítésére használják.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A réti legyezőfű fehér, bolyhos virágai és sötétzöld, fehér fonákú lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos-félárnyékos, nedves vagy pangó vizű, tápanyagdús talajú) növénnyel kombinálhatók. Az alábbi társítások különösen ajánlottak:

Lila és kék virágú nedves élőhelyi évelők: Mocsári gólyaorr (Geranium palustre) lilás-rózsaszín virágaival; ligeti zsálya (Salvia nemorosa) lila virágaival; kék iringó (Eryngium planum) kék, szúrós virágaival – a fehér és a lila-kék szívek harmonikus, friss, elegáns párost alkotnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Sárga virágú nedves élőhelyi évelők: Mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), libatop (Lysimachia vulgaris), orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis) – a fehér és a sárga szívek vidám, napsütötte kontrasztot adnak.			
Rózsaszín virágú nedves élőhelyi évelők: Rózsaszín réti legyezőfű fajták (Filipendula ulmaria 'Variegata', 'Flore Pleno'), orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis) – a hasonló tónusú, de eltérő árnyalatú szívek harmonikus, mélységet adó összképet eredményeznek.			
Díszfüvek (nedves élőhelyi fajták): Tőzegmoha (Molinia caerulea), erdei sédbúza (Deschampsia cespitosa), télisás (Carex) – a díszfüvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a réti legyezőfű tömöttebb, bokros formáját.			
Páfrányok: Erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) – a páfrányok finoman szeldelt, világoszöld lombozata kiválóan kiegészíti a réti legyezőfű tömöttebb, sötétzöld lombozatát.			
Fehér virágú évelők: Réti margitvirág (Leucanthemum vulgare), gyöngyvirág (Convallaria majalis), fehér varjúháj (Sedum) – a fehér szín kiemeli a réti legyezőfű fehér virágait, egységes, tiszta hatást eredményez.			
USDA besorolása: 3-8 (Magyarországon a réti legyezőfű teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -40°C és -45°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag az extrém száraz, homokos, tápanyagszegény talajú területeken nem telel át, nem a fagy, hanem a talaj kiszáradása és a tápanyaghiány miatt. A konténerben nevelt növények is áttelelnek a szabadban, ha a cserép nagy (legalább 10-15 literes) és a talaj nedves marad, illetve a cserép nem fagy át teljesen.)			
Rochhampton Red vörös gyertyán (kisebb)	**Carpinus betulus 'Rochhampton Red'**	11 900 Ft	11 900 Ft
Rocky Top kasvirág	**Echinacea tennesseensis 'Rocky Top'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Kasvirág Rocky Top (Echinacea tennesseensis 'Rocky Top') – A ritka, felálló szirmú, rózsaszín virágú préri évelő

A Rocky Top kasvirág Észak-Amerikából, kifejezetten az Egyesült Államokbeli Tennessee állam középső részének száraz, meszes sziklás réteiről származó, Echinacea tennesseensis faj nemesített változata. A faj a természetben kifejezetten ritka; szerepel a veszélyeztetett fajok listáján (az USA szövetségi veszélyeztetett fajok listáján). A faj név („tennesseensis”) Tennessee államra utal, ahol endemikus, míg a 'Rocky Top' fajtajelzés Tennessee állam egyik legismertebb népdalára („Rocky Top”) és a növény sziklás (rocky) élőhelyére utal. Ez az évelő növény a nyár közepétől kora őszig tartó időszakban feltűnő, felálló szirmú, élénk rózsaszín virágaival vonzza a tekintetet, emellett kiváló szárazságtűrése, meszes talajtűrése, kompakt mérete, továbbá a faj ritkasága és természetvédelmi jelentősége miatt kiemelkedő érték a gyűjtők és a préri kertek kedvelői számára. A közönséges magyar név („kasvirág”) mellett ismert még „bíbor kúpvirág” vagy „echinacea” néven is.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A kasvirág Rocky Top egy közepes vagy alacsony növekedési erélyű, bokros, feltörő szárú, lombhullató évelő növény. Kifejlett magassága 40-60 cm között alakul, szélessége 30-45 cm, ami kompaktabb méretet jelent a közönséges bíbor kasvirágnál (Echinacea purpurea). A hajtások egyenesen felállók, merevek, vékonyak, szőrözöttek, a virágzati ágak a szárak felső részén helyezkednek el. A növény mélyre hatoló karógyökérrel rendelkezik, ami nagyban hozzájárul a kiváló szárazságtűréséhez.

A levelek a növény alapvető díszítő elemei a virágzás előtti időszakban. A tőlevelek (rozettalevelek) a legnagyobbak, 5-12 cm hosszúak, 1-3 cm szélesek, alakjuk lándzsás vagy keskeny tojásdad, a levél széle ép vagy finoman fogazott, a levélnyél hosszú (3-8 cm). A szárlevelek kisebbek (3-8 cm hosszúak), váltakozó állásúak, a szár alsó részén a levelek nyelesek, a felső részen fokozatosan ülővé (nyél nélkülivé) válnak. A levél színe sötétzöld, felülete érdes, szőrözött (a szőrök rövidek és sűrűk), fonáka világosabb, a levélerek kiemelkedők. A levélzet sűrű, de a szár alsó része a virágzás idejére gyakran kopaszabbá válik.

A növény legnagyobb dísze a virágzat és a virágok. A virágzat a hajtások végén kialakuló, 5-7 cm átmérőjű, közepes méretű, feltűnő, fészekvirágzat (fejecske), amelyet a középen található dudoros, tüskés, kúp alakú termőtáj (diszkusz) és a körülötte elhelyezkedő, felemelkedő (nem lehajló, nem bókoló) szirmok (liguláris virágok) alkotnak. A termőtáj 1,5-2,5 cm széles, dudoros, tüskés felületű, kifejezetten kúpos (magasabb, keskenyebb, élesebb csúcsú, mint az Echinacea purpurea fajnál), a tüskék (apró fészekpikkelyek) hegyesek, merevek. A termőtáj színe a fiatal virágoknál zöldes, majd érés közben rézszínűvé, bronzszínűvé vagy narancsbarnává válik. A 'Rocky Top' fajta legkiemelkedőbb és legismertebb jellemzője a szirmok állása és színe: a szirmok felemelkedőek, vízszintesen vagy enyhén felfelé állnak, nem lehajlók, nem bókolók (ellentétben az Echinacea purpurea fajjal). A szirmok színe élénk rózsaszín vagy mély rózsaszín-lila, a vadon élő Echinacea tennesseensis fajnál halványabb, világosabb rózsaszín, de a 'Rocky Top' fajta intenzívebb, gazdagabb színt mutat. A szirmok töve gyakran sárgás-narancsos árnyalatú, a virág közepe felé haladva a szín egyenletes rózsaszínné vagy lilás rózsaszínné válik. A szirmok száma általában 8-15 darab, a szirmok keskenyek, lándzsásak, 2-4 cm hosszúak, 0,5-1 cm szélesek. A virágzási időszak a nyár közepétől a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően júliustól szeptemberig, a legbőségesebb virágzás augusztusban figyelhető meg. Az elnyílt virágok eltávolításával (deadheading) a virágzás meghosszabbítható, de a növény természetes módon rövidebb ideig, de intenzívebben virágzik, mint az Echinacea purpurea. A virágok a méheket, a poszméheket, a pillangókat (különösen a tarkalepkéket) és más beporzó rovarokat vonzzák. A magok a pintyfélékhez hasonló énekesmadarak számára is táplálékul szolgálnak.

Termés és magszaporítás

A virágzást követően a növény apró, kemény, kaszatterméseket fejleszt, amelyek a tüskés termőtájon (kúp alakú fejecske) belül helyezkednek el. A magok (acheniumok) 4-5 mm hosszúak, barnák vagy szürkésbarnák, a magok a tüskés pikkelyek között maradnak egész télen, ami a madarak számára táplálékot biztosít. A magok jól csíráznak, de hideg rétegződést igényelnek a sikeres csírázáshoz (az őszi vetés vagy a mesterséges rétegződés javasolt). A fajtajellemzők (a rózsaszín szín és a felálló szirmok) magról szaporításkor általában stabilan öröklődnek, de a fajták vegetatív úton (tőosztással) is szaporíthatók.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A kasvirág Rocky Top kifejezetten napfényigényes növény. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez, a bőséges virágzáshoz, a szép, kompakt habitus kialakulásához és a virágok élénk rózsaszín színének megtartásához. Félárnyékban a növény magasabbra nőhet (felnyurgulhat), a virágzás kevésbé bőséges, a szirmok színe fakóbb lesz, a növény hajlamosabb megdőlni. Teljes árnyékban a növény nem virágzik, vagy virágzása erősen gyengül.

Talaj: A kasvirág Rocky Top a természetes élőhelyéhez hasonlóan a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, sziklás, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású (pH 6,5-7,5, de tolerálja a pH 7,5-8,0-t is) talajt kedveli. Kifejezetten jól tűri a meszes, köves, száraz, tápanyagszegény talajokat; sőt, a tápanyagszegény környezetben a legkompaktabb. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős, savanyú kémhatású (pH 6,0 alatti) talajokat nem tűri; ezekben a talajtípusokban a gyökérrothadás kialakulásának veszélye jelentősen megnő. Ültetéskor javasolt a talajt apró kaviccsal, durva homokkal, meszes kőzúzalékkal vagy perlittel keverni a vízelvezetés javítása érdekében.

Öntözés: A kasvirág Rocky Top kifejezetten szárazságtűrő, a mélyre hatoló karógyökérzete lehetővé teszi a hosszabb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan (hetente 1-2 alkalommal) kell öntözni, hogy a gyökerek mélyre hatoljanak. Az idősebb, begyökeresedett (1 évnél idősebb) példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék a mérsékelt égövön (pl. Magyarország) általában elegendő számukra, kivéve a hosszan tartó, forró, csapadékmentes időszakokat (3-4 hét). A túlöntözés a leggyakoribb gondozási hiba, mert a növény nem tolerálja a pangó vizet, és fogékonyabbá válik a gyökérrothadásra. A konténerben nevelt növényeket a nyári hónapokban gyakrabban (heti 1-2 alkalommal) kell öntözni, de hagyjuk a föld felső 3-5 cm-es rétegét teljesen kiszáradni két öntözés között.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Tápanyag-utánpótlás: A kasvirág Rocky Top kifejezetten alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt, tápanyagdús virágföld vagy istállótrágya talajba keverését, mert a túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogéntartalom, a lombozat kárára válik: a növény elveszíti kompakt formáját, a szárak megnyúlnak, a virágzás elmarad vagy gyenge lesz, a növény a lombfejlesztésre koncentrál, és fogékonyabbá válik a gombás betegségekre. Évente egyszer, kora tavasszal (március-április) adható egy nagyon kevés (a csomagoláson javasolt adag negyede-harmada) lassan oldódó, alacsony nitrogéntartalmú (pl. NPK 5-10-10 vagy 5-10-15), virágzó évelők számára kifejlesztett műtrágya. A magas nitrogéntartalmú műtrágyák (pl. gyeptrágyák, zöldnövénytrágyák) kerülendők.

Metszés és ápolás: A kasvirág Rocky Top alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de az alábbi ápolási műveletek javíthatják a növény megjelenését és élettartamát:

Elvirágzott virágok eltávolítása (deadheading): Az elnyílt, elhervadt virágokat a virágzási időszak alatt érdemes eltávolítani (visszavágni az első levélpárig). Ez serkenti az újabb virágbimbók képződését, meghosszabbítja a virágzási időszakot, és megakadályozza a túlzott magképzést. Késő nyáron, augusztus végétől érdemes néhány virágot a növényen hagyni a madarak téli táplálékának biztosítása érdekében.

Visszavágás a virágzás után: A virágzási időszak végén (szeptember-október) a növényt visszavághatjuk a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. Ez segíti a növény telelését, megakadályozza a lisztharmat áttelelését, és tavasszal a növény gyorsabban, erőteljesebben hajt. A visszavágást akár kora tavaszra (március elejére) is halaszthatjuk, ha a téli időszakban is szeretnénk a termőtájak (kúp alakú fejecskék) téldíszként való megjelenését.

Tőosztás: A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal (március-április) javasolt. Ez megakadályozza a növény elöregedését, a virágzás gyengülését és a középrész kipusztulását. A tőosztást végezhetjük úgy, hogy a tövet kiássuk, éles ásóval vagy konyhakéssel 2-3 részre osztjuk, és az osztásokat azonnal visszaültetjük. A tőosztással a növény vegetatív úton is szaporítható, ami garantálja a fajta ('Rocky Top') jellemzőinek megtartását.

Telelés és fagytűrés: A kasvirág Rocky Top kifejezetten kiváló télállóságú. A kifejlett, jól begyökeresedett példányok akár -30°C és -35°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes területén (az USDA 4-5-ös zónáitól kezdve) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt. A fiatal, ősszel ültetett növények számára az első tél előtt egy vékony lombtakaró (3-5 cm) nyújthat extra védelmet, de ez nem kötelező. A konténerben nevelt növényeket is teleltethetjük a szabadban, ha a cserép nagy (legalább 10-15 literes) és a talaj jó vízelvezetésű; extrém hideg teleken a cserép szigetelhető buborékfóliával, jutával, vagy a cserép földlabdáját fagy ellen takarni (pl. vastag lombtakaróval).

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A kasvirág Rocky Top a ritkaságának, a felálló szirmú, élénk rózsaszín virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának, szárazságtűrésének és meszes talajtűrésének köszönhetően kiemelkedő érték a gyűjtők és a préri kertek kedvelői számára. Alkalmazási területei:

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a természetes élőhelyéhez hasonló, laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát; a rózsaszín virágok a szürke kövek között különösen mutatósak.

Évelőágyások előterébe vagy középső részébe – a kompakt méret (40-60 cm) miatt kiváló középtér- vagy előtérnövény.

Napos szegélyekbe, préri kertekbe, vadvirágos kertekbe, természetes hatású kertekbe – a növény a préri hangulatot erősíti, a felálló szirmok egyedivé teszik.

Pillangókertekbe, méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a pillangók, méhek és más beporzók számára.

Konténerekben, nagyobb dézsákban, teraszokon – a kompakt méret és a feltűnő virágok miatt alkalmas konténeres nevelésre (legalább 10-15 literes cserépben), ahol a ritka faj különleges dísze lehet a terasznak.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Gyűjtői kertekbe, botanikus kertekbe – a faj ritkasága és természetvédelmi jelentősége miatt.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A kasvirág Rocky Top felálló szirmú, élénk rózsaszín virágai, sötétzöld lombozata és kúpos, rézbarna termőtájai számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, meszes, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Lila és kék virágú növények: Levendula (Lavandula angustifolia), macskamenta (Nepeta), perovszkia (Perovskia atriplicifolia), kék szúrósgyöngy (Eryngium), törpe nőszirom (Iris pumila) – a rózsaszín és a lila-kék szívek harmonikus, friss, elegáns párost alkotnak, erősítik a természetes, préri hangulatot.

Sárga virágú évelők: Aranyvessző (Solidago), kúpvirág (Rudbeckia fulgida), napvirág (Heliopsis) – a rózsaszín és a sárga szívek kiváló kontrasztot alkotnak, vidám, napsütötte hatást keltenek.

Fehér virágú növények: Fehér kasvirág (Echinacea purpurea 'White Swan'), gyöngyvirág (Convallaria), fehér varjúháj (Sedum) – a fehér szín kiemeli a 'Rocky Top' élénk rózsaszín színét.

Ezüstös levelű növények: Kék csenkesz (Festuca glauca), üröm (Artemisia), bárányfül (Stachys byzantina), szürke varjúháj (Sedum pruinatum) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag, modern, szárazságtűrő hatást keltenek, és kiemelik a kasvirág élénk rózsaszín virágait.

Díszfüvek (alacsonyabb, szárazságtűrő fajták): Törpe árvalányhaj (Stipa tenuissima), kék csenkesz (Festuca glauca) – a díszfüvek lágy, mozgó, levegős habitusa kiválóan kiegészíti a kasvirág merevebb, felálló szár szerkezetét.

Más kasvirág fajták és fajok: Echinacea purpurea fajtákkal (rózsaszín, fehér, narancs), Echinacea pallidával (halványrózsaszín, lehajló szirmok) – a különböző kasvirág fajok és fajták egymás mellé ültetve változatos magasságot, színvilágot és virágformát biztosítanak.

USDA besorolása: 4-8 (Magyarországon a kasvirág Rocky Top teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es (hidegebb északi régiók, pl. Zemplén, Észak-Alföld), 5-ös (középső régiók), 6-os (nyugati régiók) és 7-es (enyhébb déli régiók) zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -30°C és -35°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy. A konténerben nevelt növények is áttelelnek a szabadban, ha a cserép nagy (legalább 10-15 literes) és a talaj jó vízelvezetésű, illetve a cserép földlabdája nem fagy át teljesen.)

Rosakönigin ligeti zsálya	**Salvia nemorosa 'Rosakönigin'**	2 950 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Rosakönigin ligeti zsálya (Salvia nemorosa 'Rosakönigin') kompakt, sűrű, bokros habitusú évelő. Kifejlett magassága általában 40–60 cm, szélessége 30–40 cm között alakul, a termőhelytől és a metszéstől függően azonban ennél valamivel alacsonyabb vagy magasabb is lehet. Levelei sötétzöldek, lándzsásak, finoman fogazott szélűek, enyhénráncos felszínűek, a száron átellenesen helyezkednek el, és a növény alsó részén sűrű, tömött lombozatot alkotnak. Virágai aprók, ajak alakúak, élénk rózsaszínűek, és sűrű, karcsú fürtökben nyílnak a merev szárak végén; a virágzatokat bíbor színű csészelevelek díszítik, amelyek a virágzás után is megmaradnak. Virágzása májustól egészen szeptemberig, kedvező esetben októberig tart, és az elvirágzott virágzatok visszavágásával másodvirágzásra ösztönözhető a nyár végén vagy ősszel. A virágok kellemes, fűszeres illatot árasztanak, és vonzzák a méheket, poszméheket és lepkéket.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb formát és a leggazdagabb virágzást, de a könnyű félárnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, inkább száraz vagy közepesen nedves, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, és a túlöntözést rosszabbul viseli, mint a szárazabb időszakokat. Az első szezonban a megerősödéshez mérsékelt öntözés javasolt.

Télállóság: Teljesen télálló, a legtöbb forrás szerint -28 °C-ig fagytűrő, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 35–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban mérsékelten öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején ritkábban, de mélyen locsolja meg. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megnyúlását és megdőlését okozhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy meghosszabbítsa a virágzást, vagy másodvirágzást serkentsen a nyár végén. A régi, elhalt szárakat kora tavasszal vágja vissza a talajszint közelében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. Csapadékos, enyhe teleken a téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes. Ritkán a lisztharmat, a verticilliumos hervadás és a gyökérrothadás jelentkezhet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyba, cottage- és informális kertekbe, sziklakertbe, kavicskertbe, préri stílusú ültetésekbe és napos, szárazságtűrő kompozíciókba illik. Kiváló vágott virág, és csoportos ültetve összefüggő, rózsaszín színhatást hoz létre. Jól mutat rózsák között, valamint városi, udvari és tengerparti kertekben egyaránt.
Növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.			
Évelők: naprózsa, kúpvirág, varfű, sédbúza – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.			
Rózsák: a ligeti zsálya függőleges virágzata szép kontrasztot ad a rózsák mellett, és jól elrejti a rózsák alsó, kopaszabb részeit.			
Illatos növények: levendula, macskamenta, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a ligeti zsálya virágzása előtt.			
USDA télállósági zóna: 4–8 (a legtöbb forrás a 4-es zónát jelöli meg alsó határként, -28 °C-ig).			
Rose Mädchen kövirózsa	**Sempervivum 'Rose Mädchen'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Rose Mädchen kövirózsa (Sempervivum 'Rose Mädchen', más írásmóddal 'Rosa Mädchen', angol nevén 'Pink Girl') a kövirózsák egyik legbájosabb, sűrűn szőrözött fajtája, amelyet Schara nemesített 2007-ben. Sűrű, tömött, szabályos rozettákat képez, amelyeket sűrű, ezüstös-fehér szőrzet borít; a szőrszálak a levelek széléről és csúcsáról erednek, és erős napfényben még sűrűbbek lesznek, ami a növénynek dérrel borított, fagyos megjelenést kölcsönöz. Levelei húsosak, vastagok, a rozetták tavasszal élénk rózsaszín-rózsás árnyalatot öltenek, nyáron szürkészöldek, a levélalap pedig vörös-rózsaszín színezetű. Kifejlett magassága 5–10 cm, szélessége 8–15 cm között alakul; a rozetták a talaj felszínén sűrű, összefüggő telepet alkotnak, és a növény bőségesen hozza a sarjakat, amelyekkel könnyen szaporítható.
A virágzat a rozetta közepéből kiemelkedő száron nyílik; a virágok rózsaszínűek, és június és július között nyílnak. A virágzás után a virágzó rozetta elhal, de a tövénél új sarjak fejlődnek, így a telep folyamatosan megújul.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a legintenzívebb rózsaszín lombszínt és a legsűrűbb szőrzetet napos helyen hozza, de a részleges árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár köves, homokos vagy sovány talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 4–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta –20 °C és –29 °C közötti fagyokat is elvisel, a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 15–20 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a tömör rozettaforma rovására.

Metszés: Metszésre nincs szükség; az elnyílt virágzatokat távolítsa el, hogy a rozetta ne fordítsa minden erejét magképzésre. Kora tavasszal a télen elhalt, elszáradt rozettákat távolítsa el a telep tisztítása érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. A levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, zöldtetőre, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, valamint konténeres és teraszkerti ültetésekbe illik. Sekély cserépben, alpesi tálban is kiválóan mutat, és a rózsaszínes, szőrös rozetták lágy színfoltot adnak a többi kövirózsa és pozsgás között.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa-fajták, varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kövirózsa tömör rozettáit.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kövirózsa virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4–8.			
Rose of Sharon örökzöld orbáncfű	**Hypericum calycinum 'Rose of Sharon'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Rose of Sharon örökzöld orbáncfű (Hypericum calycinum 'Rose of Sharon') alacsony, sűrű, talajon elterülő vagy sziklákon átbukó örökzöld évelő. Kifejlett magassága 30-60 cm, szélessége 60-90 cm, de kedvező helyen ennél nagyobb felületet is beboríthat. Levelei oválisak, tojásdadok, élénkzöldek, télen is részben megmaradnak. Virágai aranysárga színűek, öt széles szirommal, közepükön feltűnő, sárga porzókoszorúval. Nyár elejétől nyár végéig virágzik, és a virágok vonzzák a méheket, lepkéket. Termése toktermés, amely ősszel érni kezd, de díszértéke elenyésző.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; forró nyári klímán a délutáni árnyékot meghálálja.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot jól viseli.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; az első évben rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot is jól tűri.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, később csak hosszan tartó aszály idején. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elvirágzott virágzatot távolítsa el a hosszabb virágzás érdekében. A növény terjedő hajtásait tavasszal rövidítheti, hogy kordában tartsa a méretét. Az elhalt vagy sérült részeket kora tavasszal vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; az örökzöld lombozat télen is díszít, de zord teleken a levelek egy része elhalhat.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A levéltetvek és a pajzstetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább talajtakaróként, sziklakertbe, kavicskertbe, rézsűre és ágyásszegélybe illik. Kiváló szárazságtűrő, napos fekvésű helyekre, de félárnyékban is megél. Jól mutat természetes, mediterrán és minimalista kertekben, valamint cserépben és konténerben is.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűszer- és illatos növények: levendula, izsóp, zsálya.			
Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.			
USDA télállósági zóna: 5-9.			
Rose Queen japán nőszirom	**Iris ensata 'Rose Queen'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Az Iris ensata 'Rose Queen' a japán nősziromok egyik legkedveltebb és legismertebb fajtája, amely több mint 100 éve van jelen a kertészeti kultúrában. Eredetileg 1915-ben Iris laevigata 'Rose Queen' néven vezették be tévesen, de ma már egyértelműen az Iris ensata fajhoz tartozik. Késő tavasztól nyár elejéig nyíló, lágy színű virágaival igazi ékköve a vízparti kerteknek, patakpartoknak és nedves ágyásoknak.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Rose Queen' habitusa bokros, tövétől sűrűn növő, felálló szárú, amelyet rövid gyöktörzse (rizómája) tart. Levelei keskenyek, lándzsásak, szálasak, élénkzöld színűek, és a növény egész szezonban dekoratív lombot nevel. Június-júliusban nyíló virágai a növény legfőbb díszei: a 90-100 cm magas szárak csúcsán több virág is nyílik, színük világos levendularózsaszín, a szirmokat sötétebb rózsaszín erek díszítik. A virágok a jellemző japán nőszirom formát mutatják, a három lefelé hajló külső szirom és a három kisebb, felálló belső szirom alkotja a szerkezetet.

Magasság: A virágzó szárak magassága eléri a 75-100 cm-t.

Szélesség: Terjedése 45-75 cm között alakul, szépen bokrosodó telepeket alkot.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban. A bőséges virágzáshoz legalább napi 6 óra közvetlen napfény ajánlott.

Talaj: A savanyú kémhatású (pH 5.5-6.5) , tápanyagban gazdag, humuszos, nedves vagy mocsaras talajokat kedveli. Sekély vízben (0-15 cm mélyen) is kiválóan fejlődik. A meszes talajt nem tolerálja!

Ültetési mélység: Vízi környezetbe ültetve a gyökérzet legfeljebb 0-15 cm mélyre kerüljön a vízszint alá. Normál kerti ágyásba ültetve a rizómák a talajfelszínnel egy szintbe vagy kissé az alá kerüljenek.

Öntözés: Folyamatos vízellátást igényel, talaja soha ne száradjon ki, különösen tavasszal és a virágzás idején.

Télállóság (USDA-zóna): A növény jó télállósággal rendelkezik, USDA 5-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Magyarország nagy részén megbízhatóan áttelel, hidegebb területeken vastag takarással (pl. lombtakaró) védhető.

Metszés és osztás:

Tavaszi visszavágás: Kora tavasszal (márciusban) érdemes visszavágni az előző évi elszáradt leveleket, hogy helyet adjunk az új hajtásoknak.

Őszi tisztítás: Ősszel a leveleket a vízfelszín felett vágjuk vissza, ha hidegebb területen élünk.

Osztás: A növényt 3-4 évente érdemes nyár végétől kora őszig (augusztus-szeptember) osztással felfrissíteni.

Tápanyagutánpótlás: Kora tavasszal érdemes lassú oldódású, savanyú talajhoz való műtrágyát vagy komposztot kijuttatni a bőséges virágzás érdekében.

Figyelmeztetés: A növény minden része enyhén mérgező, fogyasztása nem ajánlott. Ültetéskor és osztáskor ajánlott kesztyűt viselni.

Ellenállóság: Szarvasok és nyulak számára ellenálló. Vírusok, baktériumos rothadás és szürkepenész ritkán megtámadhatja.

Kertstílus és növénytársítások:
Elegáns, lágy színű virágai és robusztus habitusa miatt sokféleképpen felhasználható:

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Tavak, patakok partja: A vízparti sáv nélkülözhetetlen dísze, a sekély vízben is megállja helyét.

Mocsárkertek: Nedves, mocsaras részek színesítésére ideális.

Vízi kertek konténerben: Vízinövény-kosarakban, akár kisebb tavacskákban is nevelhető.

Japán kertek: Tökéletes választás japán hangulatú kertekbe.

Évelőágyások nedves részein: Állandóan nyirkos, savanyú talajú ágyásokban is remekül mutat.

Vágott virág: Virágai vázában is sokáig elállnak.

Ajánlott növénytársítások:

Fehér virágú vízinövények: A rózsaszín virágok lenyűgözően kiemelkednek a fehér virágú növények közül.

Kék vagy lila virágú mocsári növények: A rózsaszín és lila rokon színek lágy, harmonikus kombinációt alkotnak. Ültessük mellé mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) kék változatait, vízi mentát (Mentha aquatica).

Sárga virágú mocsári növények: A rózsaszín és sárga élénk, vidám kontrasztot alkot, mocsári nőszirommal (Iris pseudacorus) .

Páfrányok: A könnyed, áttört lombozatú páfrányok, mint az struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris), szépen kiegészítik a japán nőszirom strukturális habitusát.

Díszfüvek: Társíthatjuk más, vízparti díszfüvekkel, vagy sással (Carex) a különböző textúrák játékához.

Tarka levelű növények: Kontrasztos színfoltként ültessük mellé tarka vízi harmatkását (Glyceria maxima 'Variegata') .

Rose Queen japán nőszirom (nagy)	**Iris ensata 'Rose Queen'**	4 950 Ft	5 350 Ft
Rosea levendula	**Lavandula angustifolia 'Rosea'**	2 350 Ft	2 350 Ft

A Rosea levendula (Lavandula angustifolia 'Rosea') 45-50 cm magasra fejlődő, kékes-zöldes színű lombozatot fejlesztő levendula fajta, melynek halvány rózsaszín virágai romantikus hangulatot kölcsönöznek a kerteknek. Legjobb társai ebben más levendula fajták, de jól mutat sok díszfűvel, gaurákkal, más alacsonyabb rózsaszín, vagy fehér évelőkkel (léggömb virág, harangvirág, ászterek, vagy bordós színű levélzettel rendelkező tűzeső fajtákkal) akár színben passzoló rózsákkal is.
Növekedés: 45-55 cm
Fényigény: napimádó
Vízigény: szárazságtűrő
Talajigény: laza szerkezetű, jó vízáteresztő talaj

Rotblum bőrlevél	**Bergenia cordifolia 'Rotblum'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Rotblum bőrlevél egy tömör, rozettás habitusú örökzöld évelő növény, amely 30-40 cm magasra és 40-60 cm szélesre nő. Fő értéke a világosrózsaszín színű, harang alakú virágok, amelyek tömött fürtökben április-május hónapokban nyílnak. A virágok hosszú, vöröses szárakon magasodnak a levelek felett. A nagy, kerekded, bőrszerű levelek sötétzöld színűek, ősszel és télen vörösbarnára színeződnek. A levelek egész évben díszesek maradnak, és sűrű talajtakarót alkotnak.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Félárnyékos vagy árnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag talaj

Távolság: 40-50 cm-es távolsággal

Használat: Talajtakaró árnyékos helyeken, határok, erdei kertek, vízpartok

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal a száraz levelek eltávolítása

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot rövid ideig tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Erdei kertek

Árnyékos kertek

Városi zöldterületek

Vízi partok

Parkok

Alacsony karbantartású kertek

Rozmaring	Rosmarinus officinalis	2 450 Ft	2 450 Ft

1-1,5 m magas, mediterrán származású örökzöld cserje. Levele aromás illatú, ami elmaradhatatlan része a mediterrán konyhának. Kékes virágai kora tavasztól nyílnak. 7a-10a USDA-zóna

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Rózsaszín bugájú pampafű	Cortaderia selloana 'Rosea'	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Rózsaszín bugájú pampafű (Cortaderia selloana 'Rosea') Dél-Amerikából, Argentínából származó, sűrű, felálló, kerekded tövet képező, örökzöld évelő díszfű. Kifejlett magassága a bugavirágzatokkal együtt általában 1,5–2,5 méter, szélessége 1–1,5 méter között alakul; a tövek a tövüknél sűrű, tömött csomót képeznek, a hosszú, szalagszerű levelek pedig elegánsan, ívesen lehajlanak. Levelei kékeszöldek, élesen fogazott szélűek, és télen is részben megmaradnak. Virágzata laza, tollas buga, amely augusztustól októberig nyílik; a bugák eleinte halvány rózsaszínek, majd fokozatosan ezüstös-rózsaszínné, végül barnás árnyalatúvá válnak. A bugavirágzatok akár 50–90 cm hosszúak is lehetnek, és télen is díszítőértékűek maradnak, kiválóan alkalmasak vágott, illetve szárított virágnak. A növény habitusa merev, felálló, a virágzatok súlya alatt enyhén ívesen lehajló.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a meleg, napos, védett fekvésben hozza a legtöbb virágot és a legszebb habitust.

Talaj: Jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, humuszos, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, de a nyári rendszeres öntözést meghálálja. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Mérsékelten fagytűrő, -15 és -20 °C közötti hőmérsékletet visel el. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken téli takarás szükséges: a tövek körül vastag mulcs, illetve a levelek összekötése javasolt, hogy a víz ne folyjon a növény szívébe. Konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság legalább 1,5–2 méter legyen, hogy a tövek szabadon kifejlődhessenek.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású díszfű-trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: A régi lombozatot és az elvirágzott bugákat kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében, kb. 15–20 cm-re. Kesztyű viselése kötelező, mert a levelek éles szélei könnyen megvághatják a kezet. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz részek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: A magyar klímán a hidegebb teleken téli takarás szükséges. A leveleket kösse össze, hogy a víz ne folyjon a növény szívébe, majd a tövénél vastag mulcsot (levél, fenyőág, rőzse) alkalmazzon. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye, és csökkentse az öntözést.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; az őzek és a nyulak is elkerülik. A gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább szoliterként, modern és minimalista kertekbe, mediterrán hatású kompozíciókba, kavicskertbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint cottage- és informális kertekbe illik. Kiváló focal pointként működik a kertben, és a hátsó napfényben visszafénylő bugavirágzata különösen látványos. Konténerben és teraszon is nevelhető. Kiváló vágott és szárított virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Őszi virágzású évelők: őszirózsa, krizantém, varjúháj, kúpvirág – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a pampafüvet.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Rózsák és borókák: a pampafű tollas bugái szép kontrasztot adnak a rózsák mellett, a boróka pedig télen is struktúrát nyújt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 7-10 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában téli takarással tartható megbízhatóan). 7a-10a USDA-zóna			
Rózsaszín szakállas bugatölcsér	**Penstemon barbatus var. nanus 'Pinacolada Rosy Red Shades'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades' (Penstemon barbatus var. nanus 'Pinacolada Rosy Red Shades') – A kompakt, bő virágú évelő
A szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades', Észak-Amerika déli részéről származó, évelő növény. A 'Pinacolada' sorozat tagjaként ez a fajta kiemelkedik kompakt habitusával, bő virágzásával és első éves virágzásával. A sorozat hat színváltozatban elérhető, amelyek közül a 'Rosy Red Shades' a rózsásvörös árnyalatokkal rendelkezik. Ez a növény a nyár első felében nyíló, feltűnő virágaival és igénytelenségével az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, bő virágzása és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades' egy kompakt, bokros növekedésű, évelő növény. Kifejlett magassága 20-30 cm, szélessége 20-30 cm között alakul. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások egyenesen felállók, a virágzó szárak sűrűn elágazóak. A növény évelő, kedvező körülmények között 3-5 évig is élhet.
A levelek lándzsásak vagy oválisak, élénkzöldek, a növény sűrű, bokros lombozatát alkotják. A lombozat egész szezonban dekoratív, és a növény a virágzás után is rendezett megjelenést biztosít.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, sűrű, felálló fürt, amelyen a trombita alakú, rózsásvörös színű virágok helyezkednek el. A virágok színe a rózsásvörös különböző árnyalatait mutathatja, ami a fajta nevében is tükröződik. A virágzási időszak a késő tavasztól a késő nyárig tart: Magyarországon jellemzően májustól szeptemberig, a legbőségesebb virágzás június-júliusban figyelhető meg. A virágzás első éves, ami azt jelenti, hogy a magról nevelt növények már az első évben virágot hoznak. A virágok a pillangókat, a méheket és a kolibriket vonzzák, ami különösen értékes a biokertekben. Az elnyílt virágok eltávolításával (deadheading) a virágzás meghosszabbítható.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról szaporítható; a magokat meleg helyen (20°C körül), vékony földtakarás mellett kell elvetni. A csírázás után hűvösebb körülmények között neveljük a palántákat. A fajta vegetatív úton (dugványozással) is szaporítható, de a magról történő szaporítás is megőrzi a fajtajellemzőket.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A szakállas bugatölcsér napos fekvést igényel a legbőségesebb virágzáshoz. Félárnyékban is nevelhető, de ott a virágzás kevésbé bőséges lehet.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, száraz vagy közepesen nedves talajban érzi magát. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri. Ültetéskor a túlzott tápanyag- és vízellátás kerülendő.

Öntözés: A szakállas bugatölcsér szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek. A túlöntözés kerülendő, mert a növény fogékonyabbá válik a gyökérrothadásra.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony vagy közepes tápanyagigényű. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására mehet. A virágzási időszakban egy kevés, kiegyensúlyozott műtrágya adható.

Metszés és ápolás: A szakállas bugatölcsér alapvetően nem igényel rendszeres metszést. A virágzási időszak alatt az elnyílt virágok eltávolítása serkenti az újabb virágzást és meghosszabbítja a virágzási időszakot. Ha a nyár közepén a növény virágzása gyengül, a növényt visszavághatjuk, ami serkenti az új hajtások képződését és az őszi virágzást. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal javasolt.

Telelés és fagytűrés: A szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades' kifejezetten kiváló télállóságú; akár -29°C és -40°C közötti hőmérsékletet is elvisel a jó vízelvezetésű talajtól függően. Magyarország teljes területén (USDA 5-7-es zóna) gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény félig örökzöld, a lombozat télen részben megmaradhat. Fontos, hogy a téli talaj ne legyen pangó vizes, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades' a rózsásvörös virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának, szárazságtűrésének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a napos, száraz kertekben:

Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe (xeriscape) – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret (20-30 cm) miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben. Természetes hatású kertekbe, vadvirágos kertekbe – a növény a természetes hangulatot erősíti, a virágok vonzzák a beporzó rovarokat. Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára. Változatos növénytársítások (társítási javaslatok) A szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades' rózsásvörös virágai és sötétzöld lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók: Ezüstös levelű növényekkel: Üröm (Artemisia), kék csenkesz (Festuca glauca) – a különböző ezüstös, szürkés árnyalatok textúrákban gazdag hatást keltenek, és kiemelik a rózsásvörös virágokat. Kék virágú növényekkel: Macskamenta (Nepeta), zsálya (Salvia) – a kék és a rózsásvörös szívek harmonikus, friss kontrasztot alkotnak. Sárga virágú növényekkel: Nagyvirágú napszem (Coreopsis) – a sárga és a rózsásvörös szívek vidám, napsütötte hatást keltenek. Díszfüvekkel: Árvalányhaj (Stipa), tollbuga (Pennisetum) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a szakállas bugatölcsér tömöttebb, bokros formáját. Lila virágú növényekkel: Levendula (Lavandula) – a lila és a rózsásvörös szívek harmonikus, mediterrán hangulatú párost alkotnak. USDA besorolása: 3-9 (Magyarországon a szakállas bugatölcsér 'Pinacolada Rosy Red Shades' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok a jó vízelvezetésű talajtól függően akár -29°C és -40°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)			
Rubra Parlagi macskatalp	**Antennaria dioica 'Rubra'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A 'Rubra' a parlagi macskatalp (Antennaria dioica) egyik legszebb, legkedveltebb vöröses virágú változata. Ez a fajta a fészkesvirágzatúak (Asteraceae) családjába tartozó, Európában és Ázsiában honos, a száraz gyepek, sziklás lejtők, homokpuszták lakója. A nemzetség neve, az Antennaria a virágok felleveleinek antennára emlékeztető formájából (a hímvirágzat lepellevelei) ered. A fajta a hagyományos, fehér virágú fajtákkal szemben feltűnőbb, rózsaszínes-bíbor színével hívja fel magára a figyelmet. Nevét a macska mancsára emlékeztető, puha, molyhos leveleiről kapta (macskatalp, angolul "cat's foot" vagy "pussytoes").
Külső megjelenés
A parlagi macskatalp 'Rubra' alacsony, törpe növekedésű, gyepes (tőálló) évelő, amely a rövid indaszerű hajtásokkal (sztólonokkal) lassan terjedve sűrű, szőnyegszerű telepeket képez. Kifejlett magassága 5-15 cm, szélessége a terjedő hajtásokkal 20-40 cm (vagy több) között alakul. A növény lassú növekedésű, de idővel (évi 10-20 cm) nagy felületeket is beboríthat.
A növény legszembetűnőbb tulajdonsága a lombozat. A levelek aprók (1-4 cm hosszúak), tojásdadok vagy lándzsásak, a tőlevélrózsa levelei szélesebbek, a szárlevelek kisebbek, lándzsásak. A levelek mindkét oldalát sűrű, fehér vagy szürkés nemezes molyhos szőr borítja, ami a növénynek puha, bársonyos tapintást és ezüstszürke megjelenést kölcsönöz, még a legszárazabb időben is. Ez a molyhos szőrzet segíti a növényt a vízpárologtatás csökkentésében.
A növény legnagyobb dísze a virágzat. A virágok aprók (4-6 mm hosszúak), fejecskékbe tömörülnek (capitulum). A virágok a szárak csúcsán, 6-12 cm hosszú, felálló száron, laza, sátorozó virágzatban vagy csomókban helyezkednek el (2-12 fejecske egy száron). A 'Rubra' változat virágainak színe a nyíláskor élénk bíborpiros, rózsaszínű, mély rózsaszín vagy bíborvörös. A növény kétlaki (dioecious) , vagyis a hím- és nőivarú virágok külön egyedeken fejlődnek. A porzós (hímivarú) példányok virágzata feltűnőbb, dúsabb, a termős (nőivarú) példányok virágzata kevésbé mutatós, de a megtermékenyülés után a szőrös magvak (a növény szél által terjesztett kaszattermései) a kert más részeire is eljuthatnak. A virágok illata enyhén édeskés.
Virágzás
A parlagi macskatalp 'Rubra' virágzási ideje a tavasz vége és a nyár eleje: május végétől június végéig (június közepéig) nyílik. A virágok a méheket, a pillangókat és a legyeket vonzzák.
Terjedés, növekedési erély
A növény a rövid indaszerű, föld feletti vagy föld alatti hajtásokkal (sztólonokkal) lassan, de folyamatosan terjed. Kiváló talajtakaró nagyobb felületekre, kavicsos rézsűkre, sziklakertbe. Kisebb kertekben, kövek közé ültetve azonban a terjedése könnyen korlátozható a túl messzire növő hajtások időszakos visszavágásával.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, sziklakerti fekvésű helyet igényel. A növény elviseli a félárnyékot is, de a legdúsabb, legszebb lombozatot és a legbőségesebb virágzást teljes napfényben hozza. Félárnyékban a levelek elveszíthetik intenzív ezüstszürke színüket, a virágzás gyengébb lehet.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, laza, homokos vagy kavicsos, meszes, tápanyagszegény talajban érzi magát. A pH tekintetében nem érzékeny: a savanyútól a lúgos (meszes) talajokig is megél. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri. Kifejezetten előnyös a tápanyagszegény talaj, mert ott a legszebb a lombozat ezüstszürke színe és a legtömöttebb a növekedés.

Öntözés: Kimondottan szárazságtűrő. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést nem igényelnek, a természetes csapadék is elegendő számukra. A túlöntözés a leggyakoribb hiba, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: Kifejezetten alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor ne keverjünk komposztot a talajhoz, és a későbbiekben se trágyázzuk. A túlzott tápanyag (különösen a nitrogén) a lombozat kárára megy: a növény elveszíti kompakt formáját, a szárai megnyúlnak, a lombozat színe elveszíti ezüstös színét.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést. Az elvirágzott szárakat a virágzás után (nyár elején) érdemes eltávolítani, hogy a növény ne a magképzésre, hanem az új lombozat és a következő évi virágbimbók fejlesztésére koncentráljon. A kártevők elkerülése érdekében az elszáradt leveleket is el lehet távolítani.

Terjedés korlátozása: A növény a sztólonokkal (indákkal) terjed. Kisebb kertekben érdemes a terjedését rendszeres (évi 1-2 alkalommal) visszavágással korlátozni, hogy a növény ne terjedjen túl a kijelölt területen.

Telelés: Kimondottan télálló, a növény akár -34°C-ig ellenáll a hidegnek (USDA 3-7), így Magyarország egész területén gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel. A növény föld feletti része (az örökzöld lombozat) azonban télen is megmarad, de a nagyon zord, hótalan teleken a levelek megfagyhatnak, de a növény a gyökérzettől tavasszal újrahajt.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, a szarvasok és nyulak kerülik. A pangó vizes talajban a gyökérrothadás alakulhat ki. Ritkán a lisztharmat

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

vagy a rozsda is megjelenhet a leveleken.

Felhasználás a kertben
A parlagi macskatalp 'Rubra' a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Sziklakertekbe, kőkertekbe, sziklaüledékekre, kavicsos kertekbe – eredeti élőhelyét idézi

Szegélyágyásokba, törpe kerti ágyásokba, évelőágyások előterébe – alacsony termete miatt ideális

Talajtakarónak – nagyobb felületek (akár 1-2 négyzetméteres területek) beborítására, ahol megakadályozza a gyomok növekedését

Zöldtetőkre – sekély gyökérzete és szárazságtűrése miatt kiváló

Tömeges csoportos ültetésre – a virágok egységes, bíborpiros színfoltot alkotnak

Konténeres teraszokra, erkélyekre – a növény a cserepekben is jól érzi magát, de a cserépnek jó vízelvezetésűnek kell lennie

Vágott virágnak – a virágok vázában is mutatósak (frissen), és szárítva is használhatók.

Változatos növénytársítások
A parlagi macskatalp 'Rubra' bíborpiros virágai és ezüstszürke lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló igényű növényekkel:

Alacsony tűlevelűekkel: Törpe boróka (Juniperus), törpefenyő (Pinus mugo) – a sötétzöld szín és az ezüstös szürke kontrasztot alkot

Pozsgásokkal: Varjúháj (Sedum) fajták, kövirózsa (Sempervivum) – a pozsgások szintén szárazságtűrők, és szép textúrát adnak a kompozíciónak

Kakukkfűvel (Thymus), kék csenkesszel (Festuca glauca) – a különböző zöld és szürke árnyalatok harmonikus egységet alkotnak

Alacsony harangvirágokkal (Campanula) – a kék-lila harangvirágok a bíborpirossal (rózsaszínnel) harmonikus, elegáns párost alkotnak

Dianthus (szegfű) fajtákkal – a rózsaszín, piros vagy fehér virágok jól passzolnak a macskatalp színvilágához

USDA besorolása: 3-7 (Magyarország egész területén, a 6a-7b zónákban a növény teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is biztonságosan nevelhető).

Rubra Szeldelt levelű szellőrózsa	**Anemone multifida 'Rubra'**	2 950 Ft	3 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A szeldelt levelű szellőrózsa 'Rubra' (Anemone multifida 'Rubra') az észak-amerikai származású Anemone multifida faj kárminpiros változata. Kis termetű, kompakt évelő, amely 2-5 év alatt éri el végleges méretét: magassága általában 20-30 cm, szélessége 15-30 cm között alakul, így sűrű, párnás bokrot képez. Levelei mélyen szeldeltek, páfrányra emlékeztető textúrájúak, finom szőrzettel borítottak, ezüstös-zöld árnyalatukkal már virágzás előtt is dekoratívak. A virágok 2-3 cm átmérőjűek, csésze alakúak, sötét rózsaszín-kárminpiros szirmokkal és élénk sárga porzókkal. Virágzás után jellegzetes, bolyhos, ezüstszürke magtokok díszítik, amelyek tovább nyújtják a növény látványértékét.
Igényei

Fény: Napos vagy félárnyékos fekvés az ideális; forró nyári klímán a délutáni árnyékot meghálálja.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, inkább szárazabb vagy közepesen nedves talajt igényel. A pangó vizet nem kedveli, a túlöntözést kifejezetten károsítja.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a szárazságot viszonylag jól tűri, de virágzás idején a rendszeres öntözés javítja a virágok méretét és a lombozat frissességét.

Télállóság: Rendkívül fagytűrő; akár -20 °C-ot is elvisel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse olyan helyre, ahol a talaj nem tömődik össze. A gyökerek viszonylag sekélyen helyezkednek el, ezért az ültetőgödörbe keverjen kavicsot vagy durva homokot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első néhány hétben rendszeresen öntözze, amíg a gyökerek megerősödnek. Később a természetes csapadék általában elegendő; aszályos időszakban hetente egyszer mélyen locsolja meg.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya támogatja a növekedést; túlzott trágyázásra nincs szükség.

Metszés: A virágok elhervadása után a visszamaradt magtokok eltávolítása meghosszabbíthatja a virágzást, de a díszes magtokok téli látványként is megmaradhatnak. Kora tavasszal a régi lombozat visszavágása segíti az új hajtások fejlődését.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény a föld feletti részeit elveszíti, tavasszal újra hajt. Nagyon csapadékos teleken a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Kerti stílus
Ez a szellőrózsa leginkább sziklakertbe, kavicskertbe és alpesi jellegű kompozíciókba illik, ahol a finom textúrájú lombozat és a kompakt termet érvényesül. Emellett cottage- és informális kertek előterébe, évelőágyások szegélyébe, valamint erdei kertekbe is kiváló választás, ahol a félárnyékos, humuszos talajt kedveli. Cserépben és konténerben is szépen mutat, így teraszra vagy balkonra is kerülhet.
Növénytársítások

Alpesi és sziklakerti társak: ködvirág, harangvirág, kőtörőfű, kankalin, szegfű – ezek hasonló talaj- és fényigényűek, és együtt változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Fűfélék: csenkesz és sásfajok – a fűfélék lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Hagymás növények: krókusz, törpe írisz, gyöngyike, mini nárcisz – ezek korán virágoznak, így a szellőrózsa virágzása előtt is színt visznek a kertbe.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Erdei és árnyéktűrő társak: hosta és páfrányok – nedvesebb, félárnyékos zugokban szép kontrasztot alkotnak a szellőrózsa finom lombozatával.

Préri és természetes hatású társulások: préri rózsa, selyemkóró, kúpvirág, préri fű – szárazabb, napos élőhelyeken alkotnak harmonikus együttest.

USDA télállósági zóna: 2-9.

Sárga fodros sásliliom	**Hemerocallis 'First Knight'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'First Knight' az 1995-ben bejegyzett, tetraploid sásliliom fajták egyik legkedveltebb képviselője, amelyet Salter nemesített. Nevének jelentése „Első lovag”. Kifejlett magassága a levelekkel együtt 50-60 cm, a virágzó szárakkal 70-80 cm, szélessége 40-60 cm. A növény gyepes, bokros habitusú, erős, sötétzöld levelekből álló, sűrű, szálas lombkoronát alkot, mely dekoratív marad a nyári melegben is.
Külső megjelenés A növény legnagyobb dísze a nagy, 12-15 cm átmérőjű, tölcséres virágok, amelyek tömött, elágazó virágzatban, a felső lomblevél felett bontakoznak ki. A virág színe a krémes sárgától a halvány vajszínig terjed, a sziromlemezek peremén azonban végig határozott, aranysárga, erősen fodros szegély húzódik, ami a fajta védjegye. A mélyen fekvő, fürtösen csoportosuló bimbók kezdetben ezüstösen csillognak, majd sárgásfehérre nyílnak. A virágok enyhén, finoman illatosak. Virágzási ideje június végétől indul, majd a nyár folyamán ismétlődően újra virágzik.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos, esetleg félárnyékos helyet kedvel. Napon a legbőségesebb a virágzás.

Talaj: jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag, semleges kémhatású talaj a legmegfelelőbb. A talaj iránt nem túl válogatós, a semleges pH (6,6-7,5) a legideálisabb. A pangó vizet nem tűri.

Öntözés: közepes vízigényű; a szárazságot jól tűri, de a tartós aszályban a levelek széle besodródhat. A fiatal növényeket az első évben rendszeresen öntözni kell.

Tápanyag-utánpótlás: tavasszal, a növekedés indulásakor komposzttal vagy lassú oldódású, teljes értékű műtrágyával érdemes megtámogatni a bőségesebb virágzás érdekében.

Metszés: különösebb metszést nem igényel. Az elnyílt virágokat érdemes eltávolítani, ami serkenti az ismételt virágzást. Késő ősszel vagy kora tavasszal a teljesen elszáradt lombozatot a tövénél vissza lehet vágni.

Télállóság: kiválóan télálló, a növény akár -45 °C-ot is elvisel, így hazánk egész területén gond nélkül tartható.

Betegségek: a fajta ellenálló a legtöbb kártevőre és gombás betegségre. A fiatal hajtásokat tavasszal a csigák károsíthatják.

Kertstílus, ahová illik Természetes és vadvirágos kertek, romantikus kertek, angol vidéki kertek, tömeges csoportos ültetések, szegélyágyások, előkertek, városi kertek, konténeres teraszok.
Változatos növénytársítások

Kék és lila virágú évelők: levendula, macskamenta, perovszkia.

Őszi virágzású évelők: őszi őszirózsa (Aster), lángvirág (Phlox), kőtörőfű (Saxifraga) – a sásliliom virágzása után veszik át a főszerepet.

Díszfüvek: tollbuga (Molinia), japán vértfű (Imperata cylindrica) – textúrájával kontrasztot alkot.

Szines évelők: pünkösdi rózsa (Paeonia), tüdőfű (Pulmonaria), kőtörőfű.

Alacsony talajtakarók: árnyéki meténg (Vinca minor), pachysandra.

Tavaszi hagymások a tövébe: krókusz, gyöngyike, törpe nárcisz.

USDA besorolása: 4-10 (Magyarország egész területén, 5-7-es zónákban biztonságosan nevelhető).

Sárga pompás kúpvirág	Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Sárga hosszúkás szirmú, fészekvirágú évelő. Megfelelő gondozás mellett erőteljesen növekszik, bokrosodik. Hosszú ideig virágzik, nyártól egészen az első fagyokig. Napos, meleg helyen, és mérsékelten száraz vagy nedves, tápanyagban dús talajban érzi jól magát. Kedveli az üde, humuszos táptalajt. Virágágyásba évelők mellé, illetve vidám, természethű kertekbe ajánljuk. Az elvirágzást követően a virágszárakat metsszük ki.			
Sárgalombú leyland ciprus (legnagyobb)	**Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'**	6 500 Ft	6 500 Ft
Sárgalombú leyland ciprus (nagyobb)	**Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'**	5 650 Ft	5 650 Ft
Sarlós gamandor	**Teucrium chamaedrys**	2 450 Ft	2 450 Ft
A Sarlós gamandor kissé tarackoló, erős szárú, bokros növekedésű félcserje Magassága 20-30 cm. Levél:a tojásdad levelek széle csipkés vagy fogazott, rövid nyéllel átellenesen csatlakoznak a szárhoz. Virágai rózsaszínűek, ajakosak, örvökben nyílnak augusztus, szeptember környékén. Évelő- vagy virágágyásban kisebb csoportokban mutat a legszebben. Gyógynövény, gyomor-és bélrenyheség ellen használják			
Sásliliom sárga törpe	**Hemerocallis Stella de Oro**	2 450 Ft	2 450 Ft
Az 'Stella de Oro' hosszú ideig virágzik, általában júniustól szeptemberig. A csodálatos aranysárga virágok a növény báját adják, és jól kiemelkednek a többi környező növény között. A Sásliliom gyors növekedésű, így hamar élvezheti a gazdag virágzást és a dús lombozatot. Kúszó rizómáival gyorsan terjed. Ültessük virágagyakba, sziklakertbe, kerti tó partjára, nagyobb növényel alá. Gondozási útmutató: Fény és Hely: Az 'Stella de Oro' a napos és félárnyékos területeket egyaránt elviseli. Ültessük olyan helyre, ahol legalább napi 6-8 óra napfény éri, hogy a virágzás minél gazdagabb legyen. Talaj: A jó vízelvezetéssel rendelkező, tápanyagban gazdag talaj ideális választás. Az 'Stella de Oro' jól teljesít különböző talajtípusokban, de egy jó minőségű kerti talaj segít a virágzásban és növekedésben. Öntözés: A növény igényli a rendszeres öntözést, különösen a szárazabb időszakokban. Ellenőrizze a talaj nedvességszintjét, és öntözzön megfelelően, hogy a növény megfelelően hidratált legyen. Metszés: Az elnyílt virágokat távolítsuk el, hogy serkentsük az új virágzást, és a növény rendezett megjelenését megőrizzük. A tél vége felé, a hervadt hajtásokat is vágjuk vissza. Tápanyag: A tavasz elején adjunk lassú felszívódású műtrágyát a növénynek, ezzel támogassuk a virágzást és a növekedést. Az Hemerocallis 'Stella de Oro' sásliliom hálás és könnyen gondozható növény, amely szép virágokkal és hosszan tartó virágzással teszi különlegessé a kertet.			
Schneekissen törpe őszirózsa	**Aster dumosus 'Schneekissen'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Schneekissen törpe őszirózsa (Aster dumosus 'Schneekissen') a törpe őszirózsa egyik legalacsonyabb és legkompaktabb fajtája, amely sűrű, félgömb alakú, párnás tövet képez. Kifejlett magassága 25–35 cm, szélessége 30–40 cm között alakul; a tövek a talaj közelében sűrű, tömött lombozatot alkotnak, és virágzáskor a virágzatok szinte teljesen beborítják a bokrot. Levelei lándzsásak, ép szélűek, fényesek, sötétzöldek, és a tövénél sűrű, tömött rózsát alkotnak.
A virágzat margarétaszerű fészekvirágzat, amelyet fehér nyelves virágok (a látványos „szirmok") és élénk sárga csöves virágok (a központi korong) alkotnak; a virágzatok átmérője mintegy 2–3 cm. A virágok tömegesen, dús csoportokban nyílnak a szárak végén, és a fajta a hagyományos őszi őszirózsáknál korábban, már augusztusban virágzásba kezd. Virágzása augusztustól októberig tart, és a virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a délutáni árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, friss, humuszos talajt kedvel; a pangó vizet rosszul tűri, de a szárazabb időszakokat is elviseli. A talaj kémhatására nem különösebben érzékeny.

Vízigény: Közepes; a rendszeres öntözést meghálálja, különösen virágzás idején, de a kifejlett növény a rövidebb szárazabb időszakokat is átvészeli.

Télállóság: Az USDA 4–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. A növények közötti távolság 30–40 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a lombozat felülről történő öntözését, mert ez elősegíti a gombás betegségek kialakulását.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő; a túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el a virágzás meghosszabbítása érdekében. A virágzás után a szárakat a talajszint közelében vágja vissza, ami megakadályozza a nem kívánt magszórást, és serkenti a tövet a következő évi virágzásra. A töveket 2-3 évente érdemes megosztani a vitalitás megőrzése érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a lisztharmat és a levélfoltosság ritkán jelentkezhet, különösen párás, meleg időben. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább évelőágyak szegélyébe, sziklakertbe, kis kertekbe, dézsába és cserépbe, valamint préri stílusú és cottage-kertekbe illik. Kompakt mérete és késői virágzása miatt különösen értékes a kertben, amikor a legtöbb nyári évelő már elvirágzott. Kiváló vágott virág, és csoportos ültetésben összefüggő, fehér színfelületet hoz létre.
Növénytársítások

Évelők: kasvirág, cickafark, varjúháj, krizantém – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Fűfélék: díszfüvek, csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a törpe őszirózsa tömör habitusát.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Korán virágzó hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a törpe őszirózsa virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 4–8.			
Scorpius kövirózsa	**Sempervivum 'Scorpius'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Scorpius kövirózsa (Sempervivum 'Scorpius') a kövirózsák egyik legfeltűnőbb, sötét lombozatú hibrid fajtája. Sűrű, szabályos, tömött rozettákat képez, amelyek mélyvörös, bíbor és borvörös árnyalatúak; a levélszín a napfény erőssége és a hőmérséklet szerint változhat, de napos helyen marad a legintenzívebb. Levelei húsosak, vastagok, szorosan egymáshoz simulnak, és a rozetta alakja rendezett, geometrikus. Kifejlett magassága 5–10 cm, szélessége 8–20 cm között alakul; a rozetták a talaj felszínén sűrű, összefüggő telepet alkotnak, és a növény dúsan hozza a sarjakat, amelyekkel könnyen szaporítható.
A virágzat a rozetta közepéből kiemelkedő száron nyílik; a virágok rózsaszínűek, és június és augusztus között nyílnak. Virágzáskor a növény magassága elérheti a 20 cm-t. A virágzás után a virágzó rozetta elhal, de a tövénél új sarjak fejlődnek, így a telep folyamatosan megújul.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a legintenzívebb lombozatszínt napos helyen hozza, de a részleges árnyékot is elviseli.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár köves, homokos vagy sovány talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 3–4. éghajlati zónától megbízhatóan áttelel; a fajta –20 °C alatti fagyokat is elvisel, és a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül is biztonságosan tartható.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 15–20 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a tömör rozettaforma rovására.

Metszés: Metszésre nincs szükség; az elnyílt virágzatokat távolítsa el, hogy a rozetta ne fordítsa minden erejét magképzésre. Kora tavasszal a télen elhalt, elszáradt rozettákat távolítsa el a telep tisztítása érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. A levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, zöldtetőre, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, valamint konténeres és teraszkerti ültetésekbe illik. Sekély cserépben, alpesi tálban is kiválóan mutat, és a sötét rozetták kontrasztos színfoltot adnak a világosabb, ezüstös vagy zöld levelű növények között.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa-fajták, varjúháj (Sedum), kövirózsa (Sempervivum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kövirózsa tömör rozettáit.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kövirózsa virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 3–4 (a magyarországi klímán teljesen télálló).			
Sea Pink tengerparti pázsitszegfű	**Armeria maritima 'Sea Pink'**	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A tengerparti pázsitszegfű 'Sea Pink' (Armeria maritima 'Sea Pink') tengerparti származású, párnás növekedésű évelő. Levelei keskenyek, tűszerűek, örökzöldek, sűrű, félgömb alakú törpecsoportot alkotnak. Virágai apró, rózsaszín-élénk rózsaszín gömbökben nyílnak, merev, vékony szárakon, tavasszal és kora nyáron. Kifejlett magassága 15-20 cm, szélessége 20-30 cm. Elvirágzás után a virágfejek visszavágásával gyakran újabb virágzásra ösztönözhető.
Igényei

Fény: Teljes nap, esetleg enyhe délutáni árnyék a forró nyári időszakban.

Talaj: Jó vízáteresztő, homokos, kavicsos, inkább szegényes talaj. A pangó vizet és a nehéz agyagtalajt nem tűri.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson is megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; a szárazságot jól tűri, de az első évben rendszeres öntözés segíti a megerősödést.

Télállóság: Fagytűrő.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel, napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében.

Öntözés: Az első szezonban hetente öntözze, de kerülje a túlöntözést. Később a természetes csapadék általában elegendő.

Tápanyag: Nem igényel sok tápanyagot; tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő.

Metszés: Az elvirágzott virágfejek rendszeres eltávolítása nyújtja a virágzást és megőrzi a kompakt formát.

Átteleltetés: Különleges védelem nem szükséges, de a téli pangó víz károsíthatja. Csapadékos teleken gondoskodjon a talaj vízáteresztéséről.

Betegségek és kártevők: Ritkán betegszik meg; a gyökérrothadásra érzékeny lehet, ha a talaj túl nedves. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, alpesi jellegű kompozíciókba és tengerparti hatású kertekbe illik. Kiváló ágyásszegélybe, évelőágyás előterébe, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat természetes, szárazságtűrő és minimalista kertstílusokban.
Növénytársítások

Alacsony évelők: kakukkfű, varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz, törpe írisz.

Fűszer- és illatos növények: levendula, izsóp, zsálya.

Szárazságtűrő társak: naprózsa, kúpvirág, préri fű.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
USDA télállósági zóna: 4-8.			
Shenandoah vesszősköles	**Panicum virgatum 'Shenandoah'**	2 750 Ft	2 750 Ft
A Shenandoah vesszősköles egy különleges új fajta, melynek lombozata a fő különlegessége, hiszen már korán, nyár elején a zöld levelek hegye pirossá válik. Emiatt még jobban mutat a nyári időszakban is, akár vegyes virágfelületekben, akár csak a gyepbe kiültetve szoliterekként. 80-100 cm magasra fejlődik, eleinte karcsú oszlopszerű habitusa lesz, majd idővel egyre inkább szélesedő gömb formát vesz fel. Virágzata nyár végén, kora ősszel jelenik meg rózsaszínes narancsos árnyalattal, majd az időjárás hidegebbre fordultával a lombja drámai sárgás színt vesz fel. Jó vízáteresztő normál kerti talaj megfelelő számára. Napos helyre telepítsük a szebb színek elérése érdekében. Száraz nyarakon az öntözést meghálálja. Télen érdemes fenthagyni a lombozatot, hiszen a téli aspektusban is gyönyörű. Tavasszal vissza lehet vágni 10-12 cm magasan.			
Shirley Blue macskafarkú veronika	**Veronica spicata 'Shirley Blue'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Shirley Blue macskafarkú veronika (Veronica spicata 'Shirley Blue') alacsony, sűrű, párnás tövet képező, lombhullató évelő. Kifejlett magassága 20–40 cm, szélessége 30–50 cm között alakul; a tövek a talaj felszínén szőnyegszerűen terülnek el, és virágzáskor a virágfürtök sűrű csoportokban emelkednek a lombozat fölé. Levelei hosszúkásak, lándzsásak, finoman fogazott szélűek, sötétzöldek, és a tövénél sűrű, tömött lombozatot alkotnak.
A virágzat karcsú, felálló fürt, amely a hajtások felső részén nyílik. A virágok élénk kék-ibolyáskék színűek, aprók, és a fürtök mentén sűrűn helyezkednek el, így a növény virágzáskor messziről feltűnő kék színfoltot ad. Virágzása tavasz végétől (május végétől) nyár közepéig (júliusig) tart, és az elnyílt virágfürtök visszavágásával másodvirágzás is serkenthető. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a méheknek és a lepkékenek.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális; a napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást, de a forró délutáni napsütéstől védett helyen is szépen fejlődik.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár meszes, homokos vagy kavicsos talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-alacsony; a kifejlett növény rövidebb szárazságot is elvisel, de a rendszeres, mérsékelt öntözést meghálálja. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Az USDA 3–8. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy félárnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagban szegény vagy közepesen termékeny talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágfürtöket rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást és serkenti az új bimbók képződését. A virágzás után a növényt enyhén visszavágva tömörebb, kompaktabb habitus érhető el. Kora tavasszal a régi, elhalt lombozatot távolítsa el.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló; a csigák, a levéltetvek és a kabócák kisebb kárt okozhatnak. A rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel, és ritkán lisztharmat vagy levélfoltosság jelentkezhet.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, ágyásszegélybe, rézsűre, városi és udvari kertekbe, cottage- és informális kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, párnás habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás. Kiváló vágott virág, és a virágzás idején élénk kék színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Illatos és fűszeres növények: levendula, macskamenta, kakukkfű – hasonló igényűek, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Alacsony évelők: varjúháj, kövirózsa, szegfű, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos textúrával egészítik ki a kompozíciót.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a veronika tömör habitusát.

Rózsák: a veronika alacsony, rendezett habitusa jól kiegészíti a rózsák tövét, és elrejti azok alsó, kopaszabb részeit.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 3–8.

Silver kövi varjúháj	**Sedum rupestre 'Silver'**	1 950 Ft	1 950 Ft

A Silver kövi varjúháj (Sedum rupestre 'Silver') egy örökzöld sziklakerti pozsgás növény, mely köves, száraz sziklakertek elmaradhatatlan eleme. Ezüstös kék lombja, sárga virágzata, és kissé rózsaszínesre, vörösre való őszi színeződésével igazán tetszetős növényke.
Virágzása: július – augusztus
Levélzet: örökzöld
Magassága: 10-15 cm
Talajigény: laza, vízáteresztő
Fényigény: napimádó
Vízigény: ültetéskor kell locsolni, de azt követően soha
Első sorban sziklakertek, kőkertek növénye, de szárazon rakott támfalakba, kerítés lábazatokra, repedezett burkolatba, vagy tipegők közé telepíthető.
Társítható kövirózsákkal, vagy más varjúhájakkal, illetve egyéb szárazságtűrő évelőkkel, sőt, télálló kaktuszokkal, délvirággal.

Silver Queen citromillatú kakukkfű	**Thymus citriodorus Silver Queen**	1 950 Ft	2 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Citromillatú kakukkfű 'Silver King' (Thymus citriodorus 'Silver King') – Az ezüstszegélyű, citromillatú fűszernövény
A citromillatú kakukkfű 'Silver King' az árvacsalánfélék családjába tartozó, hibrid eredetű, örökzöld félcserje. A faj a kerti kakukkfű és a kúszó kakukkfű természetes hibridje, amelyet jellegzetes citromillata miatt kedvelnek. A 'Silver King' fajtajelzés a levelek feltűnő ezüstfehér szegélyére utal, ami a sötétebb levelű kakukkfűfajták közül kiemelkedően mutatós. Ez a növény a sűrű, párnaszerű növekedésével, örökzöld lombozatával és illatos leveleivel az egyik legkedveltebb dísz- és fűszernövény a napos, száraz kertekben. A könnyű gondozhatósága, kiváló szárazságtűrése és a konyhai felhasználhatósága miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A citromillatú kakukkfű 'Silver King' egy alacsony termetű, elfekvő hajtású, örökzöld félcserje. Kifejlett magassága 10-15 cm, szélessége 20-30 cm között alakul, ami sűrű, párnaszerű gyepet eredményez. A hajtások elfekvők, a talajon kúsznak, és a nóduszoknál legyökereznek, ami elősegíti a növény gyors, szőnyegszerű terjedését.
A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei. A levelek aprók, oválisak, egymással átellenesek, szélük ép. A 'Silver King' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a levelek kétszínűsége: a levél középső része szürkészöld, míg a levél széle feltűnő ezüstfehér, ami a növényt távolról is dekoratívvá teszi. A levelek olajmirigyeket tartalmaznak, amelyek a jellegzetes, erős citromillatot adják. A levelek egész évben a növényen maradnak, ami a növényt télen is dekoratívvá teszi.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, sűrű, kerekded fejecske. A virágok aprók, kétajkúak, halványrózsaszín vagy világoslila színűek, és júniustól júliusig nyílnak. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt. A növény magról és vegetatív úton (hajtásdugványozással, tőosztással) egyaránt szaporítható. A vegetatív szaporítás a leggyakoribb, mivel a hajtások könnyen gyökeret eresztenek, és a növény gyorsan terjed.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A citromillatú kakukkfű 'Silver King' napos fekvést igényel; a legszebb, legintenzívebb lombozatszínt napos, szellős fekvésben hozza. Félárnyékban a lombozat színe kevésbé intenzív, a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, meszes, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; ezekben a talajtípusokban a gyökérrothadás kialakulásának veszélye jelentősen megnő.

Öntözés: A citromillatú kakukkfű 'Silver King' kifejezetten szárazságtűrő; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a hosszabb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első néhány hetében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés és a pangó víz a leggyakoribb gondozási hiba.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését, mert a túlzott tápanyag a virágzás rovására megy, és a növény felnyurgulhat, valamint az íz- és illatanyagok intenzitása is csökkenhet. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A citromillatú kakukkfű 'Silver King' metszése fontos a növény sűrűségének és virágzásának fenntartása érdekében. A metszést a virágzás után (augusztus-szeptember) kell elvégezni: vágjuk vissza a hajtásokat a hosszuk felére-harmadára, hogy serkentsük az új, fiatal hajtások képződését, és megakadályozzuk a növény felkopaszodását. A növény 3-4 évente történő tőosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt.

Telelés és fagytűrés: A citromillatú kakukkfű 'Silver King' kifejezetten jó télállóságú. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek, ami azt jelenti, hogy Magyarország nagy részén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. Konténerben nevelve a növény télen fagyérzékenyebb, ezért védett, hűvös (5-10°C), világos helyre vihető, vagy a cserepet gondosan be kell takarni. A növény örökzöld, a lombozat télen is megmarad, de a hidegebb időszakokban a levelek színe enyhén bronzos árnyalatot kaphat, ami normális jelenség.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A citromillatú kakukkfű 'Silver King' a díszes, ezüstszegélyű lombozatának, illatos leveleinek, kiváló talajtakaró képességének és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb dísz- és fűszernövény a kertekben:

Talajtakaróként napos, száraz területeken – a sűrű, párnaszerű növekedés hatékonyan takarja a talajt, és elnyomja a gyomokat.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Járólapok közé, kövezett utak fugáiba – a növény jól tűri a gyenge taposást, és a járdák, teraszok kövei között is kiválóan fejlődik.

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Szegélyágyások előterébe, illatos kertekbe – a kompakt méret és az örökzöld, ezüstös lombozat miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – kiválóan nevelhető konténerben is, ahol a lecsüngő hajtások látványosak.

Fűszerkertbe, gyógynövénykertbe – a levelek frissen és szárítva egyaránt felhasználhatók saláták, halételek, szárnyasok, zöldségek, desszertek és limonádék ízesítésére.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A citromillatú kakukkfű 'Silver King' ezüstszegélyű lombozata és citromillata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Levendulával – a levendula lilás virágai és ezüstös-zöld lombozata harmonizál a kakukkfű színével, és a mediterrán hangulatot erősíti.

Rozmaringgal – a hasonló szárazságtűrés és a mediterrán hangulat miatt kiváló társnövény.

Kék csenkesszel – a kék csenkesz kékes-zöld lombozata szépen kiegészíti a kakukkfű ezüstös szőnyegét.

Varjúhájakkal – a pozsgás varjúhájak jól társíthatók a hasonló szárazságtűrésű kakukkfűvel.

Törpe nőszirommal – a nőszirom virágai és a kakukkfű szőnyege együttesen változatos, színpompás hatást keltenek.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a citromillatú kakukkfű 'Silver King' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -20°C-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Sirius kövirózsa	**Sempervivum 'Sirius'**	1 950 Ft	1 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Sirius kövirózsa (Sempervivum 'Sirius') a kövirózsák egyik legfeltűnőbb, szőrözött lombozatú hibrid fajtája, amelyet a levelek világos széle és a rozetták szabályos formája miatt kedvelnek. Sűrű, szabályos, tömött rozettákat képez, amelyek élénkzöld alapszínűek, a levélvégek pedig vöröses-rózsaszín vagy krémes-vörös árnyalatot öltenek. A rozettákat sűrű, pókhálószerű szőrzet borítja, amely a növénynek lágy, ezüstös fényt és különleges textúrát ad. Levelei húsosak, vastagok, hegyes csúcsúak, és szorosan egymáshoz simulnak. Kifejlett magassága 5–10 cm, szélessége 15–45 cm között alakul; a rozetták átmérője egyes források szerint elérheti a 8–10 cm-t is. A növény bőségesen hozza a sarjakat, amelyekkel könnyen szaporítható, és rövid idő alatt sűrű, összefüggő telepet alkot.
A virágzat a rozetta közepéből kiemelkedő száron nyílik; a virágok rózsaszínűek, csillag alakúak, és június és július között nyílnak. A virágzás után a virágzó rozetta elhal, de a tövénél új sarjak fejlődnek, így a telep folyamatosan megújul.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy részleges árnyék az ideális; a legintenzívebb levélszínt és a legtömörebb rozettaformát napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, akár köves, homokos vagy sovány talajt kedvel; a pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

Vízigény: Alacsony-közepes; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli.

Télállóság: Az USDA 5-9. éghajlati zónában megbízhatóan áttelel; a fajta -20 °C és -29 °C közötti fagyokat is elvisel, a magyarországi klímán teljesen télálló.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos vagy részben árnyékos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 15–20 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést. Öntözéskor lehetőleg csak a talajt nedvesítse, a lombozatot ne.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a tömör rozettaforma rovására.

Metszés: Metszésre nincs szükség; az elnyílt virágzatokat távolítsa el, hogy a rozetta ne fordítsa minden erejét magképzésre. Kora tavasszal a télen elhalt, elszáradt rozettákat távolítsa el a telep tisztítása érdekében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. A levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, zöldtetőre, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, valamint konténeres és teraszkerti ültetésekbe illik. Sekély cserépben, alpesi tálban is kiválóan mutat, és a szőrös, vörös hegyű rozetták finom színfoltot adnak a többi kövirózsa és pozsgás között.
Növénytársítások

Pozsgások: kövirózsa-fajták, varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kövirózsa tömör rozettáit.			
Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kövirózsa virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 5-9.			
Siskiyou Pink évelő díszgyertya	**Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'**	3 250 Ft	3 750 Ft
Az évelő díszgyertyák igen népszerű új felfedezettjei a hazai kerteknek. Alacsonyabb és magasabb fajtaköröket különböztethetünk meg, a virágszínek pedig a fehértől a sötét rózsaszínig változnak. A Siskiyou Pink egy magasabb 80-100 cm-t elérő, sötét rózsaszín virágokat tömegesen hozó fajta. Meleg napos mérsékelten száraz helyet kedvel. Nem érdemes nagyon elkényeztetni, mert akkor töve kevésbé tud megszilárdulni, és könnyebben szétdől, ráhajlik a szomszéd növényekre a hajtásrendszere. Fagyérzékeny növény, melyet éppen ezért korábban a Salvia microphyllához hasonlóan egynyári növényként hoztak forgalomba. Ma azonban már évelők között kínáljuk azzal, hogy erősebb teleken sajnos kifagyhat, ezért érdemes a tövét lombbal, vagy egyéb mulccsal (mulcs: őröld, darabolt növényi takaró anyag) takarni, majd tavasszal kitakarni, és erősen visszavágni. Jól alkalmazható nagyobb léptékű tájkép kertekben vegyes virágágyakhoz, de többedmagával telepítve elegáns virágágy alakítható ki belőle. Más gracilis hajtásrendszerű növényekkel jól társítható, virágágyakba telepítve olyan hatással bír, mintha kis pillangók repkednének a növények között. 6b USDA-zóna Képek forrása: Pinterest			
Skyfall® bugás hortenzia (nagyobb)	**Hydrangea paniculata 'Skyfall'**	4 450 Ft	4 950 Ft
SoftGuard 1 L		6 300 Ft	6 300 Ft
SoftGuard 10 L	**Hatékony védelem baktérum-, gomba- és rovartámadások ellen**	44 000 Ft	47 000 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

SoftGuard - Kitozános növényi immunaktivátor a természetes védekezésért
A SoftGuard egy forradalmian új, 100%-ban organikus növénykondicionáló, amelynek hatóanyaga a kitozán. Ez a természetes összetevő a rákfélék kitinpáncéljából származik, és képes „felébreszteni” a növényekben szunnyadó védekező géneket. A SoftGuard nem csupán erősíti, hanem aktív védelmi állapotba kapcsolja a növényeket, így azok hatékonyabban tudnak ellenállni a kórokozóknak és a környezeti stresszhatásoknak.
Mi teszi egyedülállóvá a SoftGuard-ot?
A kitozán termékek hatékonyságát a molekulák mérete határozza meg, amelyet Daltonban mérnek. Minél kisebbek a részecskék (magasabb a Dalton szám), annál könnyebben szívódnak fel a növény szöveteibe. A SoftGuard Dalton száma 3.000, ami garantálja a kiváló felszívódást és hatékonyságot. Ráadásul a termék pH-ja 6 alatti, így kiválóan kombinálható más növényvédő szerekkel és lombtrágyákkal.
Hogyan működik a kitozán?

„Ellenség” érzékelés: A növény a kitozánt idegen anyagként (gombaként vagy rovarként) érzékeli, mivel a kitozán a kitinből származik, ami a gombák és rovarok váza.

Védekező gének aktiválása: A növény „harci üzemmódba” kapcsol: beindítja azokat a DNS-ben tárolt, eddig szunnyadó géneket, amelyek a védekezéshez szükségesek.

Védelmi enzimek termelése: A növény olyan anyagokat kezd termelni, amelyek gátolják a kórokozó gombák (pl. Botrytis, Fuzárium) fejlődését, és lebontják azok sejtfalát.

Tápanyagutánpótlás: A kitozán egy összetett cukor (glükóz lánc), így a védekezés mellett értékes szerves tápanyagforrást is jelent a növény számára.

A SoftGuard főbb előnyei:

Immunrendszer aktiválása: Serkenti a növény természetes védekezőképességét baktériumok, gombák és kártevők ellen.

Sebgyógyulás gyorsítása: Elősegíti a metszésből, jégverésből vagy egyéb sérülésekből származó sebek gyorsabb regenerálódását, „beparásítja” a sérült felületeket.

Termésminőség javítása: Fokozza a termés színesedését és beltartalmi értékeit.

Sokoldalú hatás: Rovarriasztó, valamint baktérium- és gombaellenes hatással is rendelkezik.

Szobanövények védelme: A készre kevert 0,5 literes szóróflakonos kiszereléssel könnyedén gondozhatja otthoni növényeit is.

Kijuttatás és dózis:

1L és 10L kiszerelés: A permetlevet 1-2%-os koncentrációban kell elkészíteni, azaz 10 liter vízhez adjon 1-2 dl SoftGuard-ot. A kezelést 2-3 hetente érdemes megismételni, vagy váltogatni a magas szilíciumtartalmú Ino Si termékkel.

0,5L kiszerelés: Előre hígított, készre kevert állapotban, szórófejes flakonban kapható. Azonnal használható szobanövények vagy kisebb felületek kezelésére.

Kombinálható készítmények: A SoftGuard kiválóan illeszkedik a Danuba biostimuláns rendszerébe. Javasolt kezelési sorrend:

Alapozásként Tricho Immun + Asco Alga.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

1 hét múlva SoftGuard + DanuVital Bio.

Ezt követően 2-3 hetente váltogassa a SoftGuard + Asco Alga és a SoftGuard + DanuVital Bio kombinációkat.

Figyelem: A 0,5 és 1 literes flakon a szállítás során deformálódhat. Ez a termék minőségére és hatékonyságára nincs befolyással!
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 5-30°C között legalább 36 hónapig megőrzi minőségét. Felbontás után szorosan lezárva, hűvös, fagymentes helyen 6 hónapon belül használja fel.
Kiszerelések: 0,5 L (készre kevert szóróflakon), 1 L, 10 L

Solar Eclipse turbáncső	**Heucherella 'Solar Eclipse'**	3 450 Ft	3 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Heucherella 'Solar Eclipse' konténeres növény. Aranysárga levelei bordó középponttal, egész évben dekoratív. Évelő, 30 cm magas, 40 cm ültetési távolsággal. Ideális árnyékos kertekbe. Gyors szállítás, egészséges növény.
A Heucherella a Heuchera és a Tiarella keresztezése, melyből a 'Solar Eclipse' ('Napfogyatkozás') egy igazi csillag! Ez az évelő növény nem a virágjairól, hanem hihetetlenül színes és mintázott leveleiről híres, melyek egész évben dekoratívak.

Színárnyalatok: A levél színe egy igazi műalkotás. Az aranyzöld vagy citromsárga alapot egy drámai, bordóvörös vagy cseresznyés piros mintázat díszíti a levél közepén felé, mintha valóban napfogyatkozás zajlana le a levélpaláston. Az árnyékos helyen a színek mélyebbek és gazdagabbak.

Méret: Kompakt és bozontos növekedési formájú, amely 20-30 cm magasságot és kb. 40 cm szélességet ér el. A virágzat ennél magasabbra, kb. 40-50 cm-re nyúlik.

Ültetési távolság: A lombozat szépen kifejlődéséhez és a talajt eltakaró hatás eléréséhez ajánlott 30-40 cm közötti távolsággal ültetni.

Tökéletes választás árnyékos vagy félig árnyás kertek, határok megtöltésére, alacsony lombos élősövényekként, vagy konténeres kompozíciók érdekes színfoltjáu
Gondozási útmutató
A Heucherella 'Solar Eclipse' sikeres gondozása

Fényigény: Félig árnyás vagy árnyékos hely a legideálisabb. A túl erős, déli napon a levelek pereghetnek és elveszítik színük intenzitását.

Öntözés: Közepes vízigényű. A talajt tartsd egyenletesen nedvesen. Jól elviseli a szárazságot rövid ideig, de a tartós szárazság károsíthatja.

Talaj: A jól átnedvesedő, humuszban gazdag, laza talajt szereti. Semleges vagy enyhén savas kémhatású földben érzi jól magát.

Trágyázás: Nem igényel intenzív trágyázást. Tavasszal egy kevés lassú hatású, komplex trágya bejuttatása az öntözővízbe elegendő a szép fejlődéshez.

Vágás: Tavasszal érdemes eltávolítani a télen megrongálódott leveleket, hogy helyet adjon az új hajtásoknak. A virágzatokat a virágzás után le lehet vágni.

5. Ültetési javaslat
Hogyan ültessük be a 'Solar Eclipse'-t?

Helyválasztás: Válassz egy félig árnyás vagy árnyékos helyet, például fák vagy nagyobb cserjék alatt.

Ültetés: A konténeres növényt egész évben ültetheted, amikor a talaj munkálható (kivéve fagyos időszakot). A konténerből óvatosan vedd ki a növényt és ültsd annyira mélyre, amennyire az edényben volt.

Távolság: Tarts be 30-40 cm-es távolságot a többi növénytől, hogy szépen kibontakozhasson.

Tervezési ötletek:

Színkontraszt: Ültesd olyan növények mellé, amelyeknek ezüstszürke vagy sötétzöld levele van (pl. perényi szellőrózsa, aucuba) – a színe még jobban kiemelkedik.

Szövetesség: Ültess több darabot tömegesen egy határ elejébe vagy egy ösvény mentén, hogy egy színes, alacsony talajtakarót alkosson.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Konténerben: Tökéletes érdes levélű hostákkal, vagy leomló habitusú árnyékkedvelő egyévesekkel (pl. impatiens) kombinálva.			
Konténeres szállítás előnyei: A növényt egészséges, ép gyökérrendszerrel kapod meg, ami garantálja a gyors és biztos gyökeresedést. Ültetéskor a gyökérrendszer nem sérül, így a növény stresszmentesen, akadálytalanul folytatja a növekedést.			
Solar Flare fáklyaliliom (nagyobb)	**Kniphophia x 'Solar Flare'**	4 450 Ft	4 950 Ft
Sorbet bazsarózsa	**Paeonia lactiflora 'Sorbet'**	5 950 Ft	6 300 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Sorbet bazsarózsa egy tömör, felálló habitusú, lombtakaró évelő növény, amely 80-100 cm magasra nő. Fő értéke a nagy, többszörösen teljes, réteges virág, amely rózsaszín, fehér és krém színárnyalatokban pompázik. A virágok május-június hónapokban nyílnak, átmérőjük akár 15-20 cm is lehet. A sötétzöld, tagolt levezek a növény egész vegetációs időszakában dekoratívak. A virágzatok kitűnőek vágott virágként is.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon vagy enyhén árnyas helyen

Talaj: Mély, jó vízáteresztő, humuszban gazdag, tápanyagokban gazdag talaj

Időzítés: Ősszel van a bazsarózsa ültetésének ideális időszaka

Távolság: 80-100 cm körüli térhagyás ajánlott

Használat: Szoliterként, évelőágyásokban, vágott virágként, bazsarózsagyűjteményekben

Gondozási útmutató

Metszés: A virágzás után a elvirágzott részeket távolítsuk el, ősszel a szárakat vágjuk vissza a földszintig

Télvédelem: Teljesen télálló, fiatal növényeket szerves takaróval védjünk

Öntözés: Mély gyökérzetével szárazságtűrő, de virágzás előtt és alatt igényel öntözést

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal és lassú hatású műtrágyával

Általános: Ne ültessük mélyre - a rügyek max. 3-5 cm legyenek a talaj alatt

Ajánlott kerttípusok

Hagyományos kertek

Évelőágyások

Vágott virág kertje

Formális kertek

Rózsakert kísérő növénye

Gyűjteményes bazsarózsás

Sötétpiros bogyójú tűztövis	**Pyracantha 'Mohave'**	4 250 Ft	4 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Mohave tűztövis a tűztövisek csoportján belül az egyik legimpozánsabb fajta, amelyet lenyűgöző megjelenése tesz különlegessé az év minden szakában. Ez a cserje valódi örökzöldként funkcionál, decemberre is megőrzi szinte érintetlen zöld lombját, ami különösen hasznos a kert téli színfoltjának fenntartásában.
A Mohave tűztövis piros bogyói élénk színfoltot képeznek, különösen a hűvösebb hónapokban, amikor a kert többi része pihen. Ezek a bogyók nemcsak díszítenek, hanem vadvilági szempontból is fontosak, mivel a madarak előszeretettel fogyasztják őket.
A növény legfőbb látványossága mégis a tavaszi virágzás, amikor fehér, habos virágok nyílnak, melyek méhek és más beporzók seregeit vonzzák. Ezek a virágok nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem a kert ökoszisztémáját is gazdagítja.
A Mohave tűztövis rendkívül ellenálló és alkalmazkodó, szárazságtűrő képessége miatt a napos és félárnyékos helyeket egyaránt kedveli. Szinte bármilyen talajtípusban megél, bár a jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben. Kis karbantartási igénye és ellenállóképessége miatt ideális választás kerti szegélyként vagy sövényként.
7a-9b USDA-zóna

Sour Grapes bugatölcsér	**Penstemon 'Sour Grapes'**	2 750 Ft	2 750 Ft

A Penstemon 'Sour Grapes' (bugatölcsér) egy figyelemfelkeltő és dekoratív évelő növény, amely bőséges, lila-bordó virágzásával vonzza a méheket és pillangókat. A növény 40-60 cm magasra nő, és a virágok tömege nyáron, júniustól egészen késő őszig nyílik. A 'Sour Grapes' fajta különösen jól bírja a száraz, napos környezetet, ezért ideális választás a sziklakerti kompozíciókhoz.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Penstemon 'Sour Grapes' napfénykedvelő növény, amelynek hetente legalább 6-8 órányi közvetlen napfényre van szüksége ahhoz, hogy a legszebb virágait hozza.
Talaj: A jó vízáteresztő, homokos vagy agyagos talaj ideális számára.
Öntözés: A növény szárazságtűrő, de a fiatal példányok esetében rendszeres öntözést érdemes biztosítani a gyökerek stabilizálása érdekében.
Trágyázás: A virágzási időszakot megelőzően egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágya alkalmazása javasolt, hogy támogassuk a növény növekedését.
Téliesítés: Fagyálló, de a téli hónapok előtt javasolt a virágzó szárak levágása, hogy megóvjuk a gyökereket a hidegtől.

Felhasználási lehetőségek:

Kiválóan alkalmas virágágyások díszítésére, egyedi színt és textúrát adva a tájnak.
Ideális sziklakertbe, ahol a virágok és a sziklák kontrasztja lenyűgöző látványt nyújt.
Szoliterként is megállja a helyét, kiemelve a környező növényeket.

A Penstemon 'Sour Grapes' a gyönyörű pompájával és könnyű gondozhatóságával ideális választás minden kertész számára, aki színesebbé kívánja tenni a kertjét.

Spártai boróka (közepes)	**Juniperus virginiana 'Spartan'**	9 900 Ft	9 900 Ft
Spártai boróka (nagy)	**Juniperus virginiana 'Spartan'**	14 500 Ft	14 500 Ft
Strictus kínai virágosnád	**Miscanthus sinensis 'Strictus'**	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Strictus kínai virágosnád (Miscanthus sinensis 'Strictus'), más néven zebranád vagy fehércsíkos zebrafű, Kelet-Ázsiából származó, lombhullató díszfű, amely sűrű, felálló, kompakt tövet képez. Kifejlett magassága a virágzatokkal együtt általában 1,5–2 méter, szélessége 0,8–1 méter között alakul; a tövek a virágzás idejére a virágok súlya alatt enyhén szétnyílhatnak. Levelei merevek, felállók, tüskeszerűen elállók, sötétzöld alapon feltűnő, vízszintes sárga keresztcsíkokkal díszítettek – ez a fajta legjellegzetesebb ismertetőjegye. A lombozat ősszel aranysárgára, majd barnára színeződik. Virágzata laza, ezüstös-rózsaszín kalászbuga, amely késő nyáron, szeptember–októberben nyílik, és télen is díszítőértékű marad. A növény habitusa merev, felálló, így kiválóan alkalmas függőleges akcentus képzésére a kertben.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a félárnyékot is elviseli, de a legszebb lombszínt és a legbőségesebb virágzást napos helyen hozza.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot és a városi körülményeket is jól viseli.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, a legtöbb forrás szerint –20 °C és –29 °C közötti fagyokat is elvisel, a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság legalább 1 méter legyen a szellős, kompakt tövek kialakulásához.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású díszfű-trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a tövek szétesését okozhatja.

Metszés: A száraz lombozatot kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz levelek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes. Ritkán a rozsda vagy a levélfoltosság jelentkezhet; a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább szoliterként, évelőágyba, cottage- és formális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint modern, strukturált kompozíciókba illik. Kiváló függőleges akcentusként működik a kertben, és merev, felálló habitusa miatt jól mutat a kert hátterében vagy egy fókuszpontként. Cserépben és konténerben is nevelhető, ahol a kompakt méret és a feltűnő lombozat érvényesül. Kiváló vágott virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét.
Növénytársítások

Késő nyári és őszi évelők: kúpvirág, varfű, őszirózsa, naprózsa – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a kínai virágosnádat.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4-9 (a legtöbb forrás az 5. zónát jelöli meg alsó határként, -29 °C-ig).

Summer Beauty díszhagyma	**Allium 'Summer Beauty'**	2 750 Ft	2 750 Ft

A Summer Beauty díszhagyma (Allium 'Summer Beauty') egy hagymás évelő, egészséges, sötétzöld levelekkel, és a 40-50 cm magasra fejlődő virágzatokkal. A virágok halvány rózsaszínek, és göb alakú virágzatban fejlődnek. Izgalmasan mutatnak pl. alacsonyabb évelők között, legyenek azok akár díszfüvek, vagy más virágzók. De be lehet telepíteni vegyes virágágyakba, sőt dézsákba is.
Fényigény: napos
Vízigény: átlagos
Talajigény: átlagos, vagy jó vízelvezető laza talaj
Fagytűrés: fagytűrő
Virágzás: nyár közepe
Díszítő érték: virágzatával díszít
Felhasználás: vegyes virágágyakba, nagyobb foltokba telepítve, vagy akár kaspóban tartva

Summer Nights napszemvirág	**Heliopsis helianthoides 'Summer Nights'**	2 250 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Summer Nights napszemvirág (Heliopsis helianthoides 'Summer Nights') felálló, sűrű, bokros habitusú, lágyszárú évelő. Kifejlett magassága általában 90–120 cm, szélessége 45–60 cm. Levelei sötétzöldek, durván fogazott szélűek, lándzsásak, a száron átellenesen helyezkednek el. Virágai napraforgószerűek, élénksárga sugárvirágokkal és sötét narancsvörös-barna központi kúppal; a virágzatok 5–7 cm átmérőjűek, és laza, dús csoportokban nyílnak. Virágzása júliustól szeptemberig tart, és vonzza a méheket, lepkéket. A növény habitusa merev, ezért támasztékra általában csak túl tápdús talajon van szükség.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; félárnyékban is megél, de a virágzás ilyenkor gyengébb.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen termékeny, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; az első évben rendszeres öntözést igényel, később a szárazságot jól tűri.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később csak hosszan tartó aszály idején igényel pótlólagos öntözést.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a szárak megdőlését okozhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat rendszeresen távolítsa el, hogy meghosszabbítsa a virágzást. A szárakat kora tavasszal vágja vissza a talajszint közelében.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló, de a lisztharmatra és a levélfoltosodásra érzékeny lehet. A jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyba, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, vadvirágos rétekre és napos, szárazságtűrő kompozíciókba illik. Kiváló vágott virág, és nagyobb csoportokban ültetve összefüggő, késő nyári színhatást hoz létre. Jól mutat városi és vidéki kertekben egyaránt.
Növénytársítások

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót, és télen is struktúrát adnak.

Késő nyári évelők: kúpvirág, őszirózsa, naprózsa, sédbúza – hasonló virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Hagymás növények: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a napszemvirág virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 3-9.			
Sunstar Mix kerti tollbuga	**Astilbe × arendsii 'Sunstar Mix'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Sunstar Mix kerti tollbuga (Astilbe × arendsii 'Sunstar Mix') bokros, sűrű habitusú, lombhullató évelő. Kifejlett magassága 35-50 cm, szélessége 30-40 cm, a virágzati szárakkal együtt azonban ennél valamivel magasabbra is megnőhet. Levelei hármasan összetettek, finoman szeldeltek, páfrányra emlékeztető textúrájúak, bronzos-zöld árnyalatúak, és a virágzás után is dekoratívak maradnak. A 'Sunstar Mix' vegyes színű fajtakeverék, amelyben a virágok a fehértől a halvány rózsaszínen át a mélyvörösig és liláig sokféle árnyalatban nyílnak. A virágzat tömött, tollszerű buga, amely a hajtások csúcsán emelkedik a lombozat fölé. Virágzása nyár elejére, június-júliusra esik, és a virágok vonzzák a méheket, lepkéket. Az elvirágzott virágzatok télen is díszítenek, és védik a növény tövét.
Igényei

Fény: Félárnyékos vagy árnyékos fekvés az ideális; a reggeli napfényt elviseli, de a forró délutáni napsütésben a lombozat könnyen megéghet.

Talaj: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, nyirkos, organikus anyagokban gazdag talajt kedvel. A tartósan száraz talajt és a pangó vizet egyaránt kerülni kell.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél, de a savanyúbb talajt meghálálja.

Vízigény: Közepes-magas; a rendszeres, mérsékelt öntözést igényli, különösen az első évben és száraz időszakokban. A talajt nem szabad teljesen kiszáradni hagyni.

Télállóság: Teljesen télálló, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse félárnyékos vagy árnyékos, védett helyre, jó vízáteresztő, komposzttal vagy tőzeggel dúsított talajba. Az ültetőgödörbe keverjen érett trágyát vagy komposztot a jobb talajszerkezet érdekében.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a talaj felszínének enyhe nedvesen tartása ideális; kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő. Konténerben tartva nyáron havonta egyszer folyékony trágyával is táplálhatja.

Metszés: Az elvirágzott virágzatokat a szár tövénél vágja vissza, hogy a növény ne magozzon el, és megőrizze kompakt formáját. A régi lombozatot kora tavasszal vágja vissza.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek elhalnak, tavasszal újra hajt. Az elvirágzott virágzatokat hagyhatja a növényen télen, mert védik a rügyeket.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló, de a lisztharmatra és a levélfoltosodásra érzékeny lehet. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak. A jó szellőzés és a megfelelő öntözés segít megelőzni a gombás betegségeket.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább árnyékos vagy félárnyékos kertrészekbe, erdei kertekbe, cottage kertekbe és természetközeli kompozíciókba illik. Kiváló talajtakaróként, ágyásszegélybe, valamint cserépbe és konténerbe is. Jól mutat vadvirágos rétek szélén és árnyékos ágyások előterében, ahol a tollszerű virágzat függőleges akcentust ad a kompozíciónak. Kiváló vágott virág.
Növénytársítások

Árnyéktűrő évelők: hosta, páfrányok, kankalin, ibolyák, tüdőfű – hasonló igényűek, és kiegészítik a tollbuga finom textúráját.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fűfélék: sásfajok, csenkesz – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a tollbuga előtt.

Virágzó évelők: kúpvirág, zsálya, harangvirág – nyáron gazdagítják a kertet.

Cserjék: törpe rododendron, azálea, hortenzia – savanyú talajon szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 4–8.

Suntropics Cream kristályvirág, délvirág	**Delosperma 'Suntropics Cream'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Suntropics Cream kristályvirág (Delosperma 'Suntropics Cream') a Suntropics-sorozat tagja, amelyet a hosszú virágzás és a szárazságtűrés érdekében nemesítettek. Alacsony, sűrű, szőnyegszerűen elterülő tövet képez, amelynek hajtásai a talaj felszínén kúsznak, és sűrű, összefüggő telepet alkotnak. Kifejlett magassága 10–15 cm, szélessége 25–30 cm között alakul. Levelei húsosak, hengeresek vagy keskeny lándzsásak, almazöldek, és a lombozat enyhe teleken részben vagy egészben megmarad.
A virágzat a hajtások végén nyílik; a virágok margarétaszerűek, krémes-fehér színűek, közepükön feltűnő világos sárga koronggal. A virágok átmérője mintegy 3–5 cm. Virágzása késő tavasztól (májustól) egészen késő őszig (októberig–novemberig) tart, és a virágok csak napos időben nyílnak ki teljesen. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a lepkékenek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a forró, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást. Árnyékban a virágok zárva maradnak.

Talaj: Jó vízáteresztő, sovány, homokos vagy köves talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Télállósága közepes, rövid fagyokat –10 °C és –20 °C között is elvisel. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a hajtásokat enyhén visszavághatja, hogy megőrizze a tömör, szőnyegszerű formát. Kora tavasszal a télen elhalt vagy sérült részeket távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télállósága közepes, ezért a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, szőnyegszerű habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás; konténerben a „spiller-thriller-filler” kombinációkban spiller (lecsüngő) szerepet tölt be. A virágzás idején finom, krémes-fehér szőnyeget képez a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Pozsgások: kövirózsa, varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kristályvirág tömör habitusát.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kristályvirág virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 6-9 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

Suntropics Orange kristályvirág, délvirág	**Delosperma 'Suntropics Orange'**	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Suntropics Orange kristályvirág (Delosperma 'Suntropics Orange') a Suntropics-sorozat tagja, amelyet a hosszú virágzás és a szárazságtűrés érdekében nemesítettek. Alacsony, sűrű, szőnyegszerűen elterülő tövet képez, amelynek hajtásai a talaj felszínén kúsznak, és sűrű, összefüggő telepet alkotnak. Kifejlett magassága 10–15 cm, szélessége 25–30 cm között alakul. Levelei húsosak, hengeresek vagy keskeny lándzsásak, almazöldek, és a lombozat enyhe teleken részben vagy egészben megmarad.
A virágzat a hajtások végén nyílik; a virágok margarétaszerűek, élénk narancssárga színűek, közepükön feltűnő sárga koronggal. A virágok átmérője mintegy 3–5 cm. Virágzása késő tavasztól (májustól) egészen őszig (októberig) tart, és a virágok csak napos időben nyílnak ki teljesen. A virágok bőséges nektárt és pollent kínálnak a lepkékenek és más beporzóknak.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a forró, napos fekvésben hozza a legtömörebb habitust és a legbőségesebb virágzást. Árnyékban a virágok zárva maradnak.

Talaj: Jó vízáteresztő, sovány, homokos vagy köves talajt kedvel. A pangó vizet – különösen télen – kifejezetten rosszul tűri, ezért a nehéz, agyagos talajt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Alacsony; a kifejlett növény kiválóan szárazságtűrő, és a rendszeres öntözést csak az első szezonban, illetve hosszan tartó aszály idején igényli. A túlöntözés és a pangó víz károsítja.

Télállóság: Télállósága közepes, rövid fagyokat –5 °C és –10 °C között is elvisel. A magyarországi klímán a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás javasolt; konténeres növényt védett, fagymentes helyen érdemes teleltetni.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal, a fagyok elmúltával ültesse napos, védett, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen homokot vagy apró kavicsot a jobb vízáteresztés érdekében. A növények közötti távolság 25–30 cm legyen.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a gyökérzet megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt. Kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tápanyagszegény talajon is jól fejlődik; tavasszal egy kevés komposzt elegendő. A túlzott trágyázás a lombozat növekedését serkenti a virágzás rovására.

Metszés: Az elnyílt virágzatokat rendszeresen távolítsa el, mert ez meghosszabbítja a virágzást. A virágzás után a hajtásokat enyhén visszavághatja, hogy megőrizze a tömör, szőnyegszerű formát. Kora tavasszal a télen elhalt vagy sérült részeket távolítsa el.

Átteleltetés: A növény télállósága közepes, ezért a hidegebb, csapadékos teleken a tövénél vastag mulcs vagy téli takarás segíthet. A téli pangó víz károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni. Konténeres növény esetén a dézsát védett, fagymentes helyre vigye.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes; a rosszul vízáteresztő talajban gyökérrothadás léphet fel. Az őzek és a nyulak általában elkerülik a növényt.

Kerti stílus
Ez a fajta leginkább sziklakertbe, kavicskertbe, száraz falra, mediterrán hangulatú kertekbe, modern, minimalista kompozíciókba, vidéki jellegű és oldott hangulatú kertekbe, valamint konténeres és teraszkerti kompozíciókba illik. Alacsony, szőnyegszerű habitusa miatt kiváló talajtakaróként is, és dézsába, cserépbe is jó választás; konténerben a „spiller-thriller-filler” kombinációkban spiller (lecsüngő) szerepet tölt be. A virágzás idején messziről feltűnő narancssárga színfoltot ad a kertben.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Pozsgások: kövirózsa, varjúháj (Sedum) – hasonló igényűek, és változatos textúrát adnak.

Illatos és fűszeres növények: kakukkfű, levendula, zsálya – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj – lazítják a kompozíciót, és finom textúrájukkal ellensúlyozzák a kristályvirág tömör habitusát.

Hagymások: krókusz, gyöngyike, mini nárcisz – korai színfoltot hoznak a kristályvirág virágzása előtt.

Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és dézsában szép kontrasztot alkotnak.

USDA télállósági zóna: 6-9 (a magyarországi klímán, a 6-7. zónában védett fekvésben és téli takarással tartható hosszú távon).

Svetlyachok húsos som (közepes)	**Cornus mas 'Svetlyachok'**	9 900 Ft	9 900 Ft
Sweet Dreams keskenylevelű menyecskeszem	**Coreopsis verticillata 'Sweet Dreams'**	2 450 Ft	2 850 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Sweet Dreams keskenylevelű menyecskeszem (Coreopsis verticillata 'Sweet Dreams') – A kétszínű, hosszan nyíló évelő

A Sweet Dreams keskenylevelű menyecskeszem az őszirózsafélék családjába tartozó, Észak-Amerika keleti részéről származó, évelő lágyszárú növény nemesített változata. A Coreopsis verticillata faj a természetben száraz, homokos erdőkben, réteken és útszéleken fordul elő, ahol a szegényes, jó vízelvezetésű talajokhoz és a napos körülményekhez alkalmazkodott. A 'Sweet Dreams' fajta az egyik legkülönlegesebb színű menyecskeszem, amelyet a virágok egyedülálló, kétszínű megjelenése tesz igazán különlegessé. Ez a növény a nyár közepétől az őszig nyíló, finom, rózsaszín-fehér virágaival és légies, finoman szeldelt lombozatával az egyik legkedveltebb évelő a romantikus, vidéki és természetközeli kertekben. A könnyű gondozhatósága, a rendkívül hosszú virágzási időszaka, a kiváló télállósága és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.

Külső megjelenés és morfológiai jellemzők

A Sweet Dreams keskenylevelű menyecskeszem egy kompakt, bokros növekedésű, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 30-40 cm, szélessége hasonlóan 30-40 cm között alakul, ami sűrű, bokros habitust eredményez. A növény habitusa sűrű, bokros, a hajtások egyenesen felállók, és a gyöktörzzsel lassan terjed. A szárak vékonyak, gracilisak, ami a növénynek légies, könnyed megjelenést kölcsönöz.

A levelek a növény egyik legfontosabb díszítő elemei, virágzás előtt és után is. A levelek finoman szeldeltek, tűszerűek vagy szálasak, a hajtásokon örvökben helyezkednek el. Ez a jellegzetes, finom textúrájú lombozat a növényt egész szezonban dekoratívvá teszi, és kiválóan lazítja az ágyások szerkezetét.

A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, laza bogas fürt, amelyen a százszorszépszerű virágok helyezkednek el. A virágok 3-4 cm átmérőjűek, és a 'Sweet Dreams' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok egyedi, kétszínű megjelenése: a szirmok közepét élénk málnarózsaszín díszíti, amely kifelé haladva fokozatosan hófehérbe olvad, így minden virág különleges, látványos hatást kelt. A virágzási időszak rendkívül hosszú: a nyár elejétől a késő őszig tart, Magyarországon jellemzően júniustól októberig. Az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár az első fagyokig is meghosszabbítható. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák, gazdag nektárforrást biztosítva számukra.

Termés és szaporítás

A virágzást követően a növény apró, száraz kaszatterméseket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (tőosztással) egyaránt szaporítható. A tőosztás 2-3 évente javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését és a virágzás gyengülését.

Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást napos, szellős fekvésben hozza. A napi minimum 6 óra közvetlen napsütés az optimális. Félárnyékban a virágzás gyengébb, a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén savanyú kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri.

Öntözés: A keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor keverjük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. A túlzott tápanyag, különösen a magas nitrogén, a virágzás rovására megy. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' alapvetően nem igényel rendszeres metszést, de a virágzás serkentése és a növény rendezett megjelenése érdekében érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani. Ez az eljárás serkenti az újabb virágbimbók képződését, és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A virágzási időszak végén a növényt érdemes visszavágni a talajszinttől számított 10-15 cm-es magasságúra. A növény 2-3 évente történő tőosztása tavasszal vagy kora ősszel javasolt, hogy megakadályozzuk a növény elöregedését.

Telelés és fagytűrés: A keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' kifejezetten kiváló télállóságú. Magyarország teljes területén gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A növény lombhullató, a hajtások a talajfagyás beálltával elszáradnak, elhalnak, és a gyökérzet telel át a talajban. Tavasszal a növény a gyökérzettől újrahajt.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)

A keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' a különleges, kétszínű virágzásának, kompakt méretének, kiváló télállóságának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a kompakt méret miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Sziklakertekbe, kőkertekbe, kavicsos kertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát.

Konténerekbe, cserepekbe, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Természetes hatású kertekbe, romantikus kertekbe, vidéki kertekbe – a finom, kétszínű virágok és a légies lombozat tökéletesen illik a természetközeli kertek hangulatához.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Vágott virágnak – a hosszú, karcsú virágszárak tartósak a vázában, és kiválóan alkalmasak csokrokba.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' rózsaszín-fehér virágai és finom, tűszerű lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Ligeti zsályával (Salvia nemorosa) – a lila és a rózsaszín-fehér szívek harmonikus, friss párost alkotnak.

Kasvirággal (Echinacea) – a bíbor és a rózsaszín-fehér virágok gazdag, színpompás hatást keltenek.

Levendulával (Lavandula) – a levendula lila virágai és ezüstös lombozata kiváló kontrasztot alkot a finom színű virágokkal, és erősíti a mediterrán hangulatot.

Kokárdavirággal (Gaillardia) – a sárga, narancs és vörös színek vidám, kontrasztos hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollborzfűvel (Pennisetum alopecuroides), vattacukorfűvel (Muhlenbergia capillaris) – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a menyecskeszem finom, légies lombozatát.

USDA besorolása: 4-9 (Magyarországon a keskenylevelű menyecskeszem 'Sweet Dreams' teljes mértékben télálló; az ország egész területén, az USDA 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban egyaránt gond nélkül, takarás nélkül áttelel a szabadban. A kifejlett példányok akár -25°F-ig terjedő hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Sweet Tea turbáncső	**Heucherella Sweet Tea**	3 450 Ft	3 750 Ft

A Heucherella Sweet Tea a tűzeső és a korallvirág hibridje, amely elbűvölő, élénk színű levelekkel rendelkezik. A sárgás-narancssárga szín váltakozik a bronz árnyalatokkal, ami különleges megjelenést biztosít ennek az évelő növénynek. Széles, kerekded levelei napos és félárnyékos helyeken egyaránt gyönyörűen fejlődnek, és a lombozata egész évben vonzó látványt nyújt.
Ültetési javaslat: A Heucherella Sweet Tea legjobban tápanyagban gazdag, jól vízelvezető talajba ültetve fejlődik. Általában 30-45 cm távolságra ültessük el a növényeket, hogy elegendő helyük legyen a növekedéshez. A növény kedveli az árnyékos vagy részben árnyékos helyeket, így ideális választás erdős kertekhez vagy félárnyékos ágyásokhoz. Fontos, hogy rendszeres öntözést kapjon, különösen az ültetési időszakban, de kerüljük el, hogy a levelek folyamatosan víz alatt álljanak.
A Heucherella Sweet Tea tökéletesen kiegészíti más évelő növényeket, fűt és dísznövényeket, így különösen vonzó kombinációk létrehozására alkalmas. Ezen kívül csodás látványt nyújt szegélyezett utakon és virágágyásokban.

Széles oszlopos tiszafa (nagyobb)	**Taxus baccata 'Overeynderi'**	6 950 Ft	6 950 Ft
Szibériai cickafark	**Achillea sibirica 'Love Parade'**	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A 'Love Parade' a Szibériából és a Kamcsatka-félszigetről származó Achillea sibirica egyik legszebb, legkedveltebb nemesített változata. Nevét a lágy pasztell rózsaszín virágok tömegéről kapta, amelyek a nyár nagy részében díszítik a kertet. Ez a fajta a cickafarkoktól megszokott robusztusságot, szárazságtűrést és igénytelenséget ötvözi a különleges, fényes lombozat és a kifinomult virágszín előnyeivel.
Külső megjelenés
A 'Love Parade' cickafark erőteljes, bokros növekedésű, csomókban terjedő évelő. Kifejlett magassága 50-70 cm, szélessége 40-50 cm között alakul. A növény felálló szárai erősek, a virágzat súlya alatt azonban időnként megtámaszthatók.
A növény egyik legszembetűnőbb tulajdonsága a lombozat. A levelek hosszúkásak, lándzsás alakúak, szélük finoman fűrészes, és ami a cickafarkok között szokatlan: feltűnően fényesek, szinte bőrszerűek. A levél színe sötétzöld. Ez a különleges tulajdonság a növényt még virágzás nélkül is dekoratívvá teszi. A lombozat a virágzás után is díszít, ősszel sárgás-barnás árnyalatot ölthet.
A növény legnagyobb dísze a virágzat. A virágok aprók, de hatalmas számban, 8-12 cm átmérőjű, lapos vagy enyhén domború ernyős virágzatokba tömörülnek. A virágok színe a nyíláskor lágy, pasztellrózsaszín (cukorkarózsaszín vagy halvány rózsaszín), a virág közepén apró, halványsárga porzókkal. A virágok idővel kifehéredhetnek, de a friss, rózsaszín virágok folyamatos megjelenésével a növény hosszú ideig megőrzi színpompás megjelenését.
Virágzás
A 'Love Parade' cickafark virágzási ideje rendkívül hosszú: június elejétől egészen szeptemberig, sőt akár októberig is nyílik. A virágok a beporzó rovarok (méhek, pillangók, lepkék) számára értékes nektár- és pollenforrást jelentenek. A növény kiválóan alkalmas vágott virágnak is, frissen és szárítva egyaránt mutatós.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: Napos, meleg fekvésű helyet igényel. A napi minimum 6-8 óra közvetlen napsütés elengedhetetlen a dús, tömött növekedéshez és a bőséges virágzáshoz. Félárnyékban a növény felnyurgul, a virágzás gyengébb, a lombozat elveszítheti szép fényességét.

Talaj: Nem válogatós, a legjobban a jó vízáteresztő, laza, meszes vagy semleges kémhatású talajban érzi magát. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri. Kifejezetten előnyös a tápanyagszegény, száraz talaj, mert ott a legszebb a lombozat és a legtömöttebb a virágzat. A túl gazdag talajban a növény felnyurgulhat, a szárai megdőlhetnek. A fajta jól tűri a homokos és a kavicsos talajokat is.

Öntözés: Kimondottan szárazságtűrő. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést nem igényelnek, a természetes csapadék is elegendő számukra. A túlöntözés a leggyakoribb hiba, ami gyökérrothadáshoz vezethet.

Tápanyag-utánpótlás: Kifejezetten alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor ne keverjünk komposztot a talajhoz, és a későbbiekben se trágyázzuk. A túlzott tápanyag (különösen a nitrogén) a lombozat kárára megy: a növény elveszíti kompakt formáját, a szárai megdőlnek, a virágzás gyengébb lesz.

Metszés: A növény alapvetően nem igényel metszést, de az elnyílt virágzatok folyamatos eltávolításával a virágzási időszak meghosszabbítható. A virágzás után (késő ősszel vagy kora tavasszal) a növényt a talaj szintjén vissza lehet vágni. Ez serkenti az új, erős hajtások képződését a következő évben.

Osztás, szaporítás: A növényt 3-4 évente tavasszal vagy ősszel érdemes tőosztással szaporítani, hogy megőrizze vitalitását. A fajta magról is szaporítható.

Telelés: Kimondottan télálló. A növény akár -40°C-ig ellenáll a hidegnek, így Magyarország egész területén gond nélkül áttelel, külön védelmet nem igényel. A föld feletti része ősszel elfagy, de a gyökérzet áttelel, és tavasszal újrahajt.

Kártevők, betegségek: Általában nagyon ellenálló, a szarvasok és nyulak kerülik. A párás, szellőzetlen környezetben a lisztharmat előfordulhat. A levéltetvek időnként megjelenhetnek.

Felhasználás a kertben
A 'Love Parade' cickafark a méretének, színének és igénytelenségének köszönhetően rendkívül sokoldalúan felhasználható:

Tömeges csoportos ültetésre – több tövet egymás mellé ültetve a virágok egységes, lágy rózsaszín színfoltot alkotnak

Szegélyágyásokba, évelőágyások középső sorába

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Prérikertekbe, vadvirágos rétek szélére, természetes hatású kertekbe – eredeti élőhelyét idézi			
Sziklakertekbe, kavicsos kertekbe – szárazságtűrése és alacsony igényei miatt kiváló			
Szoliterként – egy-egy példány is feltűnő a gyepen vagy a napos ágyásban			
Konténeres teraszokra, erkélyekre, tetőkertekbe – nagyobb cserepekbe, dézsákba ültethető			
Vágott virágnak – a virágzatok hosszú ideig frissek maradnak a vázában, szárítva is mutatósak			
Változatos növénytársítások A 'Love Parade' lágy pasztell rózsaszín virágai és fényes zöld lombozata kiválóan kombinálható más, hasonló igényű növényekkel:			
Lila és kék virágú évelők: Levendula, macskamenta, sudárzsálya, ligeti zsálya – a lila-kék színek a rózsaszínnel harmonikus, elegáns párost alkotnak			
Sárga virágú évelők: Kúpvirág, napvirág – a komplementer színek a rózsaszínnel összefogva vidám, vibráló kontrasztot adnak			
Fehér virágú évelők: A fehér cickafark, gyöngyvirág – a fehér és a rózsaszín romantikus, könnyed összképet ad			
Ezüstös levelű növények: Üröm, kék csenkesz – az ezüstös szürke kiemeli a virágok finom színét			
Díszfüvek: Tollbuga, kínai ezüstpázsit – a füvek laza, mozgó habitusa tökéletesen kiegészíti a növény tömöttebb formáját			
Rózsák: Különösen a fehér, halvány rózsaszín vagy sárga színű rózsák mellett a cickafark virágai gyönyörű kiegészítést jelentenek			
Pillangóvirág, kerti lángvirág – a hasonló, napos, száraz termőhelyi igényű növényekkel is jól társítható			
USDA besorolása: 4-9 (Magyarország egész területén, az 5b-7b zónákban a növény teljesen télálló; a leghidegebb, 5-ös zónájú északkeleti tájakon is biztonságosan nevelhető).			
Szibériai veronika	Veronicastrum sibiricum	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Szibériai veronika (Veronicastrum sibiricum) Kínából, Szibériából és Japánból származó, rhizómás évelő. Kifejlett magassága 1–1,5 méter, szélessége 0,5–1 méter. Levelei 4–6 tagú örvökben helyezkednek el, hosszúkásak, lándzsásak, élénkzöldek. Virágzata hosszú, füzéres, a hajtások csúcsán nyílik, levendula színű, néha fehér vagy rózsaszín árnyalatú. Júliusban és augusztusban virágzik, és a virágok vonzzák a méheket, lepkéket. Virágzás után a magfejek télen is díszítenek.
Igényei

Fény: Teljes nap vagy félárnyék az ideális. Túl árnyékos helyen a szárak megnyúlhatnak és megdőlhetnek.

Talaj: Közepesen termékeny, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talajt kedvel. A tartósan száraz talajt és a pangó vizet egyaránt kerülni kell.

pH: Savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes-magas; a rendszeres, mérsékelt öntözést igényli, különösen az első évben és száraz időszakokban.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, a magyarországi klímán gond nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy ősszel ültethető napos vagy félárnyékos helyre, jó vízáteresztő, komposzttal dúsított talajba.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a talaj felszínének enyhe nedvesen tartása ideális; kerülje a túlöntözést és a pangó vizet.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású évelő trágya elegendő.

Metszés: A régi szárakat kora tavasszal vágja vissza a talajszintig. Az elvirágzott virágzatokat távolítsa el, hogy meghosszabbítsa a virágzást.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a föld feletti részek elhalnak, tavasszal újra hajt.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló, de a lisztharmatra érzékeny lehet. A csigák és a levéltetvek kisebb kárt okozhatnak.

Kerti stílus
Ez a növény leginkább évelőágyak hátterébe, cottage kertekbe, erdőszéli kompozíciókba és préri stílusú ültetésekbe illik. Kiváló függőleges akcentust ad a kertnek, és jól mutat csoportos ültetésben. Napos vagy félárnyékos helyen egyaránt szépen fejlődik.
Növénytársítások

Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, préri fű – lazítják a kompozíciót és télen is struktúrát adnak.

Évelők: kúpvirág, naprózsa, zsálya, harangvirág – hasonló igényűek, és változatos virágzási idővel gazdagítják a kertet.

Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a veronika előtt.

Őszi virágzók: őszirózsa, krizantém – meghosszabbítják a szezont.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Cserjék: törpe fenyők, tűnyalábos fenyő - télen is struktúrát adnak a kertnek.

USDA télállósági zóna: 3-9.

Tajvani korallberkenye	**Photinia serrulata/serratifolia**	4 950 Ft	4 950 Ft

A Photinia serrulata/serratifolia (Tajvani korallberkenye) egy kifejezetten szép, akár 10 méter magasra is megnövő örökzöld fa, melynek pirosas-barna kérge lemezekben hámló. Fogazott, sötétzöld levelei fiatal korukban pirosas színűek. Fehér virágai késő tavasszal nyílnak, melyet gömb alakú, piros gyümölcsök követnek. 7b-10a USDA-zóna

Tanaka japán naspolya	**Eriobotrya japonica 'Tanaka'**	25 000 Ft	25 000 Ft
Tarackoló kékgyökér	**Ceratostigma plumbaginoides**	2 950 Ft	3 430 Ft

A Tarackoló kékgyökér (Ceratostigma plumbaginoides), lenyűgöző és rendkívül népszerű kertészeti növény. Ez a többéves évelő növény az eredeti Kínából származik, és a kertekben széles körben elterjedt az egész világon. Az 'Autumn Blue' jellegzetes jellemzője a lombozatának szépsége és színpompája. A levelek kis, elliptikus formájúak és világoszöldek, ami a kertekben friss és vonzó megjelenést kölcsönöz neki. Azonban a leglátványosabb jellemzője a őszies átalakulás. Amikor az időjárás lehűl és az ősz beköszönt, a levelek csodálatosan élénk vörösre és rézbarnára változnak. Ez a növény kifejezetten értékes a kertekben az ősz késői időszakában, amikor más növények már lehervadtak vagy virágaikat elveszítették, vagy visszahúzódnak. Az 'Autumn Blue' megjelenése a késői szezonban élénk színfoltot jelent, amely felpezsdíti a kertet és fokozza a téli előtti utolsó látványélményt. A Tarackoló kékgyökér kis méretű növény, átlagosan 30-40 cm magasra nő, így ideális választás lehet a kerti határok, ágyások, talajtakarók vagy kőkertek díszítésére. Jól működik sziklakertekben és szárazságtűrő, napos vagy félárnyékos területeken. Ezenkívül a Tarackoló kékgyökér a késő nyári és kora őszi hónapokban apró, kék virágokat hoz, amelyek tovább növelik annak vonzerejét. Ezek a virágok több héten át nyílnak, és vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat, ami élénk életet visz a kertbe. Könnyen gondozható növény, amely viszonylag ellenálló a betegségekkel és kártevőkkel szemben. Általában jól alkalmazkodik a talaj különböző típusaihoz, de jobban teljesít laza, jó vízelvezetésű talajban.

Tarka citromillatú kakukkfű	**Thymus citriodorus 'Doone Valley'**	1 950 Ft	2 450 Ft

8-15 cm-es kis örökzöld törpecserje. Apró, kerekded levelei rendkívül kellemes citromillatúak, fűszerezéshez kiválóak. Aromás, szőnyegképző, örökzöld talajtakaró növény kellemes citromos illattal. Gyógy- ésfűszernövény. Kis, lila, ajakos virágai kis csoportokban nyílnak nyáron. Vonzóak a méhek és a pillangók számára.

Tarka japán törpenád	**Phragmites karka 'Variegata'**	3 900 Ft	4 450 Ft

A Tarka japán törpenád egy kompakt, bokros növekedésű évelő díszfű. Legszembetűnőbb jellemzője a hosszanti irányban sárga vagy krémszínű csíkokkal tarkított zöld levelezete. A növény magassága a virágzattal együtt általában 140-160 centiméter között van, jóval visszafogottabb növekedésű, mint a közönséges nád. Késő nyáron és ősszel hozza a barna, selymes, tollas virágzatokat, amelyek a lombozat felett magasodnak.
Gondozási útmutató

Fényigény: A napos és a félárnyékos helyeket egyaránt kedveli.

Vízigény és talaj: Kizárólag nedves talajra vagy sekély vízbe ültetendő. Ideális ültetési mélység a 0-40 centiméter között van . A talaj típusa agyagos, homokos vagy iszapos is lehet, amíg vízelvezető.

Metszés: A tavasszal ajánlott visszametszeni a száraz hajtásokat, hogy helyet adjon az új növekedésnek.

Télállóság: A növény teljesen télálló, és magyarországi teleket problémamentesen átvészel.

Egyéb gondozás: Ajánlott a tápanyagpótlás lassan oldódó trágyával. Mivel a rizómái terjedhetnek, ültetőkosárba ültetve a legkönnyebb féken tartani a növekedését.

Ültetési javaslat
Ez a tarka nád fajta rendkívül sokoldalúan használható fel a vízközelű kertekben. Kiváló választás mocsári növényként, tó- és patakparti beültetésre, valamint vízimalom és medence szegélyezésére. Díszes megjelenése miatt szoliter növényként is kiemelkedő hatású.

Tarka levelű levendula	**Lavandula variegata 'Platinum Blond White'**	2 950 Ft	3 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Lavandula variegata 'Platinum Blond White' egy tarka levelű levendula fajta, ami különleges megjelenésével magára vonzza a tekinteteket. Az élénk, krémszínű szegéllyel körülvett mélyzöld levelek már önmagukban is dekoratív jelenséget nyújtanak, de amikor a növény virágozni kezd, a látvány még lenyűgözőbbé válik. Az illatos virágok és a színes levelek kombinációja elegáns és modern hatást kölcsönöz bármely kertnek. A növény nem csak vizuálisan vonzó, hanem az ismert levendula illatot is árasztja, amely nyugtató hatással bír.
Gondozási Útmutató:

Fényigény: A 'Platinum Blond White' napfénykedvelő növény, így napos helyre ültetése ajánlott.
Öntözés: Mérsékelt vízigényű. Hagyja, hogy a talaj felső rétege kissé kiszáradjon öntözések között.
Talaj: Jól lecsapolódó, meszes talajban érzi magát a legjobban.
Metszés: Virágzás után ajánlott visszametszeni, hogy ösztönözze a bokros növekedést és fenntartsa formáját.
Téli védelem: Fagyzugos területeken téli takarással védje a gyökérzetet.

Tarka levelű podagrafű, köszvényfű	**Aegopodium podagraria 'Variegata'**	1 450 Ft	1 750 Ft

Az Aegopodium podagraria 'Variegata' – tarka levelű podagrafű vagy köszvényfű – egy látványos talajtakaró évelő növény, amely változatos, krémszínű és zöld leveleivel díszíti a kerteket. A növény 30-50 cm magas, és sűrű, lágyszárú hajtásaival terjed, így ideális alapot képez más növények számára. A levelek zöld és krémszínű mintázatukkal tavasztól őszig vonzzák a figyelmet, különösen árnyékos helyeken, ahol más növények nehezen fejlődnek.
A 'Variegata' fajta szépsége a változatos lombozatban rejlik, amely segítségével színt és textúrát adhat a sötétebb területeknek. Nyáron a növény kis, fehér virágokat hoz, amelyek gyengédek, de vonzzák a méhek és más beporzók figyelmét.
Gondozási útmutató:

Fényigény: Az Aegopodium podagraria 'Variegata' részben árnyékos vagy árnyékos helyet kedvel. A teljes napfény elkerülése javasolt, mert a közvetlen napfény miatt a levelek színét elveszíthetik.
Talaj: A jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talaj ideális környezet. A növény jól tolerálja a különböző talajtípusokat, beleértve a nehezebb, agyagos talajokat is.
Öntözés: A rendszeres öntözés segít a növény növekedésében, különösen a nyári hónapokban. A talajnak mindig nedvesnek kell lennie, de kerülni kell az állóvizet.
Trágyázás: Tavasszal érdemes egy kiegyensúlyozott, lassú felszívódású műtrágyát alkalmazni, amely segít a növény fejlődésében.
Téliesítés: Télálló, de az őszi hónapok előtt érdemes visszavágni a leveleket, hogy friss hajtásokat hozzon tavasszal.

Felhasználási lehetőségek:

A tarka levelű podagrafű kiválóan alkalmas talajtakarónak, hiszen gyorsan betakarja a kertek talaját, ezzel meggátolva a gyomok növekedését.
Árnyékos területeken, fák alatt vagy kerítések mentén is remek választás.
Különböző színű és formájú virágokkal kombinálva szép kontrasztokat érhet el, ami gazdagítja a kert esztétikáját.

Az Aegopodium podagraria 'Variegata' nemcsak szép megjelenésével, hanem könnyű gondozásával is vonzó választás a kertekhez, ideális minden kertész számára, aki szeretné feldobni az árnyékos területeket.

Tarka nádtippan	**Calamagrostis × acutiflora 'Overdam'**	3 250 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Fedezze fel a Calamagrostis 'Overdam' Tarka Nádtippan különlegességét! Fehértarka levelekkel és szalmasárga virágokkal, tökéletes szárazságtűrő választás. Konténeres, egész évben ültethető példányokat küldünk!
Főbb jellemzők
Levelek: Zöld alapon fehértarka szegéllyel, UV hatására rózsaszínesedő. Virágzat: Szalmasárga, felálló kalászok (70-80 cm magas száron). Télállóság: -25°C-ig ellenálló. Egyediség: Meddő termés – nem terjed agresszíven.
Gondozási útmutató
Növény igényei:

Fény: Teljes nap (optimális) vagy félárnyék.

Talaj: Jó vízáteresztő, laza talaj (tűri az agyagos talajt is).

Öntözés: Szárazságtűrő (csak fiatalon igényel öntözést).

Metszés: Tavasszal visszavágás 5-10 cm magasra.

Ültetési tanácsok:

Társítás: Rudbeckia, Sedum vagy Liatris fajtákkal kontrasztért.

Használat: Évelőágyások, vízparti területek, szárazkötészet.

Ültetés: 40-60 cm tőtávolsággal.

Kiemelt előnyök
Több évszakos díszérték – levelek tavasztól, virágok nyártól télig. Alacsony karbantartás – betegség- és kártevőmentes. Szárazságtűrő – víztakarékos kertekbe ideális.

Téli dekoráció: Hagyja állni a szárakat – gyönyörű fagyos reggeleken.

Design ötlet: Kiválóan mutat kőburkolatok mellett vagy medencék szélén!

Ez a 'Overdam' nádtippan valódi gyöngyszem a modern kertek számára – rendelje meg most!

Tarka vízi harmatkása	**Glyceria maxima 'Variegata'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Glyceria maxima 'Variegata' a harmatkásafélék egyik leglátványosabb, legszínesebb változata. Ez az erőteljes, tarackos gyökerű vízi díszfű elsősorban feltűnő, csíkos lombjáért közkedvelt . A növény a vízparti kertek, tavak és patakok partjának igazi ékköve, ahol ragyogó színeivel egész szezonban felhívja magára a figyelmet . Tavasszal a frissen hajtó levelek gyakran erősebb rózsaszínes árnyalatúak, ami tovább növeli dekoratív értékét.
Külső megjelenés és kifejlett méret: A 'Variegata' habitusa tarackosan terjedő, laza bokrú , amely idővel nagyobb telepeket alkothat. Levelei hosszúkásak, szalagszerűek, szélük ép, fonákjuk érdes. Legfőbb dísze a lombozat márványozottsága: a leveleket krémsárga, fehér és néha halványrózsaszín csíkok tarkítják hosszanti irányban. Júliustól szeptemberig nyíló virágai laza bugavirágzatot alkotnak, színük zöldes, halványbíbor vagy barnás, a lombhoz képest kevésbé feltűnőek. A növény félörökzöld vagy lombhullató, hidegebb teleken visszahúzódik.

Magasság: A virágzó szárak magassága eléri a 80-130 cm-t.

Szélesség: Terjedése 100-250 cm is lehet, mivel gyorsan nő és tarackokkal hódít teret.

Igényei és gondozási útmutató:

Fényigény: Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban. Napos fekvésben a legszebb a lombozat színeződése.

Talaj: Minden nedves, vizes vagy mocsaras talajtípust kedvel . Kifejezetten jól érzi magát sekély vízben (akár 10-25 cm mélyen is) , de egyszerűen nyirkos kerti talajban is megél.

Ültetési mélység: Vízi környezetbe ültetve a gyökérzet legfeljebb 10-25 cm mélyre kerüljön a vízszint alá.

Öntözés: Folyamatos vízellátást igényel, talaja soha ne száradjon ki.

Télállóság (USDA-zóna): A növény rendkívül télálló, USDA 4-9 zónákban teleltethető biztonsággal. Magyarország teljes területén megbízhatóan áttelel.

Metszés és osztás:

Tavaszi visszavágás: Kora tavasszal (márciusban) érdemes visszavágni a növényt földközelben, hogy helyet adjunk az új, friss, élénk színű hajtásoknak .

Osztás: A növényt 2-4 évente érdemes tavasszal osztással felfrissíteni , mivel hajlamos kimerülni, és az osztással megőrizhetjük erejét és szép formáját .

Terjedésének korlátozása: Mivel a növény gyorsan terjed tarackjaival, és hajlamos lehet kiszorítani más, kevésbé agresszív növényeket, érdemes gyökércsapdában (pl. vízinövény-kosárban, vízhatlan falú edényben) nevelni, vagy rendszeresen visszavágni a terjedő hajtásokat . Magról is szaporodhat, de a 'Variegata' változat magoncai általában nem hozzák a tarka színezetet .

Ellenállóság: Betegségekre nem fogékony, kártevők nem támadják. Friss hajtásai azonban ciánglikozidokat tartalmazhatnak, ezért legeltetett területekre nem ajánlott.

Kertstílus és növénytársítások:
Élénk színű, feltűnő lombozata miatt sokféleképpen felhasználható:

Tavak, patakok partja: A vízparti sáv nélkülözhetetlen dísze.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Mocsárkertek: Nedves, mocsaras részek színesítésére ideális.

Vízi kertek konténerben: Vízinövény-kosarakban, akár kisebb tavacskákban is nevelhető.

Víztisztító növényként: Gyökérzete jól szűri a vizet, ezért természetes víztisztításra is alkalmazzák.

Évelőágyások nedves részein: Ha van a kertben egy állandóan nyirkos folt, ott magányosan vagy csoportosan ültetve remekül mutat.

Ajánlott növénytársítások:

Sötétlombú vízinövények: A tarka lombozat fantasztikusan kiemelkedik a sötétzöld vagy bordó levelű növények közül. Társítsuk nyílfűfélékkel (Sagittaria) vagy békaszőlőfélékkel (Potamogeton) .

Kék vagy lila virágú mocsári növények: A krémcsíkos lombozat szépen kiegészíti a kékes-lilás virágokat.

Sárga virágú mocsári növények: Üde, vidám kombináció a sárgával, például mocsári gólyahírral (Caltha palustris) vagy mocsári nőszirommal (Iris pseudacorus) .

Páfrányok: A könnyed, áttört lombozatú páfrányok, mint az struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris), szépen kiegészítik a harmatkása strukturális habitusát.

Díszfüvek: Társíthatjuk más, vízparti díszfüvekkel, például sással (Carex) a különböző textúrák játékához.

Tarkalevelű kamcsatkai varjúháj	**Sedum kamtschaticum variegatum**	1 950 Ft	1 950 Ft

A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' egy rendkívül vonzó és díszes talajtakaró növény, amely széles körben kedvelik kertészek és kerttulajdonosok. A 'Variegatum' fajtára jellemzőek a sötétzöld levelek, amelyeket fehér vagy krémszínű szélek szegélyeznek, és ez a színkombináció teszi rendkívül vonzóvá. A növény kicsi, csillag alakú, sárga virágokat hoz nyáron, amelyek tovább fokozzák a látványosságát. A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' ideális választás lehet kerti ágyásokba, sziklakertekbe, vagy akár konténernövényként is. Általában 10-15 centiméter magasra nő megfelelő gondozás mellett. A 'Variegatum' fajta a teljes napfénytől az enyhe félárnyékig terjedő környezetben jól fejlődik. A napsütés segíti a levelek színeinek kiemelését és a növény egészséges növekedését.
Gondozási útmutató:

Fény és elhelyezés: Helyezzük a növényt olyan területre, ahol naponta legalább 6-8 óra napfény éri. A növény a teljes napsütésben is jól érzi magát.

Öntözés: A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' egy szárazságtűrő növény, és nem igényel túlzott öntözést.

Talaj: A növény kedveli a jó vízelvezetésű talajt. Könnyű, homokos vagy kerti talajkeverék ideális a számára, amely lehetővé teszi a víz gyors lefolyását.

Tápoldat: A 'Variegatum' ritkán igényel tápoldatozást.

Metszés: A növény metszése ritkán szükséges, de a sérült vagy elszáradt részeket bármikor eltávolíthatjuk. Ez segít a növény rendezett és kompakt alakjának megtartásában.

A Sedum kamtschaticum 'Variegatum' egy kiváló választás a kertekbe, amely díszes színeivel és könnyű gondozásával vonzza a kertészeket. Egy megfelelően gondozott növény hosszú éveken át szépít és örömet szerez a kertedben.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Téli jázmin (karós)	Jasminum nudiflorum	9 900 Ft	10 300 Ft
Tengerparti fenyő, Parti fenyő	Pinus pinaster	14 500 Ft	14 500 Ft

A Pinus pinaster (Tengerparti fenyő) Franciaország dél-atlanti partvidékétől, Spanyolországon és Portugálián át, egészen Marokkóig honos, de Máltán is vannak őshonos állományai. Könnyen felismerhető, magas egyenes törzséről, vöröses kérgéről, illetve hosszú, vastag tűleveleiről. Gyors növekedése miatt elsősorban a mediterrán térség nyugati részén fontos erdészeti faj.
Tengerparti fenyő (Pinus pinaster) a fenyőfélék (Pinaceae) családjába tartozó, a Földközi-tenger nyugati medencéjében, különösen Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban (főleg Aquitániában) és Olaszországban őshonos örökzöld tűlevelű fa. A tengerparti fenyő nevét onnan kapta, hogy természetes élőhelyén gyakran a tengerparti homokdűnéken, száraz, homokos talajokon nő. Ez az impozáns fa kiváló választás nagyobb kertekbe, parkokba, ahol gyors növekedésével, impozáns megjelenésével és magas díszítőértékével hódít. A tengerparti fenyő kérge a borostyánszínű, gyantában gazdag faanyag miatt gazdaságilag is jelentős, Európában jelentős erdőket alkot belőle.
Kifejlett mérete és megjelenése: A tengerparti fenyő nagy termetű, 20-30 méter magas és 10-15 méter széles fa. Koronája fiatalon kúpos vagy tojásdad, idősebb korban szétterülő, szabálytalan, ernyőszerűvé válik, gyakran csak a törzs felső részén alakul ki korona. Törzse egyenes vagy kissé görbült, idősebb korban a kéreg vastag, vörösesbarna, mélyen repedezett, barázdált, jellegzetes, bordás megjelenésű. Levelei (tűlevelei) a növény egyik legjellegzetesebb részét képezik: hosszúak, 10-20 cm hosszúak, merevek, kissé csavarodottak, sötétzöld színűek, kettesével állnak a rövidhajtásokon. A tűlevelek élettartama 2-3 év. A virágok (tobozvirágzatok) tavasszal, április-május környékén nyílnak: a fa sárgásbarna porzós tobozokat (hímivarú) és kisebb, lilás termős tobozokat (nőivarú) hoz. A termések a tengerparti fenyő másik jellegzetességét adják: a tobozok nagyok, 8-20 cm hosszúak, kúpos vagy tojásdad alakúak, fényes barna színűek, keményen, a pikkelyek végén erős, kiálló tüske található. A tobozok második vagy harmadik évben érnek be, és akár évekig is a fán maradhatnak. A magvak szárnyasak, a szél terjeszti őket.
Igényei és gondozási útmutató: A tengerparti fenyő a legszebb formáját teljes napos, meleg, száraz fekvésben hozza. Napos helyen a lombozata sűrűbb, a fa formája szabályosabb. Kifejezetten fényigényes, árnyékban megnyúlik, gyérül. Talajban a jó vízelvezetésű, meszes vagy semleges, száraz, homokos, köves vagy sziklás talajokat kedveli. A pangó vizet, a túlzottan nedves, agyagos talajokat nem tűri. Fiatal korában némi öntözést igényel, amíg gyökérzete mélyre nem hatol. Idősebb korban kifejezetten szárazságtűrő, a nyári aszályokat is gond nélkül átvészeli. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szüksége, a szegény, homokos talajokon is jól fejlődik. Metszésre általában nincs szükség, csak az elhalt, sérült vagy beteg ágakat távolítsuk el késő télen vagy kora tavasszal. A tengerparti fenyő nem igényli a metszést, és a régi fáról nem hajt ki könnyen, ezért a formázó metszést fiatal korban érdemes elvégezni. Teleltetése Magyarországon a melegebb régiókban (például Budapest, Balaton környéke, Dél-Dunántúl) lehetséges, de a fiatal fákat érdemes az első években téli takarással (lomb, szalma, fólia) védeni a kemény fagyoktól. Hidegebb területeken konténerben nevelve, fagymentes, hűvös helyen teleltethető. Kártevők közül a fenyő-gubacstetű, a fenyő-csipkéspoloska, a fenyőpohók és a kéregtörő bogarak okozhatnak problémát. Betegségek közül a fenyőrozsda, a tűlevél-sárgulás és a gyökérrothadás (túlöntözés esetén) fordulhat elő.
Kertstílus és növénytársítások: A tengerparti fenyő méretéből és mediterrán karakteréből adódóan nagyobb kertekbe, parkokba, arborétumokba és tájkertekbe illik. Mediterrán kertekben a magyaltölgy, olajfa, ciprus, levendula és rozmaring társaságában a délies hangulatot erősíti, és a tengerparti szélnek is ellenáll. Tengerparti kertekben kifejezetten jól érzi magát, mivel kiválóan tűri a sós levegőt és a homokos talajokat. Szárazságtűrő (xeriscape) kertekben a víztakarékos kert egyik alapvető fája lehet. Tájkertekben és angolkertekben szoliter faként impozáns megjelenésével hívja fel magára a figyelmet. Homokos talajú kertekben kifejezetten ajánlott.
Változatos növénytársítások: Mediterrán fákkal és cserjékkel: A tengerparti fenyő mellé ültetett magyaltölgy (Quercus ilex), olajfa (Olea europaea), ciprus (Cupressus sempervirens), babérmeggy (Prunus laurocerasus) vagy pisztácia (Pistacia lentiscus) egy igazi déli kert hangulatát keltheti. Mediterrán évelőkkel: A fa tövébe vagy köré ültetett levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kakukkfű (Thymus vulgaris), zsálya (Salvia officinalis), szantolina (Santolina chamaecyparissus) és oregánó (Origanum) nemcsak a mediterrán hangulatot erősíti, de vonzzák a beporzó rovarokat is. Ezüstlevelű növényekkel: Az ezüstfa (Elaeagnus ebbingei), az ezüstös levelű körte (Pyrus salicifolia), a törpe ezüstakác (Acacia) vagy a tengerparti tátika (Limonium) mellett a tengerparti fenyő sötétzöld, kemény tűlevelei gyönyörű kontrasztot alkotnak. Szárazságtűrő talajtakarókkal: A fa alatti száraz, homokos részekbe ültethetünk varjúhájat (Sedum), kövirózsát (Sempervivum), meténget (Vinca minor) vagy kakukkfüvet (Thymus), amelyek szépen díszlenek a fa alatt. Díszfüvekkel: A fa mellé ültetett díszfüvek, mint a pampuszfű (Cortaderia selloana), a tollborzfű (Pennisetum) vagy a tengerparti árvalányhaj (Stipa) a mediterrán hangulatot erősítik.
A tengerparti fenyő kiváló választás azok számára, akik egy gyors növekedésű, impozáns, mediterrán hangulatú, rendkívül szárazságtűrő fát keresnek, amely a homokos, meszes talajú, tengerparti vagy szárazságtűrő kertekben is szépen fejlődik. USDA besorolása: 7-10.

7a-10b USDA-zóna

Texanum japán fagyal (kisebb)	Ligustrum japonicum 'Texanum'	3 950 Ft	4 450 Ft
Thuja occidentalis 'Tiny Tim'		3 950 Ft	3 950 Ft

Igen lassú növekedésű, apró termetű, szabályos gömb alakú, sötétzöld lombú fajta, sziklakertek ideális dísze!

Tölgylevelű hortenzia (nagyobb)	Hydrangea quercifolia	9 900 Ft	11 900 Ft
Tollas gyöngyvessző	Sorbaria sorbifolia	3 250 Ft	3 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
A Sorbaria sorbifolia (Tollas gyöngyvessző) az Uraltól Japánig nagy területeken honos, 1,5 m magasra növő, összetett levélzetű díszcserje. Fehér bugavirágzatai július-augusztusban nyílnak. Vízigényes faj, nedvesebb területek, vízpartok növényesítésére kiváló! 4a-8b USDA-zóna			
Törpe nőszirom	Iris pumila	1 950 Ft	2 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A törpe nőszirom Európától egészen Kazahsztánig honos, alacsony termetű évelő növény, amely a kert egyik legkorábbi virágzó évelője. A nemzetség legismertebb botanikai faja, amely a szakállas nőszirom (bearded irisek) ősének is tekinthető. A "pumila" név a latin "törpe" szóból ered, ami a növény alacsony termetére utal.
Külső megjelenés
Az Iris pumila egyik legkülönlegesebb tulajdonsága a szár hiánya. A virágok közvetlenül a gyöktörzsből (rizóma) kiinduló, 5-10 cm hosszú virágtömlőn ülnek, így a növény virágzó magassága mindössze 10-15 cm. A kard alakú, szürkészöld levelek sűrű, legyezőszerű tövet alkotnak, és a virágzás után is díszítik a kertet. A növény lassú növekedésű, bokrosodva terjed.
A virágok színei rendkívül változatosak: a fehér és halványsárga árnyalatoktól a világos- és sötétkék, levendula, bíborlila, egészen a mélyvörös és barna-bordó színekig terjednek. A lehajló, külső szirmokon (a "szakáll" alatt) gyakran található egy sötétebb folt vagy erezet, ami szintén nagy változatosságot mutat. A sziromlemez lehet egyszínű, vagy kontrasztos szegéllyel, erezettel. A porzós szálakon található "szakáll" színe (általában sárga, narancs vagy fehér) szintén a fajta jellemzője.
A virágzás kora tavasszal, áprilistól május közepéig tart, jellemzően a krókuszok és a hóvirágok után, de a tulipánok és a késői nárciszok előtt. A virágok illatosak, illatuk a kora tavaszi napfényben édeskés, kellemes.
Igényei és gondozási útmutató

Fényigény: napos, meleg helyet igényel. A napi legalább 6 óra közvetlen napfény elengedhetetlen a bőséges virágzáshoz és a növény kompakt formájának megtartásához. Félárnyékban kevesebbet virágzik, és lazább, kevésbé mutatós lombozatot nevel.

Talaj: jó vízáteresztő, laza szerkezetű, semleges vagy enyhén meszes kémhatású (pH 6,5-7,5) talajt kedvel. A növény a legjobban a homokos vályog vagy köves-sziklás talajokban érzi magát. A pangó vizet, a tömörödött, agyagos talajt nem tűri. Ültetés előtt célszerű a talajt durva homokkal vagy apró kaviccsal lazítani.

Öntözés: vízigénye alacsony vagy közepes. A növény jól tűri a rövid aszályos időszakokat, és kifejezetten érzékeny a túlöntözésre, a gyökérrothadásra. Fiatal növényeket a meleg, száraz időszakokban érdemes öntözni, de az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést nem igényelnek.

Tápanyag-utánpótlás: tápanyagigénye alacsony. Tavasszal, a virágzás előtt szórhatunk egy kevés komposztot vagy alacsony nitrogéntartalmú, lassú oldódású műtrágyát (pl. csontliszt) a növények tövébe. A túlzott nitrogén trágyázás a lombozat kárára megy, és gyengítheti a növény ellenálló képességét.

Metszés: rendszeres metszést nem igényel. Virágzás után az elnyílt virágokat és a virágszárakat a rizómánál le kell vágni, hogy a növény ne a magképzésre, hanem a következő évi virágbimbók fejlesztésére koncentráljon. Késő ősszel vagy kora tavasszal a régi, elszáradt leveleket is eltávolíthatjuk.

Osztás, szaporítás: A törpe nőszirom a rizómák osztásával szaporítható a legegyszerűbben. A legjobb időszak erre a virágzás utáni időszak (kora nyár) vagy kora ősz (augusztus-szeptember). A rizómákat 3-4 évente érdemes kiemelni, szétosztani, és új helyre ültetni, hogy a növény megőrizze vitalitását. Az elöregedett középső részeket el kell távolítani.

Ültetés: a rizómákat közvetlenül a talajfelszín alá, vagy úgy helyezzük el, hogy a rizóma teteje a talajfelszínen legyen. A rizóma nem szeret mélyen lenni, mert az rothadáshoz és a virágzás elmaradásához vezet. Ültetési távolság: egymástól 15-20 cm.

Telelés: kiemelkedően télálló, a szárazsággal és a hideggel szemben is ellenálló. USDA besorolása 3-9 (egyes források szerint 3-8). A fajta megőrzi zöld leveleit a tél beálltáig, és kora tavasszal új hajtásokat hoz. Külön védelmet nem igényel.

Kártevők, betegségek: Általában ellenálló. A leggyakoribb probléma a gyökérrothadás (puha rothadás) a rossz vízelvezetésű, pangó vizes talajban. A leveleken időnként rozsdagomba jelenhet meg, vagy levéltetvek támadhatják meg a hajtásokat.

Kertstílus, ahová illik
A törpe szakállas nőszirom mérete és igénytelensége miatt sokféle kerttípusba beilleszthető:

Sziklakertekbe: a legideálisabb választás. Alacsony termete és jó vízáteresztő talajigénye miatt tökéletes a kövek közé, rézsűk oldalára.

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Szegélyek elé: a virágágyások, sövények vagy ösvények szélére ültetve határolja a teret, és a kora tavaszi virágzásával felkelti a figyelmet.

Kőkertekbe, mediterrán kertekbe: jól passzol a szárazságtűrő, alacsony növekedésű növények közé.

Alacsony sövények vagy talajtakaró növények közé: lassan terjedő, bokrosodó habitusa jó talajtakaró is lehet.

Konténeres teraszokra, cserepekbe: a sekély gyökérzete miatt jól érzi magát cserépben is, ahol szabályozható a talaj összetétele és a vízellátás.

Változatos növénytársítások
A virágok gazdag színvilága és alacsony termete miatt könnyen kombinálható:

Lila és kék virágú évelőkkel: levendula (Lavandula), macskamenta (Nepeta), harangláb (Campanula) – a kora tavaszi nősziromot később ezek a nyári virágok váltják.

Alacsony, árnyéktűrő évelőkkel: tüdőfű (Pulmonaria), árnyékliliom (Hosta) – jól használhatók a növény tövében, hogy eltakarják a hervadó lombozatot.

Díszfüvekkel: kék csenkesz (Festuca glauca) – a kékesszürke lombozat szép textúrát ad a nőszirom mellett.

Tavaszi hagymásokkal: nárcisz, krókusz, gyöngyike – ezekkel együtt, egymás mellett is ültethetők, mivel hasonló a virágzási idejük.

Alacsony, napos évelőkkel: kakukkfű (Thymus), kőtörőfű (Saxifraga) – a szárazságtűrő, sekély gyökerű növényekkel harmonizál a legjobban.

Más nősziromfajtákkal: a később virágzó, magasabb fajták elé ültetve a törpe nőszirommal kiterjeszthetjük a virágzási időszakot.

USDA besorolása: 3-9 (Magyarország egész területén, 5b-7b zónákban biztonságosan nevelhető).

Törpe oszlopos gyertyán (nagy)	**Carpinus betulus 'Monumentalis'**	29 900 Ft	29 900 Ft
Törpe pampafű	**Cortaderia selloana 'Pumila'**	4 950 Ft	4 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Cortaderia selloana 'Pumila' a hatalmas termetű közönséges pampafű tömör és alacsony méretű változata. Töcsomókban növő évelő fű, amely 1-1.5 méter magasra és 1-2 méter szélesre nő. Keskeny, íves, sötétzöld levelei éles szélűek, ezért óvatos kezelést igényelnek. Legfőbb díszét a késő nyár és ősz folyamán megjelenő, krémszínű vagy ezüstfehér, hatalmas, tollas virágzatok képezik. Ezek a szárnyas, selymes kalászok akár 1.8 méter magasra is megnőhetnek, és száraz, napsütötte őszi napokon különösen varázslatosan festenek. Sokáig megmaradnak, így a kert téli képét is gazdagítják.
Gondozási útmutató
A Törpe pampafű egy rendkívül szívós és igénytelen növény.

Fényigény: A teljes napsütés az ideális számára, ahol a leggazdagabban fog virágozni. Tolerálja a szelet is.

Talajigény: Szinte bármilyen talajtípusban megél, legyen az agyagos vagy száraz, homokos talaj, amíg az jól vízelvezető. A pangó vizet nem kedveli.

Vízigény: Miután jól meggyökeresedett, jól tűri a szárazságot és a sót. Fiatal növényét a száraz időjárásban érdemes öntözni.

Metszés: A késő télen vagy kora tavasszal ajánlott visszametszeni. Vágjuk vissza a régi szárakat és halott leveleket, hogy helyet adjon az új hajtásoknak.

Télállóság: Jó fagytűrő, azonban az első évében a tél vége felé érdemis a növény tövét mulccsal vagy levelekkel beborítani a védelem érdekében.

Ültetési javaslat
A Törpe pampafű rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Szoliter növényként a legszebb hatást kelti, akár egy gyepben vagy egy nagy kő mellett.

Háttérnövényként évelőágyásokba ültetve kiemelkedő struktúrát ad.

Kis kertek számára is kiváló választás kompakt mérete miatt.

Társítás: Jól mutat más füvekkel, rozsnokkal (Rudbeckia) és örökzöld cserjékkel, például magyallal (Ilex) vagy juharokkal (Acer)

. A faj (selloana) névadója Friedrich Sellow, egy német felfedező aki a 19. század elején fedezte fel Dél-Amerikában (Argentínában). A Cortaderia selloana 'Pumila' (Alacsony pampafű) a pampafűvek legtűrőképesebb, legtélállóbb változata! Haragoszöld lombozata kisebb bokrot alkot, virágszárai is alacsonyabbak, bugái viszont alig kisebbek, mint nagyobb termetű rokonánál! Napos helyen, jó vízáteresztő talajban csodálatos szoliter! Egy kifejlett bokor akár 60 db óriási bugát is hozhat! Származási helyének éghajlata a szárazföldi (kontinentális) mérsékelt öv, forró száraz nyárral és hideg, kemény téllel. Erdős puszták, füves puszták öve. Nálunk lényegesen naposabb, melegebb éghajlatról származik, ezért kertünk azon részére ültessük, ahol a lehető legtöbb napfény éri. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, mert a pangó vizet nem bírja, ezért ha kertünk talaja kötött (agyagos), ebben az esetben folyami (szürke) homokkal kevert talajjal földeljük be ültetéskor. Öntözést kíván a nyári hónapokban, mert nálunk lényegesen nedvesebb éghajlatról származik és ha nem kapja meg nyáron a számára a növekedéshez szükséges vízmennyiséget, akkor a nyári aszályos időszak helyett a növekedési időszak áttevődik az őszi hónapokra, ezáltal a friss hajtásoknak nincs ideje beérni, ami a télállóságát rontja.

7a-9b USDA-zóna

Törpe széleslevelű ezüstfa	Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Totem karcsú európai ciprus (nagyobb)	**Cupressus sempervirens 'Totem'**	5 450 Ft	5 450 Ft
Tőtippan	**Eragrostis spectabilis**	3 450 Ft	3 450 Ft

A tőtippan laza, bokros növekedésű, évelő díszfű. Levelei vékonyak, szálasak, és sűrű tővet alkotnak. Fő díszét a nyár vége felatt megjelenő, rendkívül légies és felhőszerű virágzatok képezik. Ezek a lilás-rózsaszín vagy barnás-lilás bugák a zöld lombozat felett lebegnek, és akár 80 cm magasságba is fejlődhetnek. Ősszel a növény teljes megjelenése átalakul: a levelek sárgás-bronzos vagy vöröses árnyalatúvá válnak, a virágzatok pedig enyhe bézs színűre fakulnak.
Gondozási útmutató
A tőtippan egy különösen igénytelen és szívós növény, ideális kezdő kertészek számára is.

Szárazságtűrés: Kifejezetten szárazságtűrő, kiváló választás vízhiányos kertek számára. Már kifejlett növényként nincs szükség rendszeres öntözésre.

Metszés: A téli száraz lomb védi a növényt, és látványossá teszi a kertet télen is, ezért vágását csak kora tavaszra halasszuk. Ekkor a lombozatot a földszinthez közel vissza kell vágni, hogy helyet adjon az új hajtásoknak.

Szaporítás: A növény magról és gyöktörzseinek osztásával is jól szaporítható.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló a betegségekkel és a kártevőkkel szemben.

Ültetési javaslatok
A tőtippan rendkívül sokoldalúan használható fel a kertben.

Szoliter növényként is nagyon hatásos.

Préri- és sziklakertek nélkülözhetetlen alkotóeleme.

Évelőágyásokba ültetve kiváló háttér- és struktúranövény.

Tömeges ültetésben (akár 9 darab/négyzetméter) lenyűgöző, tájképi hatást érhetünk el.

Száraz virágként is felhasználható.

Ajánlott kerttípusok
A Eragrostis spectabilis jól illeszkedik az alábbi kerttípusokba:

Préri- és sziklakertek

Modern kertek

Természetes hangulatú kertek

Alacsony karbantartású kertek

Tremonia oszlopos páfrányfenyő (nagy)	**Ginkgo biloba 'Tremonia'**	24 900 Ft	25 500 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Tüdőfű	Pulmonaria longifolia	2 450 Ft	2 450 Ft

Atüdőfű (Pulmonaria longifolia) egy árnyéki évelő, mellyel szépen lehet fedni árnyékos területek talaját. Tőlevélrózsája évről évre növekszik, míg egy 30-40 cm széles csomót nem alkot. Levelei szinte teljes felülete ezüstös színű, csak a levéllemez szélén látható vékony zöldes sáv. Virágait tavasszal hozza, a virágok színe pedig egy tövön belül is változatos, a lila különböző árnyalataiban játszanak.
Kifejezetten árnyéki növény.
A nehezebb kötöttebb talajokon is megél, de a megfelelő talajokon természetesen szebben fejlődik.
Nedvesebb termőhelyi környezetet kíván, kiválóan mutat kisebb termetű árnyékliliomokkal, vöröses árnyalatú levelű tűzesőkkel, vinkákkal, árnyéki sásokkal.
Nem fagyérzékeny.

Tűzpiros Japán szentfa (nagy)	Nandina domestica 'Fire Power'	14 900 Ft	16 800 Ft
Újzélandi vászonfű	Phormium tenax	8 900 Ft	8 900 Ft

Az Újzélandi vászonfű egy tömör, tőrózsás növekedésű örökzöld évelő, amely merev, kard formájú leveleiről ismerhető fel. A levelek akár 2-3 méter hosszúak és 10-12 centiméter szélesek is lehetnek. Színe általában sötétzöld, de számos változat létezik bronz, bordó, lila, sárga, vagy akár csíkozott mintázatú levelekkel. Nyáron a lombozat felett magasodó, akár 4,5 méter magasra is megnövő virágzatot hoz. A virágok csöves formájúak, élénk vörös vagy sárga színűek, és jelentős mennyiségű nektárt termelnek, amely madarakat és rovarokat vonz.
Gondozási útmutató

Fényigény: A napos és a félárnyékos helyeket egyaránt kedveli. A napos helyen a legszebb színeződést éri el.

Talajigény: A jól vízelvezető talaj az alapvető követelmény. A laza, tápanyagban gazdag talajt részesíti előnyben, de meglehetősen alkalmazkodóképes.

Vízigény: Közepes vízigényű. Fiatalon és a száraz, meleg időszakban rendszeres öntözést igényel. Begyökeresedve mérsékelten szárazságtűrővé válik, de a pangó vizet egyáltalán nem tűri.

Télállóság: Korlátozottan fagytűrő. A források szerint -11°C-otvagy -15°C-ot is elvisel, de a magyarországi kemény teleken téli védelem szükséges!

Metszés: Alig igényel metszést. A legfontosabb karbantartási feladat a száraz vagy sérült levelek eltávolítása a tövéről.

Trágyázás: A növekedési szezonban (tavasztól nyár végéig) havonta egyszeri, komplex műtrágyázást igényel.

Ültetési javaslat
Az újzélandi vászonfű rendkívül sokoldalúan használható fel. Szoliter növényként kiemelkedő hatású a pázsit szélén vagy egy nagy kő mellett. Nagyobb csoportokba ültetve kiváló határvonalat vagy szerkezeti elemet alkot. Konténeres nevelésre is kiválóan alkalmas, így terasz és kerti dekorációként is felhasználható.
.

Veresgyűrű som	Cornus sanguinea	2 950 Ft	3 450 Ft

A veresgyűrűs som (Cornus sanguinea) Rendkívül edzett, szárazságtűrő cserje. 3-4 m-esre nőhet, erős illatú fehér virágai kis ernyőkben nyílnak május-júniusban. Lombozata ősszel liláspirosra színeződik. Vesszői különösen télen szembetűnőek, díszes bíborpirosak. Zóna:5a

Vesszős köles	Panicum virgatum	2 950 Ft	3 250 Ft

A vesszős köles (Panicum virgatum) egy 120-150cm magas évelő díszfű. Strapabíró, szárazságot is jól toleráló fűféle, mely jól jöhet nagyobb parki kiültetésekbe, nagyobb kertekbe háttérnövénynek, vagy akár térelválasztónak. Tavasszal ugyan érdemes erősen visszavágni, hiszen lombja nem örökzöld, de gyorsan felnő újra, és eléri az előző évi magasságát.
Lombszíne élénk zöld, vagy kékes, a kertészeti változatoknak ősszel sárgától a vörösig terjedhet a színeződése, az alapfaj inkább sárgásra színeződik.
Tápanyag dús, üde kerti talajokat kedveli.
Szárazabb periódusokat is jól átvészeli, de meghálálja az öntözést.
Napos fekvést igényel, árnyékban gyengén, ritkásan fejlődik.
Más díszfüvekkel, magas termetű évelőkkel Pl.: ernyős verbénával, cickafarkkal, kasvirágokkal, magasabb levendulával, rozmaringgal, díszgyertyákkal, magasabb őszirózsákkal, zsályákkal érdemes társítani.

Viridescens évelő tollborzfű	Pennisetum alopecuroides 'Viridescens'	2 450 Ft	2 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Levelei keskeny, ívesen hajló, sötétzöld színű, ősszel aranybarnára színeződik.Virágzata sűrű, tollas, zöldes-barnás bugák (augusztustól októberig), amelyek télen is díszítik a kertet. Magasság: 60-90 cm magasra nő, tömött, gömbölyded habitussal. Téli megjelenése romantikus, a száraz virágzatok és levelek a fagyban is díszesek maradnak.

Felhasználás és előnyök:

Dísznövény: Ültethető szoliterként, tömbökben vagy kevert ültetésekben, ahol textúrájával kontrasztot teremt.

Téli dísz: A száraz virágzatok és levelek télen is látványosak, különösen dér vagy hó borítása alatt.

Ökológiai érték: Magvai madarak táplálékául szolgálnak, virágzata méheket vonz.

Alkalmazás: Útperemek, kőkertek, medence mellé, vagy konténerbe ültetve is.

Ültetés és gondozás:

Fényigény: Napos helyet igényel a legszebb virágzásért, de félig árnyékos helyen is megél.

Talaj: Jó vízáteresztő, átlagos kerti talaj a legideálisabb. Nem tűri az állóvizet.

Öntözés: Fiatalon vízigényes, felnőtt korában szárazságtűrő.

Metszés: Tavasszal (március) vágja vissza a száraz részeket az új hajtások előtt.

Télvédelem: Magyarországon áttelelőképes, de fiatal példányokat érdemes lombbal vagy fóliával védeni.

Fontos megjegyzések:

Terjedés: Nem inváziós, tőrózsa formájú növekedésű, így könnyen szabályozható.

Betegségek: Ritkán érinti kártevő vagy gomba, de nedves talajon gyökérrothadásra hajlamos.

Társítás: Ültesse más füvekkel (pl. Miscanthus), őszi őszirózsákkal vagy lángoló színű őszi lombú növényekkel.

VitaNova	**Mikroelemes lombtrágya cukor keláttal**	3 700 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Mik is ezek a fontos mikroelemek?
Vas: hiányában kisárgulnak a levelek, klorózis alakul ki. Központi eleme a klorofillnak, ami a fényt köti meg a fotoszintézis során. Ekkor állít elő a növény vízből és széndioxidból cukrot. Lúgos, 7 feletti pH felett a növény nem tudja felvenni a talajból, így azt levélen kell pótolni. Különösen érzékeny a vas hiányra az áfonya félék, rhododendron, hortenzia, szőlő, paprika és paradicsom.
Réz: hiányában a levélcsúcsok kifehérednek. Fontos szerepe van az enzimatikus és hormonális folyamatokban.
Cink: hiányában a levelek kifehérednek és kicsik maradnak. Fontos szerepe van a fehérje és szénhidrát anyagcserében.
Mangán: hiányában gyengén fejlett lesz a növény. Fontos szerepe van pl. a fotoszintézisben és az auxin növényi hormon kialakulásában.
Molibdén: hiánya esetén a levelek sárgulnak és törpe lehet a növekedés. Kulcsszerepe van a nitrogén tápelem feldolgozásában. Különösen pillangós növények pl. bab, borsó és a káposztafélék esetén lehet végzetes a hiánya.
Bór: hiánya esetén torz lesz a növény növekedése. Rendkívül fontos szerepe van a sejtfal felépítésében és a virágzásban.

Vörös tündérvirág	**Epimedium 'Rubrum'**	3 950 Ft	4 250 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Vörös tündérvirág egy közepes termetű, tömör habitusú évelő növény, amely 25-35 cm magasra nő. Fő értéke a élénkvörös színű, kereszt alakú virágok, amelyek hosszú, íves szárakon nyílnak. A virágok április-május hónapokban nyílnak, és sárga központjuk kontrasztot alkot a vörös szirmokkal. A szív alakú levelek tavasszal vörösbarnák, nyáron zöldek vörös erezettel, ősszel pedig vörösre színeződnek. A növény rizómákkal terjed, szőnyegszerű takarót alkotva.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Árnyékos vagy félárnyékos helyen

Talaj: Jól vízáteresztő, humuszban gazdag talaj

Távolság: 30-40 cm-es távolsággal

Használat: Talajtakaró árnyékos helyeken, erdei kertek, fák alatti beültetések, szegélyültetések

Gondozási útmutató

Metszés: Tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágjuk vissza a tavalyi leveleket

Télvédelem: Teljesen télálló, különösebb védelem nem szükséges

Öntözés: Közepes vízigényű, a szárazságot jól tűri

Tápanyagutánpótlás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon ellenálló, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Erdei kertek

Árnyékos kertek

Japán stílusú kertek

Fásított terülek aljának beültetése

Városi zöldterületek

Parkok és nagyobb árnyékos terülek

Vöröslevelű japán juhar (közepes)	**Acer palmatum 'Atropurpureum'**	16 800 Ft	16 800 Ft
Vöröslevelű japán juhar (nagy)	**Acer palmatum 'Atropurpureum'**	29 500 Ft	29 500 Ft
Vörösödő végzetfa (kicsi)	**Clerodendrum bungei**	3 550 Ft	3 550 Ft
Vörösödő végzetfa (közepes)	**Clerodendrum bungei**	4 950 Ft	5 350 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Whirling Butterflies díszgyertya	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'	2 450 Ft	2 750 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Whirling Butterflies Díszgyertya (Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies') – A tiszta fehér, légies virágú évelő
A Whirling Butterflies díszgyertya a ligetszépefélék családjába tartozó, Észak-Amerika déli részéről, Texas és Louisiana prérijéről származó, évelő lágyszárú növény. A 'Whirling Butterflies' fajta az egyik legismertebb és legkedveltebb díszgyertya változat, amelyet a virágok tiszta fehér színe és a rendkívül bőséges, hosszan tartó virágzás jellemez. A fajta neve a virágok pillangószerű megjelenésére utal, amelyek a legkisebb szellőre is mozognak, mintha fehér pillangók táncolnának a növény felett. Ez a növény a késő tavasztól az őszig nyíló, tiszta fehér virágaival és légies, pillangószerű megjelenésével az egyik legkedveltebb évelő a modern, természetes hatású kertekben. A könnyű gondozhatósága, a rendkívül hosszú virágzási időszaka és a beporzók vonzása miatt kezdő és haladó kertészek számára egyaránt ideális választás.
Külső megjelenés és morfológiai jellemzők
A díszgyertya 'Whirling Butterflies' egy közepes növekedésű, bokros habitusú, évelő lágyszárú növény. Kifejlett magassága 60-120 cm, szélessége 60-90 cm között alakul, ami sűrű, bokros tövet eredményez. A növény töve fásodó, a hajtások egyenesen felállók, vékonyak, drótszerűek.
A levelek a növény alapvető díszítő elemei. A levelek keskenyek, lándzsásak, zöld színűek, gyakran vöröses foltokkal, és a száron váltakozva helyezkednek el. A lombozat egész szezonban dekoratív.
A növény legnagyobb díszét a virágzat és a virágok adják. A virágzat a hajtások végén kialakuló, hosszú, karcsú, laza fürt, amelyen a virágok egymás után nyílnak. A virágok 1,5-2,5 cm átmérőjűek, négy szirommal, tiszta fehér színűek, a bimbók halványrózsaszín árnyalatúak. A 'Whirling Butterflies' fajta legkiemelkedőbb tulajdonsága a virágok tiszta, hófehér színe és a rendkívül bőséges, folyamatos virágzás, amely a növényt egész nyáron át díszíti. A virágzási időszak a késő tavasztól a kora őszig tart: Magyarországon jellemzően májustól szeptemberig, de az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával a virágzás akár az első fagyokig is kitarthat. A virágok a legkisebb szellőre is kecsesen mozognak, mintha apró fehér pillangók táncolnának a növény felett. A virágok a méheket, a pillangókat és más beporzó rovarokat vonzzák.
Termés és szaporítás
A virágzást követően a növény apró, száraz toktermeséket fejleszt, amelyek a magokat tartalmazzák. A növény magról és vegetatív úton (dugványozással) egyaránt szaporítható. A díszgyertya rövid élettartamú évelő, ezért érdemes 2-3 évente megújítani a telepítést.
Termőhelyi igények és gondozási útmutató

Fényigény: A díszgyertya 'Whirling Butterflies' napos fekvést igényel; a legszebb, legdúsabb virágzást teljes napsütésben hozza. Félárnyékban a virágzás gyengébb lehet, és a növény felnyurgulhat.

Talaj: A növény nem igényes a talajra; a legjobban a jó vízáteresztő képességű, laza szerkezetű, homokos vagy kavicsos, tápanyagszegény, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajban érzi magát. Kifejezetten jól tűri a száraz, sziklás, köves talajokat. A pangó vizet, a nehéz, agyagos, vizenyős talajokat nem tűri; a téli nedvesség különösen veszélyes lehet.

Öntözés: A díszgyertya 'Whirling Butterflies' szárazságtűrő a begyökeresedés után; a mélyre hatoló gyökérzete lehetővé teszi a rövidebb száraz időszakok átvészelését. A fiatal, frissen ültetett növényeket a gyökérnövekedés első évében rendszeresen, mélyrehatóan kell öntözni. Az idősebb, begyökeresedett példányok külön öntözést alig igényelnek, a természetes csapadék általában elegendő számukra. A túlöntözés kerülendő.

Tápanyag-utánpótlás: A növény alacsony tápanyagigényű. Ültetéskor kerüljük a komposzt vagy tápanyagdús virágföld talajba keverését. Tápanyag-utánpótlásra általában nincs szükség.

Metszés és ápolás: A díszgyertya 'Whirling Butterflies' metszése fontos a bőséges virágzás és a növény rendezett megjelenése érdekében. Kora tavasszal erőteljes visszavágás javasolt, hogy serkentsük az egészséges, formás növekedést. A virágzási időszak alatt érdemes az elnyílt virágokat rendszeresen eltávolítani, ami serkenti az újabb virágbimbók képződését és meghosszabbítja a virágzási időszakot. A metszés elmaradása esetén a növény széteshet és kevésbé virágzik.

Telelés és fagytűrés: A díszgyertya 'Whirling Butterflies' mérsékelten télálló; az USDA 5-9-es zónákban nevelhető. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek, de a tartós fagyok és a téli nedvesség károsíthatják. Magyarországon (USDA 5-7-es zóna) a növényt érdemes védett, szélvédett helyre ültetni, és a fiatal példányok tövét télen mulccsal takarni. A konténerben nevelt növényeket télen védett, hűvös (5-10°C), világos, száraz helyre kell vinni.

Felhasználás a kertben (alkalmazási területek)
A díszgyertya 'Whirling Butterflies' a tiszta fehér virágzásának, közepes méretének, hosszú virágzási időszakának és sokoldalúságának köszönhetően az egyik legkedveltebb évelő a kertekben és parkokban:

Szegélyágyások előterébe, virágos ágyások szegélyeként – a közepes méret miatt kiváló előtér- vagy szegélynövény.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

Konténerekbe, cserepekbe, balkonládákba, teraszokra, erkélyekre – a kompakt méret és a bő virágzás miatt kiválóan nevelhető konténerben is.

Tömeges telepítésbe, természetes hatású kertekbe, prérikertbe, kavicskertekbe – a laza, sziklás, jó vízelvezető közegben ideálisan érzi magát, és a légies virágok természetes hatást keltenek.

Pillangó- és méhbarát kertekbe – a virágok kiváló nektárforrást biztosítanak a beporzók számára.

Vágott virágnak – a hosszú, karcsú virágszárak tartósak a vázában, és kiválóan alkalmasak csokrokba.

Változatos növénytársítások (társítási javaslatok)
A díszgyertya 'Whirling Butterflies' tiszta fehér virágai és finom, légies lombozata számos más, hasonló termőhelyi igényű (napos, jó vízelvezetésű, száraz talajú) növénnyel kombinálhatók:

Levendulával – a levendula lila virágai és ezüstös lombozata kiváló kontrasztot alkot a fehér virágokkal, és erősíti a mediterrán hangulatot.

Zsályával és macskamentával – a kék és lila virágok harmonikus, friss párost alkotnak a fehér díszgyertyával.

Kasvirággal és kúpvirággal – a rózsaszín, bíbor és sárga virágok színpompás, kontrasztos hatást keltenek.

Díszfüvekkel: Tollbugával, árvalányhajjal – a díszfüvek lágy, mozgó habitusa kiválóan kiegészíti a díszgyertya légies, pillangószerű virágait.

USDA besorolása: 5-9 (Magyarországon a díszgyertya 'Whirling Butterflies' mérsékelten télálló; az USDA 5-ös, 6-os és 7-es zónáiban a jó vízelvezetésű talajban és szélvédett helyen takarással áttelelhet. A kifejlett példányok akár -20°C és -25°C közötti hőmérsékletet is elviselnek. Kizárólag a pangó vizes, belvizes, nehéz agyagos talajú területeken okozhat problémát a téli felázás, nem pedig a fagy.)

Wide Brim árnyékliliom	**Hosta 'Wide Brim'**	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Hosta Wide Brim levelei szív alakúak és jellegzetes zöld-fehér mintázattal rendelkeznek. A levél széle fehér szegéllyel van körülvéve, ami szép kontrasztot alkot a zöld hátterrel. Általában 30-45 cm magasra nő, és akár 60-90 cm széles is lehet, ami kitűnő talajtakaró növény. A Hosta Wide Brim nyáron virágzik. Virágai csodálatos lila árnyalatúak, és vonzzák a méheket és a pillangókat. Ez a fajta hosta rendkívül jól tűri az árnyékos körülményeket, és kevésbé érzékeny a káros rovarokra és betegségekre.
Gondozási útmutató:

Fényigény: A Hosta Wide Brim nagyon jól tűri az árnyékos vagy félig árnyékos környezetet. Ügyeljünk rá, hogy ne érje közvetlen napfény, mivel a túl sok napfény károsíthatja a leveleket.

Talaj: Gazdag, laza és jó vízelvezetésű talaj ideális a hosta számára. Kiegészíthetjük szerves anyaggal, például komposzttal, hogy a növény jól fejlődjön.

Öntözés: A Hosta Wide Brim szereti a nedves talajt, de ne locsoljuk jól. Rendszeresen öntözzük, hogy a talaj mindig enyhén nedves maradjon.

Trágyázás: Tavasszal adjunk neki egy lassan oldódó műtrágyát, hogy elősegítsük a növekedését. Ezt évente egyszer ismételhetjük meg.

Tavaszi metszés: Tavasszal távolítsuk el a régi, elszáradt leveleket, hogy elősegítsük az új hajtások növekedését.

Téli védelem: Az erős fagyoktól való védelem érdekében takarjuk le a növényt ulccsal, száraz levelekkel vagy fenyőágakkal.

Betegségek és kártevők: A Hosta Wide Brim ellenállóbb a betegségekkel és kártevőkkel szemben, de figyeljünk az esetleges csigákra és levéltetvekre.

Yaku Jima kínai virágosnád	**Miscanthus sinensis 'Yaku Jima'**	3 250 Ft	3 550 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

A Yaku Jima kínai virágosnád (Miscanthus sinensis 'Yaku Jima') a vadon élő kínai virágosnád törpe, kompakt változata, amely Japánban, a Yaku Jima szigetén őshonos formákból származik. Sűrű, kerekded, szökőkút alakú tövet képez, amelynek keskeny, ezüstös zöld levelei elegánsan lehajlanak. Kifejlett magassága általában 90–120 cm, virágzáskor a virágzatokkal együtt elérheti a 150 cm-t, szélessége 100–150 cm között alakul. Levelei keskenyek, finoman fogazott szélűek, középső erezetük fehéres, ősszel aranysárgára, majd barnára színeződnek. Virágzata laza, tollas buga, amely késő nyáron, augusztustól októberig nyílik; a virágok eleinte rózsás árnyalatúak, majd ezüstös-barnává válnak, és télen is díszítőértékűek maradnak. A növény habitusa kompakt, rendezett, így kiválóan alkalmas kisebb kertekbe és konténeres termesztésre is.
Igényei

Fény: Teljes nap az ideális; a félárnyékot is elviseli, de árnyékos helyen a tövek megnyúlhatnak és hajlamosak lehetnek a szétesésre.

Talaj: Jó vízáteresztő, közepesen nedves, homokos vagy vályogos talajt kedvel. A pangó vizet nem tűri, de a szárazságot és a városi körülményeket is jól viseli.

pH: Enyhén savas, semleges vagy enyhén lúgos kémhatáson egyaránt megél.

Vízigény: Közepes; a kifejlett növény a szárazságot jól tűri, de homokos talajon a nyári rendszeres öntözést meghálálja. Az első szezonban a megerősödéshez rendszeres öntözés javasolt.

Télállóság: Kiválóan fagytűrő, a legtöbb forrás szerint –29 °C-ig (USDA 5. zóna) elviseli a fagyokat, így a magyarországi klímán különösebb védelem nélkül áttelel.

Gondozási útmutató

Ültetés: Tavasszal vagy kora ősszel ültesse napos, jó vízáteresztő helyre. Az ültetőgödörbe keverjen komposztot a jobb talajszerkezet érdekében. A növények közötti távolság legalább 80–100 cm legyen a szellős, kompakt tövek kialakulásához.

Öntözés: Az első szezonban rendszeresen öntözze, amíg a növény megerősödik. Később a természetes csapadék általában elegendő; hosszan tartó aszály idején mérsékelt öntözés javasolt, különösen homokos talajon.

Tápanyag: Tavasszal egy kevés komposzt vagy lassú felszívódású díszfű-trágya elegendő. Túlzott trágyázásra nincs szükség, mert a dús talaj a tövek szétesését és a szárak megdőlését okozhatja.

Metszés: A száraz lombozatot kora tavasszal, az új hajtások megjelenése előtt vágja vissza a talajszint közelében. Ősszel ne metssze, mert a téli díszítőérték és a téli védelem miatt a száraz levelek a növényen maradhatnak.

Átteleltetés: Különleges védelemre nincs szükség; a növény teljesen télálló. A téli pangó víz azonban károsíthatja, ezért a talaj vízáteresztő képességére érdemes ügyelni.

Betegségek és kártevők: Általában ellenálló és kártevőmentes. Ritkán a rozsda vagy a levélfoltosság jelentkezhet; a jó szellőzés és a megfelelő tőtávolság segít megelőzni a gombás betegségeket. Az őzek és a nyulak általában elkerülik.

Kerti stílus
Ez a díszfű leginkább szoliterként, kis kertekbe, évelőágyba, cottage- és informális kertekbe, préri stílusú ültetésekbe, valamint modern, strukturált kompozíciókba illik. Kompakt mérete miatt kiválóan alkalmas konténeres termesztésre is, ahol a szökőkút alakú habitus és a finom levéltextúra érvényesül. Kiváló vágott virág, és a téli kertben is megőrzi dekoratív értékét. Jól mutat nagy levelű évelők mellett, amelyekkel szép textúrakontrasztot alkot.
Növénytársítások

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár
Késő nyári és őszi évelők: varfű, kúpvirág, őszirózsa, naprózsa – hasonló virágzási idővel és igényekkel gazdagítják a kompozíciót.			
Fűfélék: csenkesz, árvalányhaj, sásfajok – változatos textúrával egészítik ki a kínai virágosnádat.			
Illatos és fűszeres növények: levendula, zsálya, kakukkfű – szárazságtűrők, és illatukkal gazdagítják a kertet.			
Hagymások: krókusz, nárcisz, tulipán – korai színfoltot hoznak a díszfű virágzása előtt.			
Konténeres társak: verbéna, balkonpetúnia, napvirág – cserépben és konténerben szép kontrasztot alkotnak.			
USDA télállósági zóna: 5-9.			
Zebrafű	**Miscanthus chinensis 'Zebrinus' Zebrafű**	3 950 Ft	4 450 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.

Terméknév	Latin név	Eladási ár	Lista ár

A Zebrafű egy lenyűgöző, kevés gondozást igénylő évelő növény, melyet csíkos levelei tesznek egyedivé. A növény 150-200 cm magasra és szélesre is megnő, így kiemelkedő pontot alkothat a kertben.
Ültetési javaslat

Elhelyezés: Teljes napon vagy részleges árnyékban

Talaj: Jól vízáteresztő, átlagos kerti talaj

Távolság: Legalább 1-1,5 méter térhagyás mellett

Használat: Szoliterként, csoportosítva, háttérnövényként vagy konténerben

Gondozási útmutató

Metszés: Késő télen vagy korai tavasszal vágjuk vissza a földhöz közel

Télvédelem: Fiatal növényeket fagyos teleken takarjunk be

Öntözés: Csak elültetés után és tartós szárazság idején

Táplálkozás: Tavasszal komposzttal vagy lassú hatású műtrágyával

Általános: Nagyon egyszerűen tartható, betegségekre és kártevőkre nem hajlamos

Ajánlott kerttípusok

Modern kerti tervek

Természetes hatású kertek

Mediterrán stílusú kertek

Városi kertek és zöldterületek

Vízi partjának díszítése

Zöld terülő tiszafa (nagyobb)	**Taxus baccata 'Zöld'**	3 950 Ft	3 950 Ft

Ez a bizonylat az Overflow Kft. rendszerével készült.